# 四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

# 四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

# 子部第一三七冊目次


三因極一病證方論十八卷　（宋）陳言撰　宋刻本　〇〇一

新刊仁齋直指方論二十六卷小兒方論五卷醫脈真經一卷

傷寒類書活人總括七卷　（宋）楊士瀛撰　宋景定元年至五年環溪書院刻本　一七八

新刊河間劉守真傷寒直格三卷　（金）劉完素撰　元天曆元年建安翠巖精舍刻本　四四四

傷寒標本心法類萃二卷　（金）劉完素撰　明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本　四六九

素問病機氣宜保命集三卷　（金）劉完素撰　明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本　四九〇

# 三因極一病證方論十八卷

（宋）陳言撰

宋刻本

三因極一病證方論十八卷大學士英廉家藏本

宋陳言撰。言字無擇，青田人。是書分別三因，歸於一治。其說出金匱要略。三因者，一曰內因，爲七情，發自臟腑，形於肢體。一曰外因，爲六淫，起於經絡，舍於臟腑。一曰不內外因，爲飲食飢飽，叫呼傷氣，以及虎狼毒蟲，金瘡壓溺之類。每類有論有方，文詞典雅而理致簡該，非他家鄙俚冗雜之比。蘇軾傳聖散子方，葉夢得避暑錄話極論其謬，而不能明其所以然。言亦指其通治傷寒諸證之非，而獨謂其方爲寒疫所不廢，可謂持平。吳澄集有易簡歸一序，稱近代醫方惟陳無擇議論最有根柢，而其藥多不驗。嚴子禮剽取其論，而附以平日所用經驗之藥，則兼美矣。是嚴氏濟生方其源出於此書也。宋志著錄六卷，陳振孫書錄解題亦同。此本分爲十八卷，蓋何鉅所分。第二卷中太醫習業一條，有五經二十一史之語，非南宋人所應見。然證以諸家所引，實爲原書。其詞氣亦非近人所及。疑明代傳錄此書者不學無術，但聞有廿一史之說，遂妄改古書，不及核其時代也。

妙賞樓藏
高氏鑒定宋刻版書

余紹興辛巳爲葉表
方六卷前叙陰陽病
因之說集註脈經類分八十一門
方幾千道題曰條源指治伯材
行歿得書於託貴人刊行未幾亦
世遂已淳熙甲午復與友人湯歿
德遠、慶德夫論及醫事之要無出
三因辨因之初無踰脈息遂舉脈
經曰關前一分人命之主左爲人
迎右爲氣口蓋以人迎候外因氣
口候內因其不應人迎氣口皆不
內外因儻識三因病無餘蘊故曰

醫之之要無出此也因編集蕪目
諸方類分一百八十門得方一千
五十餘道題曰三因極一病源論
粹或曰現行醫方山積徒可指示
何用此為殊不知晉漢所集不識
時宜或詮次溷淆或附會雜揉古
文簡脫章旨不明俗書無經性理
乖謬庸醫妄用無驗者傷不削繁蕪
莫知樞要乃辨論前人所不了
義無幾闡古賢之蹊徑為進學之
梯階俟夫見有志指于也於是乎
處青田鶴溪陳　言　無擇序

# 三因極一病證方論總目


○卷之一
脉經序　學診例　總論脉
三部分位　六經所屬　五臟所屬
五臟本脉體　六經本脉體　五臟傳變病脉
六經中傷病脉　五用乖違病脉　脉偶名狀
七表病脉　八裏病脉　九道病脉
○卷之二
太醫習業　五科凡例　紀用備論
臟腑配天地論　三因論　外所因論
敘中風論　敘中風證　中風治法
生薑生附湯　白散子　紅龍散
神異溫風丹　排風湯　小續命湯
獨活丹湯　三黃湯　小竹瀝湯
燒竹瀝法　獨活散　雄朱圓
仁壽圓　鐵彈圓　活絡通經圓
烏藥順氣散　舒筋保安散　松節散
芎桂散　趂風膏　附子酒
小黃芪酒　仙酒方
料簡類例　不內外因中風凡例
附子摩頭散　麋銜湯　附子湯
敘中寒論　五臟中寒證　中寒治法
附子理中湯　乾薑附子湯
敘中暑論　中暑治法　大黃龍丸
中暑凡例　敘中濕論　中濕治法
白朮酒

四氣兼中諸論　四氣治法
附子湯　防風湯　生附白朮湯
附子麻黄湯　苓朮湯

巻之三

叙痺論　合痺治法
附子湯　黄耆五物湯　黄耆酒
歴節叙論　歴節治法　芍藥知母湯
烏頭湯　附子八物湯　獨活寄生湯
叙脚氣論　叙千金論　脚氣脉證
太陽經脚氣證　太陽經脚氣治法
麻黄左經湯
陽明經脚氣證　陽明經脚氣治法
大黄左經湯　荷葉藁本湯
少陽經脚氣證　少陽經脚氣治法
半夏左經湯
料簡三陽并合脚氣證　三陽并合脚氣治法
神祕左經湯　加味敗毒散
太陰經脚氣證兼治法　六物附子湯
少陰經脚氣證兼治法　八味圓
厥陰經脚氣證兼治法　神應養真丹
料簡三陰并合脚氣證兼治法　抱龍圓
川膝煎　十全丹　乳香宣經圓
大犀角湯　四蒸木瓜圓　追毒湯
脚氣總治　烏藥平氣湯　紫蘇子湯
木瓜牛膝煎　茱萸圓　黒附圓
木通散　白皮小豆散　勝駿圓
加減法　换腿圓

巻之四

叙傷風論　傷風證治
太陽經桂枝湯　陽明經杏子湯　少陽經加桂湯
太陰經芍藥湯　少陰經桂附湯　厥陰經八物湯
叙傷寒論　傷寒辨證　傷寒證治
太陽經麻黄湯　小青龍湯　温粉　大青龍湯
陽明經承氣湯　大柴胡湯
少陽經小柴胡湯
太陰經治中湯　五積散　順元散
少陰經附子細辛湯
厥陰經麻黄散　大承氣湯　小建中湯
傷寒傳變次序　料簡　六經傷寒用藥
温脾圓
三陽合病脉證治　葛根湯
兩感證論并治法　四逆湯　兩感治法料簡
陰毒證治
附子散　返陰丹　葱熨發法
陽毒證治
升麻湯　梔子仁湯
結胷證治
大陷胷湯　小陷胷湯　大陷胷圓
胷痞證治
枳實理中圓　桔梗枳殼湯　三黄湯
半夏瀉心湯
勞復證治　白朮散

陰陽易證治　燒裩散　猳鼠糞湯
發斑證治　玄參升麻湯
○卷之五
壞傷寒證治
知母麻黃湯　無憂散　黑奴圓
狐惑證治
桃仁湯　黃連犀角湯　雄黃兌散
譫語證治
四逆湯　大承氣湯　小柴胡湯
病後虛煩證治
人參竹葉湯　橘皮湯　料簡
傷暑叙論　傷暑證治
却暑散　五苓散　桂苓圓
香薷圓　消毒圓
傷濕叙論　傷濕證治
腎着湯　滲濕湯
寒濕證治　麻黃白朮湯
風濕證治　桂枝附子湯
風濕寒證治　防己黃耆湯
風濕溫證治　白朮茯苓乾薑湯
暑濕風溫證治　茯苓白朮湯　葳蕤湯
君火論　五運論　運氣民病證治
苓朮湯　麥門冬湯　附子山茱萸湯
牛膝木瓜湯　川連茯苓湯　蓯蓉牛膝湯
黃耆茯神湯　白朮厚朴湯　紫菀湯
五味子湯

六氣叙論　本氣例　六氣時行病證治
靜順湯　審平湯　升明湯
備化湯　正陽湯　敷和散
六氣凡例
卷之六
叙疫論　四季疫證治
青筋牽一方　赤脈攢　黃肉隨一方
白氣貍二方　黑骨溫二方
料簡疫證治　屠蘇酒　太一流金散
敗毒散　虎夢人參散　雄黃丸
入瘴氣法　聖散子　凡例
茯苓散　桂枝黃芩湯　伏璽湯
瘧叙論　瘧病外所因證治
白虎加桂湯　朮附湯　麻黃白朮湯
大醫常山飲　桂薑湯
瘧內所因證治　七棗湯　四獸飲
交解飲　草菓飲　勝瘧飲子
瘧不內外因證治　麻黃白朮湯　破瘧丹
大正氣散　清脾湯　常山飲
老瘧飲　紅圓子　妙應丹
紅散子　瘧丹二方　塞耳丹
卷之七
叙汗論　諸汗證治
烏頭桂枝湯　走馬湯　桑子散
葱白散　失笑散　沛嚏散
大烏頭湯　牡丹圓　小茴香圓

苦練圓 補骨湯
叙厥論 六陽厥脉證治
四逆湯 白虎湯 承氣湯
卒厥尸厥脉證治 追魂散 內鼻散
眩暈證治 大豆紫湯 三五七散
黃龍圓 鐵术散 著頂湯
白散子 芎藭湯 黑錫丹
痓叙論 痓叙例治法
括撲桂枝湯 葛根麻黃湯 大承氣湯
參桂湯 倉公當歸酒
寒濕風濕治法
防風散 牡蠣散 香脲散
〇卷之八
內所因論 內所因治說
肝膽經虛實寒熱證治 瀉肝湯
瀉膽湯 補肝湯 溫膽湯
心小腸經虛實寒熱證治 瀉心湯
清脉湯 茯苓補心湯 分氣補心湯
溫脾湯
脾胃經虛實寒熱證治 清脾湯
平胃湯 補脾湯 養胃湯
肺大腸經虛實寒熱證治 清肺湯
瀉白湯 補肺湯 固腸湯
腎膀胱經虛實寒熱證治 清源湯
瀉浮湯 溫腎散 補浮湯
心主三焦虛實寒熱證治 清膻湯
潤焦湯 益志湯 安中散
第三焦精府辨正 痼冷積熱證治 金液丹
震靈丹 凉膈散 洗心散
五積證治 一百四十 肥氣圓 伏梁圓
痞氣圓 息賁湯 奔豚湯
六聚證治 大散聚湯
息積證治 磨積圓 化氣湯
導引法
五勞證治 豬膏湯 二百五十 虎骨酒
甜熱湯 定心湯 半夏湯
茱萸膏 引氣湯 人參厚朴湯
梔子湯 五加皮湯
六極證治 筋脉皮肉骨髓六極皆緣起有之六極之
羊角地黃湯 六百十七 烏麻酒 地黃湯
防風圓 石南散 大黃耆湯
前胡湯 鍾乳散 竹葉湯
磁石圓 二百六十三 二黃圓 犀角圓
七氣叙論 七氣證治 喜怒憂思悲恐驚
二百七十 七氣湯 大七氣湯
五噎證治 五噎散 沉香散
嘉禾散 𦠆津圓 氣憂勞思食
五膈證治 五膈圓 一百七 寬膈圓
嘉禾散 沉香散 憂思怒喜恐
〇卷之九
胷痞證治
括樓圓 橘皮生薑湯 一百八十 梔子湯

健忘證治　小定志圓　菖蒲益智圓
虛煩證治
淡竹茹湯　溫膽湯　酸棗仁湯
五痿敘論　五痿證例　五痿治法
加味四斤圓　鹿角圓　上丹
衛生湯　中丹　小丹
苦桂散　藿香養胃湯　雙血筋骨圓
失血敘論　外因衄血證治　桂枝湯
麻黃升麻散　五苓散　除濕湯
內因衄血證治　止衄散
不內外因證治
加味理中湯　花蕊石散　白及散
三因吐血證治　桂枝栝樓湯　五苓散
除濕湯　金屑丹
傷胃吐血證治　理中湯
肺疽吐血證治　二灰散
折傷吐血證治　加味芎藭湯
折傷瘀血證治　雞鳴散
病餘瘀血證治　犀角地黃湯
汗血證治　葎草汁
便血證治　伏龍肝湯　當歸赤小豆湯
風痢下血證治　胃風湯　料簡
尿血證治　髮灰散　玉屑膏
癥瘕證治　大硝石圓　小三稜煎
三聖圓　一握七圓　妙應丹
癲癇敘論　癲癇證治
六珍丹　礬丹
蛇黃丹　凡例　大鎮心丹
狂證治
鎮心丹　大補心丹　礬丹
九痛敘論　外因心痛證治　內因心痛證治
不內外因心痛證治　三因心痛總治　蜜附湯
麻黃桂香湯　加味小建中湯　雞舌香散
訶子散　九痛圓　蘇合香圓
撞氣阿魏圓　倉卒散　失笑散
卷之十
勞瘵敘論　勞瘵諸證　勞瘵治法
取勞虫法　神授散　潤神散
溫金散　蛤蚧散　蘇合香圓
疰忤中惡證治
還魂湯　桃奴圓　蘇合香圓
蠱毒敘論　中蠱證治　丹砂圓
凡例
礬灰散　解毒圓　青黛雄黃散
蛇虫傷治法　白芷散　白礬半夏散
五絕治法　半夏散　牡丹散
救自縊法　救壓死法　雞鳴散
活血丹　接骨散　花蕊石散
救溺死法
驚悸證治　溫膽湯　鎮心丹
定志圓　寒水石散
自汗證治　正元散　牡蠣散

麥煎散　桂枝湯　卻暑散
防已黃耆湯　止汗溫粉
消渴敘論　三消脉證　三消治法
眞珠圓　栝蔞圓　薑粉散
附子猪肚圓　烏金散　鬱金圓
石子薺苨湯　黃連猪肚圓　胡桃圓
古瓦湯　鹿茸圓　遠志圓
六神湯　桑白皮湯　玄兔丹
梅花湯　猪脊湯　八味圓
文蛤散　烏梅木瓜湯　羊乳圓
忍冬圓　麥門冬煎　竹龍散
澄源丹　料簡
五疸敘論　黃汗證治
桂枝黃耆湯　黃耆苦酒湯
黃疸證治　麻黃淳酒
穀疸證治　穀疸圓　紅圓子
酒疸證治　半夏湯　二石散
桂朮湯　當歸白朮湯　人參飲
如神散
女勞疸證治　滑石石膏散　消石礬石散
雜勞疸證治　茵陳梔子圓　艾煎圓
五苓散　礬石滑石散　苦參散
小半夏湯　養榮湯
○卷之十一
脹滿敘論　脹滿證治　大半夏湯
千金溫胃湯　附子粳米湯　七物厚朴湯

赤圓　麝香綿灰散　溫中湯　料簡
霍亂敘論　霍亂諸證　霍亂外因治法
理中湯
外因料簡　霍亂內因治法　七氣湯
胃氣圓　眞珠散
不內外因治法
紅圓子　胡椒湯　訶子散
霍亂凡例　木瓜湯　茯苓澤瀉湯
水浸丹　鹽湯
嘔吐敘論　寒嘔證治
四逆湯　生硫黃圓　靈液丹
熱嘔證治　小柴胡湯　胃苓圓
痰嘔證治　大半夏湯　茯苓澤瀉湯
食嘔證治　大養胃湯　治中湯
血嘔證治　茯苓湯　當歸湯
氣嘔證治　茱萸人參湯　藿香湯
漏氣證治　麥門冬湯
走哺證治　人參湯　厚朴湯
三物猪苓湯　凡例
噦逆論證　噦治法
橘皮竹茹湯　羌活散　丁香散
䭇咽證治　麯朮圓　五百圓
欝氣敘論　木香圓
欝氣治法　如神木香圓　感應圓
泄瀉敘論　寒虛泄瀉治法
桂香圓　香朴圓　建脾圓

荳蔻分氣飲　芋肉扶脾丸　川椒圓
實熱泄瀉治法　小承氣湯
冷熱泄瀉治法
博濟香薷散　建脾散　止瀉如神圓
戊己圓　補脾散　料簡

○卷之十二

滯下叙論　滯下三因證治　白頭翁湯
桃花圓　胃風湯　露宿湯
苦散　駐車圓　萬金散
固腸丸　三聖圓　斷下湯
厚腸湯　水煮木香圓　料簡
秘結證治　神功圓　麻子仁圓
半硫圓　胃氣圓　蜜兌法
脫肛證治　蝟皮散　香荊散
鐵粉散　水聖散子　又洗法
淋閉叙論　淋證治　生附散
石韋散　地膚子湯　鹿角霜圓
葎草汁　立效散　石燕圓
瞑眩膏　沉香散　髮灰散
猪苓散　五苓散　料簡
遺尿失禁證治　家韭子圓　阿膠飲
張真君茯苓圓　雞內金散
九蟲論　九蟲例　九蟲治法
烏梅丸　集效圓　化蟲圓
檳榔散
咳嗽叙論　外因咳嗽證　內因咳嗽證

不內外因咳嗽　咳嗽治法
華蓋散　五味子湯　白朮湯
丁香烏梅圓　人參散　太白丹
阿膠散　平氣散　杏仁煎
蛤蚧散　款冬花散　白散子
青金丹　應夢人參散　神效散

○卷之十三

痰飲叙論　痰飲證論　痰飲治法
十棗湯　大青龍湯　小青龍湯
防己桂枝湯　小承氣湯　茯苓五味子湯
大半夏湯　小半夏湯　葶藶大棗湯
五苓散　茯苓湯　參苓飲
八味圓　參蘇飲　破飲圓
控涎丹　強中圓　凡例
喘脉證治　杏參散　神秘散
真應散　麥門冬湯　清肺湯
神秘湯　皺肺圓　理氣圓
黑錫丹　白散子
肺痿肺癰叙論　肺痿證治　溫液湯
甘草乾薑散　人參甘草湯　小青龍湯
肺癰證治　葶藶瀉肺湯
如聖湯　葦葉湯
腰痛叙論　外因腰痛論　內因腰痛論
不內外因腰痛　腰痛治法　獨活寄生湯
小續命湯　牛膝酒　杜仲酒
腎著湯　鹿角圓　安腎圓

青娥圓 神應圓 立安圓
五積散 熟大黃湯 橘子酒
桃仁酒
虛損證治 正元散 麝香鹿茸圓
大山芋圓 羊肉圓 大補圓
兎絲子圓 妙應丹 樂令湯
養榮湯 十補圓 遠志圓
秘真丹 蓮子丹 家韭子圓
威喜圓 鎖陽丹 十四友圓
菁絲圓 參香散

○卷之十四

水腫敘論 水腫證治 復元丹
當歸散 正湯丹 消腫圓
消腫散 棗仁散 禹餘粮圓
退水圓 退水餅 大腹子散
桃紅散 大圓 葶藶大圓
料簡 大豆湯 五皮飲
澤漆湯 料簡 附子蒜豆湯
無礙圓 三棱煎 茯苓分氣飲
麻黃甘草湯 茯苓蘇子圓 料簡
氣分證治 桂附湯 枳朮湯
陰癩敘論 陰癩證治
茱萸內消圓 大戟圓 蝀陰丹
抵聖圓 兼金圓 應痛圓
蒺藜圓 三白散 蜘蛛散
牡丹散 香附散 雄黃散
癰疽敘論 癰疽證治 遠志酒
大黃酒 獨聖湯 通聖雙行湯
萬金湯 五香連翹湯 瀉毒湯
忍冬酒 轉毒散 靈寶膏
托裏散 神異膏 白玉膏
檳連散 替針圓 生肌散
瞿麥散 內塞散 內補散
善應膏 猪蹄湯 外食散
癰漏脉例 淊脉散 桂附圓
癰疽灸法

○卷之十五

瘰癧證治 必勝圓 白花蛇散
四聖散 牽牛散 旱蓮子圓
瘻瘤證治 破結散 白膏
附骨疽證治 蜡礬膏 黑彌膏
赤朮圓 又方 又方
丁腫證治 十三腫丁方 蒼耳散
腸癰證治 薏苡附子散 敗醬散
大黃牡丹湯 薏苡仁湯
五痔證治 五灰散 薰法
洗法 貼藥
腸風敘論 烏蓮湯 酒蓮圓
加味四君子湯 紫府八公圓 荆芥散
白玉丹 又方
癢瘍證治 升麻和氣飲 天麻煎
殺疥藥 百草膏

癩風證治　四生散　烏頭黃鹽圓
升麻和氣飲　天麻煎
癬證治　非荷葉草散
妬精瘡證治　麝香散　何散子
津調散　蒲黃散 附
大風敘論　大風治法
第一浴法　換骨丹　遇仙丹
踈風散　佛手膏　去毒丹
甘草散　解毒圓　福神丹
水膏藥　通天再造散　三濟圓
八菓湯　料簡
○卷之十六
斑瘡證治
三豆飲子　升麻湯　鼠粘子散
龍腦膏　仙靈散　豆皮飲子
丹毒敘論　丹毒證治　香藥皮湯
伏龍肝散　金花散 附　料簡
癮疹證治　加味羌活飲　加味烏荊圓
麴朮湯 附　傳藥 附
胡臭漏腋證治　蜘蛛散　六物散
頭疼證治　芎辛湯　藿香散 附
惺惺散 附　玉屑散　芎朮湯
救生散　寬中圓　天南星圓
硫朱丹 附　胡盧巴散　地黃圓 附
搐鼻藥　大附圓　如聖餅子
眼敘論　三因證治　千金神麴圓

羌活散 附　白蒺藜散　洗肝散 附
撥紅圓　羨肝散　四生散 附
驅風散　立勝散　照水膏
桑竹瀝膏　通利膏 附　通神膏
蛤粉圓
鼻病證治　羊肺散　細辛膏
通草散 附　粉黃膏
唇病證治　清脾湯　羌活散
菊花圓　青灰散
口病證治　龍石散　赴筵散
綠雲膏 附　兼金散 附　杏粉膏
生香膏　香附散
齒病證治　安腎圓　八味圓
四石神傳方　常用揩牙藥　玉池散 附
舌病證治失欠附　升麻柴胡湯　金沸草散
烙肺法　黑散子　薄荷蜜
文蛤散　礬石散
咽喉病證治要用　小續命湯　玉鑰匙
神效散　蜜附子　玉屑無憂散
荊芥湯　解毒雄黃圓　乾薑散
麻仁散　馬鞭草散　蜜綿纏白引法
耳病證治　菖蒲圓　補腎圓 附
蠟彈圓　乾蠍散　解倉飲子
麝香散　百虫入耳　耳中出血
○卷之十七
婦人論　求子論　溫胞湯

坐導樂 秦桂圓 探胞湯
脉倒 惡阻 竹茹湯
半夏茯苓湯 茯苓圓 小地黃圓
養胎大論 避忌法 轉女爲男法
安胎飲 白朮散 罩胎散
漏阻倒 膠艾湯 苧根湯
桂枝茯苓圓 千金保生丸
子煩證治 竹葉湯
腹痛下痢治法 當歸芍藥散 雞黃散
小便病證治 苦參圓 葵子散
八味圓 白薇芍藥散
胎水證治
鯉魚湯 商陸赤小豆湯 腎著湯
滑胎倒 枳殼散 榆白皮散
產難證法
催生湯 鈆丹
產科論序 產科二十一論評
黑神散 催生湯 勝金散
神應黑散 奪命丹 牛膝湯
清魂散 半夏茯苓湯 牡丹散
芎藭湯 見現圓 四物湯
增損四物湯 大調經散 五積散
調經散 加減茱萸湯 枳朮散
奪魂散 大調經散 調經散
七珍散 調中湯 沉香桃膠散
白頭翁湯 趂痛散 五積散
麻仁圓 阿膠枳殼圓 固經圓
芎藭加芍藥湯 底聖湯 奪命丹
芎藭湯 旋覆花湯 五積散
見現圓 天麻散 當歸湯 失笑散 小續命湯 大豆紫湯 濟危上丹
卷之十八
蓐勞證治 石子湯
陰脫證治 硫黃散 當歸散
熨法 桃仁膏 硫黃湯
下乳治法 漏蘆散 成煉鍾乳散
母猪蹄湯 青桑膏
惡露證治
黑龍丹 當歸湯 奪命丹
虛煩證治 人參當歸湯 蒲黃散
虛渴證治 熟地黃湯 六氣經緯圓
淋閉證治 茅根湯
產後雜病治法
當歸養血圓 四神散 丁香散
當歸黃耆湯 竹葉湯 神授散
調補法
黑神散 四順理中圓 當歸建中湯
濟陰丹 人參養血圓 羊肉湯
婦人女子衆病論證治法
白堊丹 濟陰丹 烏雞煎
延齡丹 交感地黃煎圓 皺血煎
人參養血圓 四物湯 溫經湯
牡丹散 伏龍肝散 艾煎圓

破血湯 抵當湯 萬病圓
礬石丸圓 三稜煎 烏金散
烏喙圓 木香散 石韋散
大腹皮飲 大黄甘遂湯 小柴胡湯
小麥湯 牡丹圓 黄耆五物湯
竹茹湯 膏髮煎
䘌瘡證治 補心湯 狼牙湯
雄黄兌散 養胃湯
小兒論 初生回氣法 初生服藥法
初生通大小便法 臍風撮口證
千金變蒸論 紫圓
夜啼四證 蒜圓 燈花散
蒲黄散 牡蠣散
客忤夜啼法 黄土散
積熱證治 四順飲子 惺惺散
紅綿散 六神散 銀白散
急慢驚風證治
陽癇方 陰癇方 辰砂散
解顱證治法 三辛散 蛇蛻散
魃病證治 龍膽湯
疳病證治
肥兒圓 六神圓 龍膽圓
不行證治 五加皮散

三因極一病證方論總目終

三因極一病證方論卷之一

青田鶴溪

脉經序

學醫之道須知五科七事五科者[illegible]
者所因中復分爲三傳約之說於斯見矣脉爲醫門之先雖
流注一身其理微妙廣大配天地變化合陰陽六經緯絡五
行纖悉無不揆度是以聖人示教有精微氣象之論後賢述
作爲太素難經之書仲景類集於前叔和詮次於後猶不昭
著六朝有高陽生者剽竊作歌訣劉元賓從而解之遂使雪
曲應稀已致和衆經文溺於覆瓿正道隳於訛鑿可歎息
今乃料簡要義別白討論分人迎氣口以辨内外因列表裏
九道以敘感傷病六經不昧五臟昭然識病推因如指諸掌
類明條備文略義詳庶幾能留神則思過半矣

學診例

凡欲診脉先調自氣壓取病人息以候其遲數過與不及所
謂以我醫彼智與神會則莫之敢違

凡診脉須先識脉息兩字脉者血也息者氣也脉不自動爲
氣使然所謂長則氣治短則氣病也

凡診須識人迎氣口以辨内外因其不與人迎氣口相應爲
不内外因所謂關前一分人命之主

凡診須先識五臟六經本脉然後方識病脉歲主臟害氣候
逆傳陰陽有時與脉爲期此之謂也

凡診須認取二十四字名狀與關前一分相符推說證狀與
病者相應使無差忒庶可依源治療

總論脉式

經云常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡

脈調勻乃可診有過之脈或有作爲當停寧食頃俟定乃診師亦如之。

釋曰停寧俟定即不拘於平旦況倉卒病生豈待平旦寧紛知之。

經云切脈動靜而視精明察五色觀五臟有餘不足六府強弱形之盛衰可以參決死生之分。

釋曰切脈動靜者以脈之潮會必歸於寸口三部診之左關前一分爲人迎以候六淫爲外所因右關前一分爲氣口以候七情爲內所因推其所自用背經常爲不內外因三因雖分猶乃未備是以前哲類分二十四字所謂七表八裏九道七表者浮芤滑實弦緊洪八裏者微沉緩濇遲伏濡弱九道者細數動虛促結代革散雖名狀不同證候差別皆以人迎氣口一分而推之與三部相應而說證故脈贊曰關前一分人命之主左爲人迎右爲氣口神門決斷兩在關後而靈論亦曰人迎緊盛傷於寒以此推明若人迎浮盛則傷風虛弱沉細爲暑濕皆外所因喜則散怒則激憂濇思結悲緊恐沉驚動皆內所因看與何部相應即知何經何臟受病方乃不失病機也其如診按表裏名義情狀姑如後說但經所述謂脈者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進文辭雖雅義理難尋動靜之辭有博有約博則二十四字不濫絲毫約則浮沉遲數總括紀綱故知浮爲風爲虛沉爲濕爲實遲爲寒爲冷數爲熱爲燥風濕寒熱屬於外虛實冷燥屬於內內外既分三因顯別學者宜詳覽不可憚煩也。經中所謂視精明者蓋五臟精明聚於目精全則目明神定則視審審視不矃則精明敗矣直視上視眩瞑眊瞑皆可兼脈而論病狀也。所謂察五色者乃氣之華也赤欲如帛裹朱不欲如赭白欲如白璧之澤不欲如堊青欲如蒼玉之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土黑欲如漆重澤不欲如炭五色精敗壽不久矣 所謂觀五臟有餘不足者候之五聲五聲者臟之音中之守也中盛則氣勝中衰則氣弱故聲如從室中言者是氣之濕也言微終日乃復言者是氣之奪也譫妄不避善惡神明之亂也鄭聲言矣不相續陰陽失守也故曰得守者生失守者死 所謂六府強弱以候形之盛衰頭者精明之府頭傾視深精神奪矣背者胸中之府背曲肩隨府將壞矣腰者腎之府轉搖不能腎將憊矣膝者筋之府屈伸不能筋將憊矣骨者髓之府也行則振掉骨將憊矣倉廩不藏者腸胃不固也水泉不止者膀胱不藏也得強者生失強者死此等證狀醫者要門在脈難明惟證易辨是故聖智備論垂教學者宜兼明之不可忽也。

三部分位

三部從魚際至高骨得一寸名曰寸口從寸口至尺名曰尺澤故曰尺中寸後尺前名曰關陽出陰入以關爲界又云陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入六分爲關分從關分又入六分爲尺分故三部共得一寸九分

六經所屬

心部在左手寸口屬手少陰經與小腸手太陽經合

肝部在左手關上屬足厥陰經與膽足少陽經合

腎部在左手尺中屬足少陰經與膀胱足太陽經合

肺部在右手寸口屬手太陰經與大腸手陽明經合

脾部在右手關上屬足太陰經與胃足陽明經合

右腎在右手尺中屬手厥陰心包經與三焦手少陽經合手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系

臑　目兌　頰　跗　頏顙　髀厭（別本作樞）

上俠咽系目其直者復從心系却上肺出腋下下循臑內後
廉行太陰心主之後下肘內廉循臂內後廉抵掌後兌骨之
端入掌內廉循小指之內出其端
手太陽之脈起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循
臂骨下廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下膈抵
胃屬小腸其支別者從缺盆循頸上頰至目兌眥却入耳中
其支者別頰上䪼抵鼻至目內眥
足厥陰之脈起於大指聚毛之際上循足跗上廉去內踝一
寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股入陰毛中環陰
器抵小腹俠胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入
頏顙連目系上出額與督脈會於巔其支從目系下頰裏環
脣內其支復從肝別貫膈上注肺
足少陽之脈起於目兌眥上抵頭角下耳後循頸行手少陽
之脈前至肩上却交出少陽之後入缺盆其支別者從耳中
出走耳前至目兌眥後其支別者自兌眥下大迎合手少陽
於䪼下交頰車下頸合缺盆下胸中貫膈絡肝屬膽循脇裏
出氣街繞毛際橫入髀厭中直者從缺盆下腋循胸過季脇
下合髀厭中以下循髀太陽出膝外廉下外輔骨之前直下
抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間其
支者從跗上入大指循歧骨內出其端還貫入爪甲出三毛
足少陰之脈起於小指之下斜趣足心出然谷之下循內踝
之後別入跟中上腨內出膕內廉上股內後廉貫脊屬腎絡
膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本其支從
肺出絡心注胸中
足太陽之脈起於目內眥上額交巔上其支別者從巔至耳
上角其直行者從巔入絡腦還出別下項循肩髆內俠脊抵

胛（別本作胂）　腨　魚　腕　髃　腹　頞　顱　頤　胸

腰中入循膂絡腎屬膀胱其支別者從腰中下貫臀入膕中
其支別者從髆內左右別下貫胛俠脊內過髀樞循髀外後
廉下合膕中下貫腨內出外踝之後循京骨至小指外側端
手太陰之脈起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺
系橫出腋下下循臑內行少陰心主之前下肘中循臂內上
骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直
出次指內廉出其端
手陽明之脈起於大指次指之端循指上廉出合谷兩骨之
間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉循臑外前廉上肩出
髃骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸
其支者從缺盆上頸貫頰下入齒縫中還出俠口交人中左
之右右之左上俠鼻孔
足太陰之脈起於大指之端循指內側白肉際過覈骨後上
內踝前廉上腨內循胻骨後交出厥陰之前上循膝股內前
廉入腹屬脾絡胃上膈俠咽連舌本散舌下其支者復從胃
別上膈注心中
足陽明之脈起於鼻交頞中下循鼻外入上齒中還出俠口
環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客
主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺
盆下膈屬胃絡脾其直行者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣
充中其支者起胃下口循腹裏下至氣充中而合以下髀關
抵伏兔下入膝臏中下循胻外廉下足跗入中指內間其支
者下膝三寸而別以下入大指間出其端
手厥陰之脈起於胸中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循
胸出脇下腋三寸上抵腋下下循臑內行太陰少陰之間入
肘內下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者從掌

中循小指次指出其端
手少陰之脉起於小指次指之端上出次指之間循出表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈徧屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下頰至䪼其支者從耳後入耳中却出至目兑眥

## 五藏所屬

左寸外以候心內以候膻中　右寸外以候肺內以候胷中
左關外以候肝內以候膈中　右關外以候脾內以候胃脘
左尺外以候腎內以候腹中　右尺外以候心主內以候腰

釋曰六臟六腑十二經絡候之無踰三部要之前布六經乃候淫邪外入自經絡而及於臟後說六腑乃候情意內鬱自臟腑出而應於經內外所因䂓然明白學診之道當自此始外因雖自經絡而入必及於臟須識五臟部位內因鬱結於中必應於經亦須徇經說豁不可偏爲故經云上竟上胷喉中事也下竟下腰足中事也不可不通

## 五臟本脉躰

人之脉者乃血之隧道也非氣使則不能行故血爲脉氣爲息脉息之名自是而分呼吸者氣之橐籥動應者血之波瀾其經以身寸度之計十六丈二尺一呼脉再動一吸脉再動呼吸定息脉五動閏以太息則六動一動一寸故一息脉行六寸十息六尺百息六丈二百息十二丈七十息四丈二尺計二百七十息漏水下二刻盡十六丈二尺營周一身百刻之中得五十營故曰脉行陽二十五度行陰二十五度也息者以呼吸定之一日計一萬三千五百息呼吸進退既遲於脉故八息三分三毫三釐方行一寸八十三息三分三毫行一尺八百三十三息三分行一丈八千三百三十三息一十丈餘六丈二尺計五千一百六十七息通計一萬三千五百息方行盡十六丈二尺經絡氣周於一身一日一夜大會於風府者是也脉屬陰陰行速猶太陰一月一周天息屬陽陽行遲猶太陽一歲一周天如是則應天常度故春肝脉弦細而長夏心脉浮大而洪長夏脾脉輭大而緩秋肺脉浮濇而短冬腎脉沉濡而滑各以其時而候旺相休囚脉息無不及太過之患故曰平人平人常氣禀於胃必以胃氣爲本取其資成也合本臟氣三分微似弦洪緩濇沉則爲平脉若真臟脉見則不住矣脉如後說

## 六經本脉躰

六經所以分手足陰陽者以足爲本手爲標如足厥陰風木肝與足少陽相火膽爲表裏同在一處足太陰濕土脾與足陽明燥金胃足少陰君火腎與足太陽寒水膀胱皆相附近至於手三陰三陽相去頗遠蓋足陰陽本乎地莫方有常手陰陽法乎天變化無定足爲常度手爲揆度躰常尺寸故爲奇度奇常揆度其道一也足厥陰肝脉在左關上絃細而長足少陰腎脉在左尺中沉濡而滑足太陰脾脉在右關上沉軟而緩足少陽膽脉在左關上弦大而浮足陽明胃脉在右關上浮長而濇足太陽膀胱脉在左尺中洪滑而長手厥陰心主包絡在右尺中沉弦而動手少陰心脉在左寸口洪而微實手太陰肺脉在右寸口濇短而浮手少陽三焦脉在右尺中洪散而急手陽明大腸脉在右寸口浮短而滑手太陽小腸脉在左寸口洪大而緊此手足陰陽六經脉躰及其消息盈虛則化理不住運動密移與天地參同彼春之暖爲夏之暑彼秋之忿爲冬之怒四變之動脉與之應者乃氣候之

至脉也故要論云厥陰之至其脉弦少陰之至其脉鈎太陰之至其脉沉少陽之至大而浮陽明之至短而濇太陽之至大而長本脉至脉雖識體狀又須推尋六氣交变南政北政司天在泉少陰之脉應與不應如要論所謂乙庚丙辛丁壬戊癸金水木火四運者皆曰北政少陰在泉故寸不應甲己土運德流四政譬如巡狩而居南面北謂之南政少陰在天故寸亦不應若北政厥陰在泉則右不應太陰在泉則左不應若南政厥陰司天則右不應太陰司天則左不應當不應者反其診則見矣此乃常度合不應而反應是謂太過應而不應是謂不及皆為外淫所因所以欲知少陰應否者以君火為万物資始不可不知此且以一歲而論之若細推求當以日論精微之道不可不知若歲主藏害自當揆度平治不能反隅則不復也

## 五臟傳变病脉

右手關前一分為氣口者以候臟氣鬱發與胃氣兼并過與不及乘尅傳变也以内氣鬱發食氣入胃淫精於脉自胃口出故候於氣口以五臟皆稟氣於胃胃者五臟之本臟氣不能自致於手太陰必因胃氣而至邪氣勝胃氣衰故病甚胃氣絶真臟獨見則死假如春肝脉弦多胃少曰肝病但弦無胃氣曰死若其乘尅春雖有胃氣而有濇脉見則秋必病濇甚則今病。夏心脉洪多胃少曰心病但洪無胃氣曰死如乘尅見微沉則冬病沉甚則今病。秋肺脉濇多胃少曰肺病但濇無胃氣曰死秋見洪為夏病洪甚為今病。冬腎脉沉多胃少曰腎病但沉無胃氣曰死冬見濡為長夏病濡甚為今病。長夏脾脉濡多胃少曰脾病但濡無胃氣曰死長夏見弦脉為春病弦甚為今病又如春肝脉合弦細而長太過則實強令人善怒忽忽眩冒癲疾不及則微虚令人胷痛引背兩脇胠滿夏心脉合洪而微實太過則來去皆盛令人身熱膚痛為浸淫不及則來不盛去反盛令人煩心上欬唾下氣泄秋肺脉合浮而短濇太過則中堅傍虚令人逆氣背痛愠愠然不及則毛而微令人呼吸少氣上喝咳下喘聲冬腎脉合沉而緊實太過則如彈石令人解㑊脊脉痛少氣不欲言不及則其去如數令人心懸如飢䏚中清脊中痛少腹滿小便变長夏脾脉當沉而濡長太過則如水之流令人四肢不舉不及則如鳥之喙令人九竅不通名曰重強太過不及脉之大要迫近而微不可失機又人之五臟配木火土金水以養魂神意魄志生怒喜思憂恐故因怒則魂門弛張木氣奮激肺金乘之脉必弦濇因喜則神廷融泄火氣赫羲腎水乘之脉必沉散因思則意舍不寧土氣凝結肝木乘之脉必弦弱因憂則魄戶不閉金氣濇聚心火乘之脉必洪短因恐則志室不遂水氣旋却脾土乘之脉必沉緩此盖五情動不以正侮所不勝既不藏德反謂侮勝而乘之侮反受邪此之謂也其病有五五五二十五変若其能所傳按勝尅流变又當詳而論之故經曰五藏受氣於其能生傳之於其所勝氣舍於其所生死於其所不勝如肝受氣於心傳於脾氣舍於腎至肺而死心受氣於脾傳於肺氣舍於肝至腎而死脾受氣於肺傳於腎氣舍於心至肝而死肺受氣於腎傳於肝氣舍於脾至心而死腎受氣於肝傳於心氣舍於肺至脾而死則知肝死於肺假於秋庚為辛死餘皆做此又如甲乙主寅卯丙丁主巳午庚辛主申酉壬癸主亥子戊己主辰戌丑未一日一夜五分則可以占死者之早暮此病之次也然

卒發者不必治於傳或其傳化不以次不以次入者憂恐怒喜思令不得以其次故令人有大病矣此五臟傳變之大要學者幸留神焉

## 六經中傷病脈

左手關前一分為人迎者以候寒暑燥濕風熱中傷於人其邪咸自脈絡而入以迎納之故曰人迎前哲方論謂太陽為諸陽主氣凡感外邪例自太陽始此考經意似若不然風喜傷肝寒喜傷腎暑喜傷心包濕喜傷脾熱傷心燥傷肺以暑熱一氣燥濕同源故不別論以類推之風當自少陽入濕當自陽明入暑當自三焦入寒卻自太陽入故經曰陰為之主陽與之正別於陽者知病從來此之謂也且太陽傷寒則左手尺中與人迎皆浮緊而盛浮者足太陽脈也緊者傷寒脈也盛者病進也其證頭項強腰脊痛無汗惡寒不惡風陽明傷濕右手關上與人迎皆澀細而長澀者足陽明脈也細者傷濕脈也長者病襲也其證關節疼痛重痺而弱小便澀秘大便飧泄少陽傷風左手關上與人迎皆弦浮而散弦者足少陽脈也浮者傷風脈也散者病至也其證身熱惡風自汗項強脅滿手少陽傷暑右手尺中與人迎皆洪虛而數洪者手少陽脈也虛者傷暑脈也數者病增也其證身熱惡寒頭痛狀如傷寒煩渴足太陰傷濕右手關上與人迎皆濡細而沉濡者足太陰脈也細者濕脈也沉者病著也其證身重腳弱關節煩疼冷痺脹滿足少陰傷寒左尺中與人迎皆沉緊而數沉者足少陰脈也緊者寒脈也數者病傳也其證口燥舌乾而渴背寒反發熱倦怠足厥陰傷風左關上與人迎皆弦弱而急弦者足厥陰脈也弱者風脈也急者病變也其證自汗惡風而倦小腹急痛手厥陰心包傷暑在右尺中與人迎皆沉弱而緩沉者心包脈也弱者傷暑也緩者病倦也其證往來寒熱狀如瘧煩渴眩暈背寒面垢此乃分布六經感傷外邪除燥熱外敘此四氣以為宗兆若其傳變自當依六經別論所傷當經沉證對證施治或燥熱傷心肺亦當依經推明理例調治如四氣兼并六經交錯亦當隨其脈證審處別白或先或後或合或并在絡在經入表入裏四時之動脈與之應氣候以時自與脈期微妙在脈不可不察察之有紀從陰陽始始之有經從陰陽生此之謂也

## 五用乖違病脈

察脈必以人迎氣口分內外所因者乃學診之要道也所以脈贊云關前一分人命之主然既有三因固不可盡詳而考之於理自備且如疲極筋力盡神度量飲食飢飽叫呼走氣房室勞逸及金瘡踒折虎狼毒蟲鬼疰客忤畏壓溺等外非六淫內非七情內外不收必屬不內外難經論曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食殊不知飲食入胃能助發宿蘊其所以應於氣口者正由七情鬱發因食助見本非宿食能應氣口且如宿食脈有浮大而微澀者有數而滑實者有診宿食不化脈則沉緊宿食成瘕脈則沉重此等名證皆曰傷胃胃何關於氣口邪其如疲極筋力其脈弦數而實筋痛則動皆傷肝也凝思則滑神耗則散皆傷心也絃誦耗氣脈濡而弱叫呼走氣脈散而急皆傷肺也房勞失精兩尺浮散男子遺精女子半產弦大而革皆傷腎也右件明文氣口何與況飢寒蝅燥脈自微浮及為緊澀胃虛不食其脈必緩亦有微濡五飲停伏浮細而滑久畜沉積沉細而軟形虛自汗脈皆微濡揮霍變亂脈自沉伏僵仆墜下脈則細滑踒折傷損瘀血在內疝瘕癥癖五內作痛脈皆弦緊中寒癥結脈

則遲濇五積六聚食飲痰氣伏留不散隧道節滯脉皆促結
三消熱中尺中洪大癲狂神乱關上洪疾氣實脉沉血實脉
滑氣血相搏脉亦沉實婦人妊娠脉則和滑遁尸尸疰脉沉
而不至寸或三部緊急鬼祟附着脉兩手乍大乍小乍短乍
長陽邪來見脉則浮洪陰邪來見脉則沉緊鬼疰客忤三部
皆滑洪大㜲㜲沉沉澤澤但與證不相附者皆五尸鬼邪遁
疰之所爲也如診得此等脉證雖與人迎氣口相應亦當分
數推尋三因交結四句料簡所謂單内單外不内不外亦内
亦外亦不内外脉理微妙藝能難精斈然後知不足教然後
知困岡之謂如魚形於朕兆隂於數義未有不斈而能者未
有斈而不成者斈者宜留心焉又如忽見異像驚惑眩乱脉
多失序急虚卒中五臟閉絶脉不往來譬如墮溺脉不可察
與夫金瘡踒折頓走血氣脉亦無準斈者當看外證不必拘
脉。

脉偶名状

浮者按之不足舉之有餘與人迎相應則風寒在經與氣口
相應則榮血虚損
沉者舉之不足按之有餘與人迎相應則寒伏陰經與氣口
相應則血凝腹藏
遲者應動極緩按之尽牢與人迎相應則濕寒凝滯與氣口
相應則虚冷沉積
數者去來促急一息數至與人迎相應則風燥熱煩與氣口
相應則陰虚陽盛
虚者遲大而軟按之豁然與人迎相應則經絡傷暑與氣口
相應則榮衛走本
實者按舉有力不疾不遲與人迎相應則風寒貫經與氣口
相應則氣血壅脉。
緩者浮大而軟去來微遲與人迎相應則風熱入藏與氣口
相應則怒極傷筋。
緊者動轉無常如紉單線與人迎相應則經絡傷寒與氣口
相應則藏府作痛。
洪者來之至大去之且長與人迎相應則寒壅諸陽與氣口
相應則氣攻百脉
細者指下尋之來往如線與人迎相應則諸經中濕與氣口
相應則五藏凝涎
滑者往來流利有如貫珠與人迎相應則風痰潮溢與氣口
相應則涎飲凝滯
濇者參伍不調如雨沾沙與人迎相應則風濕寒痺與氣口
相應則津汗血枯
弦者端緊徑急如張弓弦與人迎相應則風走注痛與氣口
相應則飲積溢疼。
弱者按之欲絶輕軟無力與人迎相應則風濕緩縱與氣口
相應則筋絶痿弛
結者往來遲緩時止更來與人迎相應則陰散陽生與氣口
相應則積阻氣節
促者往來急數時止復來與人迎相應則痰壅陽經與氣口
相應則積留胃府
芤者中空傍實如按慈葱與人迎相應則邪壅吐衄與氣口
相應則榮虚妄行
微者極細而軟似有若無與人迎相應則風暑自汗與氣口
相應則微陽脱泄
動者在閞如豆厥厥不行與人迎相應則寒疼冷痛與氣口

相應則心驚膽寒。
伏者沉隱不出，着骨乃得，與人迎相應則寒濕痼閉，與氣口
相應則凝思滯神。
長者往來流利，出於三關，與人迎相應則微邪自愈，與氣口
相應則藏氣平治。
短者按舉似數，不及本部，與人迎相應則邪閉經脉，與氣口
相應則積遏藏氣。
濡者按之不見，輕手乃得，與人迎相應則寒濕散漫，與氣口
相應則飧泄緩弱。
革者沉伏實大，如按鼓皮，與人迎相應則中風著濕，與氣口
相應則半產脫精。
散者有陽無陰，按之滿指，與人迎相應則淫邪脫泄，與氣口
相應則精血敗耗。
代者藏絕，中止餘藏代動，無問內外所因，得此必死。

七表病脉

浮為在表，為風（應人迎），為氣（應氣口），為熱，為痛，為嘔，
為脹，為痞，為喘，為厥，為內結，為滿不食。
浮大為鼻塞。浮緩為不仁。浮大長為風眩癲疾。
浮滑疾為宿食。浮大而濇為宿食滯氣。浮短為肺傷諸氣。
浮滑為飲，為走刺。浮細而滑為傷飲。浮滑疾緊為百合病。
浮數為大便堅，小便數。浮緊為淋，為癃閉。
寸芤為吐血。微芤為衄血。關芤為大便出血。
尺芤為下焦虛，小便出血。
滑為吐，為滿，為欬，為熱，為伏痰，為宿食，
為蓄血，為經閉，為鬼疰，為血氣俱實。
滑散為癱緩。滑數為結熱。滑實為胃熱。和滑為妊娠。
滑而大小不均（必吐，為病進，為泄利）。滑而浮大小腹痛溺（則陰中痛，大便亦然）。
實為熱，為嘔，為痛，為氣塞，為喘欬，為大便不禁。
實緊為陰不勝陽，為胃寒，為腰痛。
弦為寒，為痛，為飲，為瘧，為水氣，為中虛，
為厥逆，為拘急，為寒癖。
雙弦脇急痛。弦而鈎為脇下刺痛。弦緊為惡寒，為疝瘕，為癖，為瘀血。弦長為積，隨左右上下。
緊為寒，為痛（頭骨肉等），為欬，為喘，為滿。
浮緊為肺有水。緊滑為蚘動，為宿食，為逆吐。緊急為遁尸。緊數為寒熱。
洪為脹，為滿，為痛，為熱，為煩。洪實為癲。
洪緊為癰疽，為喘急，亦為脹。洪大為祟。洪浮為陽邪來見。

八裏病脉

微為虛，為弱，為衄，為嘔，為泄，為亡汗，為拘急。
微弱為少氣，為中寒。
沉為在裏（在藏），為實，為水，為寒，為喘，為癥，為瘕。
沉弱為寒熱。沉細為少氣，臂不能舉。沉滑為風水，為下重。
沉緊為上熱下冷。沉重而直前絕者為瘀血。沉重而中散為寒食成瘕。
沉重不至寸，徘徊絕者為遁尸。沉緊為懸飲。
沉遲為痼冷。沉重為傷暑發熱。
緩為在下，為風，為寒，為弱，為痺，為疼，
為不仁，為氣不足，為眩暈。緩而滑為熱中。
緩而遲虛寒相搏，食冷則咽痛。
濇為少血，為亡汗，為氣不足，為逆冷，為下痢，
為心痛。濇而緊為痺，為寒濕。
遲為寒，為痛。遲而濇為癥瘕咽酸。
伏為霍亂，為疝瘕，為水氣，為溏泄，為停痰，
為宿食，為諸氣上衝，為惡脈貫肌。

濡爲虛、爲痺、爲自汗、爲氣弱、爲下重、
濡而弱爲內熱外冷自汗、爲小便難。
弱而虛、爲風熱、爲自汗
九道病脉
緩爲氣血俱虛、爲病在內、爲積、爲傷濕、爲後泄。
爲寒、爲[illegible]、爲變傷、爲[illegible]、細而緊爲癥瘕積聚
爲[illegible]、細而滑爲僵仆、爲發熱、爲嘔吐。
數爲熱、爲虛、爲吐、爲痛、爲煩渴、爲煩滿
動爲痛、爲驚、爲攣、爲泄、爲恐。
虛爲寒、爲虛、爲[illegible]、爲食不消化、爲傷暑
促、經並無文、
釋曰其促有五、一曰氣二曰血三曰飲四曰食五曰痰但
藏熱則脉數以氣血痰飲留滯不行則止促止促非悪脉
也。
結爲痰、爲飲、爲血、爲積、爲氣。
釋曰氣寒脉緩則爲結數則爲促雖緩數不同結亦當如
促脉分別可也。
散、經無文、
釋曰六府氣絶於外則手足寒上氣五藏氣絶於內則下
利不禁甚者不仁其脉皆散散則不聚病亦危矣
革爲滿、爲急、爲虛寒相搏婦人半産漏下
釋曰革者革也固結不移之狀三部應之皆危脉也
代者一藏絶他藏代至。
釋曰代真死脉不分三部隨應皆是
如前所例皆本聖經學者當熟讀令心開眼明識取體
狀然後交絡互織所謂六經流注五藏相傳各以部位
推尋使了然不昧其如隨病分門諸脉證狀尤當參對
審詳之如是精誠方可爲醫者之萬分不尔則倚傍聖
教欺罔賢良爲含靈之巨賊幸宜勉旃。

三因極一病證方論卷之一

## 太醫習業

國家以文武醫入官，蓋為養民設，未有不自學古而得之者。學古之道，雖別而同，為儒必讀五經三史諸子百家，方稱學者。醫者之經，素問靈樞是也；史書，即諸家本草是也；諸子，難經甲乙太素中藏是也；百家，鬼遺龍樹金鏃刺要銅人明堂幼幼新書產科保慶等是也。儒者不讀五經，何以明道德性命仁義禮樂；醫不讀靈素，何以知陰陽運變德化政令；儒不讀諸史，何以知人材賢否得失興亡；醫不讀本草，何以知名德性味養生延年；儒不讀諸子，何以知崇正衛教學識醇疵；醫不讀難素，何以知神聖工巧妙理奧義；儒不讀百家，何以知律歷制度休咎吉凶；醫不讀雜科，何以知脈穴骨空奇病異證。然雖如是，猶未為博，況經史之外，又有文海類集，如漢之班馬，唐之韓柳，及我大宋文物最盛，難以槩舉。醫文漢亦有張仲景華佗，唐則有孫思邈王冰等，動輒千百卷。其如本朝太平聖惠乘閒集效神功萬全，備見崇文名醫別錄，豈特汗牛充棟而已哉。使學者一覽無遺，博則博矣，倘未能反約，則何以適從。予今所述，乃收拾諸經筋髓，其亦反約之道也。讀醫方者，當推上聖養民設教為意，庶不負於先覺也。

## 五科凡例

凡學醫，必識五科七事。五科者，脈病證治及其所因；七事者，所因復分為三。故因脈以識病，因病以辨證，隨證以施治，則能事畢矣。故經曰：有是脈而無是診者，非也。究明三因，內外不濫，參同脈證，盡善盡美。

凡學脈，須先識七表八裏九道名體證狀，了然分別，然後以關前一分應動相類，分別內外及不內外，又須知二十四脈以四脈為宗，所謂浮沉遲數，分風寒暑濕，虛實冷熱，交結諸脈，隨部說證，不亦約乎。

凡審病，先須識名，所謂中傷寒暑風濕瘟疫時氣，皆外所因；臟腑虛實，五勞六極，皆內所因；其如金瘡踒折，虎狼毒蟲，涉不內外。更有三因備具，各有其名，所謂名不正則言不順，言不順則事不成，學不可不備。

凡學審證，須知外病自經絡入，隨六經所出，井滎輸源經合，各有穴道，起沒流傳，不可不別；內病自五臟鬱發，證候各有部分，溢出諸脈，各有去處，所謂上竟上，頭項胸喉中事也；下竟下，腹肚腰足中事也。

凡用藥，須熟讀本草，廣看方書，當知炮炙，隨方過製，汗下補吐，輕重澀滑，燥潤等性，量病淺深，飲服多寡，五德五味，七情八反，升合分兩，朝代不同，一一備學，洞然對治，須識前後，故經曰：先去新病，病當在後。

凡治病，先須識因；不知其因，病源無目。其因有三，曰內，曰外，曰不內外。內則七情，外則六淫，不內不外，乃背經常。金匱之言，實為要道。巢氏病源，具列一千八百餘件，蓋為示病名也。以此三條病源部分，不亦反約乎。

凡學醫既明五科，每科須識其要。脈有浮沉遲數，病有風勞氣冷，證有虛實寒熱，治有汗下補吐。若於三因推明，外曰寒熱風濕，內曰喜怒憂思，不內外曰勞逸作強，各有證候，詳而推之，若網在綱，有條不紊。

凡看古方類例，必先明朝代，次看升合分兩差殊。古數味皆用分兩，不足校也。中間有用升合枚數，大段不同。升斗秤尺，本自隋秦，其來不可見，度量衡率，亦難明。今以錢皆準，況粗知梗槩。

凡度者分寸尺丈引本以一黍之廣為分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引觀今之尺數等不同如周尺長八尺京尺長一尺六寸淮尺長一尺二寸鄉尺長一尺二寸五分並以小尺為率小尺既自三微起抄自可準度武德年鑄開元錢徑八分當十二錢半得一尺排錢比之十一箇已及一尺又不知唐用何尺貧渾唐令擬並用尺寸分布尺寸如是不齊將何憑擇得古君子必有說焉

凡量者龠合升斗斛本以黃鍾龠容十二銖合龠為合重二十四銖今以錢準則六銖錢四箇比開元錢三箇重升斗斛皆以是而成數漢唐同用至宋紹興升容千二百銖則古文六銖錢二百箇開元二百二十箇以紹興一升得漢五升其餘私用不足計也

凡衡者銖兩斤鈞石亦以黃鍾龠所容重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石每兩則古文六銖錢四箇開元錢三箇至宋廣升以開元錢十箇為兩今之三兩得漢唐十兩明矣千金本草皆以古三兩為今一兩以古三升為今一升諸藥類例尤為難辨且如半夏一升準五兩不知用何升何兩此修合制度之要務不可不知漢銅錢質如周錢文曰半兩重如其文孝文五年錢益多而輕乃更鑄四銖其文為半兩雜以鉛鐵錫非殺雖為巧則不得贏而姦或盜磨錢質取鋊有司言錢輕重請郡國鑄五銖錢周郭有質令不得磨取鋊則知漢以二半兩錢為兩重十銖明矣漢唐例以二十四銖為一兩抑未知修史人改作唐例亦不可知觀錢譜漢興六銖錢至唐方有今以五銖錢十六个止得開元錢十个重又以六銖錢十二个止得開元錢九个重則知開元錢每个以重八銖唐武德四年鑄開元通寶徑八分重二銖四絫積十錢為兩似難改換明食貨者以有說焉

按藥書漢方湯液大劑三十餘兩小劑十有餘兩用水陸升或七升多則取貳升參升並分參服若以古龠量水半升煎今之參拾兩未論得湯況散末藥只服方寸刀圭匕圓子如梧桐子大極至於拾粒湯液豈得如此懸絕又如風引湯一劑計伍拾伍兩每兩只用參指撮水參升煮三沸去滓溫服壹升觀其多寡分劑只參指撮未應料劑如此之多此又可疑也今以臆說漢方當用半兩錢貳枚為一兩且以术附湯方較若用漢兩計一百八十銖得開元錢二十二个半重若分三服已是今之七錢半重一服若以唐方準計三百三十六銖得開元錢四十二个重每服計今之十四錢重大略可知若以開元錢準得一百單五个重分三服每服計三十五錢重此猶是小齊況有大齊名件兩數之多者未易槩舉留心此道幸少詳焉

凡古書所該不出脉病證治四科而撰述家有不知此多致顛晦文義混殽要當以四字類明之四字者即名體性用也如脉浮則為名舉有餘按不足為體為風為虛曰性可補可汗曰用如病太陽傷風為名咸已嗇嗇為體惡風自汗為性傳變經絡為用如證太陽風證為名頭項疼腰脚痛為體不與諸經濫為性微其進退為用如治藥桂枝則為名出處形色為體氣味備缺為性汗下補吐為用以此推之實脉絡有病源推方證節本草皆用此法無餘蘊矣

紀用備論

夫陰陽運五形行乎天地之間則神明為之紀故有德化政令變眚之異物類賴五行孕於八方之內則生靈賴其資故

有功能氣味性用之殊有氣運之失常非藥石則不能所謂功奪造化恩侔財成者無逾於藥石也故數和彰斯治療之用潔便愈者五氣之德也安魂育神益氣定魄守志者五藥之功也是以堅齒長生豐備緊斂清益者五氣之化也通潤悅澤輕身潤澤益精者百藥之能也舒啓明目安靜勁切凝肅者五氣之政也開明利脈滑膚肥肌強骨者五藥之業也風熱濕燥寒者五氣之令也酸苦甘辛鹹者五藥之味也顛倒五氣運与萬物雖種種不齊其如成象效法無相奪倫一一主對者合符契至於勝復盛衰不能相多往來升降不能相無故各從其動而與之亦不相加也然其行振發散彰揚剛殺凜冽者五氣之變也在藥則有收斂乾焦甘緩軟滋滑者百藥之性也散落墮灼霜消隕零者五氣之眚也在藥則有覰劫溢汗嘔吐涎涌泄利者百藥之用也觀化樂謀之精功能者藥之良故本草氣之氣味性藥之勢者之治法遇歲主藏害雖平治之不同必以所勝而命之故經曰上淫于下所勝平之平天氣也下淫于內所勝治之治地氣也故司天之氣風淫所勝平以辛涼清氣在泉風淫于內治以辛涼此之謂也至於折抑主客禁發勝復治之亦莫越乎功能氣味蓋從其微化政令之所爲也今則不然惟取其性用之所利而治其災變之所傷寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之散者收之收者散之濇者滑之滑者濇之燥者潤之急者緩之緩者急之堅者耎之脆者堅之衰者補之強者瀉之設略大功能氣味隨其性用以備治法之總目合和修制之大綱備攝災變之要略亦衛生明哲之士當不拘於此也夫五味各隨其所喜攻酸先入肝苦先入心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣則藏氣偏勝偏勝則有偏害偏害則致偏絕夭之由也是以攷理觀化藥集商量服餌之藥不具五味五氣而久服之雖且獲勝久必暴夭此之謂也近世槽俗爲治使人單服附子者害滋多可不謹乎

藏府配天地論

韓子曰形而上者謂之天形而下者謂之地介於其兩間者謂之人人受天地之中以生莫不稟二氣以成形是以六氣緯空五行麗地人則默而象之故足厥陰肝居於巳手厥陰右腎居於亥巳亥爲天地之門户故風木化焉足少陰腎居於子手少陰心居於午子午爲天地之正中故君火位焉足太陰脾居於未手太陰肺居於丑丑未爲歸藏之標故濕土化焉足少陽膽居於寅手少陽三焦居於申寅申握生化之始故相火居焉足陽明胃居於酉手陽明大腸居於卯卯酉爲日月之道路故燥金行焉足太陽膀胱居於辰手太陽小腸居於戌辰戌爲天地之魁罡故寒水主焉此三才應奉二氣相須升降之說如指諸掌至於五行六氣輾相生亦莫不有自然之序如厥陰風木生少陰君火君火生太陰濕土濕土生少陽相火相火生陽明燥金燥金生太陽寒水順天道而右旋所謂運行也或問君火不主運復能生相火火復生金何也此生成之道也相火既已發燄盛螢炭滅作之不成木見虛空能聚火金在爐非火不能鍜出所以河圖火七居西金九居南互盈互頫其成能也居以一性而推之無所不偏故木火則爲火於則金水石擊則爲火鎔則爲水流而潤之江河號江大海之中火光常起此皆生之本有也又何疑上中火火中金夫木火土金水此乃常度人皆知之至於風寒濕燥寒暑之接度則有能明其狀者故以木比風以火比暑以土比濕以金比燥以水比寒仍以上下

二氣而配手足三陰三陽則四時之節度又況五行各各不同有正有太過有不及天地氣化既然人之藏府亦然風而為病或外邪或本氣或宿疾必當推類隨二度而調之方究心明道之士孰能與此

## 三因論

夫人稟天地陰陽而生者蓋天有六氣人以三陰三陽而上奉之地有五行人以五藏五府而下應之於是資生皮肉筋骨精髓血脈四肢九竅毛髮齒牙唇舌總而成體外則氣血循環流注經絡喜傷六淫內則精神魂魄志意思喜傷七情六淫者寒暑燥濕風熱是七情者喜怒憂思悲恐驚是若將護得宜怡然安泰役冒非理百疴生焉病診既成須尋所自故前哲示教謂之病源經不云乎治之極於一一者因得之閉戶塞牖繫之病者數問其情以從其意是欲知致病之本也然六淫天之常氣冒之則先自經絡流入內合於府藏為外所因七情人之常性動之則先自藏府鬱發外形於肢體為內所因其如飲食飢飽叫呼傷氣盡神度量疲極筋力陰陽違逆乃至虎狼毒蟲金瘡踒折疰忤附著畏壓溺等有背常理為不內外因金匱有言千般疢難不越三條以此詳之病源都盡如欲救療就中尋其類例別其三因或內外兼并淫情交錯推其深淺斷以所因為病源然後配合諸證隨因施治藥石針艾無施不可

## 外所因論

夫六淫者寒暑燥濕風熱是也以暑熱一氣燥濕同源故并收而為四即冬傷寒春溫病春傷風夏飧泄夏傷暑秋痎瘧秋傷濕冬咳嗽此乃因四時而序者若其觸冒則四氣皆能交結以病人且如溫病憎寒發熱不特拘傷寒也冒風暑濕皆有其證但風散氣故有汗暑消氣故倦怠濕溢質故重著雖折傷諸證不同經絡傳變咸爾不可不知飧泄亦然經曰寒甚為腸澼又熱濕久客腸胃滑而下利亦不止於傷風痎瘧諸證亦以寒暑風濕互絡而為病因初不偏勝於暑也咳論以微寒為咳熱在上焦咳為肺痿厲風所吹聲嘶發咳豈獨拘於濕也以是觀之則知四氣本乎六化六化本乎一氣以運變而分陰陽反則為六淫故經曰陰為之主陽與之正逆之則為病乃亂生化之常矣常則天地四塞矣治之必求其本當隨四氣絡而推之所以風寒風濕寒濕風溫濕溫風暑濕為病若是合病須明異同所感亦有七證隨有所傷當如是而推之又兼三陽經絡亦有并合能所簡辨雖別脈證甚難不晶乃可論治亦通明造化即正之精微其孰能與於此

## 敘中風論

夫風為天地浩蕩之氣正順則能生長萬物偏邪則傷害品類人或中邪風鮮有不致斃者故入藏則難愈如其經絡空虛而中傷者為半身不遂手腳癱瘓涎潮昏塞口眼喎斜肌膚不仁痺瘁攣僻隨其藏氣所為不同或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂蓋風性緊暴善行數變其中人也卒其眩人也暴激人之涎浮昏人之神亂故推為百病長聖人先此以示教太醫編集所以首論中風也然四氣皆能中人在證亦有缺略奄忽搐搦癱瘓不知人者不可不以脈別故論曰寒熱諸痺所有證候皆如風狀須得脈別可也要知脈浮則為風緊則為寒細則為濕數則為熱右細則為濕浮則為暑瘍則為熱弱則為虛數則為熱有濕則為痺所謂者當以脈別其并合凡風證雖唯許其所因合以脈證在絡在

經入腑入臟依而調之乃可爲治

五臟中風證

肝中風者人迎并左關上脉浮而弦在天爲風在地爲木在人藏爲肝肝虛善中風爲類相從故脉應在左關肝風之狀多汗惡風色微蒼頭目瞤左脇偏痛嗜甘如阻婦狀筋急攣痺不伸診在目其色青

心中風者人迎與左寸口脉洪而浮在天爲熱在地爲火在人臟爲心心虛因中邪風乃子母相因故脉應在左寸口心風之狀多汗惡風色微赤翕翕發熱瘖不能言欲食食則嘔診在舌其色焦赤

脾中風者人迎与右關上脉浮而微遲在天爲濕在地爲土在人臟爲脾脾虛因中風邪爲勝尅故脉應在右關上脾風之狀多汗惡風身黄四肢怠墮皮肉瞤動發熱短氣不欲飲食嗜卧如醉人診在唇其色黄

肺中風者人迎與右寸口脉浮濇而短在天爲燥在地爲金在人臟爲肺肺虛因中邪風爲乘尅故脉應在右手寸口肺風之狀多汗惡風色皓然白口燥而喘逆氣肩息身重背痛而脹腫晝差暮甚診在鼻其色白

腎中風者人迎与左尺中脉浮而滑在天爲寒在地爲水在人臟爲腎腎虛因中邪風爲母子相感故脉應在左尺中腎風之狀多汗惡風色如炲面痝然浮腫腰脊痛引小腹隱曲不利昏寐汗食多志意惶惑診在耳其色黑

胃中風者人迎与兩關上脉並浮而大內有充中風論脾胃有名皆胃脈絡五味以滋養五臟虛而中邪風故其狀頸多汗食飲不下隔塞不通腹善滿失衣則䐜脹口肯息心下淡淡食寒則泄

中風治法

〔生附湯〕治卒中風涎潮昏塞不知人并主痰冷癖氣胸滿嘔沫頭痛飲食不消

大附子（壹隻生去皮臍切作八片）

右以水二椀生薑壹兩切同煎至一大盞去滓溫冷服

〔一法〕加沉香壹錢〔一法〕加辰砂末少匕凡中風无問冷熱虛實皆可服蓋此藥能正氣消痰散風神效

〔白散子〕治肝腎虛爲風所襲卒中涎潮昏塞不語嘔吐痰沫頭目眩暈上實下虛真陽耗竭兼治陰證傷寒六脉沉伏昏不知人又治霍乱吐瀉飲食不進及小便淋澀不通眼赤口瘡咽喉冷痛

大附子（生去皮臍） 桂府滑石（各半兩） 圓白半夏（湯洗二十一次各三分）

右爲末每服貳錢水貳盞薑七片蜜半匙煎七分空腹冷服霍乱加藿香小便不利加木通燈心茅根煎此藥說有差互亦无所苦

〔[illegible]〕治中風開關竅

朱砂（別研） 五靈脂（各一兩） 茯神（去木） 萆薢（各壹兩）

全蝎（壹兩） 腦麝（各壹錢別研）

右爲末每服貳錢酒調服先服此次服神異溫風丹

〔[illegible]〕治中風一切諸疾

麻黃（去根節） 人參 白朮

乾薑（炮） 茯神 附子（炮去皮臍） 白膠香（別研）

甘草（炙） 乳香（別研） 全蝎（去毒炒）

右將麻黃細剉用水五升熬去半入蜜六兩又熬成膏入前件藥末和丸如彈子大每服一丸溫酒下日三服

〔排風湯〕治風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯乱肝風發

則面青心悶吐逆嘔沫脇滿頭眩不聞人声偏枯筋急曲
踡而卧心風發則面赤翕然而熱悲傷嗔怒目張呼喚脾
風發則面黄身體不仁不能行步飲食失味夢寐顛倒与
亡人相隨肺風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎
風發則面黑手足不隨腰痛難以俛仰冷痹骨疼諸有此
證令人心驚志意不定恍惚多忘服此湯安心定志聰耳
明日通臟腑諸風疾悉主之

白鮮皮　白朮　芍藥　桂心

芎藭　當歸　杏仁（去皮尖）　防風（去叉）

甘草（炙各一兩）　獨活　麻黄（去節）　茯苓（各…）

右剉散每服四錢水盞半薑七片棗二枚煎七分去滓溫服

**小續命湯** 治卒中風欲死身體緩急口目不正舌強不能語
奄奄忽忽神情悶亂諸風服之皆驗不令人虛

麻黄（去節湯）　防己（崔氏外臺不用）　人參　黄芩

桂心　甘草（炙）　白芍藥　芎藭（各一兩）

杏仁（一兩去皮尖）　附子（…）　防風（一兩半）

右爲剉散每服四大錢水一盞半薑七片棗一个煎七
分去滓不以時服取汗隨人虛實与所中輕重有人脚
弱服此六七劑得差有風疾家夫陰節變輙合服之可
以防瘖一云恍惚加茯神遠志骨節疼有熱去附子方
藥古今錄驗有白朮无杏仁救急无芎藭杏仁止十味
延年无防風一云遺失便利産後失血并老人小兒用
麻黄桂心甘草各二兩一法治或歌哭或笑語无所不
及用麻黄三兩人參桂枝白朮各二兩无防風附子生
薑有當歸一兩

**獨活丸** 治風懿不能言四肢不收手足嚲曳

白芍藥　栝蔞根　獨活　桂心（各…）　甘草（…）

右爲剉散每服四錢匕薑五片水一盞半煎六分去滓入
生葛汁一合和勻服

**三黄湯** 治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心乱惡寒不欲飲
食兼治賊風偏風猥退風半身不遂失瘖不言

麻黄（…）　黄芪（…）　黄芩（…）　獨活（…）

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓不以時服取
汗欬心熱加大黄半兩腹滿加枳實一分氣逆加人
參三分心悸加牡蠣三分渴加栝蔞根寒加附子一枚
炮熟入劑

**小竹瀝湯** 治中風涎潮謇澀四肢緩縱不收

秦艽　防風　附子　獨活

右水四盞煎二盞入生地黄汁竹瀝各半盞煎三五沸
去滓分四服不拘時热服病去以它藥扶持未知再作

**竹瀝法** 淡竹截尺許長用兩磚對立相去八寸置竹在上
每截破作二片仰安磚上急著火磚外兩頭各置碗以盛
瀝二尺以絹濾澄清夏秋須沉冷水中防瀝酸大熱有風
人亦可單服冷暖隨人勿過度荊瀝亦然

**獨活散** 治男子婦人氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪使上
氣不守正位致頭招搖手足顫掉漸成目昏

獨活　地骨皮　細辛　芎藭

菊花　防風（去叉）　甘草（炙）

右等分爲末每服三錢水一盞半煎一盞去滓取六分清
汁入少竹瀝再煎食後溫服日兩服又法不用獨活

**[illegible]圓** 治中風涎潮[illegible]咽作声目瞑不開口眼喎斜手足不
隨但是一切風疾並宜服之

雄黃(研) 辰砂 龍骨 麝香
烏蛇 白殭蚕 天南星(生) 白附子
右爲末煉蜜丸梧桐子大如中風涎潮牙関不開先用
大蒜一瓣搗爛塗在兩牙関外腮上用豆淋酒化一丸
揩牙斷上即開續用薄荷酒化下一丸如丈夫風氣婦
人血氣牙関緊急只用豆淋酒化一丸揩牙如頭風目
眩暗風眼黑欲倒者急嚼一二丸薄荷湯下

**仁壽圓** 治肝腎氣虛風冷所中筋脉瞤動口眼喎邪常服補
肝元行榮衛養氣血
附子(炮去皮臍) 桂心 白茯苓 山茱萸
五味子 杜仲 續断 枸杞子
熟地黃(洗) 巴戟(去心) 兎絲子 防風
牛膝

右爲末蜜丸梧子大每三五十丸温酒塩湯食前任下

**鐵彈圓** 治男子婦人一切風疾无問遠近癱瘓中風口眼喎
斜言語蹇澁手足軃曳難以伸舉或發搐搦或如虫行或
失音不語牙関緊急脚不能行身躰頑麻百節疼痛精神
不爽頭虛煩悶夜卧不安多涎胷膈不利口乾眼澁多困
少力如破傷風身如角弓口噤不開作汗如油及洗頭風
腦重眉梁骨痛卒中不語迷悶兼口緩風遍身搔癢皍多
倩悸耳作蟬鳴小兒驚風天弔搐搦婦人血風手足煩熱
夜多虛汗頭旋倒地並皆治之
白附子 没藥(別研) 虎脛骨 全蝎
烏頭(炮去皮尖) 麻黃(去節) 自然銅
白花蛇 辰砂(別研) 五靈脂(壹分)
木鼈子 腦麝(壹分) 乳香

右爲末蜜圓彈子大用无灰酒一升浸一貼分二十服
傷風傷寒入分三十服空心臨卧各一服大風五貼可安

**活絡圓** 治半身不遂口眼喎斜癱瘓諸風通活經絡宣
通凝滯常服壯筋骨助血脉起偏廢之疾其效如神
川烏頭 草烏 木鼈子
斑猫 烏蛇 白花蛇
好墨 白膠香 當歸(兩半) 五靈脂
右爲末將木鼈子末醋研爲膏和黑豆末一斤好醋拌
一兩作十丸以墨爲衣空心食前温酒塩湯嚼下一丸

**[illegible]** 治風氣不順手脚偏枯流注經絡并濕毒進襲
腿脚筋攣痺筋骨疼痛
烏藥(去木) 麻黃(去節) 橘皮 甘草(炙)
川芎 枳殻 桔梗 白殭蚕(炒去絲觜)
白芷(各壹兩) 白薑(兩半)
右爲末每服二錢匕水一盞薑三片薄荷七葉煎七分
空心服治氣去侍荷用棗子二枚同煎

**舒筋保安散** 治左癱右瘓筋脉拘攣身體不遂脚腿少力乾
濕脚氣及濕滯經絡久不能去宣導諸氣
乾木瓜(五兩) 萆薢 五靈脂 牛膝(酒浸)
續断 白殭蚕(炒去絲) 松節 白芍藥
烏藥(去木) 天麻 威靈仙 黃芪
川當歸 防風(去叉) 虎骨(各壹兩)
右用无灰酒一斗浸上件藥二七日緊封扎日數足取
藥焙乾搗爲細末每服二錢用浸藥酒半盞調下如酒
尽用米湯調下又方添金毛狗脊一兩却將乳香白膠
香各一兩同研入乾藥末內

別本無此方

松節散治風寒冷濕搏於筋骨使筋攣掣痛行步艱難但是
諸筋攣縮疼痛悉主之
茯神中心木(壹兩剉如米) 乳香(壹錢別研)
右入銀石器內炒留兩分性爲末每服貳錢木瓜酒下

芎桂散治中風四肢疼痛及兩足俱軟行履不便
川烏頭([illegible])
川芎(兩半) 桂心(壹兩) 甘草(炙) 乾姜(炮各一分)
右爲末每服貳錢溫鹽酒調下日參服

二十

趁風膏治中風手足偏廢不舉
川山甲(左癱用右足右癱用左足) 紅海蛤(如棋子者) 川烏頭(大者生用各貳兩)
右爲末每用半兩擣烈葱白汁和成厚餅約徑寸半
貼在所患一邊腳中心用舊絹緊縛定於無風密室
中椅子上坐椅前用湯一盆將貼藥腳於湯內浸仍用
人扶病人恐汗出不能支持候汗出即急去了藥汗欲
出身麻木得汗周遍爲妙切宜避風自然手足可舉如
病未盡除候半月二十日以後再依此法用一次自除
根本仍服治風補理藥忌口遠慾以自養

附子酒治中風風冷痰癖脹滿諸痺
大附子(一枚去皮臍[illegible])
右用醇酒一升春浸五日夏三日秋冬七日每服一合
日二三服以痺住爲効未知再作

別本無此方

小黄芪丸治大治風虛痰癖四肢偏枯兩腳弱手不能上頭或
小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有積飲夜夢悲恐
不樂恍惚善忘此由風虛五藏受邪所致或久坐腰痛耳
聾卒起眼眩頭重或舉體流腫疼痛飲食惡冷澀澀惡寒
胃中痰痛心下寒疝及婦人產後餘疾風虛積冷不除

黄芪 附子(炮去皮) 川椒(去目并合口者) 桂心
秦艽 牛膝 防風(去叉) 烏頭([illegible])
白朮 川芎 獨活 細辛(去苗)
甘草(各壹兩) 大黄 葛根 山茱萸
乾姜(各弍兩) 當歸(弍兩半)
右爲剉散少壯人無熬煉虛老人微熬之以絹袋盛用
清酒弍斗漬之春夏五日秋冬七日可先服食一合不
知至四五合日三服此藥攻痺尤佳亦不令人吐悶小
熱宜冷飲食也大虛加蓯蓉二兩下利加女萎三兩多
忘加石斛菖蒲紫石英各二兩心下多水加伏苓人參
各二兩山藥三兩酒盡可更以酒二斗重漬滓服之不
尔可曝滓擣下篩酒服方寸匕不知稍增之服一劑得
力令人耐寒冷補虛治諸風冷神妙

[illegible]翊謨經進仙傳方治大風及偏風一切風疾延年益壽
牛蒡根 牛膝(各一斤) 秦艽 鼠粘子(各弍[illegible])
枸杞子(炒一升) 蒼朮([illegible]) 防風 蚕沙(各[illegible]兩)
大麻子([illegible]) 桔梗 羌活(各弍兩)
右爲剉散无灰酒二斗淨瓷器內浸密封七日開二時
不得對瓶口日進三服每服一大盞溫服常令面有酒
色甚者不過一斗足效食并魚肉動風物([illegible])

科簡類例

且人之冒風也輕則爲傷重則爲中蓋風散氣動於陽腠理
開故自汗而惡風其色從皆隨藏氣而言六府无論唯胃有
中者蓋飲食所致故孫真人曰新食竟取風爲胃風據論亦
然然六府經絡邪既能中豈不能中諸府也雖曰轉輸在大
小腸則有腹脹在胞則有轉戾在膽則有摘縮但文缺不論

芒入喉中諸藏故入論諸府此亦一説故兩存之治法論中
所謂左癱右瘓者蓋邪氣中人邪氣反緩正氣即急正氣引
邪喎僻不遂入風懿者以心肺閉塞不能言化痰作喘嗄
肺氣入心則能言邪中心肺涎潮過塞故使然也邪收縮
為風邪者以風散涎注於關節氣不能行故使四肢不遂也
舌強不能言者以風入心脾經心之別脈係於舌本脾之脈
絡胃俠咽連舌本散舌下風涎入其經絡故舌不轉而不能
言也四肢拘攣者以中風冷邪氣入於肝臟使諸筋攣急屈
不可伸也風痱者以風熱入於肝臟使諸筋弛張緩而不收
也故經云寒則攣急熱則弛張風顫者以風入於肝藏經絡
上氣不守正位故使頭招搖而手足顫掉也風癔者以風冷
之氣客於中滯而不能發故使口噤不能言也与前所謂涎
塞心肺同候此以口噤為差耳猥退風者半身不遂失音不
語臨事不前亦偏中於心肺經所致也諸證類例可推而論

不內外因中風凡例

凡因不內不外而致風中者亦各從其類也如新沐中風名
曰首風飲酒中風名曰漏風又曰酒風入房中風名曰內風
又曰勞風治之各有方

**附子摩頭散**治因沐頭中風多汗惡風當先風一日而病甚
頭痛不可以出至日則少愈名曰首風

大附子一枚炮去皮臍　鹽等分

右二味為散沐了以方寸匕摩頭上令藥力行

**白朮散**治因醉中風惡風多汗少氣口乾善渴近衣則身熱
如火臨食則汗流如浴骨節懈惰不欲自勞名曰漏風

澤瀉　白朮各一兩　麋銜半兩

右為末每服二錢酒飲任調下食前服

**附子湯**治房室竟中風惡風多汗汗出沾衣口乾上漬其不能
勞事身体盡痛名曰內風

附子炮去皮臍　人參各半兩　茴香炒　茯苓
山茱萸去核一分　甘草炙　乾姜炮各一分

右為剉散每服四大錢水一盞半姜三片鹽少許煎至七
分去滓食前服

敘中寒論

夫寒者乃天地殺厲之氣在天為寒在地為水在人臟為腎
故寒喜中腎中之多使攣急疼痛昏不知人挾風則眩暈
兼濕則腫疼治之唯宜溫劑不可吐下皆逆也然寒性雖喜
歸腎五臟皆能中之若中於經絡之表則易散入裏則不消
与傷寒脉證无異但輕重不同其有本藏即中寒者經論既
載不可不辯明也詳論在傷寒門

五藏中寒證

肝中寒者人迎与左關上脉緊而弦肝虛中寒乃母子相因
弦多則吉但緊不弦舌卷囊縮為不利故使本部脉緊如切
繩肝中寒之狀其人洒洒惡寒翕翕發熱翕然面赤漐漐如
有汗胸中煩熱脇下攣急足不得伸
心中寒者人迎与左寸口脉緊而洪心虛中寒賊邪相剋脉
應本部洪滑則吉但緊不洪為不利心中寒之狀其人如啖
韭蒜狀劇則心痛徹背背痛徹心猶如蠱注惡寒四肢厥自
吐少悶頭時復發休作不已昏塞不知人
脾中寒者人迎与右關上脉緊而沉細脾虛中寒二邪兼剋
脉應本部緩則吉沉緊而弦為不利脾中寒之狀心腹脹
四肢攣急噯噫不通藏氣不傳或秘或泄
肺中寒者人迎与右寸口脉緊而濇肺虛中寒母子相感脉

應本部浮皆為苦但緊而傷鼻乾燥為不利肺中寒之狀喜
吐濁涎氣短不能報息洒洒而寒吸吸而咳
腎中寒者人迎与左尺中脉似緊而滑虛中寒之病中腎
以類相從脉雖本部亦滑者吉緊濇且軟黑目滿腹為不利
腎中寒之狀色黑氣弱吸吸少氣耳聾腰痛膝下清拘攣而
疼皆不知人餘例見傷寒門

中寒治法

**附子理中湯** 治五臟中寒口噤四肢強直失音不語昔有武士守邊大雪出帳外觀瞭忽然暈倒時林億作隨行醫官灌以此藥兩劑遂醒

大附子炮去皮臍 人參 乾姜炮 甘草炙 白朮各分

右為剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓不以時服口噤則斡開灌之

**姜附湯** 治中寒卒然暈倒或吐逆涎沫狀如暗風手腳攣搐口噤四肢厥冷或復燥熱

乾姜炮 附子生去皮臍

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服入肝加木瓜入肺加桑白皮入脾加朮入心加茯苓隨證加之

中暑論

中暑者其脉陽弱而陰虛微遲似乎夫暑在天為熱在地為火在人臟為心故暑喜歸心中之使人噎悶昏不知人入肝則眩暈頑痺入脾則昏睡不覺入肺則喘滿痿躄入腎則消渴利小便見中暍死治之切不得用冷惟宜溫養得冷則死道塗无湯即以熱土熨臍中仍使更溺臍間見矣若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚下之則淋甚治之不可不謹也然傷暑中暍其實一病但輕重不同新校正要略者乃去傷寒家別有暍病非也詳論治法見傷暑門

中暑治法

**大黃龍圓** 治中暑眩暈昏不知人或身熱惡寒頭痛狀如傷寒或往來寒熱煩躁渴甚嘔吐泄瀉常服大暑每分利陰

硫黃 硝石各一兩 雄黃通明者 滑石
白礬各半兩 寒食麵四兩

右為末入水為圓如梧子大每服五圓至七圓漸加至二十圓新汲水下昔暑不知人則以水化開灌之中暑忌得冷水此藥却似冷水下之乃熱因寒用疑者釋之

中暑大例

中暑悶倒急扶在陰涼處切不可与冷水當以布巾衣物等蘸熱湯熨臍中及氣海續以湯淋布上令徹臍腹暖即漸醒如倉卒无湯處掬道上熱土於臍上以多為佳冷即易古法道塗无湯即掬熱土於臍上仍撥開作竅令人更溺於其中以代湯續与解暑毒藥如白虎竹葉石膏湯凡覓中暑急嚼生姜一大塊以冷水送下如已迷亂悶嚼大蒜一大瓣以冷水送下如不能嚼即用水研灌之立醒路中覓蓼子丸水濕研爛嚼生蒜二寸許以同搗碎抵飲水一升

中濕論

中濕者脉沉而細微緩以濕溢人肌之浮脉則沉細夫濕者在天為雨在地為土在人臟為脾故濕喜歸脾脾虛喜中濕故曰濕流關節中之多使人頭脹四肢關節疼痛而煩久則渾身浮腫喘滿昏不知人挾風則眩暈嘔噦挾寒則攣拳掣痛治之不得猥發汗及灼艾泄瀉惟利小便為佳故論云治濕不利小便非其治也大汗大下皆死詳論治法見傷暑門

中濕治法

白朮酒 治中濕口噤不知人
白朮半兩
右酒三盞煎一盞頓服不能飲酒以水代之日三夜一

四氣兼中證論

風寒暑濕本乎一氣性中則同用中相兼且風寒既能中五藏暑濕其可不論所以論有肝者其人常欲蹈其背未苦時但欲飲熱肝著四肢浮腫身重如石不能自反腎著者身重腰中冷如坐水中形如水狀以不渴小便自利食飲如故心肺不見明文恐文簡所以略以臆補或云濕唯中脾三陰故不及心肺然五藏有金柄片果射勝就相感相因而得之假如風中肝為本病中脾為勝就中肺為乘就中心為相因中腎為相感則九所以通明濕不及心肺未為確論故執以俟明哲暑濕亦然見六淫均故四氣皆能中人中風則有汗脈必浮弦中寒則无汗脈必緊澀寒痛中暑則昏憒面垢脈必虛緩發怠中濕則重著脈必細緩四肢腫即疼痛皆能交錯互織所謂風寒風溫風濕寒濕暑溫三溫等當以人迎脈證別之令无差誤更有七情內作亦能交潮氣寒手足嚲曳一如中風不可例作六淫氣治其至天狂不言亦惡涎隨氣上厥使人眩暈昏不知人半身不遂口眼喎邪手足嚲曳者故有中氣中痰之別猶當辨別毋使混濫除外所因方見於此後內所因各見本門

四氣兼中治法

附子湯 治五臟中風寒手足不仁口面喎斜骨節疼失音眼目瞤動牙車緊急不得轉動
附子炮去皮臍 桂心各半兩 細辛去苗 防風去叉
人參 乾姜炮各

右為剉散每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎七分去滓食前服或為末酒調二錢服

杏子湯 治中風冷者卒然暈倒而昏四肢緩弱喜呻欠口喎邪四肢不仁好笑
防風去叉 麻黃去節 桂心 杏仁去皮尖麩炒
乾姜炮 甘草炙各等分
右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

生附白朮湯 治中風濕昏悶恍惚脹滿身重手足緩縱漐漐自汗失音不語便利不禁
附子生去皮臍 乾姜炮各半兩 白朮一兩 甘草一分炙
右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

附子麻黃湯 治中寒濕昏暈緩弱或腰脊強急口噤語聲混濁心腹䐜脹氣上喘不能轉側
附子炮去皮臍 麻黃去節 白朮 乾姜
甘草炙 人參各等分
右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

茯苓[illegible] 四肢不仁半身不遂骨節離解緩弱不收或入浴暈倒口眼喎邪手足嚲曳皆濕溫為也
附子炮去皮臍 茯苓 白朮 乾姜炮
澤瀉 桂心各半兩
右為剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前小服

敘痺論

夫風濕寒三氣雜至，合而為痺。雖曰合痺，其用自殊。風勝則為行痺，寒勝則為痛痺，濕勝則為著痺。三氣襲人經絡，入於筋脈、皮肉、肌骨，久而不已，則入五臟。凡使人煩滿，喘而吐者，是痺客於肺；煩心上氣，嗌乾恐噫，厥脹滿者，是痺客於心；多飲數小便，小腹痛如懷妊，夜臥則驚者，是痺客於肝；善脹，尻以代踵，脊以代頭者，是痺客於腎；四肢解墮，發欬嘔汁，上為大塞者，是痺客於脾。又有腸痺者，數飲而小便不利，中氣喘急，時發飧泄；又胞痺者，小腹按之內痛，若沃以湯，濇於小便，上為清涕。又六腑各有俞，風寒濕中其俞，而食飲應之，故循俞而入，各舍其腑。治之，隨其腑俞，以施針灸之法，仍服逐風濕寒發散等藥，則病自愈。大抵痺之為病，寒多則痛，風多則行，濕多則著；在骨則重而不舉，在脈則血凝不流，在筋則屈而不伸，在肉則不仁，在皮則寒，逢寒則急，逢熱則縱。又有血痺，以類相從，附於此門，外有支飲作痺，見痰飲門。

合痺治法

附子湯 治風濕寒痺，骨節疼痛，皮膚不仁，肌肉重著，四肢緩縱。

附子（生，去皮臍） 白芍藥 桂心 甘草

白茯苓 人參（各三分） 白朮（一兩）

右為剉散，每服四錢，水二盞，煎七分，去滓，食前服。

黃芪五物湯 治尊榮人骨弱肌重，因疲勞汗出，臥不時動搖，加以微風，遂作血痺，脈當陰陽俱微，尺中少緊，身體如風痺狀。

黃芪 芍藥 桂心（各等分）

右為剉散，每服四大錢，水一盞半，薑五片，棗三枚，煎七分，去滓，食前服。

[illegible] 治風濕寒痺，身體腫痛，疼痺不仁，飲食惡冷，濇濇惡寒，胃中痰滿，心下塞。○方見中風門

歷節論

夫歷節，疼痛不可屈伸，身體尫羸，其腫如脫，其痛如掣，流注骨節，短氣自汗，頭眩，溫溫欲吐者，皆以風濕寒相搏而成。其痛如掣者，為寒多；腫滿如脫者，為濕多；歷節黃汗出者，為風多。顧病源所載，飲酒當風，汗出入水，遂成斯疾，原其所因，雖涉風濕寒，又有飲酒之說，自屬不內外因；亦有不能飲酒而患此者，要當推求所因，分其先後輕重為治。久而不治，令人骨節蹉跌，變為癲病，不可不知。

歷節治法

桂枝芍藥知母湯 治諸肢節疼痛，身體尫羸，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐。

桂心 知母 防風（各四兩） 芍藥

甘草（炙） 麻黃（去節） 附子（炮，去皮臍）

右為剉散，每服肆錢，水壹盞半，薑伍片，煎柒分，去滓，空腹服。一法，有白朮、川芎、杏仁、半夏。

烏頭湯 治病歷節痛不可屈伸。

烏頭（五枚，剉，以蜜二升煎取一升，去烏頭） 甘草（炙） 麻黃（去節）

芍藥 黃芪（各三兩）

右為剉散，每服四錢，水貳盞，煎至柒分，去滓，投煎蜜一合，空腹溫服。千金有老薑、桂心、大棗，與黃芪、麻黃，治寒疝腹中絞痛，賊風入腹攻五臟，拘急不得轉側，叫呼發作有時，使人手足厥冷。

附子八物湯 治風歷節，四肢疼痛，如槌鍛，不可忍。

附子炮去皮臍 乾姜炮 芍藥 茯苓
甘草炙 桂心各三兩 白朮四兩 人參三兩

右為剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓食前服一方
去桂心用乾地黃二兩

獨活寄生湯 亦治歷節風近人用之甚效亦治腰背痛及脚氣流注 方見腰痛門

敘脚氣論

夫中風寒暑濕與脚氣皆以斷頓淺深之不同中風寒暑濕得之頓而淺脚氣得之漸而深以其隨臟氣虛實寒熱發動故得氣名自其經絡入臟證候雖不一然三陽多熱躁三陰多寒冷所以療之亦不專主一氣亦不專在一經故與中風寒暑濕為異耳兼有緩縱諸證其狀多端未易分別治之須尋其經絡病證所在去處然後以脉察其虛實淺深為治假如三陽經其證多在足外踝及手背三陰經其證多在足內踝及臂內以此粗分陰陽可知大槩是其如風寒暑濕性用各不同乃為風為行寒為痛暑為煩濕為着乃不判之說千金方論與蘇長史類門類皆論其證候以雖悉推留心斯道者必有在當之論焉

敘千金論

千金論脚氣皆由感風毒所致多不令人即覺會因他病乃始發動或奄然大悶經三兩日方乃覺之庸醫不識或作餘疾治之莫不大驚始覺甚微食飲嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱為異耳及論風毒相搏下天有脚未覺異而頭項臂膊已有所苦諸處皆悉未知而心腹五內已有所困或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下利或大小便秘澀或胸中衝悸不欲見光明或精神昏憒語言錯亂或壯熱頭痛或身體冷疼煩或覺轉筋或腫或脛腫或頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或小腹不仁皆謂脚氣狀貌也乃至婦人產後取涼多中此毒其熱悶掣縱驚悸心煩嘔吐氣上臍下冷痛幅二然不快兼小便淋澀不同生平皆是脚氣之候頑弱名緩風疼痛為濕痺右件一一千金節文但備叙諸證不說陰陽經絡所受去處亦不分風寒暑濕四氣及內外虛實所因使學者何為治若一向信書不若無書為此之謂也

脚氣脉證

脚氣之脉其狀同多但當以脉證分其陰陽使無差互所謂脉浮為風緊為寒緩細為濕洪數為熱見於諸陽經在外宜發散之愈沉而弦者亦為風沉而緊者為寒沉細為濕沉數為熱見諸陰經在裏宜溫利之愈外證自汗走注為風無汗疼痛攣急為寒腫滿重着為濕煩渴熱頑為暑四氣兼有但推其多者為勝分治之當以諸證互辨而分表裏寒熱則濕之熱則寒之在表則散在裏則下若太虛氣乏間作補湯隨病冷熱而用之不可拘不得服補藥

敘太陽經脚氣證

病者頭痛目眩項強腰脊連身體痛從髀外踝之後循京骨至小指外側皆痛者乃足太陽膀胱經為風寒暑濕流注自汗者為風勝無汗疼痛為寒勝熱煩為暑勝重著腫滿為濕勝諸經皆當如此推尼太陽經宜隨四氣發散令愈

太陽經脚氣治法

麻黃左經湯 治風寒暑濕流注足太陽經手足攣痺行步艱難憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭疼眩暈腰重關節

麻黃去節 乾葛 細辛 白朮米泔浸
茯苓 防己 桂心不見火 羌活

防風　甘草炙等分

右爲麁末每服肆錢水貳盞薑伍片棗壹箇煎柒分去滓空腹服自汗去麻黃加桂芍藥重着加朮橘皮無汗減桂加杏仁澤瀉所加並等分

陽明經脚氣證

病者㿉㿉寒熱呻欠口鼻乾腹脹髀膝臏中循胻外廉下足跗入中指內間皆痛者乃足陽明胃經爲風寒暑濕流注之所爲四氣偏勝並如上說治之宜隨四氣微利之

陽明經脚氣治法

大黃左經湯　治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚腫痛行步艱難從朝昏至大小便秘澀腹痛嘔吐或復下利惡聞食氣喘滿肩息或自汗譫妄

大黃炙　細辛去苗　茯苓　防已

羌活　黃芩　前胡　枳殼麩炒去瓤

厚朴去皮薑汁製炒　甘草炙　杏仁麩炒去皮尖別研

右剉散每服肆大錢水盞半薑伍片棗壹箇煎柒分去滓空腹熱服腹痛加芍藥秘結加阿膠喘加桑白皮紫蘇小便秘加澤瀉四肢瘡癢浸淫加升麻所加並等分

荷葉藁本湯　治脚脛生瘡浸淫腿胻腫汁淋漓熱痒痛痒

乾荷葉四張　藁本壹分

右爲剉散以水貳斗煎減伍升去滓溫暖得所淋洗仍服前大黃左經湯佳

少陽經脚氣證

病者口苦善太息脇痛面垢體無膏澤頭額目兑皆痛缺盆并腋下馬刀腫自汗振寒發熱胷中脇肋髀膝外至胻絕骨外踝及諸節指皆痛者乃足少陽膽經爲風寒暑濕流注之所爲四氣偏勝例如前說治之宜隨四氣和解

少陽經脚氣治法

半夏左經湯　治足少陽經爲風寒暑濕流注發熱腰脇痛頭疼眩暈嘔吐宿汁耳聾驚悸熱悶心煩氣上喘滿肩息腿痺緩縱不隨

半夏湯洗去滑　乾葛　細辛　白朮

茯苓　桂心不見火　防風　乾薑炮

黃芩　小草　甘草炙　柴胡

麥門冬去心各等分

右剉散每服肆大錢水壹盞半薑叁片棗壹箇煎柒分去滓空腹服熱悶加竹瀝每服半合喘滿加杏仁桑白皮

料簡三陽并合脚氣

三陽經有并有合如太陽并少陽少陽併陽明陽明并太陽三陽合病皆於經絡中推故其并合隨證治之所謂并者二經相并合者三經會合以此強分使名義易曉不必論其一二也

三陽并合脚氣證治

病者憎寒壯熱自汗惡風或無汗惡寒暈眩重着關節掣痛手足拘攣疼痛冷痺緩縱不隨心躁氣上嘔吐下利此皆三陽經中風寒暑濕其脈必浮弦緊數

大料神秘左經湯　治風寒暑濕流注足三陽經手足拘攣疼痛行步艱難憎寒發熱自汗惡風頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞大小便秘澀或腹痛嘔吐下利惡聞食臭髀腿頑痺緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上臍下冷痺喘滿肩息

麻黃去節　乾葛　細辛　厚朴薑汁製炒

茯苓　防已　枳殼麩炒去瓤　桂心

羌活　防風去叉　柴胡　黃芩

小草去心炒 白薑炮 半夏湯洗去滑 甘草

麥門冬去心各等分 [illegible]

右剉散每服肆大錢水壹盞半薑參片棗壹枚煎柒分去滓空腹服自汗加牡蠣白朮去麻黄腫滿加澤瀉木通熱甚無汗減桂加橘皮前胡升麻腹痛吐利去黄芩加芍藥附子炮大便秘加大黄竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇所加並等分凡有此病詳認證狀逐一加減無不愈者常服下氣消痰散風滌退腫進飲食令人不虛江南諸師因秘此方雖父子兄弟不傳學者當敬用之

**加味敗毒散** 治三陽經脚氣流注脚踝上焮熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒

羌活 獨活 前胡 柴胡

枳殼去穰麩炒 桔梗 甘草炙 人參

茯苓 川芎 大黃蒸 蒼朮米泔浸各等分

右剉散每服四大錢水盞半薑參片薄荷一頭煎柒分去滓熱服不過貳服愈皮膚瘙痒赤疹加蟬蛻煎

太陰經脚氣證治

病者腹滿夾咽連舌系急胸脅痞滿循胻骨下股膝內前廉內踝過核骨後連足大指之端內側皆痛者乃足太陰脾經為四氣流注之所為也四氣偏勝並如前說治之各隨其氣所中輕重溫散之

**六物附子湯** 治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利惡風怯寒頭面手足時時浮腫

附子炮去皮臍 桂心各四兩 白朮參兩 甘草炙貳兩

防己四兩 茯苓參兩

右剉散每服肆錢水貳盞薑柒片煎柒分去滓溫服

少陰經脚氣證治

病者腰脊痛小指之下連足心循內踝入跟中上腨內出膕中內廉股內皆痛上衝胸咽飢不能食面黑小便淋閉咳唾不已善恐心惕惕若人將捕之狀小腹不仁者難治足少陰腎經為四氣流注之所為也四氣偏勝並如前說治之各隨其氣所中輕重而溫之

**八味圓** 治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自汗此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵

牡丹皮 澤瀉 茯苓各參兩 附子炮去皮臍

桂心各貳兩 山茱萸 山藥各肆兩 熟地黄捌兩

右為末煉蜜圓梧子大每服伍拾圓溫酒米湯食前任下

厥陰經脚氣證

病者腰脇偏疼從足大指連足趺上廉上膕至內廉循股環陰抵小腹夾臍諸處脹痛兩脚攣急嗌乾嘔逆洞泄者足厥陰肝經為四氣流注之所為也四氣偏勝並如前說治之各隨其氣所中輕重調理之

**神應養真丹** 治厥陰肝經為四氣進襲肝藏左癱右瘓涎潮昏塞半身不遂手足頑麻語言蹇澀頭旋目眩牙關緊急氣喘自汗心神恍惚肢體緩弱上攻頭目下注脚膝榮氣凝滯遍身疼痛兼治婦人產後中風角弓反張墮車落馬打撲傷損瘀血在內

當歸酒浸 天麻 川芎 羌活

白芍藥 熟地黃各等分 [illegible]

右為末蜜圓如雞子黃大每服壹圓木瓜菟絲子浸酒下脚痺薏苡仁浸酒下中風溫酒米湯下

料簡三陰并合脚氣

傷寒三陽有并合三陰與并合藏腑不同故也亦自不妨傳變脚氣則不然以久滯藏氣隨其虛實寒熱而流注故病多并合不可不知

三陰并合脚氣治法

地仙圓 治肝腎藏虛風濕進襲流注腿膝行步艱難漸成風濕脚氣足心如火上氣喘急小腹不仁全不進食

赤小豆 五靈脂 白膠香 破故紙（炒）
狗脊（火去毛） 木鱉子（去殼） 海桐皮 威靈仙
地龍（炒） 草烏

右各壹兩為末酒糊為丸如梧子大辰砂為衣每服伍拾圓空心鹽酒任下

[illegible]圓 治肝腎虛為風寒濕毒所中流注腿膝歷節疼痛如錐刀鍛刺不可名狀

大烏頭 牛膝

右貳味並不得見銅鐵器及火以木臼擣碎牛膝同入石磨中磨為末酒糊圓梧子大每服肆拾圓用無灰酒壹瓶中搖木瓜壹箇切作片入瓶中煨木瓜爛形度用此酒下不拘時候然肝氣惡鐵忌則有之不見火日此好事者妄忌且如烏頭牛膝採時豈一向陰乾也

十全丹 治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小腹不仁煩渴小便或秘或利關節攣痺疼痛神效不可具述

蓯蓉（酒浸） 石斛（酒浸） 狗脊（火去毛） 萆薢
茯苓 牛膝（酒浸） 地仙子 遠志（去心炒）
熟地黃 杜仲（去皮剉炒）

右為末煉蜜圓梧子大每服五十圓溫酒鹽湯任下

[illegible]圓 治腎虛為風濕寒所襲四氣相搏半身不遂手足頑麻骨節煩疼足脛浮腫惡寒發熱漸成脚氣肝腎不足四肢攣急遍身攻注或閃肭打撲內傷筋骨及風邪內搏男子疝氣婦人經脈不調常服活血止痛補虛壯筋骨

威靈仙（去蘆） 烏藥（去木） 茴香（炒） 川練子（去核炒）
牽牛子（炒） 橘皮（去白） 萆薢 防風（各貳兩）
五苓脂 乳香（各半兩） 草烏

右為末酒糊丸梧子大每服伍拾圓鹽酒鹽湯任下婦人醋湯下食前

大犀角湯 治脾腎經脚膝腫痺小腹頑麻上攻頭面通身洪腫小便不利上氣喘滿悶絕欲死

犀角（鎊） 黃芩 旋覆花 白朮
桂心（不見火） 防己 香豉（炒） 橘皮
茯苓 前胡 桑白皮 紫蘇莖葉

右為剉散每服肆錢水壹盞半薑伍片棗兩枚煎柒分去滓食前服加杏仁

四蒸木瓜圓 治肝腎脾三經氣虛為風寒濕搏着流注經絡[illegible]日晚歲治療不瘥凡遇六化更變七情不和必至發動或腫滿或頑痺增寒壯熱嘔吐自汗

威靈仙 黃芪 蒼朮 烏藥

右各半兩以大木瓜肆箇切蓋去穰入前件藥仍用蓋簽定酒酒蒸熟三蒸三曬取藥出焙乾為末研瓜為膏搜和擣千杵圓如梧子大每服伍拾圓空心溫酒鹽湯任下此傳木瓜圓最多惟此方有效曾敘之黃松節圓

[illegible] 治肝脾腎三經為風濕寒熱毒氣上攻陰陽不和四

肢拘攣上氣喘滿小便秘澁心熱煩悶遍身浮腫腳弱

半夏湯洗壹兩 黃芪 甘草炙 當歸

人參 厚朴薑汁製 獨活 橘皮各壹兩

熟地黃 芍藥 枳實去穰麩炒 麻黃去節各半兩

桂心不見火叁兩 貝子[illegible]

右為㕮咀散每服肆錢水壹盞半薑柒片棗三箇煎柒分

去滓空心溫服日參夜壹

腳氣總治

千金腳氣論在諸風之前良有以也方論雖多識此病者少或覺之傷晚或狐疑不決枉死者半信不誣矣凡有此證最宜急治緩則入腹攻五藏與神丹亦無如之何又久患續生諸病如大小便不利腫滿飲食傷等不妨別別為治所謂先去新病病當在後若總而治之則亦庶乎其可也

**烏藥平氣湯** 治腳氣上攻喘滿及五藏偏勝諸氣不和喘咳奔衝坐卧不安頭暈腳弱上實下虛

烏藥去木 人參 白朮 川芎

當歸 伏神去木 甘草炙 白芷

木瓜乾 五味子 紫蘇子各等分

右為㕮咀散每服肆錢水壹盞半薑伍片棗兩枚煎柒分去滓溫服或作細末湯點下

**紫蘇子湯** 治腳弱上氣陰陽交錯清濁不分上重下虛中滿喘急嘔吐自汗無複紀律千金云宋湘王在南州患腳氣困篤服此得效

紫蘇子略炒 半夏湯洗各五兩 前胡去苗 厚朴去皮製

甘草炙 當歸各貳兩 桂心不見火 橘皮各參兩

右為㕮咀散每服肆錢水貳盞薑柒片棗兩箇煎柒分去

滓食後服心謂前山人降氣湯是也好事者復加附子黃芪又改其分兩亦班入太醫方用者宜知之

**木瓜牛膝圓** 治寒濕腳氣冷濕下注腳弱無力或腫急疼痛兼治婦人血風大固腎氣活血壯筋絡

木瓜 川烏 牛膝 萆薢

茴香炒 羌活 青皮 青鹽別研入

狗脊燎去毛 巴戟 海桐皮各

右為末入青鹽和勻將前貳膏搜為圓如硬再入酒杵數千下圓梧子大每服伍拾圓食前鹽湯鹽酒任下

**茱萸圓** 治腳氣入腹腹脹不仁喘悶欲死

吳茱萸湯泡 木瓜去穰切

右等分為末酒糊圓如梧子大每服伍拾圓至百圓酒飲任下或以木瓜蒸爛研膏為圓尤妙

**[illegible]圓** 治乾濕腳氣

附子 黑豆

右熟豆壹合同附子研為餅焙乾為末煉蜜為圓如皂角子大每服兩圓空心煨香酒嚼下

**木通散** 治腳氣服補藥太過小便不通淋閉臍下脹急

當歸 梔子仁炒 赤芍藥 赤茯苓

甘草生各等分

右為散每服參錢水壹盞煎柒分去滓服

**白皮小豆散** 治腳氣小便澁兩腳腫氣脹

赤小豆 桑白皮 紫蘇 生薑半兩

右剉散水參升煮豆熟取豆食去滓仍取餘汁飲之

**[illegible]圓** 治元氣不足真氣虛弱及治下虛寒濕氣進襲手足拳

攣，腳指連腳向拘急，足注疼痛，筋脉不伸，行步不隨，常服
益真氣，壯筋骨，黑髭鬢，滑皮膚，一切足弱鶴膝諸風。
附子（去皮臍，炮，壹兩） 當歸（酒浸，壹兩） 天麻（酒浸） 牛膝（酒浸）
酸棗仁（炒） 熟地黃（酒蒸） 防風（去叉，各貳兩） 木瓜（肆兩）
乳香（半兩） 麝香（壹分） 全蝎（去毒） 木香
沒藥（別研） 羌活 甘草（炙，各壹兩）
右件為細末，用生地黃叁斤，淨洗研爛如泥，入無灰酒
肆升，煮爛如膏，以前藥勻和，杵令堅，每兩作拾圓，每服
壹丸，細嚼，臨睡酒下。地黃膏吞夏極多遇冬或無地黃，
只煉蜜為丸，如梧子大，每服伍拾圓，鹽湯溫酒下。

【加減法】 檳榔 萆薢 白茯苓（酒浸） 破故紙（炒）
巴戟（去木）
右五味各添壹兩，內熟地黃、當歸各減壹兩，尤妙。如服
此藥五七日或半月日見效，甚速，行步如飛，千里可至，
乃名勝駿。

【換腿圓】治足三陰經虛，為風寒暑濕進襲，攣痺緩弱，上攻胸
脇肩背，下注腳膝，疼痛，斷成風濕腳氣，行步艱難，足心如
火，上氣喘急，全不進食。衛生方太治一切腳氣
石南葉 天南星（炮） 石斛（酒浸） 川牛膝（酒浸）
羌活 薏苡仁（炒） 防風（去叉） 萆薢
黃芪（蜜炙） 天麻 當歸（酒浸） 川續斷（各兩半）
木瓜（四兩） 檳榔（貳兩半）
右為末，酒煮麪糊為圓，如梧子大，每服伍拾圓，空心溫
酒鹽湯任下。或方加至七十丸，乳香溫酒下





敘傷風論

經云：春傷風，夏飧泄。此乃四時之序也。或表中風在經絡中，
循經流注，以日傳變，與傷寒無異，但寒泣血，無汗惡寒；風散
氣，有汗惡風，為不同。仲景正以此格量太陽經傷寒傷風，用
藥不同。而纂集者不識門類，遂雜編二證，使後學混濫，卒不
知歸。甚者以傷風暑濕、時氣疫沴，凡曰太陽病者，皆謂之傷
寒。昔人不經類皆如此，固不足道。但名義中錯，惑於後世，不
可不與之辨。今別立傷風一門，於四淫之前，且依先哲，以太
陽為始，分注六經，學者當自知。

傷風證治

足太陽膀胱經傷風，有汗惡風，不惡寒，頭項強，腰脊痛。以其
脉從巔入絡腦，還出別下項，循肩膊內，俠脊抵腰中，故太陽
諸證如是，治之宜桂枝湯。

【桂枝湯】治太陽傷風，脉陽浮陰弱，發熱惡寒，頭痛鼻鳴乾嘔，
發熱自汗惡風，或頭熱，汗出則解，有如瘧狀，脉浮洪虛者。
桂枝（去皮） 芍藥（各壹兩） 甘草（炙，半兩）
右㕮咀，每服五錢，水壹盞半，煎八分，去滓，食前服，溫覆
令遍身微汗愈。或發汗漏不止，惡風，小便難，四肢拘急
者，加熟附子一分。或項背強几几，反汗出惡風者，加葛
根一兩三錢。或汗出後身疼痛，脉沉遲者，加芍藥、生薑
各半兩，人參一兩半。或下後脉促胸滿者，去芍藥；若微
寒，乃加附子。或下後頭項強痛，翕翕發熱，無汗，心下滿
微痛，小便不利者，去桂，加茯苓、白朮各一兩半。太陽外
證未除而數下之，挾熱利不止，心下痞鞕，表裏不解，加
人參一兩。或下之微喘者，加厚朴六錢三字，杏仁十七

粒因燒針令汗針處被寒核起而赤必發奔豚炙其核
各一壯加桂一兩與服因燒針煩躁者去芍藥減桂一
兩牡蠣龍骨各一兩可代救逆湯
足陽明胃經傷風口燥煩渴自汗嗜卧身重小便難以其脉
俠鼻絡目下脇屬胃絡脾俠臍入氣街故陽明諸證如是治
之宜杏子湯
**杏子湯** 治陽明傷風能食口苦咽乾腹滿微喘發熱惡風自
汗嗜卧身重小便難潮熱而噦其脉浮弦長而數悉主之
杏仁去皮尖 半夏湯洗 五味子各二錢半 芍藥
桂心 細辛 乾薑炮 大黃蒸
甘草炙各 茯苓四錢
右㕮咀每服四錢水壹盞半煎至柒分去滓食前服
足少陽膽經傷風身熱惡風自汗項強脇滿以其脉起於目
兊皆上抵頭角交出入缺盆下胷中貫膈絡肝循脇裏出氣街
合髀厭中故少陽諸證如是治之宜柴胡加桂湯
**柴胡加桂湯** 治少陽傷風四五日身熱惡風頸項強脇下滿
手足溫口苦而渴自汗其脉陽浮陰弦或發汗多亡陽譫
語可以此和其榮衛通其津液自愈
柴胡壹兩 半夏湯洗 甘草炙 芍藥
黃芩 人參 桂各半兩
右㕮咀每服五錢匕水壹盞半薑五片棗壹箇煎七分
去滓食前溫
足太陰脾經傷風自汗咽乾腹痛四肢倦怠以其脉入腹絡
胃上膈俠咽連舌本散舌下故太陰諸證如是治之宜桂枝
芍藥湯
**桂枝芍藥湯** 治太陰傷風自汗咽乾胷腹滿自利不渴四肢

倦怠手足自溫其脉弦大而緩者
桂心半兩 白芍藥叁兩
右㕮咀每服伍錢匕水壹盞半薑叁片棗一箇煎柒分
去滓溫服腹痛甚者加大黃壹兩
足少陰腎經傷風口燥舌乾咽痛胷滿心煩自汗腰連胻骨
痠痛以其脉貫脊屬腎上貫肝膈入肺中循喉嚨俠舌本故
少陰諸證如是治之宜桂附湯
**桂附湯** 治少陰傷風胷滿心煩咽喉痛自汗腰疼連胻骨痠
痛嘔吐涎沫頭痛其脉沉弦者
附子生去皮臍 桂心 乾薑炮 芍藥
甘草炙 茯苓 桃仁去皮尖麩炒各壹兩
右㕮咀每服四錢水貳盞煎柒分去滓食前服或咽喉
痛加桔梗
足厥陰肝經傷風自汗惡風而倦小腹急痛以其脉循股入
毛中環陰器抵小腹俠胃絡膽布脇與督脉會故厥陰諸證
如是治之宜八物湯
**八物湯** 治厥陰傷風惡風而倦自汗小腹急痛寒熱如瘧骨
節煩疼其脉尺寸俱微而遲者
桂心 當歸 川芎 前胡
防風各叁分 芍藥壹兩半 甘草炙 茯苓各半兩
右㕮咀每服肆錢水壹盞半薑五片棗叁箇煎八分去
滓食前服

## 叙傷寒論

經云冬傷於寒春爲溫病以冬不即病其寒毒藏於風府之
上至春溫煖之氣發而爲病故曰溫病或愈或死死則六七
日閒愈則多出旬日之外世號爲大病要當隨此經絡傳受

仍以脉證別之乃可施治治傷寒法盡於此至晉集仲景論於太陽經出麻黄桂枝二方治傷寒傷風并録預備救失加減之法甚詳至陽明少陽與三陰經傷風證治則我闕矣故知仲景只就太陽一經格量二病令勿差互細推既不詮辨後學懵無所知昏瞀與墳千有餘載畧不加省良可嘆息今輒提其六經傷寒合用對治諸方以為宗兆其如壞證治法除各見本門外編集于後使皂白自分初不敢取許胸臆盖有所本於聖經也

傷寒辨正

內經論傷寒惟説足三陰三陽六經傳受并日數及各隨其藏府經絡流注去處而證以行汗下并兩感脉應病形而巳至張長沙以伊尹湯液作治法兼述傷風暑濕等詳畧不同格量互顯使後學奉陽而反至晉不解其義閲行編集遂行於世此後跲襲者不可勝計所謂百問證治提綱目録撮要備全活人書傷寒論乃至圖形指脉皆剥採晉集初無反隅雖有意於廣傳皆未明其義類綜晉集不識偏正以此預預備之方雜於正治而正治之方多所簡脱故使與證愈乖後學固封不削繁無冏知樞要因別論于後云

傷寒證治

足太陽膀胱經傷寒頭項强腰脊痛無汗惡寒其經絡流注去處與傷風同但脉浮洪緊數為異耳惟足太陽寒水為諸陽主氣故寒先傷之

麻黄湯 治太陽傷寒脉浮緊而數頭痛身疼發熱惡寒無汗曾彌而喘者

麻黄去節 桂心各壹兩 甘草炙半兩 杏仁二十五個

右㕮咀每服伍錢水壹盞半煎八分去滓食前服覆取微汗乏則加知母半兩石膏壹兩黄芩一分或汗出後無大熱而喘者去桂加石膏四兩

小青龍湯 治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小腹痛而喘者

麻黄去節 細辛去苗 乾薑炮 甘草炙

桂心 芍藥各兩 半夏湯去滑 五味子各

右㕮咀每服五錢水貳盞煎八分去滓食前温服噎者去麻黄加熟附子一錢若小便不利小腹痛者加茯苓一錢喘者加杏仁七枚去皮尖

温粉 凡發汗不欲多多則亡陽宜用此粉撲之即愈效如神

白术 藁本 川芎 白芷

右為末每末一兩入米粉叁兩和匀撲之

大青龍湯 治太陽中風傷寒脉緊發熱惡寒身疼不汗出而煩渴或脉浮緩身不疼但重乍有輕時或傷寒見風脉傷風見寒脉

麻黄去節 桂心 甘草炙 杏仁去皮尖

石膏

右為剉散每服五錢匕水壹盞半薑五片棗壹個煎七分去滓食前服

足陽明胃經傷寒身熱目痛而鼻乾不得卧不惡寒腹滿咽乾口燥而渴其脉流注與傷風同以陽明主肉故次傳之

大承氣湯 治陽明傷寒脉長身熱不惡寒目疼鼻乾不得卧腹滿咽乾渴大便硬譫語或汗後脉沉實或下利心下堅或已經下其脉浮沉尚有力者

大黄酒洗 芒消 厚朴 枳實

右為麄末每服五錢水貳盞煎八分去滓入消再煎服

若脉遅而滑汗出身重時發潮熱并得病二三日無太陽證煩躁心下硬下利後譫語者去芒消名小承氣或發汗不解蒸蒸發熱温温欲吐胷中痛大便反溏又吐利後腹脹煩躁譫語去厚朴枳實入甘草半兩芒消一分煎名調胃承氣或結熱膀胱如狂狀下血小腹急結者去厚朴枳實加桃仁拾貳箇桂甘草各半兩消壹分名桃核承氣

**大柴胡湯** 治證狀大畧與大承氣湯同輕則柴胡重則承氣

柴胡 四兩　黄芩　赤芍藥 各壹兩半　半夏 湯去滑壹兩壹分

枳實 麩炒

右為麄末每服叁大錢水壹盞半薑五片棗壹枚煎八分去滓食後温服若内熱裏實身體疼痛是表證未解不可服

足少陽膽經傷寒胷脇痛耳聾口苦咽乾往來寒熱目眩乾嘔其脉流注與傷風同以少陽主膽屬半表半裏故三傳之

**小柴胡湯** 治少陽傷寒脉弦或沉緊往來寒熱胷脇苦滿默默不欲食心煩喜嘔或渴腹痛或脇下痞鞕或心悸小便不利或咳有微熱亦有不渴不嘔者又治婦人傷風傷寒經水適斷發熱惡寒晝日明了暮則譫語此為熱入血室其血必結故使如瘧狀得七分熱除脉遅身凉胷脇滿譫語如結胷狀前刺期門隨其實而取之投此湯即愈又太陽病不解轉入少陽幷陽明傷寒脉反弦浮身目悉黄小便難潮熱時噦

柴胡 貳兩　半夏 湯去滑八錢一字　黄芩　人參

甘草 炙各叁分

右為剉散每服伍錢水壹盞半生薑伍片棗一枚煎七分去滓食前服若腹痛去黄芩加芍藥三分心下悸小便不利加茯苓一兩若不渴外有微熱去人參加桂三分若咳嗽去棗加五味子三分乾薑半兩胷中煩不嘔者去半夏加栝蔞實一枚四分之一若渴去半夏加栝蔞根一兩胷中痞鞕去棗加牡蠣一兩若過經不解日晡發熱已而微利加芒消一兩

足太陰脾經傷寒手足温自利不渴腹滿時痛咽乾其脉流注與傷風同治之各有正方

**治中湯** 治太陰傷寒手足温自利不渴腹滿時痛咽乾其脉尺寸俱沉細

人參　乾薑 炮　白术　甘草 炙

陳皮　青皮 各等分

右剉散每服四錢水壹盞半煎七分去滓食前服

**五積散** 治太陰傷寒脾胃不和及有積聚腹痛

蒼术　桔梗　陳皮　白芷

甘草　當歸　川芎　芍藥

白茯苓　半夏　麻黄

乾薑　枳殼　厚朴　桂

右先將前十二味㕮咀微炒令香取出當風凉之入後枳殼桂朴三味同為細末每服三錢水一盞薑三片棗二枚煎七分食前温服傷寒手足逆冷自汗不止脉沉細面青嘔逆加順元散一錢同煎熱服産婦陣踈難産經三兩日不生胎死腹中或産母氣乏委頓産道乾澁加順元散水七分酒三分煎相継兩服氣血内和即産胎死者不過三服當下其順元散多少量産母虚實加減傷寒發熱頭内寒者加葱白二寸豉七粒同煎相継

服當以汗解

回陽丹

烏頭（炮去皮尖二兩） 附子（炮去皮臍） 天南星（炮各一兩） 木香（半兩）

右為末同前法煎此藥治內外感寒脈沉伏遲細手足冷毛髮慄傷寒陰證大吸一二盃氣和汗出即愈

足少陰腎經傷寒口燥舌乾而渴背惡寒反發熱倦怠其脈流注與傷風同

附子細辛湯 治少陰傷寒口中和而背惡寒反發熱倦怠自汗而渴其脈尺寸俱沉而緊者

麻黃（去節） 細辛 附子（炮去皮臍各半兩）

右麄末每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服手足厥者去麻黃細辛加乾薑半兩甘草一分或口燥舌乾而渴宜急下之宜大承氣湯

足厥陰肝經傷寒煩滿發熱惡寒往來如瘧或囊縮小腹急痛其脈流注與傷風同（方見厥陰門小建中湯方見）

桂枝麻黃各半湯 治厥陰傷寒煩滿發熱惡寒往來如瘧或囊縮其脈尺寸俱微緩者主之若脈沉短其囊必縮急以大承氣下之可保五死一生承氣湯乃利陽明藥耳若病到厥陰其勢已甚蓋陽明養宗筋為熱毒所攻乃以承氣湯瀉其能養以利陽以救陰此猶假虞伐虢圍魏救趙之意也

桂心（四錢） 芍藥 麻黃（去節） 杏仁（拾二箇去皮尖）

甘草（炙各半兩）

右麄末每服五錢水一盞半煎八分去滓食前服入薑棗煎亦得

大承氣湯 方見足陽明經

主

大建中湯 方見九痛門

傷寒傳變次序

內經熱論論傷寒云太陽為諸陽主氣傷寒必先自太陽始至漢諸師凡外所因皆曰太陽病未為了義足太陽寒水其位居辰辰為六氣化原故丙辛遁起戊子至辰為壬辰水而太陽正化居焉在天為寒在地為水寒毒歸水故寒必首傷太陽以此例推寒既自太陽入風當自少陽入濕當自陽明入經曰陰為之主陽與之正別於陽者知病從來別於陰者知死生之期此之謂也或問傳變次序當如何耶然陰陽流行出入次序固有定說及其中病或喜入或虛或夜兩感或守一經其可拘也但當以脈證分別陰陽表裏盛衰為治尤不可以日數期也

料簡

論曰有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝切忌不得誤若寒證見風脈風證見寒脈却以麻黃桂枝各半湯古人治傷風熱多寒少惡風脈浮緊無汗用青龍湯蓋先傷風而後傷寒風證尚在而寒脈已行故有是脩也若先傷寒而後傷風寒多熱少不煩躁微厥脈當浮緩弱而自汗即傷寒見風脈但青龍服之不若各半湯平和無悔吝也諸經皆倣此

六經傷寒用藥格法

夫傷寒始自太陽逆傳陽明至手厥陰而止六經既別治法不同太陽屬膀胱非發汗則不愈必用麻黃者以麻黃生于中牟雪積五尺有麻黃處雪則不聚蓋此藥能通內陽氣却外寒也陽明屬胃非通泄則不愈必用大黃芒硝以利之少陽屬膽無出入道柴胡與半夏能利能汗佐以子芩非此不解太陰屬脾中州土也性惡寒濕非乾薑白朮不能溫燥少

陰屬腎性畏寒燥非附子則不能温肝陰屬肝藏血養筋非
温平之藥不能潤養此經常之道也後學不知倫類妄意進
餌遂致錯亂諸證蜂起夭傷人命可不究辨且三陽病汗下
和解人心知之至太陰脾經温燥不行亦當温利自陽明出
如温脾圓用大黄者是也少陰腎經雖用附子復使麻黄則
知少陰亦自太陽出厥陰用桂自少陽出明矣及其二陽傳
閉皆當自陽明出故三陰皆有下證如少陰口燥咽乾下利
清水太陰腹滿時痛厥陰舌卷囊縮皆當下之學者宜留詳
不可率易投也

**温脾圓** 治久病虚羸脾氣弱食不消喜噫

黄檗　大麥蘗炒　呉茱萸　桂心
乾薑炮　細辛　附子炮去皮臍　當歸
大黄蒸　神麴炒　黄連各壹兩

右爲末蜜和圓如梧子大毎服三十九空腹酒飲任下

## 三陽合病脉證治

三陽有合病三陰無合病所謂三陽合者有太陽陽明有少
陽陽明自太陽傳至陽明頭疼腰痛者太陽也肌熱目痛鼻
乾者陽明也尚惡寒脉必浮大而長浮者太陽脉也長者陽
明脉也當隨證調之太陽證因發汗多則譫語屬陽明故有
太陽陽明也少陽證未罷猶當和解不可便作陽明下之

**葛根湯** 治太陽病項背強几几然無汗惡寒并治三陽合病
自利方

葛根壹兩　麻黄去節叁分　桂心半兩　甘草炙
芍藥各半兩

右剉散毎服五錢匕水壹盞半薑五片棗一枚煎七分
去滓食前温服三陽合病不下利但嘔者加半夏六錢

## 兩感證論并治法

兩感傷寒者表裏俱病也一日太陽與少陰俱病頭痛口乾
咽痛而渴二日陽明與太陰俱病腹滿身熱不食譫語三日
少陽與厥陰俱病耳聾囊縮而厥兩病俱作治有先後先宜
救裏藏氣内正急宜攻表故内固且急而表亦不可緩也救
裏解表各隨諸證而善用之自非精妙甄別其孰能與於此

**四逆湯** 治少陰傷寒自利不渴嘔噦不止或吐利俱發小便
不利或汗出過多脉微欲絶腹痛脹滿手足冷及一切虚
寒厥冷凡病傷寒有此證候皆由陽氣虚有寒雖更覺頭
痛體疼發熱惡寒四肢拘急表裏悉具者未可攻表宜先
服此藥以助陽救裏

甘草炙壹分　乾薑貳錢炮　附子生去皮臍半枚破

右剉散毎服五錢匕水壹盞半煎七分去滓食前服強
人加乾薑一錢或惡寒脉微而利利止仍亡血若加人
參半兩或發汗若下之病仍不能解煩躁者仍加茯苓
半兩面赤者加連鬚葱九莖腹中痛者去葱加芍藥一
兩嘔者加生薑一兩咽痛者去芍藥加桔梗半兩

## 兩感治法料簡

桂枝麻黄皆攻太陽經表藥方各見太陽經其如陽明太陰
少陽厥陰並可於風寒二方論中隨證施治

## 陰毒證治

陰毒爲病手足冷腰背強頭疼腹痛或煩渇精神恍惚額與
手背時出冷汗音声鄭重爪甲面色青黒多因腎虚寒伏
陰重感於寒所致

**附子散** 治陰毒傷寒唇青面黒身重強四肢冷或因服冷藥
過度心腹脹滿昏沉不識人

附子（炮去皮臍） 桂心（半兩） 當歸 白朮（各壹兩）
半夏（湯洗） 乾薑（炮各一分）
右為末每服叁錢水貳盞生薑叁片煎六分不以時熱
服衣覆取汗

六一 **返陰丹** 治陰毒傷寒心神煩躁頭痛四肢逆冷面青腹脹脉
沈伏者
硫黃（五兩別研） 硝石（別研） 太陰玄精（各二兩別研）
乾薑（炮） 桂心（去皮） 附子（炮各半兩）
右用鐵銚先鋪玄精次下硝末各一半中間鋪硫黃末
又將二石餘末蓋上以小盞合着熟炭火三斤燒令得
所勿令煙出急取瓦盆合着地上四面灰蓋勿令煙出
候冷取出研細入後藥為末同研勻米糊圓如梧子大
每服二三十丸煎艾湯下頓服汗出為度未退乃大著
艾炷灸臍下丹田氣海更不退則以葱餅熨之

六二 **葱熨法** 治氣虛陽脫體冷無脉氣息欲絕不省人事及傷
寒陰厥百藥不效者
葱一束以索纏如餅餤大去根葉唯存白長二寸許先
以火熁一面令通熱勿至灼人乃以熱處着病人臍下
上以熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透入腹中更作三四
餅遇一餅壞不可熨即易一餅俟病人醒手足溫有汗
乃差更服四逆湯良

陽毒證治

陽毒為病蹶熱面赤咽痛身斑色如錦紋下利赤黃內外結
熱舌焦鼻黑類如煙煤妄言狂走多因腸胃燥熱陽氣獨盛
陰氣暴絕妄服燥藥熱食所致

六三 **升麻湯** 治陽毒傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成
陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言或走或見鬼或下利面
赤斑斑如錦紋咽喉痛下膿血脉大浮數五日可治七日
不可治
升麻（半兩） 犀角屑 射干 黃芩
人參 甘草（炙各一分）
右為剉散每服五錢匕水一盞煎七分去滓熱服併進
三四服溫覆汗出為度

六四 **梔子仁湯** 治陽毒傷寒壯熱百節疼痛
梔子仁（一兩） 赤芍藥 大青 知母（各壹兩）
升麻 黃芩 石膏 杏仁（去皮尖各二兩）
柴胡（一兩半） 甘草（炙半兩）
右剉散每服四大錢水壹盞半生薑叁片豉二十粒同煎七
分去滓不以時服

結胸證治

結胸證者心下緊滿按之石鞕而痛心胸高起手不得近項
強如柔痓狀此本傷寒身熱醫下之早熱氣乘虛而入痞結
不散之所致也若脉浮大者不可下下之則死尚宜發汗若
沈緊者宜以大小陷胸湯量輕重而下之又結胸有不按而
痛者有按而痛者有水結在胸脇間但頭汗出者有熱實結
者有寒實結者治之不可不知其輕重也各有正方

六五 **大陷胸湯** 治傷寒表未解醫反下之膈內拒痛手不可近短
氣煩躁心中懊憹心下鞕大便不通舌燥而渴熱實脉沈而
緊又治身無大熱有水結在胸脇間者
大黃（半兩） 芒消（四錢） 甘遂（半錢）
右各為末水叁盞先煮大黃至一大盞入消煮一二沸下甘
遂末煮一沸分二服得利止

小陷胸湯 治結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者
黃連一分　半夏湯洗四分　栝樓實大者用四分之一
右為剉散水二盞先煎栝樓至一盞半入前藥煎至六分
去滓分二服利黃涎沫即安
大陷胸丸 治病發於陽而反下之熱入因作結胸以下之太
早故也其病項強如柔痓狀下之則和
大黃二兩　葶藶炒　杏仁去皮尖炒　芒消各一分
右前二味為末將杏仁芒消合研為脂和藥取如彈子
大一枚別杵甘遂末一錢匕白蜜一大匕水二盞煎至
七分頓服之一宿乃下如不下更服取下為效甘遂性
猛宜斟酌虛實入之

胃痞證治

胃痞證者胃中不和心下堅硬乾嘔惡寒汗出噫氣不除亦
有因傷寒身冷醫反下之遂成胃痞
枳實理中圓 治傷寒及諸吐利後胃痞欲絕膈高起急痛手
不得近
枳實麩炒　茯苓　人參　白朮
乾薑炮　甘草炙各等分
右為末蜜和一兩作四圓熱湯化下渴加栝樓根下利
加牡蠣粉各等分
桔梗枳殼湯 治中寒氣痞胃滿欲死
桔梗　枳殼各一兩炒去穰
右為剉散每服五錢匕水一盞半煎七分去滓食前服
三黃湯 治傷寒陰證下之太早致心下痞按之軟其脉關上
浮者主之若表未解未可攻宜先隨風寒二證投桂枝麻
黃湯表解已即服此方

大黃蒸　黃連　黃芩
右為剉散每服五錢併湯二盞熱漬之一時久去滓分
二服暖服或汗出惡寒加附子別煎汁入一合同服
半夏瀉心湯 治心下痞滿而不痛者
半夏湯洗七次二兩一錢　黃芩　人參　甘草炙
乾薑炮各一兩半　黃連半兩
右剉散每服五錢水一盞半薑五片棗一個煎七分去滓
溫服或傷寒中風醫反下之下利日數十行穀不化腹
中鳴心下痞硬乾嘔心煩者加甘草半兩人參一兩名
甘草瀉心湯或汗出解後胃中不和心下痞硬乾噫食
臭脇下水鳴下利者加生薑一兩減乾薑一兩餘如正
方名生薑瀉心湯

勞復證治

傷寒新差後不能將攝因憂愁思慮勞神而復或梳沐洗浴
作勞而復並謂之勞復或飲食不節謂之食復此皆大病後
精神血氣腸胃並虛之所致也論有正方可依證調治唯犯
房室為女勞復多死不治
白朮散 治傷寒氣脉不和憎寒壯熱鼻塞腦悶涕唾稠粘痰
嗽壅滯或冒涉風濕憎寒發熱骨節煩痛或中暑嘔吐眩
暈及大病後將理失宜食復勞復病證如初並主之又治
五勞七傷氣虛頭眩精神恍惚睡臥不寧肢體倦怠潮熱
盜汗脾胃虛損面色萎黃飲食不美口吐酸水臟腑滑泄
腹內虛鳴反胃吐逆心腹絞痛久瘧久痢及膈氣咽塞上
氣喘促坐臥不安或飲食所傷胸膈痞悶腹脇膨脹婦人
產前產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省人事常服辟四
時不正之氣及山嵐瘴疫神效不可具述

白芷　甘草炒　青皮　陳皮
白茯苓　桔梗　山藥　香附去毛各三兩
乾薑半兩　白术一兩

右為末每服二錢匕水一盞薑三片棗一箇木瓜乾一片紫蘇兩三葉煎七分食前服若吐瀉入白梅煎喘入桑白皮杏仁煎傷寒勞復入薄荷腸氣入木通三寸麝香少許中暑嘔逆入香薷產前産後血氣不和入荊芥煎霍乱入藿香煎氣厥入鹽湯調下

陰陽易證治

陰陽易者其男子病新差未平復而婦人与之交接得病名曰陽易裏急腰踝連腹内痛婦人病新差未平復而男子与之交接得病名曰陰易身重少氣陰腫入裏腹内絞痛熱上衝胸頭痛不欲舉眼中生花蓋男女病相挟易故謂之陰陽易治之各有法

**燒裩散**治傷寒陰易其人身體重少氣小腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急悉主之

婦人裩襠燒灰

右細研以方寸匕水調服小便利陰頭痛即愈

**猳鼠糞湯**治丈夫傷寒病後女人与之交接病名陽易

韭根去青壹握　猳鼠糞十四枚兩頭尖者

右二味水壹盞煎至半盞去滓溫溫頓服粘汗出為效未知再作

發斑證治

傷寒發斑者蓋不當下而下之熱則乘虛入胃當下而失下則胃熱不得泄二者皆能發斑其狀如錦紋赤者易治黑者難治熱毒入胃深也宜玄參升麻湯

**玄參升麻湯**治傷寒失下不當下而下之熱毒在胃發斑如錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

玄參　升麻　甘草炙各半兩

右為剉散每服五錢匕水盞半煎七分去滓溫服溫毒亦能發斑

三因極一病證方論卷之四

三因極一病證方論卷之五

壞傷寒證治

壞傷寒者，以醫者不辨陰陽，錯謬汗下，或發汗不解，壞證乱經；又傷寒過經，熱留臟府，病候數變，久而不差，陰陽無復紀律，皆名壞病。

**知母麻黃湯** 治壞傷寒，以傷寒差後經久，精神不守，言語錯謬，或潮熱頰赤，寒熱如瘧，昏沉不愈，皆由汗下不止，毒在心包間所致也。

知母兩半　麻黃去節　甘草炙　芍藥　黃芩　桂心各半兩

右為剉散，每服五錢，水一盞半，煎七分，去滓，溫服，日三四服。若心煩欲飲水，稍稍與之。

**鼈甲散** 治傷寒調理失序，毒氣內結，胸脇腹脹滿，坐卧不安，日久不差，狂躁妄語，大小便不通，或復吐逆。

臘月黃牛膽 以天南星為末入膽內，縛令緊，當風避日懸之，候乾取用

右為末，以人參半兩，煎湯七分盞，調末二錢，乘熱服，遂頃更以熱人參湯投之，或睡，便溺下黃黑惡物是效。

**黑奴丸** 治傷寒調理失序，醫所不治，及時行疫病六七日不汗，脈洪數，面赤目瞪，身熱煩躁，狂言欲走，大渴，或口噤，精魄已散，但心下暖，斡開口灌藥下咽即活。治陽毒發斑。

麻黃去節　大黃各二兩　芒硝　釜底煤另研　黃芩　梁上塵別研　小麥奴　竈突墨各壹兩，另研

右為末，煉蜜丸彈子大，新汲水研下一丸。渴者與冷水盡飲之，須臾當寒，寒竟汗出便差。若日移五尺不汗，依前法服一丸。差，須病人大渴乃可與之，不渴者莫服。

狐惑證治

狐惑證者，默默欲眠，目不得瞑，惡飲食，面目乍赤乍白乍黑，齒無色，舌上白，声嗄咽乾。此因大病後，腸胃空虛，三虫求食，食人五臟。食其喉則為惑，其声嗄；食下部則為狐，其咽乾。當看上唇有瘡，虫食其臟；下唇有瘡，虫食其肛。

**桃仁湯**

桃仁去皮尖　槐子碎　艾各壹兩

右剉散，每服五錢，水大盞，姜三片，棗兩枚，煎七分，去滓，食前服之。

**黃連犀角湯** 治傷寒及諸病後，內有瘡出下部。

黃連半兩　犀角壹兩，無以升麻代　烏梅壹箇　木香壹分

右為剉散，每服五錢，水盞半，煎七分，去滓，食前服。

**雄黃兌散** 治下部䘌瘡。

雄黃研　青葙子　苦參　黃連各壹分　桃仁去皮尖，研，壹分

右為末，以生艾搗汁，丸如棗核大，綿裹內下部。扁竹汁更加，無艾只用綿裹散子內下部亦得。

譫語證治

病有言語錯謬若狂，其證有二：有虛有實。虛則鄭聲，實則譫語。傷寒胃實及三陽合病，婦人熱入血室，及下利而譫語者，皆屬實。大小便利，手足逆冷，脈微細，言語鄭重者，皆屬虛寒。治之各有方。虛寒當溫之，如四逆湯之類；胃實宜下，承氣湯；婦人熱入血室，小柴胡湯。若譫語而反四逆，脈沉細者，不治。

**四逆湯**　**小柴胡湯**　**大承氣湯**

虛煩證治

大病後，心虛煩悶，發熱，與傷寒相類，但不惡寒，與不頭疼為異。與汗與人參竹葉湯，嘔者橘皮湯。諸病後多有此證，各見本門。

**人參竹葉湯** 治汗下後，表裏虛煩，不可攻者。

竹葉二把 人參一兩 甘草炙各二兩 半夏二兩半
石膏 麥門冬各五兩
右爲剉散每服四大錢水一盞半姜五片粳米一撮煎
米熟去滓食前服
橘皮湯治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨節
疼痛目運惡寒食則反嘔穀不得入宜服此方
橘皮一兩半 甘草炙半兩 人參一分 竹茹半兩
右剉散每服五錢水一盞半姜三片棗一箇煎至七分去
滓食前服之

刺闌
凡傷寒中雜病證狀一一當隨所觀量而處治之可也如發黃
則多用五苓中藥又從黃根治之致在已見陽毒門吐衄便
利發血見失血門下利見痢下發斑見五積陰陽厥見厥論
痰喘咳嗽各見本門其他更不贅錄

傷暑叙論
傷暑者乃夏至前後各二十日有大陽相火用事之時也
火熱大行爍石流金暑毒之氣傷人或傷之則發熱自汗面垢
背寒倦怠少氣以暑傷氣故脉虛[illegible]
即病非冬傷寒至夏發為熱病也當以脉別之傷暑脉虛[illegible]
力蓋因氣血消散致血至[illegible]傷寒則脉血而[illegible]有力
大不同也要略言傷寒[illegible]有陽證[illegible]者見其一證則
在後故有是說輕重不同識者當自知之

傷暑證治
病者身熱惡寒頭痛狀如傷寒或往來寒熱如瘧煩躁渴甚
眼暈嘔吐背寒面垢泄瀉昏悶不省其脉陰陽俱虛細而[illegible]
弱皆由傷暑之所致也

[illegible]散治暑者伏熱頭痛眩暈嘔吐泄利煩渴背寒面垢
赤茯苓[illegible] 生姜[illegible]
右為末每服二錢[illegible]水調下或湯點服不拘時候
五苓散治伏暑[illegible]治傷寒溫熱表裏未解頭痛
渴引水水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止又
治霍亂吐利躁渴引飲
澤瀉二兩半 桂一兩 豬苓[illegible] 赤茯苓 白朮各一兩半
右為末每服二錢熱湯下不以時服多飲熱湯汗出愈
[illegible]圓治伏暑消渴[illegible]
乾生姜[illegible] 甘草[illegible]半兩
桂心 白朮[illegible] 赤茯苓三兩 烏梅肉[illegible]
右為末蜜丸彈子大每一丸至二丸嚼細熟水下
香薷圓治大人小兒傷暑伏熱燥渴瞀悶頭目昏眩胸膈煩滿
嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐
利轉筋並宜服之
香薷去土 紫蘇[illegible] 木瓜各一兩 丁香
甘草炙 檀香 白茯神[illegible] 藿香各半兩
右為末煉蜜丸彈子大每一丸至二丸熟水嚼下或新汲
水化下亦得小兒半丸
消暑圓治中暑為[illegible]
半夏[illegible] 茯苓 甘草生各半斤
右為末薑汁糊丸梧子大每服三十圓熱湯水下不以時服

傷濕叙論
經云濕為停著凡關節疼痛重痹而弱皆為濕著若氣不平
亦使人半身不遂口眼喎斜從濕皆寒作中濕之候也夫寒
熱風濕皆能共入合而為痹所謂風濕寒濕濕溫者其證各不同

爲治亦別不可不辨若治風濕寒濕當發其汗但微微似汗出則風濕俱去若大汗出風去濕不去則不能愈若治單中濕只宜利小便忌不得以火攻并轉利濕家下之額上汗出微喘小便不利者死若下利不止者亦死論曰治濕不利小便非其治也

傷濕證治

病者身重脚弱關節重疼發熱惡寒小便秘澁大便飱泄自汗腰脚冷痺腿膝浮腫小便或自利不渴皆久坐卑濕或爲雨露所襲或汗出衣裹冒濕漸漬得之名曰濕痺

**腎著湯** 治身重腰冷痺如坐水中形如水狀反不渴小便自利食飲如故病屬下焦從身勞汗出衣裹冷濕久而得之腰以下冷痛腰重如帶五貫錢

甘草炙　白术各貳兩　乾薑炮　茯苓各肆兩

右爲剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓食前服

**除濕湯** 治坐卧濕地或爲雨露所襲身重脚弱關節重疼發熱惡寒或小便秘澁大便飱泄或汗出衣裹濕漬得之腰膝或腫小便利反不渴

蒼术米泔浸　白术　甘草炙各貳兩　乾薑炮

茯苓各肆兩　陳皮　丁香各半兩

右剉散每服四錢水盞半姜三片棗一枚煎七分去滓食前溫服

寒濕證治

病者身體煩疼无汗惡寒發熱脉浮緩細皆寒濕相并所致也

**麻黃白术湯** 治寒濕身體煩疼無汗惡寒發熱者

麻黃去節湯泡　桂心貳兩　甘草壹兩炙　杏仁二十枚去皮尖　白术肆兩

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓食前溫服

風濕證治

病者身疼日晡發熱不能轉側短氣汗出惡風不欲去衣或身微腫脉浮弦細此風濕相搏或汗出當風所致也

**桂枝附子湯** 治風濕相搏身體煩疼掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫

桂枝去皮　白术　附子炮去皮臍各　甘草炙貳兩

右爲剉散每服四大錢水盞半姜五片棗兩箇煎七分去滓空心溫服或大便秘則去桂小便不利悸氣加茯苓三兩痺加防己四兩腹痛加芍藥四兩

風濕寒證治

病者汗出身重惡風喘滿腹內不和下氣上衝臍下連脚冷痺不能自屈伸骨節煩疼近之則痛極如歷節狀此由冒風濕寒三氣雜至而爲病也

**防己黃芪湯** 治傷風濕寒脉浮緊細身重汗出惡風并治風水脉浮身重不渴

防己肆兩　黃芪伍兩　甘草炙貳兩　白术叁兩

右爲剉散每服五錢水盞半姜五片棗兩枚煎七分去滓空腹服喘者加麻黃胃中不和加芍藥氣上衝加桂下有陳寒加細辛服藥後當如虫行皮中從腰以下如水後坐被上又以一被繞腰以溫下令微汗差

風濕溫證治

病者煩渴引飲心腹冷痛悶亂口乾面垢惡寒惡風飢不能食躰重嘔噦此伏暑中風濕所致也治之各有方法

**白术茯苓乾薑湯** 治伏暑中風濕煩渴引飲心腹疼躁悶口乾面垢洒洒惡寒淅淅惡風微汗飢不能食

白术　乾姜　茯苓　細辛　桂心

乾葛　甘草炙　橘皮　烏梅　京豉

右等分爲細末每服貳錢白湯點下

暑濕風溫證治

暑者六經氣之一能與風濕併合爲病循經流入諸藏但與寒不相得故有暑濕風溫之證暑濕者惡寒反熱自汗關節盡痛頭目昏眩手足倦怠不自勝持此併傷暑濕所致也風溫者頭痛身熱常汗出體重喘息四肢不收嘿嘿欲眠此由先傷風後傷暑所致也治之各有方法

**茯苓白朮湯** 治冒暑毒加以著濕或汗未乾即浴皆成暑濕

茯苓　乾姜炮　甘草炙　白朮　桂心各壹兩

右爲剉末每服四錢水壹盞煎七分去滓食前服

**葳蕤湯** 治風溫兼療冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛咽喉乾舌強胸內疼痛痞滿腰背拘急

葛根　麻黃去節湯炮　甘草炙　白薇　川芎

羌活　杏仁各半兩去皮尖　石膏壹兩　葳蕤壹分　青木香壹分

右剉散每服五錢水壹盞半煎七分去滓食前服之木香冬用壹兩春用半兩

君火論

五行各一唯火有二者乃君相之不同相火則麗于五行人之日用者是也至於君火乃二氣之本源万物之所資始人之初生必投生於父精母血之中而成形精屬腎腎屬水故天一而生水血屬心心屬火故地二而生火識爲玄玄屬水故天三而生水乃太一含三引六之義也亦道生一一生二二生三之數也則知精血乃財成於識以識動則暖靜則息靜息无象暖觸可知故命此暖識以爲君火正內典所謂暖識息三連持壽命者是也然其所以謂之君者以不行炎暑象君之德万物資始象君之化位居以陽象君之政神明出入象君之令故君亦天也天亦君也乾以元亨利正而運行於其上君以德化政令而輔成於其下夫道順序則生長化收藏不失其時君道助順故進退存亡不失其正其實皆一理也成象取法雖主配於心腎推而明之一點精明無物不備是宜君火之用上合昭昭下合冥冥與物俱生而無所間斷也醫者尚不明此皆墮於術數役於藝夫醫道之用易拘拘於卜筮休咎之中吾見其大戕聖人之道未聞有益於天下後世也然夫

五運論

夫五運六氣乃天地陰陽運行升降之常道也五運流行有太過不及之異六氣升降則有逆從勝復之差凡不合於德化政令者則爲變眚皆能病人故經云六經波蕩五氣傾移太過不及專勝兼并所謂治化人應之也或遇變眚聿興災沴因而發以亂其真常不德而致折復隨人藏氣虛實而爲病者謂之時氣與夫感冒中傷天行疫沴顯然不同前哲知夫天地有餘不足違戾之氣還以天地所生德味而平治之經論昭然人鮮留意恐成湮沒故叙而紀之

五運時氣民病證治

凡遇六壬年發生之紀歲木太過風氣流行脾土受邪民病飧泄食減體重煩冤腸鳴腹支滿甚則忽忽善怒眩冒巔疾爲金所復則反脇痛而吐甚則衝陽絕者死

**苓朮湯** 治脾胃感風飧泄注下腸鳴腹滿四肢重滯忽忽善怒眩冒顛暈或左脇偏疼

白茯苓　厚朴薑炒　白朮　青皮

乾薑炮　半夏湯洗　草果去皮　甘草炙各等分

右剉散每服四錢水盞半薑三片棗兩枚煎七分去滓

食前服之

凡遇六戊年赫曦之紀歲火太過炎暑流行肺金受邪民病
瘧少氣欬喘血溢泄瀉嗌燥耳聾中熱肩背熱甚則胸中痛脇
支滿脇痛膺背髀并兩臂痛身熱骨痛而爲浸淫爲水所復則反譫
妄狂越欬喘息鳴血溢泄瀉不已甚則太淵絶者死

麥門冬湯治肺經受熱上氣欬喘咯血痰壅嗌乾耳聾泄瀉
胸脇滿痛連肩背兩臂膊疼息高

麥門冬去心　香白芷　半夏湯洗　竹葉
鍾乳粉　桑白皮　紫苑取茸　人參各半分　甘草炙

右剉散每服四錢水盞半薑兩片棗壹枚煎七分去滓
食前服

凡遇六甲年敦阜之紀歲土太過雨濕流行腎水受邪民病
腹痛清厥意不樂體重煩寃甚則肌肉痿足痿不收行善瘈
脚下痛中滿食減四肢不舉爲風所復則反腹脹溏泄腸鳴
甚則太谿絶者死

附子山茱萸湯治腎經受濕腹痛寒厥足痿不收腰脽痛行
步艱難甚則中滿食不下或腸鳴溏泄

附子炮去皮臍　山茱萸各壹兩　木瓜乾　烏梅各半兩
半夏湯洗　肉豆蔻各三分　丁香　藿香各壹分

右剉散每服四錢水盞半薑錢七片棗一枚煎七分去
滓食前服

凡遇六庚年堅成之紀歲金太過燥氣流行肝木受邪民病
脇小腹痛目赤眥痒耳無聞體重煩寃胸痛引背脇滿引小
腹甚則喘欬逆氣背肩尻陰股膝髀腨胻足痛爲火所復則
暴痛胠脇不可反側欬逆甚而血溢太衝絶者死

牛膝木瓜湯治肝虛遇歲氣燥濕更勝脇連小腹拘急疼痛
耳聾目赤欬逆肩背連尻陰股膝髀腨胻皆痛悉主之

牛膝酒浸　木瓜各壹兩　芍藥　杜仲去皮薑製炒絲斷
枸杞子　黄松節　菟絲子酒浸　天麻各三分　甘草炙半兩

右剉散每服四錢水盞半薑三片棗壹枚煎七分去滓
食前服

凡遇六丙年漫衍之紀歲水太過寒氣流行邪害心火民病
身熱煩心躁悸陰厥上下中寒譫妄心痛甚則腹大脛腫喘
欬寢汗憎風爲土所復則反腹滿腸鳴溏泄食不化渴而妄
冒甚則神門絶者死

川連茯苓湯治心虛爲寒冷所中身熱心躁手足反寒心腹
腫病喘欬自汗甚則大腸便血

黄連　茯苓各壹兩　麥門冬去心　車前子炒　通草
遠志去心薑汁製炒各半兩　半夏湯洗　黄芩　甘草炙各壹分

右剉散每服四錢水盞半姜錢七片棗一枚煎七分去
滓食前服

遇六丁年委和之紀歲木不及燥乃盛行民病中淸胠脇小
腹痛腸鳴溏泄爲火所復則反寒熱瘡瘍痤疿癰腫欬而鼽

蓯蓉牛膝湯治肝虛爲燥熱所傷胠脇并小腹痛腸鳴溏泄
或發熱遍體瘡瘍咳嗽肢滿鼻鼽

肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸　木瓜乾　白芍藥
熟地黄　當歸　甘草炙各等分

右剉散每服四錢水盞半薑三片烏梅半箇煎七分
去滓食前服筋痿脚弱鎊鹿角屑同煎

遇六癸年伏明之紀歲火不及寒乃盛行民病胸膺痛脇支滿
膺背肩胛兩臂內痛鬱冒朦昧心痛暴瘖甚則屈不能伸髖
髀如別爲土所復則反鶩溏食飲不下寒中腸鳴泄注腹痛

暴攣痿痹足不能任身

**黃芪茯神湯** 治心虛挾寒心胸中痛兩脅連肩背肢滿噎塞鬱冒朦昧髖髀攣痛不能屈伸或下利溏泄飲食不進腹痛手足痿痹不能任身

黃芪　茯神　遠志去心薑汁淹炒　紫河車　酸棗仁炒各等分

右剉散每服四大錢水盞半薑三片棗一个煎七分去滓食前服

遇六己年卑監之紀歲土不及風氣盛行民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨繇併肌肉瞤酸善怒為金所復則反胸脅暴痛下引小腹善太息氣客於脾食少失味

**白朮厚朴湯** 治脾虛風冷所傷心腹脹滿疼痛四肢筋骨重弱肌肉瞤動酸廝善怒霍亂吐瀉或胸脅暴痛下引小腹善太息食少失味

白朮　厚朴薑炒　半夏湯洗　桂心　藿香　青皮各三兩　乾薑炮　甘草炙各半兩

右剉散每服四錢水盞半薑三片棗一枚煎七分去滓食前服之

遇六乙年從革之紀歲金不及炎火盛行民病肩背瞀重鼽嚏血便注下為水所復則反頭腦戶痛延及腦頂發熱口瘡心痛

**紫菀湯** 治肺虛感熱欬嗽喘滿自汗衄血肩背瞀重血便注下或腦戶連囟頂痛發熱口瘡心痛

紫菀茸　白芷　人參　甘草炙　黃芪　地骨皮　杏仁去皮尖　桑白皮炙各等分

右剉散每服四錢水盞半棗一枚薑三片煎七分去滓食前服之

遇六辛年涸流之紀歲水不及濕乃盛行民病腫滿身重濡泄寒瘍腰膕髀股膝痛不便煩冤足痿清厥腳下痛甚則跗腫腎氣不行為木所復則反面色時變筋骨併辟肉瞤瘛目視䀮䀮肌肉胗發氣并鬲中痛於心腹

**五味子湯** 治腎虛坐臥濕地腰膝重着疼痛腹脹滿濡泄無度行步艱難足痿清厥甚則浮腫面色不常或筋骨併辟目視䀮䀮膈中咽痛

五味子　附子炮去皮臍　巴戟去心　鹿茸燎去毛酥炙　山茱萸　熟地黃　杜仲製炒各等分

右剉散每服四錢水盞半薑七片鹽少許煎七分去滓食前服之

凡六壬六戊六甲六庚六丙歲乃木火土金水太過五運先天六丁六癸六己六乙六辛歲乃木火土金水不及為五運後天民病所感治之各以五味所勝調和以平為期

## 六氣敘論

夫陰陽升降在天在泉上下有位左右有紀地理之應標本不同氣應異象逆順變生太過不及悉能病人世謂之時氣者皆天氣運動之所為也今先次地理本氣然後以天氣加臨為標有勝有復隨氣主治則悉見病源矣

## 本氣論

自大寒後至春分厥陰風木為一主氣　春分至小滿少陰君火為二主氣
小滿至大暑太陰濕土為三主氣　大暑至秋分少陽相火為四主氣
秋分至小雪陽明燥金為五主氣　小雪至大寒太陽寒水為六主氣

凡一氣所管六十日八十七刻半為本氣後以天之六氣臨御觀其逆從以藥調和使上下合德無相奪倫此天地之紀綱變化之淵源不可不深明之

六氣時行民病證治

辰戌之歲太陽司天太陰在泉氣化運行先天初之氣乃少陽相火加臨厥陰風木民病瘟身熱頭痛嘔吐肌腠瘡瘍二之氣陽明燥金加臨少陰君火民病氣鬱中滿三之氣太陽寒水加臨少陽相火民病寒反熱中癰疽注下心熱瞀悶四之氣厥陰風木加臨太陰濕土風濕交爭民病大熱少氣肌肉痿足痿注下赤白五之氣少陰君火加臨陽明燥金民氣乃舒終之氣太陰濕土加臨太陽寒水民乃慘悽孕死治法用甘溫以平水酸苦以補火抑其運氣扶其不勝

靜順湯 治辰戌歲太陽司天太陰在泉病身熱頭痛嘔吐氣鬱中滿瞀悶少氣足痿注下赤白肌腠瘡瘍發為癰疽

白茯苓 木瓜乾各一兩 附子炮去皮臍 牛膝酒浸各三分

防風去叉 訶子炮去核 甘草炙 乾薑炮各半兩

右為剉散每服四大錢水盞半煎七分去滓食前服其年自大寒至春分宜去附子加枸杞半兩自春分至小滿依前入附子枸杞自小滿至大暑去附子木瓜乾薑加人參枸杞地榆香白芷生薑各三分自大暑至秋分依正方加石榴皮半兩自秋分至小雪依正方自小雪至大寒去牛膝加當歸芍藥阿膠炒各三分

卯酉之歲陽明司天少陰在泉氣化運行後天初之氣太陰濕土加厥陰木此下剋上民病中熱脹面目浮腫善眠鼽衄嚏欠嘔吐小便黃赤甚則淋二之氣少陽相火加少陰君火此臣居君位民病癘大至善暴死三之氣陽明燥金加少陽相火燥熱交合民病寒熱四之氣太陽寒水加太陰濕土此下土剋上水民病暴仆振慄譫妄少氣咽乾引飲心痛癰腫瘡瘍寒瘧骨痿便血五之氣厥陰風木加陽明燥金民氣和終之氣少陰君火加太陽寒水此下剋上民病溫治法宜鹹寒以抑火辛甘以助金汗之清之散之安其運氣

審平湯 治卯酉之歲陽明司天少陰在泉病者中熱面浮鼻鼽小便黃赤甚則淋或癘氣行善暴仆振慄譫妄寒瘧癰腫便血

遠志去心薑汁炒 紫檀香各一兩 天門冬去心 山茱萸各三分

白朮 白芍藥 甘草炙 生薑各半兩

右剉散每服四錢水盞半煎七分去滓食前服自大寒至春分如白茯苓半夏湯洗紫蘇葉生薑各半兩自春分至小滿加玄參白薇各半兩自小滿至大暑去遠志山茱萸白朮加川參澤瀉各半兩自大暑至秋分去遠志白朮加酸棗仁車前子各半兩自秋分直至大寒並依正方

寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在泉氣化運行先天初之氣少陰君火加厥陰木民病溫氣怫於上血溢目赤咳逆頭痛血崩脅滿膚腠中瘡二之氣太陰土加少陰火民病熱鬱咳逆嘔吐胸臆不利頭痛身熱昏憒膿瘡三之氣少陽相火加少陽火民病熱中聾瞑血溢膿瘡咳嘔鼽衄渴嚏欠喉痺目赤善暴死四之氣陽明金加太陰土民病滿身重五之氣太陽水加陽明金民避寒邪君子周密終之氣厥陰木加太陽水民病關閉不禁心痛陽氣不藏而咳治法宜鹹寒平其上辛溫治其內宜酸滲之泄之漬之發之

升明湯 治寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在泉病者氣鬱熱血溢目赤咳逆頭痛脅滿嘔吐胸臆不利聾瞑渴身重心痛陽氣不藏瘡瘍煩躁

紫檀香 車前子炒 青皮 半夏湯洗

酸棗仁 薔薇 生薑 甘草炙各半兩

右為剉散每服四錢水盞半煎七分去滓食前服自大

寒至春分加白薇玄參各半兩自春分至小滿加丁香一錢自小滿至大暑加漏芦升麻赤芍藥各半兩自大暑至秋分加茯苓半兩自秋分至小雪依正方自小雪至大寒加五味子半兩

丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉氣化運行後天初之氣厥陰風木加風木民病血溢筋絡拘強關節不利身重筋痿二之氣大火正乃少陰君火加君火民病溫癘盛行遠近咸若三之氣太陰土加少陽火民病身重胕腫胸腹滿四之氣少陽相火加太陰土民病腠理熱血暴溢瘧心腹䐜脹甚則浮腫五之氣陽明燥金加陽明燥金民病皮膚寒氣及體終之氣太陽寒水加寒水民病關節禁固腰脽痛治法用酸以平其上甘溫治其下以苦燥之溫之甚則發之泄之發其陽火令禦其寒

備化湯治丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉病者關節不利筋脉拘急身重萎弱或溫癘盛行遠近咸若或胸腹滿悶甚則浮腫寒瘧血溢腰脽痛

木瓜乾 茯神去木各一兩 牛膝酒浸 附子炮去皮臍各一兩

熟地黃 覆盆子各半兩 甘草壹分 生薑三分

右為剉散每服四大錢水盞半煎七分去滓食前服自大寒至春分依正方自春分至小滿去附子加天麻防風各半兩自小滿至大暑加澤瀉三分自大暑直至大寒並依正方

子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉氣化運行先天初之氣太陽水加厥陰木民病關節禁固腰脽痛中外瘡瘍二之氣厥陰風木加少陰君火民病淋目赤氣鬱而熱三之氣少陰君火加少陽火民病熱厥心痛寒熱更作欬喘目赤四之氣太陰土加濕土民病黃癉鼽衄嗌乾吐飲五之氣少陽火加陽明金民乃康終之氣陽明金加太陽水民病上腫欬喘甚則血溢下連少腹而作寒中治法宜鹹以平其上苦熱以治其內鹹以耎之苦以發之酸以收之

正陽湯治子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉病者關節禁固腰痛氣鬱熱小便淋目赤心痛寒熱更作咳喘或鼻鼽嗌咽吐飲發黃癉喘甚則連小腹而作寒中悉主之

白薇 玄參 川芎 桑白皮炙 當歸

芍藥 旋覆花 甘草炙 生薑各半兩

右為剉散每服四錢水盞半煎七分去滓食前服自大寒至春分加杏仁升麻各半兩自春分至小滿加茯苓車前子各半兩自小滿至大暑加杏仁麻仁各一分自大暑至秋分加荊芥茵陳蒿各一分自秋分至小雪依正方自小雪至大寒加紫蘇子半兩

巳亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉氣化運行後天初之氣陽明金加厥陰木民病寒於右脇下二之氣太陽水加少陰火民病熱中三之氣厥陰木加少陽火民病淚出耳鳴掉眩四之氣少陰火加太陰土民病黃癉胕腫五之氣太陰土加陽明金燥濕相勝寒氣及體終之氣少陽火加太陽水此下水剋上火民病瘟癘治法宜用辛涼平其上鹹寒調其下畏火之氣無妄犯之

敷和湯治巳亥之歲厥陰風木司天少陽相火在泉病者中熱而反右脇下寒耳鳴淚出掉眩燥濕相搏民病黃癉浮腫時作瘟癘

半夏湯洗 棗子 五味子 枳實麩炒 茯苓

訶子炮去核 乾薑炮 橘皮 甘草炙各半兩

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服自大寒至春分加鼠粘子一分自春分至小滿加麥門冬去心山藥各一分自小滿至大暑加紫苑一分自大暑至秋分加澤瀉山梔仁各一分自秋分直至大寒並依正方

六氣凡例

凡六氣數起於上而終於下歲半之前自大寒後天氣主之歲半之後自大暑後地氣主之上下交互氣交主之司氣以熱用熱无犯司氣以寒用寒無犯司氣以涼用涼无犯司氣以溫用溫無犯司氣同其主亦无犯異主則少犯之是謂四畏若天氣反時可依時及勝其主則可犯以平為期不可過也

三因極一病證方論卷之五

三因極一病證方論卷之六

敘疫論

夫疫病者四時皆有不正之氣春夏有寒清時秋冬亦有暄熱時一方之內長幼患狀率皆相類者謂之天行是也若春時應暖而清氣折之則責邪在肝病曰青筋牽夏時應暑而寒氣折之則責邪在心病曰赤脈攢秋時應涼而熱氣抑之則責邪在肺病曰白氣貍冬時應寒而暖氣抑之則責邪在腎病曰黑骨溫土無正形因火而名故附金木水火而變病曰黃肉隨其天行之病大則流毒天下次則一方一鄉或偏着一家悉由民庶同業所召故天地灾沴祇假斯不正之氣而責罰且人命有遭逢時有否泰故有偏着一家者天地既有斯害亦還以天地所生之物而防備之命曰賢人知方

四季疫證治

病者發熱腰痛強急腳縮不伸胻中欲折目中生花或澀澀增寒復熱頸中雙筋牽不得屈伸項直背強眼赤黃欲轉動合目回側病名青筋牽者由春三月其膚從厥陰泣足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽怫鬱於腠理脈贓受厲而生若腑虛則為陰邪所傷故發熱若臟實則為陽毒所損故增寒

**治青筋牽** 肝腑臟溫病陰陽毒腰脊腑虛為陰邪所傷腰痛強急腳縮不伸胻中欲折目中生花色[illegible]春者

柴胡去苗 茯苓 梔子仁 半夏湯洗 大青各叁兩

桂心 竹茹 香豉 甘草炙各壹兩

右剉散每服五錢水一盞半薑五片煎七分去滓空心溫服

**治青筋牽** 肝腑臟溫病陰陽毒肝臟實為陽毒所傷瀉澀惡寒食肩發熱頸外雙筋牽不得屈伸項直背強眼赤黃轉

動則令身回側色蒼蒼者
玄參壹兩 細辛貳兩 梔子仁 黄芩 升麻
芒消各叁兩 石膏捌兩
右為剉散每服五錢水兩盞入車前草葉淡竹葉各
片煎七分去滓空心服
病者脉促身顫掉不能禁或肉熱口乾舌破咽塞声嘶病名
赤脉攅者以夏三月其病從少陰太陽之氣相搏而停則榮
衛不通皮肉痛起太陽發動少陰淫邪之氣因而作癘則臟
腑隨時受夏疫病也若腑虛為陰邪所傷則寒戰若臟實為
陽毒所侵則肉熱
治赤脉攅 心腑臟溫病陰陽毒心臟實則為陽毒所傷肉熱
口乾舌破咽塞声嘶色焦赤者
天門冬去心 麥門冬去心 車前子炒 梔子仁
黄芩 升麻 寒水石煅 甘草炙各等分
右為剉散每服五錢水兩盞煎七分去滓食前服
病者頭重頸直皮肉強痺或蘊而結核起於喉頸之側布熱
毒於皮膚分肉之中上散入髮際下貫顳顬隱隱而熱不相
斷離病名黄肉隨以四季各十八戊己日其病從太陰陽明
相搏寒濕不調關節格滞若腑虛則皮肉強痺若臟實則布
毒熱於皮膚
治黄肉隨 脾腑臟溫病陰陽毒胃腑虛則為陰邪所傷頭重
頸直皮肉強痺臚脹色黃黑者
厚朴薑製炒壹兩半 白术 陳皮各壹兩 乾薑炮
紫蘇 甘草炙 半夏湯洗各叁兩
右為剉散每服五錢水兩盞煎七分去滓食前服
治黄肉隨 脾腑臟溫病陰陽毒臟實為陽毒所傷蘊熱結核
起於喉頸之側布毒熱於皮膚分肉之中散入髮際下貫
顳顬蘊熱不散色黄者
葛根 蒼术泔浸 升麻 白芷 桔梗
青皮各壹兩 大黄半兩
右為剉散每服五錢水兩盞煎七分去滓食前服
病者乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆或躰熱發斑喘欬引氣
名白氣狸以秋三月其病從陽明係手太陰受疫淫邪之氣若
腑虛為陰邪所傷則乍寒乍熱臟實為陽毒所傷則躰熱發
斑
治白氣狸 肺腑臟溫病陰陽毒大腸腑虛為陰邪所傷寒熱
互作上氣欬逆大腸飧泄色晧白者
白术 人參各壹兩 乾薑炮 麥蘖炒各 白茯苓
五味子 肉豆蔻 草菓 烏梅 甘草炙各半兩
右為剉散每服五錢水盞半煎七分去滓食前服
治白氣狸 肺腑臟溫病陰陽毒臟實為陽毒所傷躰熱肌膚
發斑氣喘引飲色昏白者
紫苑茸 梔子仁 升麻 前胡各叁分
石膏煅半兩 葶藶炒壹分 杏仁去皮尖 甘草炙各半兩
右為剉散每服五錢水兩盞煎七分去滓食前服
病者裏熱外寒意欲守火而反引飲腰痛欲折或胸脇切痛
類如刀刺不得轉動熱彭彭服冷多則洞瀉病名黑骨溫以
冬三月其病從足太陽少陰相搏蘊積寒熱若腑虛為陰毒所
傷則裏熱外寒若臟實為陽毒所損則彭彭發熱
治黑骨溫 腎腑臟溫病陰陽毒膀胱腑虛為陰邪所傷裏熱
外寒煩渴引飲腰腸痛小便赤黄面與腳俱黑
附子炮去皮臍 茯苓各壹兩 山茱萸 細辛去苗各半 麻黃去節叁分

山茱　澤瀉各半　杏仁去皮尖分

右爲剉散每服五錢水兩盞煎七分去滓食前服

**治黑骨溫**　治腎腑臟溫病陰陽毒骨髓痠爲陽毒所傷腰脇切痛不得轉動大小便秘澀小腹脹食冷則洞泄色重黑

吳茱萸　黑牽牛炒　桃仁去皮尖麩炒

大黃　杜仲去皮炒斷絲各

右爲剉散每服五錢水兩盞煎七分去滓食前服

料簡諸疫證治

凡春分以前秋分以後天氣合清寒忽有溫暖之氣折之則民病溫疫春分以後秋分以前天氣合溫熱忽有清寒之氣折之則民病寒疫治之各有法不可拘以日數汗下此且攝方論一其而分既有寒溫二疫風溫亦宜備論如己未年京師大疫汗之死下之死服五苓散遂愈此無他溫疫也以此爲法每年遇有不正之氣即當紀而用之假如冬合寒時有溫暖之氣則春必患溫疫春合溫而有清凉之氣則夏必患燥疫夏合熱而有寒氣折之秋必病寒疫秋合清而反淫雨冬必病濕疫此亦一途而推之更須以時斟酌不可偏執況疫之所興或溝渠不泄畜其穢惡薰蒸而成者或地多死氣鬱發而成者或官吏枉抑怨讟而成者世謂獄溫傷溫墓溫廟溫社溫山溫海溫家溫竈溫歲溫天溫地溫等不可不究古法辟之用屠蘇酒務成子螢火圓李子建殺鬼煎老君神明散皆辟法惟劉根別傳令於州治太歲六合處穿地深三尺闊亦如之取淨沙三斛實之以醇酒三升沃其上俾使君祝之此亦消除疫氣之良術所謂太歲六合者蓋泄氣之所在故以厭禳

**屠蘇酒**　辟疫氣令人不染及辟溫病傷寒

大黃　桔梗　川椒　白朮　桂心各一兩

菝葜一兩　烏頭炮去皮尖一兩

右爲剉散絳囊盛之十二月晦日日中懸沉井中令至泥正月朔旦出藥置酒中煎數沸於東向戶中飲之先從少起多少自在一方有防風官桂兩

**太一流金散**　辟溫氣

雄黃三兩　羖羊角燒　雌黃各二兩　礬石　鬼箭羽各一兩半

右爲末以絳囊盛一兩帶心前并挂門戶上若逢大疫年以月旦青布裹一刀圭中庭燒之溫病人亦燒熏之

**敗毒散**　治傷寒溫疫風濕頭目昏眩四肢痛憎寒壯熱項強眼睛痛尋常風眩拘急風痰並宜服之

羌活　獨活　人參　甘草炙　柴胡

前胡　茯苓　枳殼麩炒　川芎　桔梗各等分

右爲剉散每服四錢水一盞薑三片薄荷少許煎七分去滓熱服寒多則熱服熱多則溫服傷溼加白朮脚痛加天麻赤芍藥爲細末亦可點服抄庸此令其方知出道藏乃歙云自非異人曾出吉土神會則莫之敢爲良可數服煙瘴之地或溫疫時行或人多風多寒多氣或處卑溼脚弱此藥不可缺也出入不節飲食常務作新奇敵於俗今所見者亦此藥治瘴無辛不治之蔬熱亦體加大黃其李大承氣湯服之效

**人參敗毒散**　治傷寒時氣發熱頭痛風痰咳嗽咯血

白芷　枳殼　羌活　桔梗炒　白朮

人參各三兩　甘草炙

右爲末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分通口服如傷風……

未米茶爲……

血更三醫不退一日謁太尉蔡元度取人參散一貼并藥見授繼歸有客承議郎薛道至留食與熱進一服良久瘥敬立止而客怪曰公氣色頓快何藥也爲道其由求方蔡公又送一貼越三日病全除往見蔡公公曰此藥僧伽也元祐中泗守劉士彥病八日不汗女求僧伽甚確夜夢告曰翌日塔中取藥遂於大聖鉢中取得此藥題印云太平州楊家人參散今太醫局中亦貴無甘草乾葛兼無分兩疑非眞方

**芎起散**

蒼朮 泔浸　麻黃 去節　荊芥 各貳兩　石膏 研　人參　大黃 兩半

括樓根　乾葛　芍藥　白芷　甘草 各壹兩

右爲末每服貳錢水盞半薑三片葱白三寸煎至七分食前服

**入瘟家令不相染著**

雄黃

右研細水調以筆濃蘸塗鼻竅中與病人同床亦不相染初洗面後及臨卧時點之凡疫家自生惡氣聞之即入上元宮逐散百脉而成斯病宜即以紙撚探鼻嚏之爲佳如以雄黃點鼻則自不聞并辟諸惡夢神良

**聖散子**方東坡敘云昔嘗觀千金方三建散於病無所不治而孫思邈著論以謂此方用藥節度不近人情至於救急其驗特異乃知神物效靈不拘常制至理開惑智不能知今予所得聖散子殆此類也自古論病唯傷寒至爲危急表裏虛實日數證候應汗應下之法差之毫釐輒至不救而用聖散子者一切不問陰陽二感男女相易狀至危篤者連飲數劑則汗出氣通飲食漸進神宇完復更不用諸藥連服取差其餘輕者額微汗正尔無恙藥性小熱而陽毒發狂之類入口即覺清凉此殆不可以常理詰也時疫流行平旦輒煮一釜不問老少良賤各飲一大盞則時氣不入其門平居無病能空腹一服則飲食快美百疾不生眞濟世衛生之寶也其方不知所從來故人巢君穀世寶之以治此疾百不失一余既得之謫居黃州連歲大疫所全活者至不可數巢君初甚惜此方指江水爲盟約不傳人余切隘之乃以傳蘄水龐君安常龐以醫聞於世又善著書故授之且使巢君之名與此方同不朽也用藥如后

草豆蔻 麪裹煨　木猪苓 去皮　石菖蒲　茯苓　高良薑 剉炒

獨活　柴胡　吳茱萸　附子 炮去皮臍　麻黃 去節

厚朴 去皮薑汁炙　藁本　芍藥　枳殼 去穰麩炒　白朮

蒼朮 泔浸　半夏 湯洗　澤瀉 各半兩　藿香　防風

細辛 各半兩　甘草 炙壹兩

右爲剉散每服五錢水盞半煎七分去滓熱服空腹服此藥以治寒疫因東坡作序天下通行辛未年永嘉瘟疫被害者不可勝數往往頃時寒疫流行其藥偶中抑未知方土有所偏宜未可考也東坡便謂與三建散同類一切不問似太不近人情夫寒疫亦能自發狂蓋陰能發躁陽能發厥物極則反理之常然不可不知今錄以備療寒疫用者宜審之不可不究其寒溫二疫也辛巳年余嘗作指治至癸巳復作此書見石林避暑錄亦曰宣和間此藥盛行於京師太學生信之尤篤殺人無數醫頓廢之然不妨留以備寒疫無使偏廢也

凡例

夫疫雖以三事鏈成若天行多假六淫交錯鬱折而致之者

旣有寒溫兩疫風濕其可不辨但證似傷濕而脉色不同與
夫一方相染長幼同病即當作疫治除辟法外治濕用五苓
散加炙甘草治風用桂枝湯加黃芩無不愈者其如涇邪交
絡互織當以類推之

**五苓散** 治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴
引水水入即吐或小便不利及汗出表解煩渴不止者宜
服之又治霍亂吐利○方見傷暑門加甘草壹兩炙

**桂枝黃芩湯** 治風疫脉浮數而不弱頭項疼腰脊痛發熱惡
風其證皆如太陽傷風但脉陰不弱相傳染爲異耳

桂枝去皮　芍藥　黃芩各半兩　甘草炙壹兩

右剉散每服五錢水盞半薑三片棗一枚煎至七分去
滓食前服

**[illegible]湯** 治傷寒溫疫濕疫熱疫

蒼朮　乾薑炮　甘草炙各半兩　防風　乾葛

厚朴製炒　芍藥各壹兩

右爲剉散每服三錢半重水兩盞煎七分去滓服

瘧叙論

夫瘧備內外不內外三因外則感四氣內則動七情飲食飢
飽房室勞逸皆能致瘧經中所謂夏傷暑秋痎瘧者此則因
時而序耳不可專隅以此論之則知溫病瘧泄欬嗽不可拘
也夫瘧之始發先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛
寒去則內外皆熱頭痛而渴唯欲飲冷者以陰陽上下交爭
虛實更作若陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷
太陽虛則腰背頭項俱痛少陽虛則身體解㑊心惕惕然三
陽俱虛則陰氣勝骨寒而痛陰并於陽則陽實而陰虛太陰
虛則不嗜食善嘔嘔已乃衰少陰虛則熱多寒少嘔甚其病
難已厥陰虛則腰腹痛小便不利如癃三陰俱虛則陽氣勝
熱盛悒悒不樂陰盛則內寒陽虛則外寒寒生於內故中外
皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱熱生於外故中外皆熱此皆
因外感寒暑風濕內傷喜怒憂恐積涎飲乃至飲食飢飽
勞逸之所爲也病氣與衛氣并居故病作衛氣晝行陽夜行
陰得陽而外出得陰而內薄所以日作其氣內薄於五臟橫
連於募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱出故間日
作以衛氣一日一夜大會於風府日下一節以此日作稍晏
至二十五日至骶骨二十六日入脊內其氣上行故作日益
早也瘧氣所以更盛更虛當氣之所在者在陽則熱躁在陰
則寒靜極則陰陽俱衰衛氣相離則病休衛氣集則復病也
於是有日作間作早晏不同又邪氣中於頭項者氣至頭項
則作中於背者氣至背則作中於腰脊者至腰脊即作各隨
其所中而作但衛氣之所在與邪氣相合則病作也更有痎
瘧鬼瘧等證亦以邪氣中衛氣之所爲也除癉瘧純熱溫瘧
先熱牝瘧無熱外諸瘧皆先寒而後熱又經曰無刺熇熇之
熱無刺渾渾之脉無刺漉漉之汗爲其病逆未可治也知此
則病方來與正作與將過皆不可治以反傷眞氣不可不知
所因備列于後

瘧病外所因證治

病者先寒後熱寒則湯火不能溫熱則氷水不能寒以先傷
寒後傷風故先寒而後熱名曰寒瘧

病者先熱後寒嘔煩自汗惡風以先傷風後傷寒風爲陽寒
爲陰故先熱而後寒名曰溫瘧

病者但熱不寒陰氣孤絶陽氣獨發少氣煩寃手足熱而欲
嘔必渴以傷於暑熱名曰癉瘧

病者寒熱身重骨節煩疼脹滿濈濈自汗善嘔因汗出復浴濕舍皮膚及冒雨濕名曰濕瘧

病者寒多不熱但慘戚振慄病以時作此以陽虛陰盛多感陰濕陽不能制陰名曰牝瘧

五種瘧疾以外感風寒暑濕與衛氣相并而成治之各有方

**白虎加桂湯** 治溫瘧先熱後寒惡風多汗

石膏 知母 甘草 桂心壹兩 粳米壹合

右剉散每服四錢水盞半煎七分去滓未發前進三服

**朮附湯** 治冒雨濕着于肌膚與胃氣相并或腠開汗出因浴得之

附子 白朮 甘草炙 茯苓 桂心

右剉散每服四大錢水盞半薑五片棗兩枚煎七分去滓食前服

**麻黃白朮湯** 治傷風寒暑溫不留經絡與衛氣相并病以日作寒熱交煎

麻黃去節 白朮 茯苓 桂心 陳皮

青皮 桔梗 白芷 甘草 半夏麯

紫蘇 烏梅 乾薑

右爲剉散每服四錢重水兩盞薑三片棗二枚煎七分去滓當發日空心一服臨發一服尤妙亦治時疫

**[illegible]常山飲** 治諸瘧先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日併發或間日一發頭疼惡心煩渴引飲氣息喘急口苦咽乾諸藥不效

川常山 知母 甘草炙 草果

烏梅 良薑

右爲剉散每服四錢水盞半棗五枚同煎七分去滓溫服未發前進參服

**牡蠣湯** 治牝瘧寒多微熱或但寒不熱

柴胡 桂心壹兩 黃芩參兩 牡蠣 甘草炙

乾薑 栝樓根

右爲剉散每服四錢水貳盞煎七分去滓空心服日參服初服微須汗出愈一法有半夏參兩

瘧病內所因證治

病者寒熱顏色蒼蒼然善太息如死狀以蓄怒傷肝氣鬱所致名曰肝瘧

病者心煩欲飲清水反寒多不甚熱乍來乍去以喜傷心心氣耗散所致名曰心瘧

病者寒多腹中熱痛或渴不渴不熱不泄腸鳴汗出以思傷脾氣鬱涎結所致名曰脾瘧

病者心寒寒甚則發熱熱間善驚如有所見以憂傷肺肺氣凝痰所致名曰肺瘧

病者手足寒洒然腰脊痛發熱大便難目眴眴以失志傷腎所致

伍種瘧疾以臟氣不和鬱結涎飲所致治之各有方

**七棗湯** 治五臟氣虛陰陽相勝作爲瘧疾不問寒熱先後與夫獨作疊間日悉主之

附子

右剉散水壹盞薑七片棗七箇煎至八分當發日空心溫服仍吳參五箇棗子忌如常良方用烏頭兼不用鹽水浸不特服之

**四獸飲** 治五臟氣虛喜怒不節勞逸兼并致陰陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發爲瘧疾悉主之兼治瘴瘧最效

半夏湯洗 茯苓 人參 草果 陳皮

甘草　烏梅肉　白朮　生薑　棗子各等分

右為剉散，鹽少許淹食頃，厚皮紙裹，水淹入慢火煨香熟，焙乾。每服秤半兩，水二盞，煎至七分，去滓，未發前併進叁服

**交解飲** 治脾胃氣弱，陰陽勝復，發為痎瘧

肉荳蔻二枚，一生一煨　草荳蔻二枚，如上　甘草半生半炙　厚朴半生半薑製

右等分剉散，每服四錢，水兩盞，煎七分，去滓，空心服

**草果飲** 治脾寒等瘧

草菓　川芎　白芷　紫蘇葉　良薑

甘草炙　青皮去白　等分炒

右為麁末，每服二大錢，水一盞，煎七分，去滓，熱服，當發日連進三服

**驅瘧飲子**

前胡　柴胡各四兩　桂心　桔梗　厚朴薑製

半夏湯洗去滑，各三兩　黃芪　乾薑炮　甘草炙，各二兩

右剉散，每服四大錢，水一盞半，薑三片，棗兩枚，煎至七分，去滓溫服

**瘧病不內外因證治**

病者發寒熱，一歲之間，長幼相若，或染時行，變成寒熱，名曰疫瘧，以歲運推之

病者寒熱日作，夢寐不祥，多生恐怖，名曰鬼瘧，宜用禁避厭禳之法

病者乍寒乍熱，乍有乍無，南方多病，此名曰瘴瘧，當隨方土所宜治之

病者寒熱，善飢而不能食，食已支滿，腹急疞痛，病以日作，名曰胃瘧。六腑無瘧，唯胃有者，蓋飲食飢飽所傷胃氣而成，世謂之食瘧，或因諸瘧飲食不節，變為此證

病者經年不差，差後復發，遠行久立，下至微勞，力皆不任，名曰勞瘧，亦有數年不差，百藥不斷，結成癥癖，在腹脇，名曰老瘧，亦曰母瘧

以上諸證名狀不同，各有治方，宜推而用之

**[illegible]白朮湯** 治一切瘧疾，方見外所因門

**紅[illegible]** 治鬼瘧殊效

眞阿魏半兩　桃枝　柳枝各長一寸　雄黃

辰砂別研

右為末，以重午日五家粽角為丸，如梧桐子大，辰砂所留一半為衣，遇發時用淨盞水摩一圓，塗鼻尖并人中，未退，以冷水服一丸，合時須用五月五日

**大正氣散** 治山嵐瘴氣，發作寒熱，遂成瘴疾

附子炮去皮臍　厚朴薑汁製　桂心　甘草炙　乾薑炮

陳皮各等分　茱萸湯洗

右為細末，每服二大錢，水一盞半，薑五片，棗一枚，同煎至七分，熱服，不拘時。兼治霍亂吐瀉，一切氣疾

**[illegible]** 治胃瘧發作有時，先覺伸欠，乃作寒慄，鼓振頤頷，中外皆寒，腰背俱痛，寒戰既已，內外皆熱，頭疼如破，渴欲飲冷，或痰聚胸中，煩滿欲嘔，或先熱後寒，先寒後熱，寒多熱少，寒少熱多，或寒熱相半，或但熱不寒，但寒不熱，或隔日一發，一日一發，或三日五日一發者，悉主之

厚朴薑製　烏梅打去仁　半夏湯去滑　青皮

良薑各一兩　草菓去皮，一兩　甘草炙，半兩

右為剉散，每服四錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎七分，去滓，未發前併三服，忌生冷油膩時菓。此藥溫脾化痰，治

胷膈痞悶心腹脹滿噫醋吞酸自可常服

**常山飲** 治勞瘧虛人老人皆可服

常山　川山甲(燒)　木通　秦艽(各壹分)

辰砂(半兩別研)　甘草(炙半兩)

右為剉散作一劑水三盞烏梅棗子各七枚煎半盞再入酒一盞煎至八分去滓入辰砂溫服

**老瘧飲** 治久瘧結成癥瘕癖在腹脇諸藥不去者

蒼朮(米泔浸)　草菓(去皮)　桔梗　青皮　陳皮

良薑(各半兩)　白芷　茯苓　半夏(湯洗去滑)　枳殼(麩炒去瓤)

甘草(炙)　桂心　乾薑(炮各[illegible])　紫蘇葉　川芎(各[illegible])

右為剉散每服四大錢水二盞鹽少許煎七分去滓空心服日參夜壹切吞下後紅圓子

**紅圓子** 治食瘧尤妙

蓬莪朮　京三稜(各二兩醋煮一伏時)　胡椒(一兩)　青皮(三兩炒香)

阿魏(一分醋化)

右為末別研倉米末用阿魏醋煮米糊搜和丸如梧子大炒土朱為衣每服五十圓至百圓以老瘧飲下古方雖有礬紅煎等不特服不見效抑亦藥料難備

**[illegible]瘧丹** 治諸瘧无問寒溫久近悉主之

黃丹(炒參分)　木香(半兩為末)　青皮　陳皮

吳茱萸(各半兩[illegible])

右以黃丹木香為末入醋膏內搜和為丸梧子大辰砂為衣每服十圓當未發前一食頃白湯下再將前三件滓絲木香半兩為末別研入黃丹參分和勻以醋糊為圓如梧子大每服三五十圓治瘧亦妙名曰捷丹

**紅散子** 須當發日早晨服

黃丹(炒色變)

右入好建茶合和末[illegible]錢匕白湯調下或溫酒調不入茶

**[illegible]瘧方**

雄黑豆([illegible])　其砒([illegible])

右五月五日午時圓如菉豆大粒乾衣砂為衣[illegible]之發日空心井花水下壹圓忌見雞犬若女人病令男子用月送入口忌熱食一日孕婦不得服於發日以緋帛裹一圓於右臂上小兒不能吞隨男左女右繫之

**又方**

黃丹(不以多少)

右五月五日用獨蒜[illegible]搗爛研細搜圓如梧子大每服伍圓當發前一食頃桃柳枝煎湯咽下

**[illegible]方**

青黛　桂心　砒　巴豆　硫黃(等分)

右並不去皮殼不修治為末以五月五日五家粽角為圓麥[illegible]大綿裹[illegible]當發日塞耳中男左女右[illegible]

許此者方後[illegible]名[illegible]丹不用此[illegible]面南用粽子角為[illegible]同搗[illegible]梧桐子大每用一粒當見人令[illegible]

三因極一病證方論卷之六

三因極一病證方論卷之七

疝敘論

經論雖云梁疝諸疝等更不說名狀但出寒疝賊風入腹而已惟
大奇論列五臟脈為五疝證所謂腎脈大急沉為腎疝肝脈
大急沉為肝疝心脈搏滑急為心疝肺脈沉搏為肺疝三陰
急為脾疝三陰即太陰脾脈也大抵血因寒泣則為瘕氣因
寒聚則為疝但五臟脈理不同不可不辨且腎脈本沉心脈
本滑受寒則急於理乃是肝脈本弦肺脈本濇並謂之沉未
為了義又脾不出本脈但云急為疝亦文義之缺也凡云急
者緊也緊為寒亦可類推且賊風入腹亦為疝冒暑履濕皆
能為疝當隨四氣改易急字風則浮弦暑則洪數濕則緩細
於理甚明要知疝雖兼臟氣皆外所因也

諸疝證治

疝之為病隨臟氣虛實感傷外邪寒泣風散暑鬱濕着絞刺
擊搏無有定處倉卒之際痛不堪忍世人稱為橫弦豎弦膀
胱小腸氣賊風入腹等名義不同證狀則一寒則溫之風則
散之暑則利之濕則燥之各有成法

**大烏頭桂枝湯** 治風寒疝腹中痛逆冷手足不仁身體疼痛
灸刺諸藥不能療及賊風入腹攻刺五臟拘急不得轉側
發作叫呼陰縮悉主之
大烏頭(實者五枚[illegible]) 桂心
芍藥([illegible]) 甘草([illegible])
右為剉散每服四大錢水一盞半薑五片大棗三箇入
前煎烏頭蜜半合同煎至七分盞去滓食前服
**一法** 用附子[illegible]不使烏頭為蜜附湯

**走馬湯** 治卒疝無故心腹痛陰縮手足厥逆并治飛尸鬼擊
巴豆(貳箇去皮心炒) 杏仁(貳箇去皮尖)
右貳味取綿纏槌令碎熱湯貳合捻取白汁飲之當下
老少量與

**梔附湯** 治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣絞刺脾腎氣
攻擊急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石白汗出
山梔子([illegible]) 附子([illegible])
右為末每服貳錢水壹盞酒半盞煎至七分入鹽一捻
溫服即愈(良方同)

**葱白散** 治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻刺疼痛及治婦
人產前產後腹痛胎不安或血刺者兼能治血藏宿冷百
骨節倦疼肌瘦怯弱傷勞帶癖久服尽除但婦人一切疾
病最宜服之
川芎 當歸 枳殼(麩炒去瓤) 厚朴(薑製) 官桂(去皮)
青皮 乾薑(炮) 茴香(炒) 川楝(炒) 神麴(炒)
麥糵(炒) 三稜(炮) 蓬朮([illegible]) 人參 茯苓
芍藥 木香(炮) 乾地黃([illegible])
右為末每服三錢水一盞葱白二寸煎七分入鹽少許
熱服大便秘澁加大黃煎大便自利加訶子煎食前服

**失笑散** 治小腸氣痛及婦人血痛心腹絞痛欲死十餘日百
藥不驗([illegible])
五靈脂 蒲黃(等分)
右末每服二錢先用釅醋一合熬藥成膏水一盞煎至
七分熱呷服([illegible])

**[illegible]** 治諸疝心腹絞痛不可忍
玄胡索 胡椒(等分)
右為末每服二大錢酒半盞水半盞煎七分食前溫服

大烏頭湯治寒疝繞臍，發白汗出，手足厥，其脉沉弦。卷十三之
大烏頭（五箇，炮，去皮，銼如骰子，炒令黑，不可焦）
右一味，水三盞，煎取八分，去烏頭，入蜜半盞，已下煎七
分，兩上空腹服。
牡丹圓治寒疝心腹刺痛，休作無時，及治婦人月病血刺疼痛
川烏頭（炮令焦黑，去皮尖） 牡丹皮（各四兩） 桂心（二兩） 桃仁（去皮尖，炒，五兩，別研）
右末，煉蜜丸梧子大，每服五十圓，溫酒下，婦人醋湯下。
小茴香圓治小腸氣腹痛
茴香 胡椒（等分）
右爲末，酒糊丸如梧子大，每服五十圓，空心溫酒下。
苦棟圓治肝腎氣虛，風冷相搏，心腹絞痛，攻刺腰背，不能舒，
及下注陰器，腫痒疼痛，久服壯腎活血，駐顏輕身，益老進
美飲食
川楝（一斤，銼，研，分三，去一分，用巴豆七粒，去皮同炒；一分用斑蝥七箇，去翅足同炒；一分用海金沙同炒，各去不用） 茴香（炒） 破故紙（炒）
葫蘆巴（炒） 木香（炮，各一兩） 烏藥（二兩）
右爲末，酒糊丸如梧子大，每服三五十圓，湯酒任下。
[illegible]湯治寒疝入腹，上實下虛，小腹疞痛，時復泄瀉，腸鳴
痛，不進飲食，常服溫脾補腎。
人參 茯苓 白朮 黃芪
附子（炮，去皮臍，各壹兩） 沉香（四錢） 木瓜（壹兩） 羌活（半兩）
甘草（炙） 芎藭（各壹分） 紫蘇（三分）
右爲剉散，每服三錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎七分，去
滓，食前服。嘔加半夏半兩，添水作盞半，薑七片煎。

## 敘厥論

經云：厥者，逆也。有寒厥，有熱厥，有六經厥，有尸厥。寒厥者，陰氣起於足五指之裏，集於膝下，聚於膝上，故陰氣勝則從五指至膝上寒。陽氣衰，不能滲營其經絡，陽氣日損，陰氣獨在，故手足爲之寒，名曰寒厥。熱厥者，陽氣起於足五指之表，集於足下，聚於足心，故陽氣勝則從五指至足心熱。熱入於胃，絡脉滿，經脉虛，陰虛陽入，腎氣衰，陽氣獨勝，故手足爲之熱，名曰熱厥。六經厥者，頭重足弱，發爲眴仆，名太陽厥；妄言走呼，腹滿面赤，名陽明厥；暴聾頰腫脇胻拘痛，名少陽厥；腹脹後悶，食則嘔，名太陰厥；口乾溺赤，腹滿心痛，名少陰厥；涇溲不利，胻熱陰縮，名厥陰厥。尸厥者，脹滿暴不知人，或至半日，遠至一日。此以陰氣盛於上則下虛，下虛則腹脹，腹脹則下氣重上而邪氣逆，逆則陽氣亂，而不知人矣，名曰尸厥。經論如此，雖粗分六經，殊不出寒熱二證。所因欲求備治，當歷明之。寒厥則因多欲而奪其精，故致陽衰陰盛；熱厥則因醉飽入房，精虛則熱入，故致陰虛陽盛。故其厥因多以不勝乘其所勝，氣不得行，遂致於逆。如腎移寒於脾，則水乘於土，水既不行，乃成寒厥；如心移熱於腎，則火乘於水，火既不行，乃成熱厥。六經皆然，可以類論也。所謂得其要者，一言而終矣。尸厥亦然，正由臟氣相刑，或與外邪相忤，則氣遏不行，閉於經絡，諸脉匿伏，昏不知人，惟當隨其臟氣而通之，寒則熱，熱則寒，閉則通。如經所謂盛則瀉，虛則補，不盛不虛，以經取之，其旨一也。經中以數證爲熱厥之因，學者不可拘此。蓋傷寒溫病皆有熱厥，仲景所謂熱深厥深，聖意以酒能發百脉熱，故舉此以爲例耳，不可不知。

## 陰陽厥脉證治

陰陽相乘而生寒熱，厥者脉證似同而大異。寒厥者，初得之四肢冷，脉沉微而不數，多惡寒，引衣自覆，下利清穀，外證多

惺惺熱厥者初得之必發熱頭疼脉雖沉伏按之必數其人或畏熱喜冷揚手擲足煩躁不眠大小便秘赤外證多昏冒傷寒亦然治之各有方

**四逆湯**治寒厥或表熱裏寒下利清穀食入則吐或乾嘔或大汗大吐大下之後四肢冰冷五內拘急舉體疼痛不渴脉沉伏

大附子去皮臍生用 乾薑半兩 甘草炙壹分 附子半兩

右剉散每服四錢水二盞煎七分去滓食前溫服併進取效

**白虎湯**治熱厥腹滿身重難以轉側面垢譫語遺溺手足厥冷自汗脉沉滑裏有熱也

石膏碎四兩 知母壹兩半 甘草炙半兩

右爲剉散每服四大錢水二盞粳米一撮煮米熟去滓取七分清汁服可併進服

**承氣湯**亦治熱厥方見傷寒門此爲例當觀病淺深量多寡以飲之方見第四卷

卒厥尸厥脉證治

**追魂湯**治卒厥暴死及主客忤鬼擊飛尸奄忽氣絕不覺口噤

麻黃去節三兩 杏仁百八十枚去皮尖 甘草炙壹兩

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓灌之通治諸感忤或口噤拗口不開去齒下湯湯入口活不下分病人髮左右捉搶肩引之藥下漸令服盡取効千金有桂心二兩金匱云寸脉沉大而滑沉則爲實滑則爲氣實氣相搏血氣入臟則死入腑則愈若卒厥唇口青身冷爲入臟即死身和汗出則愈

**內鼻散**治尸厥脉動而無氣氣閉不通靜而若死亦名卒厥

菖蒲

右爲末內鼻孔中吹之令入仍以桂末安舌下

眩暈證治

方書所謂頭面風者即眩暈是也然眩暈既涉三因不可專爲頭面風如中傷風寒暑濕在三陽經皆能眩人頭重項強但風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重著吐逆眩倒屬外所因喜怒憂思致藏氣不行鬱而生涎結爲飲隨氣上厥伏留陽經亦使人眩暈嘔吐眉目疼痛眼不得開屬內所因或飲食飢飽甜膩所傷房勞過度下虛上實拔牙金瘡吐衄便利去血過多及婦人崩傷皆能眩暈眼花屋轉起則眩倒屬不內外因治之各有法

**大豆紫湯**治中風頭眩惡風自汗吐冷水及產後百病或中風痱痙背強口噤直視煩熱

獨活壹兩半 大豆半升 酒三升

右先以酒浸獨活煎一二沸別炒大豆極焦煙出急投酒中密封候冷去豆每服一二合許得少汗則愈日數十服此湯能去風消血結如妊娠折傷胎死腹中服此得差

**三五七湯**治感寒頭眩惡寒口眼喎斜耳聾

大附子去皮臍炮 山茱萸伍兩 山藥七兩

右爲末每服二錢匕酒調服或㕮咀每服四大錢水一盞半薑五片棗一箇煎七分去滓服

**黃龍圓**治感暑眩暈昏不知人方見中暑門

**芎朮散**治冒濕頭眩暈經久不差嘔吐涎沫飲食無味主之

神麴二兩炒 白朮三兩

右爲末每服二錢生薑煎湯調下或以酒糊圓如梧子大每服三五十圓湯飲任下

**署預湯** 治七情所傷，脈氣不行，鬱而生涎，涎結爲飲，隨氣上厥，伏留陽經，心中忪悸，四肢緩弱，翕然而熱，頭目眩冒，如欲搐動。

署預　人參　麥門冬（去心各[illegible]兩）　前胡　白芍藥

熟地黃（各貳兩）　枳殼（麩炒去穰）　遠志（去心[illegible]）　黃芪（[illegible]）

白茯苓　茯神（各壹兩半）　半夏（[illegible]）　甘草（炙半兩）

右爲剉散，用千里流水壹盞半，薑七片，秫米壹撮，煎七分，去滓，食前服。

**白散子** 治上實下虛，眩暈昏塞。方見中風門

**芎藭湯** 治產後去血過多，運悶不省，及傷胎去血多，崩中去血多，金瘡去血多，拔牙齒去血多不止，懸虛心煩，眩暈頭重，目暗耳聾，舉頭欲倒。

芎藭（三兩）　當歸（去蘆[illegible]洗焙乾）

右爲剉散，每服四錢，水一盞半，煎七分，去滓，熱服，不以時候。

**黑錫丹** 治陰陽不升降，上熱下冷，頭目眩暈，病至危篤，或服暖藥僭上，愈甚者，當服此藥，已經曾損身。

硫黃（[illegible]）　川楝子　黑鉛（[illegible]各貳兩）

陽起石　木香　沉香　青皮

肉荳蔻（一兩）　茴香（炒）　官桂（去皮不見火）　附子（炮去皮臍）

葫蘆巴（炒）　破故紙（炒各壹兩）　烏藥（[illegible]）

右爲細末，酒糊爲丸，如梧子大，每服三五十圓至一百圓，濃煎人參茯苓薑棗湯吞下，食前服。

痓敘論

夫人之筋，各隨經絡結束於身，血氣內虛，外爲風寒濕熱之所中，則痓。故寒則緊縮，熱則弛張，風則弦急，濕則脹緩。四氣兼并，當如常說。以風散氣，故有汗而不惡寒，曰柔痓；寒泣血，故無汗而惡寒，曰剛痓。熱消氣，故爲瘈瘲；濕溢血，故爲緩弱。經中所謂大筋緛短，小筋弛長，緛短爲拘，弛長爲痿，皆濕熱不攘之所爲也。原其所因，多由亡血，筋無所營，故邪得以襲之。所以傷寒汗下過多，與夫病瘡人及產後致斯病者，概可見矣。診其脈皆沉伏弦緊，但陽緩陰急則兀兀拘攣，陰緩陽急則反張強直，二證各異，不可不別。

痓敘例治法（破傷風濕等並附）

病者身熱足寒，頭項強急，惡寒，時頭熱面赤，目脈赤，獨頭動搖，卒口噤，背反張，以發熱惡寒不惡寒、有汗無汗分剛柔者，風寒痓也。脈沉細，即爲濕痓。瘡瘍未合，風入爲破傷風，濕入爲破傷濕。二者害人最急，倉卒不知其因，甚難忍療。痓瘡腠消之後，尤宜謹之。產婦汗多，或因怒所皆成此病，治之各有方治。

**栝樓桂枝湯** 治柔痓，身體強几几然，脈反沉遲，自汗。

栝樓根（貳兩）　桂心　白芍藥（各[illegible]）　甘草（[illegible]）

右爲剉散，每服四大錢，水盞半，薑五片，棗一枚，煎七分，去滓溫服。汗不透，食頃啜熱粥發之。

**葛根麻黃湯** 治剛痓，無汗，小便少，氣上衝胸，口噤不能語。

葛根（[illegible]）　麻黃（[illegible]）　桂心　白芍藥　甘草（[illegible]）

右剉散，每服四大錢，水盞半，薑五片，棗一枚，煎七分，去滓，食前服。

**大承氣湯** 治剛痓，胸滿口噤，卧不著席，腳攣急，必齘齒，主之方。

大黃（[illegible]）　厚朴（薑製）　枳殼（[illegible]麩炒去穰）

右剉散，每服四大錢，水盞半，煎七分，去滓，入芒硝貳錢

已煎鎔服得利止後服此以陽明養宗筋陽明者胃也
風濕寒入于胃則熱甚宗筋無以養故急宜利陽明以
治其能養也

**參桂湯** 治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智或
癡或身強直不語或生或死狂言不可名狀角弓反張或
欲得食或不用食或大小便不利悉主之
人參　桂心　當歸　獨活　黃芩
乾薑炮　甘草炙各半　石膏一兩　杏仁去皮尖六十箇
右剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓服無汗加
麻黃去節三分

**[illegible]當歸湯** 主破傷風口噤角弓反張痓者
當歸　防風各一兩　獨活一兩半　麻黃去節一兩一分
細辛去苗半兩　附子炮去皮臍一箇八錢重
右為剉散每服四錢水酒各半盞同煎七分去滓口不
開者挾開口內湯一服蘇二服少汗三服大汗愈

破傷風濕治法

**防風散** 治風自諸瘡口入為破傷風項強牙關緊欲死
防風去叉　天南星湯洗等分
右為末每服三錢童子小便一大盞煎至七分熱服

**牡蠣散** 治破傷濕口噤強直
牡蠣取末敷瘡口仍以末二錢煎甘草湯調下

**香膠散** 治破傷風口噤強直
魚膠燒七分留性
右研細入麝香少許每服二錢酒調下不飲酒米湯下
又一方以蘇木煎酒下

三因極一病證方論卷之七

# 三因極一病證方論卷之八

## 內所因論

夫臟腑合手足三陰三陽為十二經各有所主故為十二官
心者君主之官神明出焉肺者相傅之官治節出焉肝者將
軍之官謀慮出焉脾者諫議之官公正出焉腎者作強之官
伎巧出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂
出焉小腸者受盛之官化物出焉大腸者傳送之官變化出
焉胃者倉廩之官五味出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀
胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故五臟為陰六腑
為陽此十二官不得相失苟正由陰陽消息盈虛當隨四序
而調養之不可使其偏勝偏勝則偏復偏復則偏害勝克流
變則真病生焉夫陰陽虛實者乃臟腑更相勝復也若其子
母相感則母虛能令子虛子實能令母實經曰實則瀉其母
虛則補其子如肝實則瀉脾肝虛則補心如百姓足君孰與
不足此經之本意也難經則反是及觀金匱之論其得為多
肝虛補用酸助用焦苦益用甘味之藥酸入肝焦苦入心甘
入脾脾能制腎腎氣微弱則水不行水不行則心火盛心火
盛則肺金受制肝氣乃舒肝氣舒則肝病自愈此補子之意
也虛肝則用此實則反之千金亦云肝虛當補心心旺則感
於肝皆此類也此正本藏十二官冷熱盈虛而為病非外感
淫邪叉故為腠理者之比然內所因惟屬七情交錯愛惡相
勝而為病能推而明之此約而不濫學者宜留神焉

## 內所因治說

論云治傷寒有法治雜病有方方即義方法即法令外病用
法令猶奸邪外擾非刑不除內病用義方猶父兄子弟不足
以禮格之而已故內外之治由是而分外邪難辨當以例明

內證易知只敘方證學者不可不審。

肝膽經虛實寒熱證治

**瀉肝湯** 治肝實熱陽氣伏邪脇痛忿忿悲怒發熱喘逆滿悶目痛視物不明狂悸非意而言乍寬乍急所作反常

前胡去苗 柴胡 秦皮 細辛去苗 梔子仁

黃芩 升麻 蕤仁 決明子各等分

右㕮咀每服四錢水兩盞苦竹葉車前葉各五片煎至盞半內藥再煎至八分去滓入芒消壹錢匕煎一沸不以時服

**溫膽湯** 治膽實熱反洒洒惡寒腹中氣滿脇下硬口苦咽乾頭疼不欲食

半夏湯洗去滑 生地黃伍兩 酸棗仁 黃芩壹兩

遠志去心 茯苓各貳兩 甘草炙壹兩

右㕮咀長流水壹斗糯米壹升文火煮蟹眼沸揚三千遍澄清每用貳盞抄藥四錢匕薑七片煎七分去滓不以時服

**補肝湯** 治肝虛寒兩脇滿筋急不得太息寒熱腹滿不欲飲食悒悒不樂四肢冷發搶心腹痛目視䀮䀮或左脇偏痛筋萎脚弱及治婦人心痛乳癰膝熱消渴爪甲枯口面青

山茱萸 甘草炙 桂心 細辛去苗 茯苓

桃仁 柏子仁 防風 川烏頭

右㕮咀每服四大錢水盞半薑五片棗三枚煎至七分去滓空心服

**補膽湯** 治膽虛寒眩厥足痿指不能搖躄不能起僵仆目黃失精虛勞煩擾因驚膽懾奔氣在胸喘滿浮腫不睡

半夏湯洗去滑 麥門冬去心各壹兩半 茯苓貳兩 酸棗仁炒叁兩

甘草炙 桂心 遠志 黃芩 萆薢 人參各壹兩

右為剉散每服四大錢用長流水壹斗糯米煮如蟹眼湯法(一方見虛煩門)

心小腸經虛實寒熱證治

**瀉心湯** 治心實熱心下痞滿身重發熱乾嘔不安腹中雷鳴溏泄不利水穀不消欲吐不吐煩悶喘急

黃連去毛貳兩 半夏湯洗 黃芩 甘草炙 人參各壹兩

乾薑

右為剉散每服四大錢水兩盞薑三片棗二枚煎七分去滓服并治霍乱若寒加附子壹枚炮去皮臍若渴加栝樓根嘔加橘皮痛加當歸客熱以生薑代乾薑

**清脈湯** 治小腸實熱身熱手足心熱汗不出心中煩滿結塞不通口瘡身重

柴胡 澤瀉 橘皮 芒消 枳實

黃芩 升麻 旋覆花 生地黃各等分

右剉散每服四錢水盞半煎七分去滓下芒消再煎熱服不以時

**茯苓補心湯** 治心虛寒病苦悸恐不樂心腹痛難以言心寒恍惚喜悲愁恚怒衂血面黃煩悶五心熱渴獨語不覺咽喉痛舌本強冷汗出善忘恐走及治婦人懷姙惡阻吐嘔眩暈四肢怠惰全不納食

白茯苓 人參 前胡 半夏 川芎

橘皮 枳殼 紫蘇 桔梗 甘草炙

乾薑 當歸 白芍藥 熟地黃

右剉散每服四大錢水盞半薑五片棗一枚煎七分去滓食前服

分心氣湯 治心氣鬱結忪悸噎悶四肢浮腫上氣喘急

大腹皮炒 香附子炒去毛 白茯苓 桔梗各壹兩 木通 甘草炙 川芎 前胡去苗 青橘皮炒 枳殼麩炒 白朮各叁分 細辛去苗 木香各半兩

右剉散每服四大錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去滓食前服

[illegible]湯 治小腸虛寒苦頭偏痛耳聾疼下痢赤白腸滑腹中疞痛裏急後重

乾薑 當歸 黃蘗 地榆各壹兩 阿膠 茴香 石榴皮 黃連

右剉散每服四錢水盞半煎七分去滓溫服

脾胃經虛實寒熱證治

[illegible]湯 治脾實熱病苦足寒脛熱腹脹滿煩擾不得臥舌本強體重面黃頭痛右脇滿痛偏脹口唇乾裂寒熱如瘧

茯苓 橘皮 草菓去皮 白朮 人參 桂心 白芷 甘草炙 川芎各壹兩 半夏湯洗

右爲剉散每服四大錢水貳盞薑七片紫蘇三葉煎七分去滓服欲通利加大黃一兩

平胃湯 治胃實熱口唇乾嘔噦煩悶大小便秘澀及熱病後餘熱不除蓄于胃中四肢發熱口渴胸滿無汗

厚朴 射干 升麻 茯苓 芍藥 枳殼 大黃 甘草

右爲剉散每服四錢水一盞煎七分去滓空心熱服

[illegible]湯 治脾虛寒病泄瀉腹痛咽嗌嘔吐心煩不得臥腸鳴虛脹飲食不消勞倦虛羸噫四肢逆冷多臥少起

人參 茯苓 草菓 益智 乾薑 麥糵炒 甘草 厚朴 橘皮 白朮

右爲剉散每服四錢水壹盞半煎七分去滓食前服

[illegible]湯 治胃虛寒脛寒不得臥淅淅惡風洒洒既寒腹中痛虛鳴寒熱如瘧唇口乾面目虛浮嘔噦吐瀉四肢疼痛不思飲食或傷寒溫瘧骨節酸痛

厚朴 藿香 半夏 茯苓 人參 甘草 附子 橘皮 草菓 白朮

右剉散每服四錢水盞半薑五片棗一枚烏梅半箇煎七分去滓空心服常服溫胃消痰進食下氣辟寒疫

肺大腸經虛實寒熱證治

[illegible]湯 治肺實熱肺壅汗出若露上氣喘逆咳嗽咽中塞如嘔狀短氣客熱或唾膿血

薏苡仁 防己 杏仁 冬瓜子仁 雞子白皮

右爲剉散每服四錢先以葦葉切半握水貳盞煎盞半入藥同煎至七分去滓食前服

瀉白湯 治大腸實熱腹脹不通俠臍痛食不化喘不能久立口生瘡

橘皮 竹茹 黃芩 梔子仁 蘗皮 茯苓 芒硝 生地黃

右爲剉散每服四錢水盞半薑棗煎七分空心服

[illegible]湯 治肺寒虛逆滿上氣咽中悶塞寒從背起口中如含冰雪語無音聲舌本乾燥吐沫唾血不能飲食

款冬花 桂心 桑白皮 人參 紫菀茸 白石英 五味子 鍾乳粉 麥門冬

右剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗二枚粳米壹撮同煎七分去滓食前服

[illegible]治大腸虛寒利下青白腸中雷鳴相逐大便不節小便赤黃氣上衝胸不能久立身腫腹急當臍痛悉主之

酸石榴皮　黃連　地榆　罌粟殼　茯苓

右剉散每服四錢水盞半薑五片烏梅一個煎七分去滓空心服

腎膀胱經虛實寒熱證治

[illegible]治腎實熱小腹脹滿四肢正黑耳聾骨熱小便赤黃腰脊離解及伏水等

茯苓　黃芩　菖蒲　玄參　細辛

大黃　甘草　磁石

右爲剉散每服四錢水一盞煎七分去滓熱服

[illegible]治膀胱實熱腰脊痛閉塞不通舌乾咽腫悉主之

茯苓　梔子仁　知母　生地黃

淡竹葉　石膏八兩

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分入蜜半匙再煎兩沸熱服須利加芒消壹錢匕

[illegible]治腎虛寒陰萎腰脊痛身重緩弱足腰不可以按語音混濁陽氣頓絕

熟乾地黃　蓯蓉　麥門冬　牛膝　茯苓

五味子　巴戟　甘草　茯神

乾薑　杜仲

右爲末每服貳錢溫酒調下空心日二三服

[illegible]治膀胱虛冷腳筋急腹痛引腰背不可屈伸耳聾目䀮䀮坐欲倒小便數遺白而黑如炭

黃芪　白茯苓　杜仲

磁石　五味子　白朮　白石英

右爲剉散每服四錢水盞半煎七分去滓空心溫服

[illegible]治右腎實熱身執脊腸相引痛足冷小便黃赤如梔子蘗汁每欲小便即莖頭痛

榆白皮　冬葵子　石葦　黃芩

通草　瞿麥

右爲麄末先以水貳盞入車前葉數片煎至盞半入藥末四錢再煎七分去滓熱服

[illegible]治三焦實熱目內眥急痛腹脇熱脊背連腔中煩悶飲食未定頭面汗出閉格不通不吐不下或氣逆不續走哺不禁或泄瀉溺澁實證

地骨皮　半夏　柴胡　澤瀉　茯苓

麥門冬　甘草　人參

右剉散每服四錢水貳盞薑伍片竹茹煎七分去滓空心服

[illegible]治右腎虛寒小便數腰脇引痛短氣欬逆四肢煩疼耳鳴面黑骨間熱夢遺白濁目眩諸虛困乏

鹿茸　巴戟　熟乾地黃　枸杞子

蓯蓉　牛膝　附子　桂心

山茱萸　白芍藥　防風　甘草

右剉散每服四大錢水盞半薑五片鹽少許煎七分去滓食前服

[illegible]治三焦虛寒短氣不續腹不安食隨即消下小便赤濁精泄不禁腳脛酸疼小腹脹滿

熟地黃　巴戟天　龍骨　遠志

茯苓　天雄　五味子　山藥

刻本作藏

茯苓（去皮） 續斷（各一兩） 蛇床子（略炒） 菟絲子（酒浸各[illegible]）
右為細末每服二錢匕溫酒調下夫三焦為精腑臟精
以養身係累于心脾腎三經人多以醉飽心虛而合陰
陽故此病作惟謹之為得

三焦精府辨正

古人謂左腎為腎藏其腑膀胱右腎為命門其腑三焦三焦
者有脂膜如手大正與膀胱相對有二白脉自中出夾脊而
上貫于腦所以經云丈夫藏精女子繫胞以理推之三焦當
如上說有形可見為是扁鵲乃云三焦有位無形其意以為
上中二焦如漚如霧下焦如瀆不可遍見故曰有位無形而
王叔和輩失其旨意遽云無狀空有名俾後輩承緩不已且
名以召實無實奚召果其無形尚何以藏精繫胞為哉其所
謂三焦者何也上焦在膻中內應心中焦在中脘內應脾下
焦在臍下即腎間動氣分布人身有上中下之異方人湛寂
欲想不興則精氣散在三焦榮華百脉及其想念一起慾火
熾然翕撮三焦精氣流溢並命門輸瀉而去故號此府為三
焦耳學者不悟可為長太息

痼冷積熱證治

夫以臟腑禀賦不同亦有將理失宜遂致偏冷偏熱故方論
中有痼冷積熱之説痼冷者中寒也多因真氣既微胃氣不
實復啖生冷冰雪之屬致腸胃虛寒陰既停凝陽不能正大
便洞泄小便頻併鼻多清涕嘔吐涎沫水穀不化洒洒淅淅
皆陽虛陰盛之所為也積熱者臟腑燥也多因精血既衰三
焦煩壅復餌丹石酒炙之屬致腸胃蘊毒陽既熾盛陰不能
制大便秘澀小便赤淋口苦咽乾涎稠眵淚飲食無度掀揭
燥渴皆陰虛陽盛之所為也治各有方

刻本無膿　刻本作煩燥

刻本一兩

**金鎖丹** 固真氣暖丹田堅筋骨壯陽道除久寒痼冷補勞傷
虛損治男子腰腎久冷心腹積聚脇下冷癖腹中諸蟲失
精遺溺形羸力弱腳膝疼痛冷風頑痺上氣衄血咳逆寒
熱霍亂轉筋虛滑下利又治痔瘻濕䘌生瘡下血不止及
婦人血結寒熱陰蝕疽痔
硫黃（壹斤[illegible]）
右研為細末每一兩用炊餅一兩湯浸搓去水脉為丸
如梧子大每服三十丸多至百圓溫米飲下空心服之
又治傷寒陰證身冷脉微手足厥逆或吐或利自汗不
止或小便不禁不拘圓數併服得身熱脉出為度

**[illegible]** 補虛壯氣暖腎祛邪益精髓溫脾胃進飲食悅顏色
治真氣虛憊臍腹冷痛股骻痠疼腰背拘急腳膝緩弱面
色痿黃目眩耳鳴心怔氣短大便自利小便頻數口乾煩
渴飲食無味大治婦人崩中帶下參拾六病小兒驚癇及
一切痼冷風虛老人之常服者神養氣輕身延年此藥劑
合陰陽功侔造化留心服餌百痾不生真濟世衛生之寶也
丁頭代赭石　禹餘粮石（火煅紅醋淬者）　紫石英
赤石脂（各肆兩）
右各為細末並入砂合內用赤石脂固口縫以炭一秤
鍛頂煅候火消及七分存然八分火取出合子令冷開却
合先於地上掘一坑深尺餘用厚紙兩重襯定傾藥在
上以新瓦盆子覆之四畔將黃土遍壅一宿取出再入
乳缽沒藥二兩五靈脂二兩都為細末一處拼前藥合
和勻再研極細者糯米糊和勻杵數千下圓如雞頭大
每服式圓或伍圓空心濃煎棗湯下忌六畜血

上內

[illegible] 治大人小兒臟腑積熱煩躁多渴面熱頭昏唇焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡痰實不利涕唾稠粘睡臥譫妄及腸胃燥澁便溺秘結一切風壅

大黃 朴消 甘草 山梔子仁

黃芩 薄荷 連翹

右爲末每服二錢水一盞竹葉七片蜜少許同煎七分去滓食後服

洗心散 治風壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘心神煩躁眼澁睛疼及大小便秘澁

大黃 甘草 當歸 芍藥

麻黃 荊芥 白朮

右爲末每服一錢水一盞生薑薄荷各少許煎七分去滓溫服小兒豆瘡欲發先狂語多渴及驚風積熱可服一錢臨臥服如大人五臟壅實欲要溏轉加至四五錢乘熱服

五積證治

五積者五臟之所積皆臟氣不平遇時相逆而成其病如憂傷肺肺以所勝傳肝遇長夏脾王傳剋不行故成肝積名曰肥氣肥氣者以其積氣藏於肝木之下猶肥遁於山林也失志傷腎腎以所勝傳心遇秋肺王傳剋不行故成心積名曰伏梁伏梁者以其積氣横架於肓膜也怒則傷肝肝以所勝傳脾遇冬腎王傳剋不行故成脾積名曰痞氣痞氣者以積氣痞塞中脘也喜則傷心心以所勝傳肺遇春肝王傳剋不行故成肺積名曰息賁息賁者以積氣喘息賁溢也思則傷脾脾以所勝傳腎遇夏心王傳剋不行故成腎積名曰奔豚奔豚者猶水之奔衝於心火也雖經以肥氣成於戊己伏梁成於庚辛以至奔豚成於丙丁者正合陰陽施化休王乘剋之大義也又論曰病有積有聚有穀氣積者臟病也終始不移聚者腑病也發無定処展轉痛移爲可治穀氣者即宿食也由饑飽之邪從口入更有息積病乃氣息癖滯於脇下非導引不行

肥氣丸 治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鼈狀久久不愈發欬逆嘔瘧連歲月不已其脉弦而細

青皮 當歸 蒼朮 蛇含石

蓬朮 三稜 鐵孕粉

右爲末醋煮米糊丸菉豆大每服四十圓當歸浸酒下

伏梁丸 治心之積起於臍上上至心大如臂久久不已病煩心身體髀股皆腫環臍而痛其脉沉而芤

茯苓 厚朴 人參 枳殼

白朮 半夏 三稜

右等分爲末麪糊丸梧子大米飲下二十圓食前日兩服作散酒調服絕勝

痞氣丸 治脾之積在胃脘覆大如盤久久不愈病四肢不收黃疸飲食不爲肌膚心痛徹背背痛徹心脉浮大而長

大烏頭 附子 赤石脂

川椒 乾薑 桂心

右爲末蜜丸如梧子大朱砂爲衣每服五十丸米湯下漸至十圓食前

息賁丸 治肺之積在右脇下大如覆杯久久不愈病洒洒寒熱氣逆喘咳發爲肺癰其脉浮而毛

半夏 吳茱萸 桂心 人參

刘本作服

刘本作参

壹

甘草炙 桑白皮炙 葶藶隔紙炒各弍兩

右爲剉散每服四錢水一盞半姜七片棗兩枚煎七分

去滓食前服

**奔豚湯** 治腎之積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下无

時久久不已病喘逆骨痿少氣其脉沉而滑

甘李根皮焙 乾葛各壹兩 當歸 川芎

白芍藥 甘草炙 黄芩各弍兩 半夏湯洗七次四兩

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓服

六聚證治

六府者大小腸胃膽膀胱三焦者也屬於三陽太陽利清氣陽明泄濁氣少陽化精氣如都會之府主轉輸以爲常也六府失常則痤聚不通故實而不轉虛而輸隨氣往來痛無定處在上則格在下則脹傍攻兩脇如有坯塊易於轉變非五臟比乃可治也

**散聚湯** 治久氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時心腹絞痛攻刺腰脇上氣窒塞喘咳滿悶小腹䐜脹大小便不利或復泄瀉淋瀝無度遺精白濁狀若虛勞

半夏湯洗七次 檳榔 當歸各壹兩 橘皮

杏仁麩炒去皮尖 桂心各弍兩 茯苓 甘草炙

附子炮去皮臍 川芎 枳殼去瓤麩炒 厚朴姜汁炒

呉茱萸湯洗各一兩

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服大便不利加大黄

息積證治

病者脇下滿氣逆息難頻歲不愈名曰息積因氣留滯癖於脇下不在臟腑榮衛之間積久形成氣不干胃故不妨食炙之則火熱内燥刺之則反動其經雖服消化之藥不能獨治宜積以導引助而行之

肓

**[illegible]** 治腸胃因虛氣癖於肓膜之外流於季脇氣逆息難悒日頻年醫所不治久則榮衛停凝一旦敗濁潰爲癰膿多致不救

胡椒壹伯五十粒 木香壹分 全蝎十个去毒

右爲末粟米飲圓如菉豆大每服十五圓橘皮湯下

**化氣湯** 治息積癖于腹脇之下偏脹膨滿不妨飲食鐵藥不能取轉及治心脾疼痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人脾血氣

縮砂仁 桂心 木香各壹分 甘草炙 茴香炒

丁香皮 青皮炒 陳皮 生薑乾 蓬术炮各半兩

胡椒 沉香各壹錢

右爲末每服二錢姜蘇鹽湯調下婦人醋湯調服

**導引法** 以兩手拇指壓無名指本節作拳按髀趺坐扣齒三十六屏氣二十一息嚥氣三口再屏息再嚥如是三作以氣通爲效遇子午卯酉時則行於按摩導引之法甚多隨意行之皆可不必拘此法

五勞證治

五勞者皆用意施爲過傷五臟使五神不寧而爲病故曰五勞以其盡力謀慮則肝勞曲運神機則心勞意外致思則脾勞預事而憂則肺勞矜持志節則腎勞是皆不量稟賦臨事過差遂傷五臟以臟氣本有虛實因其虛實而分寒熱世醫例以傳尸骨蒸爲五勞者非也彼乃瘵疾各一門類不可不知

**[illegible]** 治肝勞實熱關格牢澁閉塞不通毛悴色夭

猪脂 生薑汁 青蒿汁 天門冬汁各壹升

右以鐵火銀石器內熬成膏每服壹匙酒湯調下不拘時候

虎骨酒 治肝勞虛寒口苦關節疼痛筋攣縮煩悶

虎骨　丹參　地骨皮　乾薑　芎藭

熟地黃　猪椒根　五加皮　枳實　白朮

右爲剉散以絹袋盛淳酒四斗浸四日初服二三合漸加至壹盞日再服食前

瀉心湯 治心勞實熱口舌生瘡大便閉澁不通心滿痛小腸澀

澤瀉　梔子仁　黃芩　桂心　通草

石膏　大黃　甘草

右爲剉散每服四錢水壹盞半煎七分去滓食後熱盛者煎熟加芒硝壹錢煎不以時服

定心湯 治心勞虛寒驚悸恍惚多忘夢寐驚魘神志不定

茯苓　桂心　甘草　白芍藥

半夏湯 治脾勞實熱四肢不和五臟乖戾脹滿肩息氣急不安

乾薑　遠志　人參

右剉散每服四錢水壹盞半棗兩枚煎七分去滓食前服

茯苓　白朮　杏仁

橘皮　芍藥　半夏

右剉散每服四錢水壹盞半生薑七片棗兩枚煎七分去滓不以時服

茱萸煎 治脾勞虛寒氣脹咽滿食不下通噫宿食臭

吳茱萸　白朮　猪膏　宿薑汁

右擣茱萸白朮貳味爲末內薑汁膏中煎成膏飴每服壹大匙食前溫酒調下

引氣湯 治肺勞實熱氣喘鼻張面目苦腫

橘皮　細辛　白朮　桂心　紫蘇

麻黃　杏仁　石膏　半夏　枳殼

右剉散每服四錢水兩盞薑七片竹葉五片煎七分去滓食後服

人參厚朴湯 治肺勞虛寒心腹冷氣逆游氣胸脇氣滿從胸達背痛嘔逆飲食即吐虛乏不足

人參　厚朴　甘草　桂心

半夏　橘皮　麥門冬

當歸

右剉散每服四錢水兩盞薑七片去滓食前服腹痛加芍藥

梔子湯 治腎勞實熱小腹脹滿小便赤黃末有餘瀝數而少莖中痛陰囊生瘡

梔子仁　芍藥　通草　石韋

滑石　紫參　熟地黃　榆白皮

右剉散每服四錢水壹盞半淡竹葉七片同煎七分去滓不以時服

五加皮湯 治腎勞虛寒羸瘦失志傷精損髓虛吸短氣遺泄白濁小便赤黃陰下濕痒腰脊如折顏色枯悴

五加皮　丹參　石斛　杜仲　附子

牛膝　秦艽　川芎　防風　桂心

獨活　茯苓　麥門冬　地骨皮　薏苡仁

右爲剉散每服四大錢水壹盞半薑五片大麻子一撮研破同煎七分去滓食前服

六極證治

臟損虛藏主秘藏腑如會府主轉輸藏實則腑無不實臟虛則腑亦因而致虛故六極者由臟虛致腑虛陰陽失度榮衛

走本無以養筋脉皮肉骨髓故六物皆極極者窮絕之謂也
與洪範六極同意

**犀角地黃湯** 治筋實極欬而兩脇下痛不可轉動脚下滿不得遠行脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急煩滿

生地黃　犀角（鎊各一兩）　乾葛　玄參
梔子仁　升麻（各三分）　大黃（半兩）　芍藥（半兩）

右爲剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓不以時服
寒熱痛加麻黃頭疼加石膏煎半兩

**烏麻湯** 治筋虛極好悲思四肢噓吸脚手拘攣伸動縮急腹內轉痛十指甲痛數轉筋甚則舌卷卵縮唇青面色蒼白不得飲食

烏麻（十兩）　人參　防風　茯苓　細辛
秦椒（炒出汗）　黃芪　當歸　牛膝　桔梗（各半兩）
乾地黃　丹參　薯蕷　礬石（各二兩）　山茱萸
川芎（各二兩）　麻黃（去節）　白朮（各二兩半）　五加皮　生乾薑（各一兩）
大棗　鍾乳粉（各三兩小棗子五十個）

右爲剉散用清酒二斗半同浸五宿溫服三合日再服

**地黃湯** 治脉實極氣衰血焦髮落好怒唇舌赤甚則言語不快色不澤飲食不爲肌膚

麥門冬（去心）　生地黃（乾各五兩）　人參　茯苓　芍藥（各三兩）
萎蕤（四兩）　石膏（六兩）　遠志（去心十兩）　甘草（炙二兩）　白朮（二兩）

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓不以時服

**防風丸** 治脉虛極則欬欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫

防風　桂心　通草　茯苓　人參
遠志（去心）　甘草（炙）　白石英　麥門冬（去心各三分）

右爲細末蜜丸如梧子大食前酒服三十圓

**石南散** 治肉實極肌痺淫淫如鼠走津液脫腠理開汗大泄或不仁四肢急痛或復緩弱唇口壞皮膚變色

石南（去梗）　天雄（炮去皮臍）　山藥　桃仁（麩炒去皮尖）　芍藥
甘菊花　甘草（炙各一兩）　升麻　萎蕤（各一兩半）　黃芪
辰砂（別研各一分）　石膏（研）　山茱萸（各二兩）

右爲細末每服二大錢食前溫酒調下

**大黃芪湯** 治肉虛極體重怠惰四肢不欲舉關節疼痛不嗜飲食食則欬欬則右脇下痛陰陰引背及肩不可轉動

黃芪　桂心　巴戟（去心）　石斛　澤瀉
茯苓　乾薑（炮各三兩）　防風　獨活　人參（各一兩）
天雄（炮去皮臍）　芍藥　附子（炮去皮臍）　半夏（湯洗七次）　細辛（去苗）
白朮　黃芩　栝樓根（各半兩）

右爲剉散每服四錢水二盞生薑七片煎七分去滓食前服

**前胡湯** 治氣實極喘息衝胸常欲自恚心腹滿痛內外有熱煩嘔不安甚則唾血氣短乏不欲食口燥咽乾

前胡（去蘆兩）　半夏（湯洗七次）　麻黃（去節）　芍藥（各二兩）
黃芩（各一兩）　枳實（麩炒去瓤壹兩）

右剉散每服四錢水二盞生薑七片棗一个煎七分去滓不以時服

**鍾乳散** 治氣虛極皮毛焦津液不通力乏腹脹甚則喘急氣短自寒甚晝差夜甚

煉成鍾乳（別研）　乾薑（炮）　桔梗　茯苓
附子（炮去皮臍）　細辛（去苗）　桂心　人參（各壹兩壹分）
白朮（壹兩）　防風　牡蠣（煆）　栝樓根（各壹兩半）

右爲末每服二大錢溫酒調下食前

[illegible]湯 治精實極，眼視不明，齒焦髮落，形衰，通身虛熱，甚則胸中痛，煩悶泄精。

生乾地黃五兩 芍藥五兩 黃芪 茯苓

澤瀉 甘草炙 麥門冬去心，各三兩

右剉散，每服四錢，水一盞半，姜三片，淡竹葉十片，煎七分，去滓，不以時服。

磁石圓 治精虛極，尫羸，驚悸，夢中遺泄，尿後遺瀝，小便白濁，甚則陰痿，小腹裏急。

磁石煅淬 龍齒煅 蓯蓉酒浸 茯苓各二兩 人參

麥門冬去心 遠志去心 續斷 赤石脂煅

鹿茸酥炙 地黃[illegible] 韭子炒 柏子仁 丹參各一兩一分

右為末，蜜圓梧子大，食前溫酒下三十圓至五十圓。

三黃圓 治骨實極熱，耳鳴，面色焦枯，隱曲，膀胱不通，牙齒腦髓苦痛，手足酸疼，大小便閉。

黃芩[illegible] 大黃[illegible] 黃連[illegible]

右三味搗和，蜜圓豆大，每服十圓至十五圓，米飲下。

[illegible]圓 治骨虛極，面腫垢黑，脊痛不能久立，氣衰，髮落齒槁，腰背相引，痛甚則喜唾不了。方見五痿門



七氣敘論

夫五臟六腑，陰陽升降，非氣不生，神靜則寧，情動則亂，故有喜怒憂思悲恐驚，七者不同，各隨其本臟所生所傷而為病。故喜傷心，其氣散；怒傷肝，其氣擊；憂傷肺，其氣聚；思傷脾，其氣結；悲傷心胞，其氣急；恐傷腎，其氣怯；驚傷膽，其氣亂。雖七診自殊，無踰於氣。黃帝曰：余知百病生於氣也。但古論有寒熱憂恚，而無思悲恐驚，似不倫類，於理未然。六府無診，唯膽有者，蓋是奇恒淨府，非轉輸例，故能若敘驚而為病。

七氣證治

夫喜傷心者，自汗，不可疾行，不可久立，故經曰：喜則氣散。怒傷肝者，上氣不可忍，熱來盪心，短氣欲絕，不得息，故經曰：怒則氣擊（一作上）。憂傷肺者，心系急，上焦閉，榮衛不通，夜臥不安，故經曰：憂則氣聚。思傷脾者，氣留不行，積聚在中脘，不得飲食，腹脹滿，四肢怠惰，故經曰：思則氣結。悲傷心胞者，善忘，不識人，置物在處，還取不得，筋攣，四肢浮腫，故經曰：悲則氣急。恐傷腎者，上焦氣閉不行，下焦回還不散，猶豫不決，嘔逆惡心，故經曰：恐則精却。驚傷膽者，神無所歸，慮無所定，說物不竟而迫，故經曰：驚則氣亂。七者雖不同，本乎一氣。臟氣不行，鬱而生涎，隨氣積聚，堅大如塊，在心腹中，或塞咽喉，如粉絮，吐不出，嚥不下，時去時來，每發欲死，狀如神靈所作，逆害飲食，皆七氣所生所成，治之各有方。

七氣湯 治臟腑神氣不守正位，為喜怒憂思悲恐驚忤鬱不行，遂聚涎飲，結積堅牢，有如坯塊，心腹絞痛，不能飲食，時發時止，發則欲死。

半夏湯洗去滑，五兩 人參 桂心 甘草炙，各壹兩

右剉散，每服四錢，水盞半，姜七片，棗一枚，煎七分，去滓，食前服。

大七氣湯 治喜怒不節，憂思兼并，多生悲恐，或時振驚，致臟氣不平，憎寒發熱，心腹脹滿，傍衝兩脅，上塞咽喉，有如炙臠，吐嚥不下，皆七氣所生。

半夏湯洗，五兩 白茯苓四兩 厚朴薑製炒，三兩 紫蘇二兩

右剉散，每服四錢，水盞半，姜七片，煎七分，去滓，食前服。

五噎證治

夫五噎者，即氣噎、憂噎、勞噎、思噎、食噎，雖五種不同，皆以氣

爲主所謂氣噎者心悸上下不通噫噦不徹胸背痛[illegible]
遇天陰寒手足厥冷不能自温勞噎者氣上鬲脇下支滿胸
中塡塞攻背疼痛思噎者心怔悸喜忘目視䀮䀮食噎者食
無多少胸中苦寒疼痛不得喘息皆由喜怒不常憂思過度
恐虞無時欝而生涎涎與氣搏升而不降逆害飲食與五膈
同但此在咽嗌故名五噎

**五噎散** 治五種噎食飲不下胸背痛嘔噦不徹攻刺疼痛涎
與涎俱出

人參　茯苓　厚朴（去粗皮製炒）　枳殼（麸炒）
桂心　甘草（炙）　訶子（煨去核）　白朮
橘皮　白薑（炮）　三稜（炮）　神麯（炒）
麥蘗（炒）　木香（炮）　檳榔　蓬朮（煨各半兩）

右爲末每服貳錢水壹盞生薑三片棗子一枚煎七分
空心溫服鹽湯點亦得

**[illegible]** 治五噎五膈胸中久寒諸氣結聚嘔逆噎塞食飲不
化結氣不消常服寬氣通噎寬中進食

白朮　茯苓（各一兩）　木通　當歸　橘皮
青皮　大腹子　大腹皮　檳榔　芍藥（各[illegible]）
甘草（炙[illegible]）　白芷（[illegible]）　紫蘇葉（[illegible]）　枳殼（去瓤麸炒[illegible]）

右爲末每服貳錢水壹盞薑三片棗一枚煎七分空腹
溫服

**嘉禾散** 治中滿下虛五噎五膈脾胃不和胸膈痞悶脇肋脹
滿心腹刺痛不思飲食如中焦虛痞不任攻擊臟腑虛寒
不受峻補或因病氣衰不復常稟受怯弱不能多食尤宜
服之

枇杷葉（[illegible]）　薏苡仁（炒）　縮砂仁　人參　茯苓（各壹兩）

石斛（[illegible]）　大腹子（[illegible]）　沉香　木香　藿香
杜仲（[illegible]）　[illegible]　白豆蔻
五味子（炒）　桑白皮　丁香　檳榔　青皮（[illegible]）
半夏（[illegible]）　神麯（炒）　甘草（炙）　陳皮　白朮（[illegible]）

右爲末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分
溫服不計時五噎入乾柿一枚同煎若服見五膈氣吐
逆痰入薤白三寸棗五枚同煎

**[illegible]** 治五噎八味
碯砂（[illegible]）　[illegible]
丁香　橘紅　木香　蓽撥　胡椒

右等分爲末用[illegible]爲丸如梧子大先嚼[illegible]鹽少許令生
津液[illegible]漸加至二三五圓臨卧服

[illegible]五行記[illegible]有僧[illegible]則病噎不能食語弟子曰吾死之
後便可開吾胸喉視有何物言絕而卒弟子果開視胸中得
一物形似魚而有兩頭遍身皆肉鱗弟子置器中跳躍不已
戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作澱有一僧以澱置器中
此虫遶器中走須臾化爲水此乃生蟲非五噎比後人因
以藍治噎驗矣

## 五膈證治

病有五膈者胸中氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣名憂
膈中脘實滿噫則醋心飲食不消大便不利名曰思膈胸脇
逆滿咽塞不通嘔則筋急惡聞食臭名曰怒膈五心煩熱口
舌生瘡四肢沈重身常發熱胸背引痛不能多食名曰喜膈
心腹脹滿咳嗽氣逆腹下苦冷雷鳴遶臍痛不能食名曰恐
膈此皆五情失度動氣傷神致陰陽不和結於胸膈之間病
在膈中之下故名五膈若在咽嗌即名五噎治之五病同法

[五膈圓]治憂恚思慮膈塞不通及食冷物即發其病苦心痛不得氣息引背痛如刺心下堅大如拳痺痛欲吐吐即差食飲不下甚者手足冷短氣或上氣喘急嘔逆主之

麥門冬去心 甘草炙各五兩 人參四兩 川椒炒出汗 遠志去心

細辛去苗 桂心各三兩 乾薑炮二兩 附子炮去皮臍一兩

右為末蜜圓彈子大含化日三夜二胸中當熱七日愈亦可丸如梧子大米湯下二三十圓延年方更加麥門冬甘草人參各一兩經心錄以吳茱萸代桂治遇寒冷則心痛咽中有物吐不出嚥不入食飲減少並可服之不拘時候

[□□圓]治氣不升降胸膈結痞

木香 京三稜炮 青皮各半兩 半夏湯洗七次各一兩

大腹子壹分

右為細末薑汁糊為丸梧子大食後米湯下二三十圓

[五膈寬中散][沉香散]並治五膈 方見前五噎門

三因極一病證方論卷之八

三因極一病證方論卷第九

胸痺證治

病者心下堅痞痛緩急肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其胸前皮皆痛手不得犯胸中愊愊而滿短氣咳唾引痛咽塞不利習習如癢喉中乾燥時欲吐嘔煩悶白汗時出痛引徹背不治則數日殺人病名胸痺由下虛極氣上控膈使然其脉陽微陰結

[栝蔞圓]治胸痺胸中痛徹背氣塞喘息咳唾心腹痞悶

栝蔞去殼取子炒香別研 枳殼去穰麩炒

右二味為細末先取栝蔞瓤研末水熬成膏和二物末為丸如梧子大熟水下二十五圓日二食後服

[橘皮生薑湯]治胸痺胸中愊愊如滿噎塞習習如癢喉中澀燥唾沫

橘皮壹斤 枳實麩炒去瓤 生薑半兩

右為剉散分三服水貳盞煎七分為一服去滓食前

[梔子湯]治胸痺切痛方

梔子 附子炮去皮臍

右為剉散每服三錢水一大盞薤白三寸同煎至五分食前溫服

健忘證治

脾主意與思意者記所往事思則兼心之所為也故論云言心未必是思言思則必是心兼外人議思心同時理甚明也今脾受病則意舍不清心神不寧使人健忘盡心力思量不來者是也或曰常常喜忘故謂之健忘二者通治

[小定志圓]治心氣不定五臟不足甚者憂憂愁愁不樂忽忽喜忘朝差暮劇暮差朝發及因事有所大驚夢寐不祥登

高涉險致神苑不安驚悸恐怯

菖蒲炒　遠志去心姜汁淹各一兩　茯苓
茯神　人參各五錢　辰砂為衣

右為末蜜圓如梧子大每服五十圓米湯下一方去茯神名開心散飲服二錢匕不以時

**菖蒲益智圓** 治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳目

菖蒲炒　遠志去心姜汁淹炒　人參　桔梗炒
牛膝酒浸各一兩一分　桂心去皮三分　茯苓一兩三分　附子炮去皮臍二兩

右末蜜圓如梧子大每服三十圓溫酒米湯下食前服

## 虛煩證治

虛煩者方論中所謂心虛煩悶是也大抵陰虛生內熱陽盛生外熱外熱曰燥內熱曰煩此不分而分也傷寒大病不復常霍乱吐瀉之後皆使人心虛煩悶婦人產蓐多有此病其證內煩身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥不渴清清不寐皆虛煩也方例有虛煩近傷寒之說不可不辨又平人自汗小便頻併遺泄白濁皆憂煩過度之所致傷寒屬外因憂煩屬內因霍乱兼不內外因李者當辨析而調治

**淡竹茹湯** 治心虛煩悶頭疼短氣內熱不解心中悶乱及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬去心　小麥各二兩半　甘草炙一兩　人參
白茯苓各一兩半　半夏湯洗七次二兩

右為剉散每服四大錢水二盞姜七片棗三枚淡竹茹一塊如指大煎七分去滓食前服虛勞煩悶尤宜服之

**溫膽湯** 治大病後虛煩不得眠此膽寒故也此藥主之又治驚悸

半夏湯洗七次　竹茹　枳實麩炒去穰各二兩　陳皮去白三兩

廿一

甘草炙一兩　茯苓一兩半

右為剉散每服四大錢水一盞半姜五片棗一枚煎七分去滓食前服

**酸棗仁湯** 治霍乱吐下增劇虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠或發寒熱頭疼暈悶

酸棗仁炒二兩　人參　桂心各一分　知母
茯苓各一兩　石膏煅半兩　甘草炙二錢

右剉散每服四錢水一盞半姜三片棗一枚煎七分去滓食前服

## 五痿敘論

夫人身之有皮毛血脈筋膜肌肉骨髓以成形內則有肝心脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒不節勞佚兼并致內藏精血虛耗榮衛失度發為寒熱使皮血筋骨肌肉痿弱無力以運動故致痿躄狀與柔風腳弱皆相類以脈證并所因別之不可混濫柔風腳氣皆外所因痿躄則屬內臟氣不足之所為也審之

## 五痿證例

病者肺熱皮虛弱急薄著則生痿躄其色白而毛敗名曰皮痿由肺熱葉焦使然也肺為五臟長有所失亡所求不得則發肺鳴肺鳴則肺熱葉焦論曰五藏因肺熱葉焦發為痿躄

病者心下熱脈厥樞紐如折去而不相提挈脛筋縱緩不能任其地其色赤而絡脈溢名曰脈痿由悲哀太甚陽氣內動數溲血故本病論曰大經空虛發為肌痺傳為脈痿

病者肝熱口苦筋膜乾筋急而攣其色蒼而爪枯名曰筋痿由思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱及為白淫故下經曰筋痿者生於肝使內也

十二

痿者脾熱胃乾而渴肌肉不仁其色黃而肉蠕動名曰肉痿由漸於濕地以水為事居處下濕濡漬痺而不仁故下經曰肉痿者得之濕地也

病者腎熱腰脊不舉骨枯而髓減其色黑而齒槁名曰骨痿因有所遠行勞倦遇大熱而渴陽氣內伐熱舍於腎致水不勝火則骨枯而髓虛故下經曰骨痿者生於大熱也

## 五痿治法

諸治痿法當養陽明與衝脈陽明主胃乃五臟六腑之海主潤宗筋束骨以利機關衝脈者諸經絡之海主滲灌谿谷與陽明合養於宗筋會於氣街屬於帶脈絡於督脈故陽明虛則宗筋縱帶脈不引故足痿不用也治之各補其榮而通其俞調其虛實和其逆順筋脈骨肉各得其旺時病乃已矣

**加減四斤圓** 治腎經虛熱淫於內致筋骨痿弱不自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虛不足

肉蓯蓉酒浸　牛膝酒浸　天麻　木瓜乾
鹿茸燎去毛切酥炙　熟地黃　兔絲子酒浸通軟別研細　五味子酒浸　各等分

右為末蜜丸如梧子大每服五十圓溫酒米湯食前下

**一法** 不用五味子有杜仲

**煨腎圓** 治五痿及痿弱毛瘁血脈枯槁肌肉薄着筋骨羸弱飲食不美痿厥事不與四肢無力爪枯髮落眼昏唇燥疲憊不能支持

鹿角膠煉成者二斤酒浸一宿　熟地黃焙八兩　大附子生去皮臍四兩半

右用大麥米二升以一半藉底一半在上以二布巾隔覆炊一日取出藥與麥別焙乾為末以浸藥酒添清酒煮麥粉為糊搜和得所杵三千下圓如梧子大每服五十圓溫酒米湯任下食前服

王啓玄傳玄珠先生耘苗丹三方序曰張長沙戒人妄服燥烈之藥謂藥勢偏有所助勝尅流變則真病生焉猶揠苗不長而揠之者也若稟氣受血不強合服此而不服反忽略之是不耘苗者也

**上丹** 養五臟補不足秘固真元均調二氣和暢榮衛保神守中久服輕身耐老健力能食明目降心火交腎水益精氣男子絕陽庶事不堪女子絕陰乃不能姙腰膝重痛筋骨衰敗面色黧黑心勞志昏寤寐恍惚煩憤多倦餘瀝夢遺膀胱邪熱五勞七傷肌肉羸瘁上熱下冷難任補藥服之半月陰陽自和容色肌肉光潤悅澤開心意安魂魄消飲食養胃氣

五味子半斤　百部酒浸一宿焙　兔絲子酒浸別研　肉蓯蓉酒浸
杜仲炒斷絲　巴戟去心　遠志去心　枸杞子
防風去叉　白茯苓　蛇床子炒　山藥　柏子仁別研　各二兩

右為末蜜丸梧子大食前溫酒鹽湯任下三十圓春煎乾棗湯夏加五味子四兩四季月加蓯蓉六兩秋加枸杞子六兩冬加遠志六兩食後兼服衛生湯

**衛生湯** 補虛勞強五臟除煩養真退邪熱順血脈緩中安和神志潤澤容色常服通暢血脈不生癰瘍養胃益津

當歸　白芍藥各四兩　黃芪八兩　甘草炙一兩

右為剉散每服四錢水盞半煎七分去滓不以時年老加酒半盞煎

**中丹** 補百損體劣少氣善驚昏憒上焦客熱中脘冷痰不能多食心腹弦滿脾胃氣衰精血妄行容色枯悴

黃芪　白芍藥　當歸各四兩　白茯苓　人參

桂心各二兩 川椒去目炒出汗 大附子炮去皮臍 黃芩各半兩

右為末，粟米飲搜和得所，搗千杵，圓如梧子大，酒飲任下三五十圓，食前服。

**小丹** 補勞益血，去風冷百病，諸虛不足，老人精枯神耗，女子絕傷斷緒。久服益壽延年，安寧神志魂魄，流滋氣血脈絡，開益智慧，釋散風濕，耳目聰明，筋力強壯，肌膚悅澤，氣宇泰定。

熟地黃 肉蓯蓉酒浸各六兩 五味子 菟絲子酒浸各五兩
柏子仁別研 天門冬去心 蛇床子炒 覆盆子
巴戟去心 石斛各三兩 續斷 澤瀉
人參 山藥 遠志去心炒焦 山茱萸
菖蒲 桂心 白茯苓 杜仲剉炒絲斷各二兩
天雄炮去皮 煉成鍾乳粉

右為末，蜜丸如梧子大，食前酒服三十圓至五十圓。忌五辛、生葱、莧菜、餳、餹。虛人多起，去鍾乳，倍地黃；多忘，倍遠志、茯苓；少氣神虛，倍覆盆子；欲光澤，倍柏子仁；風虛，倍天雄；虛寒，倍桂心；小便赤濁，三倍茯苓，一倍澤瀉；吐逆，倍人參。

**芎桂散** 治四肢疼痛軟弱，行履不便。方見中風門

**加減養胃湯** 治胃虛不食，四肢痿弱，行立不能，皆由陽明虛，宗筋無所養，遂成痿躄。

藿香 白术 白茯苓 神麴炒
烏藥去木 縮砂仁 薏苡仁炒 半夏麴
人參各半兩 蓽澄茄 甘草炙各三錢半

右為麁末，每服四錢，水一盞半，生薑五片，棗二枚，同煎七分，去滓，不以時服。

## 失血敘論

夫血猶水也，水由地中行，百川皆理，則無壅決之虞。血之周流于人身榮經府俞，外不為四氣所傷，內不為七情所鬱，自然順適。万一微爽節宣，必至壅閉，故血不得循經流注，榮養百脈，或泣或散，或下而亡反，或逆而上溢，乃有吐衄便利汗痰諸證生焉。十種走失，無重於斯，隨證別之，乃可施治。

### 外因衄血證治

病者因傷風寒暑濕，流傳經絡，陰陽相勝，故血得寒則凝泣，得熱則淖溢，各隨臟腑經絡湧泄于清氣道中，衄出一升一斗者，皆外所因，治之各有方。

**桂枝栝樓湯** 治傷風汗下不解，鬱于經絡，隨氣湧泄，衄出清血，或清氣道閉，流入胃管，吐出清血，遇寒泣之，色必黯黑者。

桂心 白芍藥 栝樓根 甘草炙 川芎各等分

右為剉散，每服四大錢，水一盞半，薑三片，棗一枚，煎至七分，去滓服。頭痛加石膏。

**麻黃升麻湯** 治傷寒發熱，解利不行，血隨氣壅，世謂紅汗者是也。

麻黃去節湯浸焙秤二兩半 升麻壹兩 黃芩 芍藥
甘草生 石膏煅 茯苓各壹兩

右剉散，每服四大錢，水一盞半，薑三片，煎七分，去滓熱服，微汗解。

**五苓散** 治伏暑飲熱，暑氣流入經絡，壅溢發衄，或胃氣虛，血滲入胃，停留不散，吐出一二升許。方見傷暑門

**茯苓補心湯** 治胃雨着濕，鬱于經絡，血溢作衄，或脾不和，濕着經絡，血流入胃，胃滿吐血。

茯苓　乾薑炮各肆錢　甘草炙　白朮各貳錢
右爲剉散每服四錢水一大盞煎六分去滓服頭疼加
川芎一錢最止浴室中發衄
內因衄血證治
病者積怒傷肝積憂傷肺煩思傷脾失志傷腎暴喜傷心皆
能動血蓄聚不已停留胸間隨氣上溢入清氣道中發爲鼻
衄名五臟衄
止衄散 治氣鬱發衄无比神方
黃芪陸錢　赤茯苓　白芍藥各叁錢　當歸
生乾地黃　阿膠炙各叁錢
右爲細末煎黃芪湯調下二錢匕未知再作
不內外因證治
病者飲酒過多及啖炙煿五辛熱食動於血血隨氣溢發爲
鼻衄名酒食衄或墮車馬打撲傷損致血淖溢發爲鼻衄名
折傷衄
[illegible] 治飲酒過多及啖炙煿熱食動血發爲鼻衄
人參　白朮　甘草炙　乾薑炮
乾葛　川芎各等分
右爲剉散每服四錢水一盞煎七分去滓溫服
花蕊石散 治一切金瘡打撲傷損猘犬咬傷也於傷処摻藥
或內損血入臟腑煿溢作衄及婦人產後敗血不散
花蕊石壹斤研細　上色硫黃肆兩研細
右二味拌勻入瓦罐中以紙筋搗黃泥固濟候乾焙令
熱透以磚稭用白炭一秤頂上發火燒灰盡候冷取出
再研極細諸臟傷及婦人產後瘀血不行並用童子小
便溫酒調一二錢匕取瘀血即效

[illegible]散 治鼻衄立効
白及不拘多少
右爲末冷水調用紙花貼鼻竅中 一方用黃膠湯令軟
貼鼻竅中
三因吐血證治
病者諸血積聚合發爲衄而清氣道閉濁道涌溢凝停胸胃
中因即滿悶吐出數斗至于一石者名曰內衄或因四氣傷
于外七情動于內及飲食房勞墜墮傷損致瘀血留聚胸間
滿則吐溢世謂妄行
[illegible]丸 治傷風吐血 [illegible]丸 治傷暑吐血 [illegible]湯 治傷
濕吐血　三方並見外因衄血證內
[illegible]丸 治三因吐血及衄血下血一切血溢妄行
葉子雌黃 不以多少
右一味爲細末入棗肉內線繫定用湯煮用黑錫封
雌黃斤兩鎔作汁傾入湯煮一日添湯候冷取出雌黃
洗淨乾研爲細末却以煮藥棗肉和丸如梧子大每服
五七圓用黑錫煎湯下
傷胃吐血證治
病者因飲食過度傷胃或胃虛不能消化致翻嘔吐逆物与
氣上衝蹙胃口決裂所傷吐出其色鮮紅心腹絞痛白汗自
流名曰傷胃吐血
理中湯 能止傷胃吐血者以其功最理中脘分利陰陽安定
血脉方說廣如局方但不出吐血證學者當自知之
人參　白朮　甘草炙　白薑炮各等分
右爲剉散每服四錢水一盞煎七分去滓不以時服或
只煮乾薑甘草湯飲之亦妙方見養生必用

臟衄吐血證治

病者因飲啖辛熱三燥傷肺血得熱則溢因作嘔吐出血一合或半升許名曰肺疽傷於腑則爲胃傷於臟則屬肺右以此分不可不究

**二灰散** 治肺疽吐血并妄行

紅棗和核燒存性　百藥煎煅各等分

右爲細末每服二錢米湯調下

折傷吐血證治

病者因墜閃肭致傷五臟損裂出血停留中脘臟熱則吐鮮血臟寒則吐瘀血如豆羹汁此名內傷治之各有方

**加味芎藭湯** 治打撲傷損敗血流入胃脘嘔吐黑血或如豆羹汁

川芎　當歸　白芍藥　百合水浸半日　荊芥穗各等分

右爲剉散每服四錢水一盞酒半盞同煎七分去滓不以時服

折傷瘀血證治

病者有所墜墮惡血留內或因大怒肝血并濕停蓄不散兩脇疼痛脚善瘈骨節時腫氣上不下皆由瘀血在內治之各有方

**雞鳴散** 治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕欲死并久積瘀血煩躁疼痛叫呼不得并以此藥利去瘀血即愈此藥推陳致新治折傷神效

大黃酒蒸一兩　杏仁三七粒去皮尖

右研細酒一碗煎至六分雞鳴時服次日取下瘀血即愈若便覺氣絕不能言取藥不及急擘口開以熱小便灌之

病餘瘀血證治

病者或因發汗不徹及吐衄不盡瘀蓄在內使人面黃脣白大便黑脚弱氣喘甚則狂悶皆瘀血所致治之各有方

**犀角地黃湯** 治傷寒及溫病應發汗而不汗內蓄爲瘀血及鼻衄吐血不盡餘血停留致面黃大便黑

犀角壹兩　生地黃捌兩　芍藥叁兩　牡丹皮貳兩

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言滿爲无熱但依方不須加也

汗血證治

病者汗出正赤污衣名曰汗血皆由大喜傷心喜則氣散血隨氣行婦人產蓐多有此證

**葎草汁** 治產婦大喜汗出污衣赤色及膏淋尿血

葎草不拘多少

右搗取汁一升醋二合和空腹飲一盃或濃煮汁飲亦治淋瀝尿血

便血證治

病者大便下血或清或濁或鮮或黑或在便前或在便後或與泄物并下此由內外有所感傷凝停在胃隨氣下通亦妄行之類故曰便血

**伏龍肝湯** 治先便後血謂之遠血兼治吐衄

伏龍肝半斤　甘草炙　白朮　阿膠　乾地黃　黃芩各叁兩

右爲剉散每服五錢水一盞煎七分去滓空腹溫服

一法有附子叁兩炮入

**赤小豆湯** 治先血而後便謂之近血

赤小豆（伍兩浸令芽出曬乾）當歸（壹兩）

右為末漿水服方寸匕日三四服

風痢下血證治

病者因風停於膚腠乘虛入腸胃風動血故便清血或下瘀血注下無度名曰風利古方以此為蠱痢非也

**胃風湯**治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度

人參　白茯苓　芎藭　桂心

當歸　白芍藥　白朮

右等分為剉散每服四錢水一盞半入粟米百餘粒同煎七分去滓空心稍熱服

料簡

夫便血有腸痔蠱毒熱痢酒痢血枯肺痿等別有門類其如風痢亦當在痢門以純下清血故附于此不可不知

尿血證治

病者小便出血多因心腎氣結所致或因忿怒房室過度此乃得之處寒故養生云不可專以血得熱為淖溢為說二者皆致尿血與淋不同以其不痛故屬尿血痛則當在血淋門

**髮灰散**治小便尿血或先尿而後血或先血而後尿亦遠近之謂也

髮灰（本草云能消瘀血通關格利水道破癥瘕癰腫 [illegible]）

右一味每用二錢以米醋二合湯少許調服井花水調亦得兼治肺疽心衄內崩吐血一兩口或舌上血出如針孔若鼻衄吹內立已（一法）搜攪燒灰米飲調下大治大小便下血（又一法）同葵子等分為末飲服二錢治轉胞尤妙

**玉屑散**治尿血并五淋砂石疼痛不可忍受者

黃芪　人參（各等分）

右為末用蘿蔔大者切一指厚三指大四五片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸盡蜜二兩為度勿令焦炙熟點黃芪人參末吃不以時仍以鹽湯送下

癥瘕證治

癥瘕積聚隨氣血以分門故方云以癥瘕屬肝部積聚屬肺部不亦明矣況七者火數屬心蓋血生於心八者木數屬肝蓋血歸於肝雖曰強分理似不混夫癥者堅也堅則難破瘕者假也假物成形然七癥八瘕之名經論亦不詳出雖有蛟龍蛇鱉肉髮蝨米等七證初非定名偶因食物相感而致患耳若婦人七癥八瘕則由內外不內外因動傷五臟氣血而成古人將婦人病為痼疾以蛟龍等為生瘕然亦不必如此執況婦人癥瘕並屬血病龍蛇魚鱉等事皆出偶然但飲食間誤中之留聚腹臟假血而成自有活性亦猶永徽中僧病噎者腹有一物其狀如魚即生瘕也與夫宿血停凝結為所埋雖內外所感之不同治法當以類相從所謂醫者意也如以敗梳治蝨瘕銅屑治龍瘕麴蘖治米瘕石灰治髮瘕如此等類方論至多不復繁引學者可以理解

**大硝石圓**治七癥八瘕聚結痞塊及婦人帶下絕產并欲服丹藥腹中有癥瘕者當先下之此藥但去癥瘕不令人困

消石（陸兩）　大黃（捌兩）　人參　甘草（各叁兩）

右為末以三年苦酒三升置銅器中以竹作準每一升作一刻拄器中先內大黃常攪不息使微沸盡一刻乃內餘藥又盡一刻極微火熬使可丸則圓如雞子中黃若不能服大圓則作小圓如梧子大米湯下三十圓四

日一服婦人服之或下如雞肝或如米泔正赤黑等三
二升下後忌風冷自養如産婦

**小三稜煎圓** 治食癥酒癖血瘕氣塊時發刺痛全不思食及積
滯不消心腹堅脹痰逆嘔噦噫酢吞酸脇肋刺痛胸膈痞
悶幷脾氣橫泄

京三稜　蓬莪术各四兩　芫花壹兩去
右同入瓷器中用米醋伍升浸滿封器口以灰火煨令
乾取出稜术將芫花以餘醋炒令微焦焙乾爲末醋糊
丸如菉豆大每服十五圓生姜湯下婦人血分男子脾
氣橫泄腫滿如水用桑白皮煎湯下

**三聖圓** 治積年癥瘕癖塊諸藥療理不差至効

舶上硫黃壹兩　水銀壹兩　硇砂去砂石
右參物乳缽內衮研如粉却以生鐵銚內用文武火熬
鎔成汁以火筋攪令勻停冷刀刻下以瓷器盛置地坑內
埋一宿取出再研細次以
赤芍藥　當歸　荊三稜　蓬莪术　紅花各壹分
並細剉以法酒壹升煎及一半濾出磁盆內研生布裂
汁再熬成膏入飛羅麪爲糊搜圓如菉豆大治因産後
傷於飲食結伏在腹脇時發疼痛不可忍者當歸浸酒
壹升逐旋取酒煖下七圓至十圓每服壓癖塊空心溫
酒下參圓至伍圓所是藥併裂了以乾爲末別入
乾地黃兩　真蒲黃　芫花
右爲末以前一般糊圓如菉豆大治女人血臟冷氣攻
心疼及一切血疾溫酒下拾圓

**萬病七圓** 治臟腑宿癥風冷氣血不和停飲宿飲結爲癥瘕
坯塊及婦人血瘕腸胃中塞飲食不下欬逆脹滿及下痢
赤白霍亂轉筋及踠躄攣急腰脚疼痛行步不能常
服建脾暖胃堅骨強陽

神麴　大附子　甘草
右末蜜丸每左手壹握分作七圓每服一圓細嚼米飲下

治諸臟氣虛積聚煩悶及飲食中蠱毒或食水陸菓
瓜子卵入腹而成蟲蛇魚鼈或宿食留飲婦人産後敗血
不消女子月水不通結爲癥瘕時發寒熱唇口焦黑肢體
瘦削嗜臥多驚食少腹痛大便糟粕変成冷痢

附子
蓽撥　木香　青皮　破故紙
右爲末麪糊搜丸如梧子大每服三十圓生姜橘皮湯
下曲利米湯下加至五十圓

## 癲癇叙論

夫癲癇病皆由驚動使臟氣不平鬱而生涎閉塞諸經厥而乃成或在母胎中受驚或少小感風寒暑濕或飲食不節逆於臟氣詳而推之三因備具風寒暑濕得之外驚恐震懾得之內飲食飢飽屬不內外三因不同忤氣則一傳变五臟散及六腑溢諸經絡脉但一臟不平諸經皆閉隨其臟氣證候殊分所謂象六畜分五聲氣色脉證各隨本臟所感所成而生諸證古方有三癎五臟癎六畜癎乃至一百二十種癎以其禀賦不同臟腑強弱性理躁靜故諸證蜂起推其所因無越三條病由都盡矣

## 癲癇證治

病者旋暈顛倒吐涎沫搐搦腰背強作馬嘶鳴多因挾熱蓄涎心動臟腑涎涎入心之所致也名曰馬癎以馬屬在午手少陰君火主之故其病生手心經病者暈眩四肢煩疼恍惚

搐倒掣縱吐沫作羊叫聲多因少小臟腑未愈數洗浴濕冀脾經之所致也名曰羊癇以羊屬未坤位足太陰濕土主之故其病生于脾經病者昏暈攧倒兩手頻伸叫作雞聲須臾即醒醒後復發多因少小燥氣傷胃煩毒內作鬱涎入胃之所致也名曰雞癇以雞屬酉足陽明燥金主之故其病生于胃經病者眩暈攧倒眼目相引牽縱急强作猪叫鳴吐涎沫食頃方已多因少小吐利挾風之所致也名曰猪癇以猪屬亥手厥陰心胞風木主之故其病生于右腎經病者眩暈攧倒目反口噤瘛瘲吐沫作牛吼聲多因少小濕熱傷肺涎留肺系遇燥熱則發動名曰牛癇以牛屬丑手太陰濕土主之故其病生于肺經

**六珍丹** 治風癇失性攧倒欲死或作牛吼馬嘶雞鳴羊叫猪嘷等聲腑臟相引氣爭掣縱吐沫流涎久而方甦

通明雄黃 葉子雌黃 末鐵 眞珠各壹兩

鉛貳兩熬 丹砂半兩 水銀壹兩半

右研令極勻蜜丸如梧子大每服叁圓至五圓薑棗湯下須搗二三萬杵乃可圓

**[illegible]丹** 治五癇百種無問陰陽冷熱

鍋丹 晉礬各壹兩

右用塼鑿一窠可容貳兩許先安丹在下次安礬在上以白炭五斤煅令炭尽取出細研以不經水猪心血爲圓如菉豆大每服十圓至二十圓橘皮湯下

**大鎮心丹** 治一百二十種癲癇驚狂譫妄攧倒昏不知人噴吐涎沫及治心驚膽寒情清不睡或左脇偏疼

辰砂用黃松節酒煑 龍齒用遠志苗醋煑

右只取辰砂龍齒各等分爲末猪心血爲丸如雞頭大每服壹圓以麥門冬葉薑豆燈心生薑白蜜水煎豆熟爲度臨臥嚥下小兒磨化半圓量歲數與之

**蛇黃丸** 治五臟六腑諸風癲癇掣縱吐涎沫不識人及小兒急慢驚風

蛇含煆紅以米醋淬 天南星炮 白附子

辰砂別研 麝香各壹兩

右爲末糯米糊丸如梧子大每服溫湯磨化壹圓量大小與服大人嚼細三五圓溫酒米湯任下

凡例

夫五癇合屬五臟而無腎有胃者以腎屬鼠非畜養物神無主治故不作癇胃屬雞係六畜物故有象兼胃爲五臟海非餘府比又犬屬戌手少陽小腸經主之雖屬六畜初無犬癇者以辰戌爲魁罡四殺沒處不與癇象古方類例未之究也學者宜知之

狂證論

夫三陽并三陰則陽虛而陰實故癲三陰併三陽則陰虛而陽實故狂論曰陽入陰其病靜陰入陽其病怒怒則狂矣病者發狂不食棄衣奔走或自稱神聖登高笑歌踰墻上屋所至之處非人所能罵詈妄言不避親屬病名狂多因陽氣暴折畜怒不決之所致故經曰陽明常動太陽少陽不動不動而動爲大疾此其候也

**鎮心丹** 治心氣不足病苦驚悸自汗心煩悶短氣喜怒悲憂悉不自知亡魂失魄狀若神靈所憑及治男子遺泄女子帶下

光明辰砂研 白礬煆汁盡各等分

右爲末水丸如雞頭大每服壹圓煎人參湯下食後服

[illegible] 治憂愁思慮過多，致神志不寧，魂魄失守，虛陽外泄，則自汗，嘔吐，溺利頻數，諸陰不生，則語言重複，忪悸眩暈，兼治大病後虛煩不得眠，羸瘦困乏，及婦人胎前產後，悉能主之。常服安心神，調血脈，鎮驚補虛。

黃芪（蜜炙） 茯神 人參 酸棗仁（炒） 熟地黃（各一兩） 遠志（去心，炒） 五味子 柏子仁（別研，各半兩）

右為末，蜜丸如梧子大，用辰砂為衣，每服三十圓，米湯溫酒任下。盜汗不止，麥麩湯下；亂夢失精，人參龍骨湯下；卒暴心痛，乳香湯下；肌熱虛煩，麥門冬湯下；吐血，人參卷柏湯下；大便下血，當歸地榆湯下；小便尿血，赤茯苓湯下；中風不語，薄荷牛黃湯下；風癇涎潮，防風湯下。

[illegible] 亦治狂，方見癲癇門。

凡傷寒陽毒及蓄熱血，皆發狂，各見本門。

## 九痛敘論

夫心痛者，在方論則曰九痛，內經則曰舉痛，一曰卒痛，種種不同。以其痛在中脘，故總而言之曰心痛，其實非心痛也。若真心痛，則手足青至節，若甚，旦發夕死，夕發旦死，不在治療之數。方中所載者，乃心主包絡經也。若十二經絡外感六淫，則其氣閉塞，鬱於中焦，氣與邪爭，發為疼痛，屬外所因；若五臟內動，汨以七情，則其氣痞結聚於中脘，氣與血搏，發為疼痛，屬內所因；飲食勞逸，觸忤非類，使臟氣不平，痞隔於中，食飲遁疰，變亂腸胃，發為疼痛，屬不內外因。治之當詳分三因，通中解散，破積潰堅，隨其所因，無使混濫，依經具錄諸證，以備治法云爾。

## 外所因心痛證治

足厥陰心痛，兩脇急，引小腹連陰股相引痛；手心主心痛，微背心煩，掌中熱，咽乾，目黃赤，脇滿；足太陰心痛，腹脹滿，澀澀然大便不利，鬲閉咽塞；手太陰心痛，短氣不足以息，季脇空痛，遺失無度，胸滿煩心；足少陰心痛，煩劇，面黑，心懸若飢，胸滿，腰脊痛；背輸諸經心痛，心與背相引，心痛徹背，背痛徹心；諸腑心痛，難以俛仰，小腹上衝，卒不知人，嘔吐泄瀉。此皆諸經諸俞諸腑涉邪所致，病屬外所因。

## 內所因心痛證治

肝心痛者，色蒼蒼如死灰狀，終日不得太息；真心痛者，手足青至節，旦發夕死，夕發旦死；脾心痛者，如針錐刺其心腹，蘊蘊然氣滿；肺心痛者，若從心間起，動作痛益甚，色不變；腎心痛者，與背相引，善瘈，如物從後觸其心，身傴僂；胃心痛者，腹脹滿，不下食，食則不消。皆臟氣不平，喜怒憂鬱所致，屬內因。

## 不內外因心痛證

久積心腹痛者，以飲啖生冷果實，中寒不能消散，結而為積，甚則數日不能食，便出乾血，吐利不定，皆由積物客於腸胃之間，遇食還發，名積心痛；及其臟寒生蚘，致心痛者，心腹中痛，發作腫聚，往來上下，痛有休止，腹熱涎出，病屬不內外因。方論中所謂九種心痛，曰飲，曰食，曰風，曰冷，曰熱，曰悸，曰蟲，曰注，曰去來痛者，除風熱冷屬外所因，餘皆屬不內外。更有婦人惡血入心脾經，發作疼痛，尤甚於諸痛；更有卒中客忤，鬼擊尸疰，使人心痛，亦屬不內外因。

## 三因心痛總治

[illegible] 治心腹疼痛，或吐或泄，狀如霍亂，及療冒涉濕寒，賊風入腹，拘急切痛。

附子（[illegible]）

桂心 芍藥（各三分） 甘草（[illegible]）

右為剉散每服四大錢水壹盞姜五片棗二枚煎七分
去滓食前大便秘結入白蜜半匙同煎

**麻黄桂枝湯** 治外因心痛惡寒發熱內攻五臟拘急不得轉側

麻黄(去節湯泡) 桂心 白芍藥 細辛(去苗)
乾薑(炮) 甘草(炙各半分) 半夏(湯洗七次) 香附(炒去毛各半兩)

右為剉散每服四大錢水盞半姜五片煎七分去滓食
前服大便秘入大黄如博棊大兩枚煎

**加味小建中湯** 治心腹切痛不可忍按輕却痛按重則愈皆
虛寒證服熱藥并針灸不差此藥主之

桂心(三分) 甘草(炙半兩) 白芍藥(壹兩) 遠志(去心半兩)

右為剉散每服四大錢水壹盞半姜五片棗一枚煎七
分去滓入餳糖一塊如皂莢子大煎令鎔食前溫服

**[illegible]散** 治心腹[illegible]痛安胃進食調冷熱定泄瀉老少通用

丁香(壹[illegible]) 甘草(半兩) 高良薑(壹兩) 白芍藥(貳兩)

右為細末每服二錢匕陳米飲調下空心食前服王序
玄子序云初余為禁隊因此證慰與御醫使令施用後
至富貴乃由此始

**訶子散** 治心脾冷痛不可忍一服見效及老幼霍亂吐瀉其
効如神

訶子(炮去核) 甘草(炙) 厚朴(姜汁製) 乾薑(炮) 草菓(去皮)
陳皮 良薑(炒) 茯苓 神麯(炒) 麥蘗(炒各等分)

右為末每服二錢候發刺不可忍時用水壹盞煎七分
入鹽服如速則鹽點

**九痛圓** 治九種心痛虫痛疰痛風痛悸痛食痛飲痛冷痛熱
痛往來痛兼治卒中惡腹脹痛口不能言又治連年積冷
流在心胷并令腰痛上氣落馬墮車瘀血等疾

附子(炮去皮臍) 狼毒(炙香) 巴豆(去皮心膜炒研[illegible])
人參 乾薑(炮) 吳茱萸(湯洗炒各[illegible])

右為末煉蜜丸如梧子大每服空腹溫酒下三圓卒中
惡心痛不能言服三圓

**蘇合香圓** 治傳尸骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐
利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴利瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼
忤中人小兒吐乳大人狐狸等病方

蘇合香油(入安息香膏內) 薰陸香(別研) 龍腦(研各壹兩) 白朮
丁香 朱砂(研水飛) 青木香 白檀香
沉香 烏犀(鎊屑) 安息香(別為末用無灰酒熬膏) 蓽撥(各貳兩)
香附子(去毛) 訶子(煨去核) 麝香

右為末用安息香膏同煉蜜旋丸如梧子大早朝井
花水溫冷任意化下肆圓老人小兒壹圓溫酒化服亦
得辟邪用蠟紙裹壹圓如彈子大緋絹袋盛帶之

**[illegible]圓** 治九種心痛五種噎疾痃癖氣塊冷氣攻刺及
脾胃停寒胷滿膨脹腹痛腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦
人血氣血刺等

阿魏(壹錢半[illegible]) 胡椒(貳錢半) 甘草(炒)
茴香(炒) 川芎 青皮 陳皮
丁香皮(炒) 蓬朮(各壹兩) 縮砂仁 桂心
白芷(炒各半兩) 生薑([illegible]切作片用鹽壹兩[illegible])

右為末阿魏糊為圓如雞頭大每藥壹斤用朱砂柒錢
為衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下貳粒至叁粒婦人血氣醋
湯下常服茶酒任下貳粒並嚼細嚥食前

**[illegible]散** 治氣自腰腹間攣急疼痛不可屈伸腹中冷重如石
痛不可忍白汗如洗手足冰冷久不差垂死方

山梔子 肆拾玖箇連皮搥碎 附子 壹枚炮去皮臍

右為末每服貳錢酒壹小盞入鹽少許煎七分溫服又

## 失笑散

治胷脅切痛

方見前疝門

三因極一病證方論卷之九

# 三因極一病證方論卷之十

## 勞瘵敘論

夫骨蒸殗殜復連尸疰勞疰蟲疰毒疰熱疰冷疰食疰鬼疰等皆曰傳尸者以疰者注也病自上注下与前人相似故曰疰其變有二十二種或三十六種或九十九種大略令人寒熱盜汗夢与鬼交遺泄白濁髮乾而聳或腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復數箇或聚或散沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復下利羸瘠困乏不自勝持積月累年以至於死死後乃疰易傍人乃至滅門者是也更有蟲尸遁尸寒尸喪尸尸注等謂之五尸及大小附著等不的知其所苦無處不惡乃挾諸鬼邪而害人以三因收之內非七情所忤外非四氣所襲雖若類乎不內外因奈其湯藥無驗又非疰易傳染難以推測故自古及今愈此病者十不得一所謂狸骨獺肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未嘗見效唯膏肓俞崔氏穴若聞早灸之可否幾半晚既不濟也近集得經效方亦又取之頗驗錄于左論以俟明哲

## 勞瘵證

病者增寒發熱自汗面白目乾口苦精神不守恐畏不能獨臥其傳在肝病者增寒發熱面黑鼻燥忽忽喜忘大便苦難或復泄瀉口瘡其傳在心病者增寒發熱面青唇黃舌本強不能言飲食無味四肢羸瘦吐涎沫其傳在脾病者增寒發熱面赤鼻白乾燥毛折咯嗽喘急時吐白涎或有血線其傳在肺病者增寒發熱面黃耳輪焦枯胻骨痠痛小便白濁遺瀝腹痛其傳在腎所謂勞瘵者二十四種因證皆可考兮七折驗傳脈沉中錯其意在及外人喬熱自反思之自撥醒劇其表猶內晨食鼻衄或後欬加其歎升血身熱增煩痛如針刺之狀

在脉小肠焦枯眼昏两胁急痛其证作筋脉幽黑燥大抒腹
痰其蒸在胃背膂疼痛脐背攻刺其蒸在脑头眩闷热口干
滴涎眼多眵泪其蒸在髓男子失精女子白淫其蒸在五脏
夜多盗汗热中烦与肌中烦闷其蒸在三焦小便赤黄淋涩如
膏其蒸在膀胱溺道不均或涩或淋腹中雷鸣其蒸在小肠
大腹隐痛右鼻干痰其蒸在大肠口鼻干燥腹胀睡卧不安
白汗出其蒸在胃口苦耳聋胁下痛其蒸在胆惊恐后重肛
门涩闭其蒸在回肠小腹疗痛筋脉纵缓阴器自强其蒸在
宗筋眼昏不下时复腹鸣燥怒不常其蒸在肝舌焦黑气短
烦闷洒洒如[illegible]其蒸在心唇焦口舌生疮腹胀闷畏食不食其
蒸在脾吃吃喘嗽痰唾吐血声嘶音远其蒸在肺耳轮焦枯
脚气酸疼起居不得其蒸在肾情想不宁无故精泄白物绵
绵而下其蒸在右肾心主胞络心烦[illegible]攻坠痛洗仰烦
闷其蒸在病诸证虽日不同其根多有虫当看其心肺治之不
可不绝其根也

劳瘵治法

**取劳虫方**

青桑枝　柳枝　石榴皮　桃枝
梅枝各七茎长四寸许　青蒿一小握

右用童子小便一升半葱白七茎去头叶煎及一半去
滓别入安息香阿魏各一分再煎至一盏滤去滓调辰
砂末半钱槟榔末一分麝香一字分作二服调下五更
初一服五更三点时一服至巳牌时必取下虫色红者
可救青者不治见有所下即进软粥饭温暖将息不可
用性及食生冷毒物合时须择良日不得令猫犬孝服
秽恶妇人见

**[illegible]** 治诸传尸劳气杀虫方得之于清源郡王府

川椒二斤去目并合口者炒出汗

右为末每服二钱空心米汤调下须痹闷少顷如不
能禁即以酒糊为丸如梧子大空心服三五十丸昔人
常与病劳妇人交妇人死遂得疾遇一异人云劳气已
入脏遂与此方令急服二斤其病当去如其言服之兹
尽大便出一虫状如蛇自此遂安续有人服之获安者
皆多矣

**[illegible]** 治劳瘵增寒发热口干咽燥自汗款痰烦躁

人参　黄芪　甘草炙　桔梗
麦门冬去心各等分

右为末每服二钱水一盏煎七分不以时自汗入浮竹
茹小麦同煎

**[illegible]** 治积劳咳嗽喉闷咯痰中有血

甘草生用　黄芩　桑白皮　防风去叉
杏仁去皮尖麸炒[illegible]　麦门冬去心一分　茯神半两

右为末每服二大钱水一盏入黄蜡一片如指大同煎
至七分食后服

**蛤蚧散** 治积劳久咳失音方

蛤蚧一对去口足[illegible]　诃子[illegible]　阿胶炒
熟地黄　麦门冬去心　细辛去苗　甘草炙各

右为末炼蜜丸如皂子大每服一丸含化不拘时候服

**[illegible]** 治传尸骨蒸咯血肺痿疰忤鬼气心疼霍乱时气
瘴疟等方见方后门

此方盛行于世大能安魂魄却外邪凡病自内作不晓其
名者服之皆效所以治气瘀气不和吐利荣卫闭格甚者

神效

疰忤中惡證治

病者卒心腹脹滿，吐利不行，如乾霍亂狀，世所謂衝惡是也。由人精神不全，心志多恐，遂為邪鬼所擊，或復附著，沉沉默默，寢言譫語，誹謗罵詈，訐露人事，不避譏嫌，口中好言未然禍福，及至其時，毫髮無失，人有起心，已知其肇，登高涉險，如履平地，或悲泣呻吟，不欲見人，其狀萬端，如醉如狂，不可概舉。此皆鬼神及諸精魅附著惑人，或復觸犯忌諱，土地神靈為其所作，非有真實，但隨方俗考驗治之，方列于后。

還魂湯 治卒中惡，或先病痛，或卒然而死，或客忤，鬼擊，飛尸，諸奄忽氣絕，無復覺知，或已死絕，口噤不開，去齒下湯，湯入口不下者，分病人髮左右捉踏肩引之，藥下，復增取盡一升，須臾立蘇。

麻黃三兩去節　桂心二兩　甘草一兩　杏仁[illegible]

右剉散，每服四大錢，水一盞半，煎七分，去滓，不以時服。

[illegible]安圓 治心氣虛，自恍惚，恐不常，言語錯亂，尸疰客忤，魘夢不祥，小兒驚癇，並宜服之。

桃奴[illegible]　辰砂[illegible]　桃仁[illegible]

牛黃[illegible]　龍腦[illegible]

雄黃[illegible]　犀角[illegible]

麝香[illegible]　安息香[illegible]

琥珀[illegible]三分

右為細末，入前膏為丸，如雞頭大，陰乾，每丸用蠟封閉，淨室安置，用人參湯研下一丸，食後臨卧服。

蘇合香圓 治卒中惡疰忤，方見[illegible]門。

蠱毒敘論

江南閩中山間人以蛇虺蜈蚣蚰蜒蝦蟆等百蟲同器畜之，使其自相食啖，勝者為靈，以事之，取其毒，雜以菜果飲食之類，以毒人，妄意要福，以圖富貴，人或中之，證狀萬端，廣如治百蟲篇，或致年歲間人多死。又有人家香火伏事，如家先者，亦謂之蠱，能病人，世謂之蠱注，以姓類屬五音，謂之五蠱。此皆邊鄙邪僻之地多有此事，中都則稀聞也。

中蠱證治

夫中蠱毒者，令人心腹絞痛，如有物嚙，吐下血皆如爛肉，若不即治，食人五臟即死。驗之，令病人唾水，沉即是蠱。有人行蠱毒以病人，若欲知其姓名者，以敗鼓皮燒作末，飲服方寸匕，須臾自呼蠱主姓名，可語令呼喚將去，則愈。治之亦有方。

丹砂圓 治蠱毒從酒食中著者，端午日合。

辰砂別研　雄黃別研　赤腳蜈蚣　續隨子各一兩

麝香一分

右為末，糯米飲為丸，如雞頭大，若覺中毒，即以酒下一丸，蛇蠍所螫，醋磨塗之。

凡例

凡諸蠱毒，是假毒藥以投之，知時宜煮大豆甘草薺苨汁飲之，通除諸毒藥。

[illegible]散 治中諸物毒

晉礬　建茶各等分

右同為末，每服二錢，新汲水調下，得吐即效，未知再作。

[illegible]圓 治誤食毒，百物毒，救人於必死。

板藍根[illegible]　貫衆去土一兩　青黛研　甘草生，各一兩

右為末，蜜丸梧子大，以青黛別為衣，如稍覺精神恍惚，惡心，即是誤中諸毒，急取藥十五丸，爛嚼，用新水送下，即解。此方傳得於人，京師陳進士用水浸炊餅為丸。

妙如煩燥小可三五丸大解暑毒

凡中毒者嘔吐黑血不惺瞀目痺味甘者皆中毒无疑

**青黛雄黃散** 治凡必見中毒及諸蟲咬癰疽腫作即服此令毒氣不聚

上好青黛　雄黃等分

右爲細末新汲水調下二錢

蛇虫傷治法

**白芷散** 治惡蛇咬傷瀕死不可救者

香白芷

右一味爲末水調下須臾咬處出黃水盡腫消皮合

**白礬半夏散** 治蝎螫痛不可忍

白礬　半夏各等分

右爲細末醋調貼之

五絕治法

凡魘寐産乳自縊壓溺五者令人卒死謂之五絕

**半夏散** 治魘寐卒死及爲墻壁竹木所壓水溺金瘡卒致悶絕産婦惡血衝心諸暴絕證

半夏湯洗七次爲末

右爲末每一大豆許吹鼻中即活但心頭溫者一日可治

**[illegible]** 治産乳血暈悶絕狼狽若口噤則拗開灌之必效

方見婦人門

**救自縊法**

徐徐抱解不得截繩上下安被卧之一人以脚踏其兩肩手少挽其髮常弦弦勿縱之一人以手按據胸上數動之一人摩捋臂脛屈伸之若已強但漸漸屈之并按其腹如此一炊頃氣從口出呼吸眼開而猶引按莫置亦勿苦勞之須臾可少桂湯及粥清含與之令濡喉漸漸能嚥乃稍稍止更以兩人以管吹其兩耳此法最善无不活者自旦至暮雖冷亦可暮至旦少難

**救溺死方**

以死人安著將手袖掩其口鼻眼上一食頃活眼開仍與熱小便若初覺氣絕而不能言可急劈口開以熱小便灌之打撲悶絕者亦以此救

夫壓死折傷乃大法君子守身之要戒固无是事然妄車良馬時有之奔輪步騎指流未免危甚罹兇行險征賈捕獵異人逸步所多不測尤甚其墮致斃加害凶險劫持打撲無論皆須救治之不可不急也

**雞鳴散** 治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕欲死并久積瘀血煩躁疼痛叫呼不得並以此藥利去瘀血即愈此藥能推陳致新　方見折傷門

**大[illegible]活血丹** 治男子婦人外傷內損狗咬虫傷驢馬撲墜手足傷折一切疼痛腹中瘀血刺脇築心及左攤右瘓走注疼痛癰腫痔漏婦人冷氣入腹血脈不通産後敗血灌注四肢吹妳腫痛並宜服之

花桑枝 [illegible]

[illegible]

細墨 [illegible]

[illegible]

大黑豆 [illegible]

乳香 [illegible]

右六味爲末入乳香膏內和杵三千下丸如彈子大如乳香少更入醋糊和丸者一服一丸輕者半丸以無灰酒一盞乳香一豆大先磨香盡入以蘇木煎三五沸臨卧

時温服以痛処痛止不計如欲出汗以衣被覆仍用药塗
貼損処只一切動風物狀婦人諸疾服者更用當帰末
一錢依法煎服打撲不得服

**接骨散** 治跌撲脚手腰骨脚折

水蛭不拘多少

右於新瓦上炙令香熟勿令太過為末每服一錢热酒
調仍入麝香半錢服折処不可手觸恐伤行良久覺痛折
処渐渐如蟻觸之遂要人捻揉骨折処相接即用杉木
夾縛兩三日去之骨全矣

**[illegible]石灰散** 治一切金瘡打撲傷損猫犬咬傷方見矣

古石灰 兩石

右以灰堆塚患処溺者埋灰中從頭至足水出耽即活

驚悸證治

夫驚悸与忪悸二證不同驚悸則因事有所大驚或聞虛響
或見異相登高涉險驚忤心神氣与涎鬱遂使驚
悸名曰心驚膽寒在心膽經屬不内外因其脉必動忪悸則
因汲汲富貴戚戚貧賤又思所愛遠失所重觸事不意氣鬱
涎聚遂致忪悸在心脾經意思所主屬内所因或冒寒暑濕
塞閉諸經令人忽忽若有所失恐恐如人將捕中脘忪悸此
乃外邪非因心病况五飲停畜閉於中脘最使人忪悸治屬
飲家除飲停与外内因所治各見本門驚悸治方備列于后

**温膽湯** 治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥或異象感惑遂致
心驚膽懾氣鬱生涎涎与氣搏變生諸證或短氣悸乏或
復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安

半夏湯洗 竹茹 枳實麩炒各二兩 橘皮三兩

甘草炙 白茯苓一兩半

右為剉散每服四大錢水一盞半姜五片棗一个煎七
分去滓食前服

**[illegible]心丹** 大治驚悸方見補損門

**定志圓** 治心氣不足驚悸方見健忘門

**寒水石散** 治因驚心氣不行鬱而生涎涎結為飲遂為大疾
忪悸陷暈不自勝持少小遇驚尤宜服之但中寒者不宜服

寒水石煅 滑石水飛各一兩 甘草生一分

右為末每服二錢热則新汲水下怯寒則煎姜棗湯下
入龍腦少許尤佳小兒量歲与之

自汗證治

夫自汗多因傷風傷暑及喜怒驚恐房室虛勞皆能致之无
問昏醒浸浸自出者名曰自汗或睡著汗出即名盜汗或云
寢汗若其飲食勞役負重涉遠登頓疾走因動汗出非自汗
也人之氣血猶於陰陽水火平則寧偏則病陰虛陽必湊故
發热自汗如水熱自涸陽虛陰必乘故發厥自汗如水溢自
流考其所因风暑涉外喜怒驚恐涉内房室虛勞涉不内外
理亦甚明其間如歷節腸癰脚氣産蓐等病皆有自汗治之
當推其所因為病源无使混濫如經脉別論所載但原其汗
所出処初非自汗證也不可不知

**正元散** 治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽
氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍乱轉筋久下冷利少氣
羸困一切虛寒並宜服之常服助陽消陰正元氣温脾胃
進飲食

人參 白茯苓 白朮 黄芪各一兩

甘草炙 烏藥去木 山藥 附子炮去皮

川芎　乾葛各二兩　桂心　烏頭（炮去皮臍）各
紅豆（炒）　乾姜（炮）　橘皮各三錢
右為末每服二錢水一盞姜三片棗一个煎少許煎七
分食前服白汗加浮麥

牡蠣散 治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗夜臥
即甚久而不止羸瘠枯瘦心忪驚惕短氣煩倦
牡蠣（米泔浸刷去土火燒通赤）　麻黃根　黃芪各一兩
右為剉散每服三錢水一盞半小麥百餘粒同煎至八
分去滓不拘時一方為細末每服二錢水二盞葱白三寸
煎一盞半八分三服

□□散 治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食進退肌瘦
黃芪二兩　柴胡（去蘆）一兩　大鱉甲（去裙醋炙）
乾□　人參　茯苓　乾葛
川烏（炮）　玄參二兩
右為末每服一錢先用小麥二七粒煎湯一盞去麥入
藥煎七分食後溫服或臨臥服如久患後亦宜服此以
退貝熱調理經絡

□□湯 治傷風自汗 方見傷風門
□□湯 治傷暑自汗 方見傷暑門
□□湯 治濕症自汗 方見中濕門

止汗粉
用川芎白芷藁本各一分入米粉三分為細末撲身上

消渴敘論
夫消渴皆由飲食無節或耗津液枯竭引飲無度小便必利漸致衰
微肌肉脫剝指脈不榮精髓內竭推之所因外內外與不內
外古方不原病本但出其名似屬不內外因藥中乃用煩勞
遠志得非內外共用以心虛煩悶最能殺得風寒暑濕病耶今
作熱入于腎經引水自救皆由文也不知其因施治錯謬醫
之大患不可不知

三消脈證
渴病有三曰消渴消中消腎消渴屬心故煩心致心火散漫
渴而引飲經云脈軟散者當病消渴諸脈軟散皆氣實血虛
也消中屬脾癉熱成則為消中消中復有三有寒中熱中強
中寒中陰勝陽鬱久必為熱中經云脈洪大陰不足陽有餘
則為熱中多食數溲為消中陰狂興盛不交精泄則為強中
三消病至強中不亦危矣消腎屬腎盛壯之時不自謹惜快
情縱欲意房中年長腎衰多服丹石真氣既喪石氣孤立
唇口乾焦精溢自出不飲而利經云腎實則消不渴而小便
自利名曰消腎亦曰內消

三消治法
□□圓 治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣飲過多皆致
消渴口舌乾燥引飲無度小便或利或不利
知母（焙）一分　川連（去須）一兩　苦參一兩　玄參一兩
鐵胤粉（研）一兩　牡蠣（煅）一分　朱砂二錢（研）　麥門冬（去心）
天花粉　金箔　銀箔各二十片　白扁豆（去皮）一兩
右為末煉蜜入生栝樓根汁少許丸如梧桐子大用金銀
箔為衣每服一十丸至三十丸先用栝樓根汁下一服
次用麥門冬熟水下病退日二服忌炙煿酒色次投烘
春間補

□□圓
麥門冬（去心）　磁石（煅醋淬）　熟地黃　山茱萸
桂心　山藥（炒）　牛膝（酒浸）　茯苓

黃芪（鹽湯浸）　澤瀉　鹿茸（酥炙）　遠志（去心）
石斛　覆盆子　五味子　萆薢
破故紙（炒）　巴戟（去心）　兔絲子（酒浸）　龍骨
杜仲（去皮[illegible]炒去絲）　附子（一个，炮去皮臍）
右為末，蜜丸如梧子大，每服五十丸，空心服，米飲下。

**黃芪湯** 治消中，多因外傷瘅熱，內積憂思，喜啖鹹食及麪，致
脾胃乾燥，飲食倍常，不生肌肉，大便反堅，小便無度。
生薑（[illegible]）　[illegible]
右㕮咀，每服二錢匕，長流水煎[illegible]，次投豬肚
方補。

**附子豬肚圓**
附子（炮去皮臍）　檳榔　鱉甲（醋炙）　當歸
知母　木香　川芎（[illegible]）　秦艽（去苗）
大黃（[illegible]）　龍膽草　白茯苓　破故紙（[illegible]）
枳殼（麩炒去瓤）
右為末，分作三分，將二分入豬肚內，縫定，令蜜酒三升
童子小便五升，同入砂鍋內煮乾，爛研細，入一分末同
搜為圓如梧子大，每服五十丸，溫酒、米湯下。

**[illegible]** 治熱中，因外傷燥熱，內用意傷脾，飲啖肥膩，熱積
胸中，致多食數溲，小便過於所飲，亦有不渴而飲食自消
為小便者。
黃丹（[illegible]）　[illegible]
右研勻，每服二錢，食後，先用水一兩，抹漱口，待心中熱，
家米便以冷水調下。

**[illegible]圓** 治熱中消渴，止後將補，精血既受邪，虛勞，傷夫骨節
間熱，寧心強志，安神定魄，固臟腑，進飲食，免生瘡瘍。
大豬肚（一个）　黃連（三兩）　蜜　生薑（[illegible]）
先將豬肚淨洗，後以蔥、椒、醋、麪等洗，次乾，用藥同水酒
入銀石器內煮半日，洮出，以黃連洗去蜜酒令乾，剉研為
細末，再用酒調成膏，入先洗豬肚內，縫定，入銀石器內
水煮爛，研為膏，搜下項藥。
人參（二兩）　黃芪（四兩）　五味子　山藥
杜仲（去皮[illegible]炒）　山茱萸　石斛
車前子　鱉甲（醋炙）　熟地黃　新蓮肉（去心）
當歸（各二兩）　川楝子（炒）　白茯苓　磁石（[illegible]）
川芎（一兩）　沉香（[illegible]）　麝香（[illegible]）　兔絲子（[illegible]）
右為末，用豬肚膏搜和，得所，膏少則添熟蜜，杵數千下，
元如梧子大，食前溫酒或米湯任下五十丸。一法有白
朮二兩、陽起石一兩。

**石子薺苨湯** 治強中，多因耽嗜色慾，及快意飲食，或服丹
石，真氣既脫，藥氣獨存，燥渴引水，飲食倍常，陰器常[illegible]，不交
精出，故中焦[illegible]，[illegible]於下焦，三消之中，最為難治。
薺苨　石膏（各二兩）　人參　茯神
栝樓根　磁石（[illegible]）　知母　乾葛
黃芩　甘草（各一兩）
右為剉散，每服水三盞，腰子一个，去脂膜，黑豆一合，煮
至一盞半，去腰子、大豆，入藥四錢，煎至七分，去滓，食後服。
下焦抗，則夜間服，渴止勿服，只投補藥。

**豬肚圓** 治強中消渴，服石子薺苨湯，渴差，退，可服此補養。
黃連（去鬚）　粱米　栝樓根　伏神（各四兩）
知母　麥門冬（去心，各二兩）
右為末，用大豬肚洗極淨，入藥末，縫定，甑中炊極爛，取

出火毒別研搗為末煉蜜和得所別添少蜜杵數千
下丸如梧子大飲服五十丸食前服

胡桃圓 治消腎亦云內消多因快情縱欲極意房中年少懼
不能房多服丹石及失志傷腎遂致唇口乾焦精溢自出
或小便赤黃五色浮濁大便燥實小便大利而不甚渴
白茯苓　胡桃肉［illegible］　附子［illegible］
右等分為末蜜丸如梧子大米飲下三五十丸或為散
以米飲調下食前服

古瓦湯 治消腎腎消小便中飲水無度小便頻數
乾葛　天花粉　人參　[illegible]
右為末每服二大錢用多年古瓦碎研煎湯調下不以
時候服

鹿茸圓 治失志傷腎三消消渴小便無度
鹿茸［illegible］　麥門冬［去心］　熟地黃　黃芪
雞膍胵［微炒］　茯苓［去皮］　山茱萸　破故紙［炒］
牛膝［酒浸］　五味子［illegible］　茯苓　玄參
地骨皮［各一兩］　人參［三兩］
右為末蜜丸如梧子大每服三十丸至五十丸米湯下

遠志圓 治心腎虛消渴引飲智慮昏閉小便自利白濁泄遺
人參　白茯苓　川芎［illegible］　牡蠣［煅］
遠志［illegible］
右為末用茯苓一兩［illegible］糊圓如梧子大每服五十
圓粳米湯下

六神湯 治三消渴疾
蓮房　乾葛　枇杷葉［去毛］　甘草［炙］
栝樓根　黃芪［各等分］

右為剉散每服四錢水一盞煎七分去滓溫服小便不
利加茯苓

[illegible]湯 治三消渴疾飲多利少或不飲自利肌膚
瘦削四肢倦怠常服補虛止渴利
[illegible]桑白皮［illegible］　茯苓
人參　麥門冬［去心］　乾葛　乾山藥
桂心［略一］　甘草［炙］

玄菟丹 治三消渴利神藥常服禁精止白濁延年
菟絲子［illegible］　白茯苓
乾蓮肉［各三兩］　五味子［illegible］
右為末別碾乾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊
搜和搗數千杵丸如梧子大每服五十丸米湯下
空心食前服

[illegible]湯 治三消渴利神
糯谷［illegible］　桑根白皮［illegible］
右等分每用一兩許水一大碗煮取半碗渴則飲不拘時

[illegible] 治三消渴疾
大棗［illegible］　新蓮肉［illegible］　西木香［一分］
甘草［二兩炙］
右用豬脊骨一尺二寸同前藥用水五碗於銀石器
內煮去肉骨滓取汁一碗空腹任意啜服忌生冷鹽藏
等物以滓減去甘草一半焙乾為末米湯調服不以時

六味圓 治消渴小便多以飲水一斗利小便反倍之
澤瀉　茯苓　牡丹皮［各三兩］　桂心
附子［illegible］　山茱萸　山藥［各四兩］
熟地黃［八兩］

右爲末糝丸梧子大每服五十丸米湯下食前服

□□□治渴欲飲水不止

文蛤〔小注不清〕

右一味爲末以水飲化調方寸匕不以時

烏梅木瓜湯 治酒食過度中焦蘊熱煩渴枯燥小便併多遂成消中兼治瘴癘所謂瘴渴者此人往南方之瘴地多有此疾

木瓜乾 烏梅打碎不去核 麥蘗炒 甘草

草菓去皮各半兩

右剉散每服四大錢水壹盞半姜五片煎七分去滓不以時服

茅根圓 治嶺南山瘴風熱毒氣入腎中變寒熱脚弱虛煩而渴

黃連去須 麥門冬去心 生栝樓根汁 生地黃取汁

茅根〔小注不清〕

右以三汁搜和爲丸如梧子大每服米飲下三五十丸

一法 黑豆小麥粥飲下

渴疾 有人病渴山谷方單用兎絲子酒浸焙乾不拘服甚効亦有用黃芪陸兩甘草一兩作六一湯服之尤效又渴人病愈須預防發癰疽宜服忍冬圓

忍冬草〔小注不清〕

右以米麯酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許爲末即以所浸酒爲糊元如梧子大每服五十元至百丸酒飲任下不以時此藥不特治癰亦能止渴并五痔諸漏

麥門冬圓 治消渴

麥門冬去心 人參 黃芪蜜炙二兩 白茯苓

山茱萸 山藥 桂心各一兩半 黑豆三合炒去皮

右爲末地黃自然汁二碗牛乳二盞熬爲膏元如梧子大每服飲下五十丸

□□□ 治消渴

五靈脂半兩 黑豆半兩去皮生

右爲末煎冬瓜子湯調下二錢

猪肚丸 治三消渴疾神妙

牡蠣粉 苦參 蜜陀僧 知母

水銀以白蠟半兩同結砂各一兩 栝樓根半兩 黃丹一兩與水銀同研

右爲末男子用雌猪肚一个女人用雄猪肚一个入藥在內以線縫定用繩縛在新塼上別用生栝樓根半斤切碎同煮早晨至午時取藥出不用栝樓根只爛研猪肚和藥爲丸如梧子大每服三十粒食前米湯下日三服十日可去病根

秘簡

經云渴无外所因因傷寒脉浮而渴屬太陽有汗而渴屬陽明自利而渴屬少陰又陽毒傷寒病重燥盛而渴其若自中暑伏熱累取不差而渴者有瘴毒氣發寒熱而渴者得非外因治法如傷寒論中不復繁引酒疸黃連元治中暑熱渴最妙又有婦人産蓐去血過多而渴者名曰血渴非三消類不可不審

## 五疸敘論

古方敘五種黃病者即黃汗黃疸谷疸酒疸女勞疸是也觀別錄則不止於斯然疸与黃其實一病古今立名異耳黃汗者以胃爲脾表屬陽明陽明蓄熱喜自汗汗出因入水中熱必鬱故汗黃也黃疸者以暴熱用冷水洗浴熱留胃中所致以与諸疸不同故用黃汗目之又云因食生黃瓜氣上薰所致人或疑其不然古賢豈妄云也必有之矣谷疸者由失

脱發熱大食傷胃氣衝發所致酒疸者以酒能發育脉熱由
大醉當風入水所致女勞疸者由大熱交接竟入水水流溼
入于脾因胃氣虛勝以所勝遞入致腎氣七行故有額黑身
黄之證也謂脾胃病者即此證也其間兼濕與腹脹名黄疸
證彼於陰必嘔發於陽則振寒而發熱更本於胃氣鬱發土
色上行故發於脾則為肉疸發於骨則為黑疸若論所因外
則風寒暑濕內則喜怒憂驚酒食房勞三因悉備世醫但云
於傷寒論中不亦[illegible]矣學者宜識之

黄汗證治

病者身體腫發熱不渴狀如風水汗出染衣色正黄如蘗汁
名曰黄汗

桂枝加黄芪五兩湯 治黄汗身腫汗出出已輒輕久久必身
瞤瞤胸中痛腰以下無汗腰髖弛痛如有物在皮中劇者不
能食煩躁小便不利

桂枝去皮 芍藥各三兩 甘草二兩炙 黄芪五兩

右為剉散每服四錢水一盞半姜五片棗三枚煎七分去
滓溫服仍飲熱粥以助藥力溫覆取微汗未汗又服

黄芪苦酒湯 治身體洪腫發熱自汗汗如蘗汁其脉沉

黄芪五兩 芍藥三兩 桂心三兩

右為剉散每服四錢苦酒三合水一盞半煎至七分去
滓不以時服初服當心煩以苦酒阻故也至六七日稍
自愈

黄疸證治

病者發黄身面眼悉黄如金色小便如濃煮蘗汁名曰黄疸

麻黄醇酒湯 治傷寒瘀血不解鬱發於表發為黄疸其脉浮緊
者以汗解之

麻黄三兩去節

右一味以醇酒五升煮取二升半每服一盞溫服汗出
愈秋冬用酒春夏用水煮

谷疸證治

病者發黄[illegible]熱食則腹滿眩暈谷氣不消胃中苦濁濁氣
下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黄名曰谷疸

谷疸丸 治胃有鬱熱氣壅食谷不消大小便不利腹痛不
下食趺陽脉緊而數亦治因勞發熱熱鬱發黄

苦參三兩 龍膽草一兩 梔子半兩去皮炒 人參三分

右為末以豬膽汁入熟蜜少許搜和丸如梧子大以大
麥煎飲下五十丸日三不知稍加之

茵陳湯 亦治谷疸用生姜甘草湯下方見霍亂門

酒疸證治

五疸唯酒疸變證最多蓋酒之為物隨人性量不同有盡
醉而不醉者有醉而歐吐而顛亂者以飲酸而成有大熱毒滲
入百脈為病則不特發黄溢于皮膚為黑為腫流于清氣
道中則眼黄鼻癰種種不同故方論中所指外有肉疸黑
疸之證相類乃至令人恍惚失常等數證不同

[illegible] 治酒疸發黄身無熱靖言了了腹滿欲嘔心煩足
疼或成癖心中懊憹其脉沉弦或緊細

半夏湯洗去滑 茯苓 白朮各三兩 前胡
枳殼去瓤 甘草炙 大戟炒各二兩 黄芩
茵陳 當歸各一兩

右為剉散每服四大錢水一盞半姜三片煎七分去
滓空腹服

[illegible] 治酒疸飲少小便多如白泔色因酒所致其脉虛

凝水石 白石脂 括樓根 桂心各一兩
兎絲子 知母各三分
右爲末每服二錢大麥飲調下
**京枳散** 治酒疸因下後久久爲黑疸目青面黑心中如啖韭
虀狀大便正黑皮膚不仁其脉微而數
桂心 白朮各一兩 枳實麩炒 京鼓
乾葛 杏仁 甘草各半兩
右爲剉散每服四錢水一盞煎七分去滓食前服
**葛根白朮湯** 治酒疸發黃結飲在心胸間心下縱横堅滿
骨肉沉重逆害飲食小便赤黃此由本虛飲食生冷與脾
胃痰結所致其脉弦滑方
白朮 茯苓各二兩 當歸 黃芩
茵陳各 前胡 枳實麩炒 甘草炙
杏仁[illegible] 半夏 七枚
右剉散每服四大錢水一盞半生姜七片煎七分去滓食前服
**人參散** 治飲酒房勞酒入百脉令人恍惚失常
人參 白芍藥 括樓根 枳殼麩炒
茯神 酸棗仁 甘草炙 熟地黃各一兩
右剉散每服四大錢水一盞煎七分去滓食後臨卧服
**瓜蒂散** 治酒疸不散發黃久久浸漬流入清氣道中宜引鼻
内鼻滴出黃水愈
苦瓠子去 苦胡盧子 黃黍米 安息香
右爲末以一字搐入鼻中滴出黃水一二升忌勿吹或
過多即以黍穰燒灰麝香末各少許搐鼻立止
女勞疸證治
夫女勞疸病[illegible]三焦上焦屬心中焦屬脾下焦屬腎動則

熱二則於火熾因入水中中焦熱精故能發黃下焦氣勝故
額黑上焦走血隨熱行大便溏黑膚腠人有男女同室而
浴者多成此病搐之久不可不知
**滑石散** 治女勞疸身黃額黑日晡發熱惡寒小腹急足
下熱其脉沉或滿者難治
滑石 石膏各等分
右爲細末以大麥粥飲調下二錢
七日三四小便極利則差
**消石礬石散** 治女勞疸其腹臚脹急如水狀大便黑
者非水腹滿者難治
消石 礬石燒汁 各等分
右爲末每服二大錢大麥汁調下日三服重衣覆取汗病
隨大小便出大便黑小便黃是効
雜病疸證治
五疸之外有時行瘴癘風寒暑濕等證疸不同
**茵陳梔子圓** 治時行病急黃及瘴瘧疫癘
茵陳 梔子 芒消 杏仁
豆豉 恒山 鱉甲 巴豆
大黃
右爲末餳飴爲丸如梧子大每服三丸飲下吐利爲效
未知加一丸 体氣有異急服之妙
**茯苓圓** 治因傷風熱不解發於風疸身面皆黃小便或黃
或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱
生干地黃 大黃 黃連
括樓根 凝水石 苦參 葶藶
右爲末以煉蜜和得所丸如梧子大每服六七丸

至二十丸，有熱加苦參，渴加栝樓根，小便澀加葶藶，小便多加蠣粉水石，小便白加黃連，大便難加大黃，所加並倍之。

五苓散 治伏暑鬱發黃，小便不利，煩渴，用茵陳煎湯調下。方見傷暑門

礬石滑石散 治女勞疸，女勞得之，一身盡疼發熱，面色黑黃，七八日後壯熱，在裏有血，下如豚肝狀，小腹滿者，急下之，身目又黃，小便不利，其脈沉細。

礬石燒　滑石各等分

右為末，每服二大錢，大麥粥飲調下，日三服，食前，便利如血者然，或汗愈。

苦參散 治人無漸忽然振寒發黃，皮膚麴塵出，小便赤澀，大便時秘，氣力無異，食飲不妨，服諸湯不除，因為久黃方。

苦參　黃連　瓜蒂　黃柏去皮　大黃各一兩　葶藶炒半兩

右為細末，每服一大錢，飲調服，當吐下，隨時消息加減。

小半夏湯 治黃疸，小便色不異，欲自利，腹滿而喘者，不可除熱，熱去必噦。

半夏湯洗七次

右為剉散，每服三錢，水一盞半，薑十片，煎七分，去滓，不拘時。

茯苓湯 治五疸，腳弱心忪，口淡耳響，微寒發熱，氣急，小便白濁，當作虛勞治之。方見虛損門





## 脹滿敘論

內經有脹論，各脹治法雖詳，而不論其所因。原其脹滿之由，皆胃與大腸二陽明爲之，三陰之長，大抵陰爲之上，陽爲之下，或臟氣不平，勝乘剋，或相因，致陰陽失序，遂有此證。然內所傷則有寒熱之異，治脹於胃，名曰脹滿；或怒氣所傷，各不傳化，脹於大腸，名曰寒脹；或思慮聚結不散，氣鬱則成此證。外感風寒暑濕，傳其經絡，久而不解，亦致脹滿。內所因，飲食饑飽生冷甜膩，聚結不散，或作痞滿脹，[illegible]。不內外因，跌仆傷損，以人迎氣口分其內外，不內外，其治法詳而調之，不失其要，否則妄施，受困者不可不詳。

脹滿證治

論云：五積者，五臟之所積，皆以五臟氣不平，肝爲肥氣，心爲伏梁，脾爲痞氣，肺爲息賁，腎爲奔豚，皆聚結隨所生而感，可以五積法治之，可也。然內所因，飲食所傷，脹滿亦當隨其氣而平治之，所謂以經調治。

大半夏湯 治肝氣不平，勝剋於脾土，脾氣不行，結聚涎沫，閉於臟氣，胸腹則脹滿，其脈弦遲，故知中虛胃冷脹滿，服此可下，美進食。

半夏湯洗　桂心各五錢　附子炮去皮臍　人參

甘草炙　厚朴薑製　當歸　茯苓

枳實麩炒，各二兩

右爲剉散，每服四大錢，水一盞半，薑五片，棗一枚，煎七

分空心食前服

千金厚朴湯　治憂思鬱結脾肺氣凝陽不能正大腸與胃氣
不平脹滿衝咳食不得下脈虛而緊澀
附子炮去皮臍　黃芪　厚朴姜製　人參
橘皮　白朮　甘草　乾姜各一兩
川椒炒出汗各一分
右為剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓食前服

溫胃湯　治憂思聚結傷脾志不守思慮兼并擾亂脾不
主傳導使諸陽不能正以為逆中寒氣脹腸鳴切痛胃弱
逆滿嘔吐不食
附子炮去皮臍　厚朴姜製　半夏湯洗
甘草炙各一分　乾姜炮一分半　粳米各一分
右剉散每服四大錢水二盞姜三片棗二枚煎七分去滓食前

七物厚朴湯　治腹滿發熱以陽并陰則陰實而陽虛陽盛生
外熱陰盛生內寒陰氣盛則為實陽氣盛則為熱陰盛不
能宣導飲食如故致脹滿者為熱脹
厚朴姜製　甘草炙　大黃　枳實麩炒
桂心去皮各二分
右為剉散每服四大錢水一盞半姜七片棗三個煎七分
去滓食前服嘔者加半夏一分利者去大黃寒多加生
姜十片煎

宣腹膏　治腹虛脹滿結痛惡風諸藥不差惡風不能
宣螺二枚
安息香　麝香各一錢
右研細令勻每服一大錢溫酒調下
住不以時一法有乾漆此出最驗宜用之

中湯　治虛人老人飲食少多致腹脹心下痞滿有妨飲
食或刺痛泄利氣痞滯悶
厚朴去皮　甘草各　生姜洗切　青州棗去核各等分
右上件搗令得所方入生姜又杵令勻取出同棗焙
令過三微焙却入鍋內慢火炒令紫色又焙乾為細末
每服一大錢擦生姜少許沸湯點空腹服以知為度氣
味殊美兼能愈疾又易修合

料簡

上件諸方如內因與不內外因皆可選用若外因傷風傷寒
傷暑傷濕陽明經腹脹可以大水氣杏子湯等各見本門濕脹朮
附湯加茯苓桂心等脹當丸丸皆良藥也更有脚氣支滿腫
痛泄及五疸石水婦人腸覃血癥或單單腹脹之證治之各
見本門等皆當審詳為治无致混濫失其旨要也

霍亂敘論

夫霍亂之病揮霍變亂起于倉卒頃刻之間揮霍之間便至
變亂悶絕不救甚為可畏臨深履危不足以諭有生之流不
可不達其旨趣其病因涉於內外不內外三種其用而讀
傷寒論者見有本是霍亂今是傷寒之說便以為霍亂即傷寒
殊不知因傷寒致霍亂只是外因一證尔或風暑濕皆有此
證殊不知喜怒憂思飲食飢飽皆能致揮霍之證故不得不
備論

霍亂證治

霍亂者心腹卒痛嘔吐下利增寒發熱頭痛眩暈先心痛則
先吐先腹痛則先利心腹俱痛吐利並作甚則轉筋入腹則
斃霍亂惡證无越於斯此蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升
陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔迸扶救不先治之唯宜溫煖更

審別三因隨內外以調之不尒則必脫困殆也

霍亂外因證治

諸感風寒暑濕皆以外所因若傷風則惡風有汗傷寒則惡寒無汗冒濕則重著傷暑則熱煩此雖常論揮霍之間倉卒不辨遂致錯誤用藥經絡常為害不淺當止本為霍亂今是傷於四氣已成當隨外所因治之乃可

理中湯 治霍亂吐下脹滿食不消心腹痛

人參　乾姜炮　白朮　甘草炙各等分

右為剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓食前遠行防霍亂煉蜜為丸如梧子大每服三五十丸如作散每服方寸匕酒調下小得若轉筋者加石膏煅三兩若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩腎惡燥故去朮恐作奔豚故加桂吐多者去朮加生姜二兩下多者復用朮悸者加茯苓二兩渴欲得水加朮合前成四兩半腹中加人參合前成四兩半寒者加乾姜合前成四兩半腹滿者去朮加附子服湯後食頃食熱粥一盃微自溫勿發揭衣被吐利止身疼痛不休者審其元因以和解之如初因傷風用桂枝之類所謂治有本也

外內料簡

凡外所因必自經絡傳入臟腑須以脈診推其所因隨經調之爲尽善矣假如傷寒在太陰經當用四逆湯少陰經當用附子麻黃湯厥陰經當用理中湯若在太陽經選用麻黃湯陽明經養胃湯少陽經小柴胡湯風冒濕亦然風則桂枝湯暑則香薷飲五苓散濕則苓朮湯除濕湯皆可於諸門隨證檢用不復繁引

霍亂內因證治

諸七憙傷心則氣散怒傷肝則氣擊憂傷肺則氣聚思傷脾則氣結悲傷心胞則氣急恐傷腎則氣怯驚傷膽則氣亂致府藏不通遂致滿悶隔其陰陽遂以作吐利當從內所因治

七氣湯 治喜怒憂思悲恐驚七氣鬱發致五藏互相刑克陰陽反戾揮霍變亂吐利交作寒熱眩暈痞滿咽塞

半夏湯洗五兩　厚朴薑製　桂心各三兩　茯苓
白芍藥　紫蘇葉　橘皮各二兩　人參一兩

右為剉散每服四錢水一盞半姜七片棗一枚煎七分去滓空腹服

胃氣丸 治思慮過度脾胃氣閉聚結涎飲留滯胃氣不舒與冷於陽陰陽反戾吐利交作四肢厥冷頭目眩暈或復發熱兼治老人胃寒大便反秘婦人妊娠惡阻全不納食

硫黃 [illegible]

半夏 [illegible]　白茯苓　人參各一兩　石膏 [illegible]

右為末以生姜自然汁釋蒸餅糊為丸如梧子大每服五十丸至百丸空腹米湯入少生姜汁下

[illegible]散 治憂慮不常暴思兼并致脾氣痞隔結涎留滯胸膈或嘔或吐痞咽脹滿或發吐利交作

附子 [illegible]　半夏 [illegible]　滑石
成煉鍾乳 [illegible]

右為末每服二錢水一盞半姜七片藿香三葉煎至七分食前冷服小便不利加木通茅根煎

不內外因證治

諸飲食生冷或飽食乳酪水陸珍品膾炙肥鮮 [illegible]
自傷 [illegible] 以胃為五藏之海因脾氣以運行胃既 [illegible]

治脾胃虛弱，氣不行，必致停飲，遂成吐利，當從不內外因治
治之

【丸】治脾胃虛冷，飲食不節，宿食留飲，聚於腸胃，或因氣
不調，酒食後寒暑怒作，霍亂吐利，嘔吐心腹痛，腸胃攪刺

蓬莪朮燒

蓬朮　三稜濕紙裹煨　胡椒一兩

青皮三兩炒　阿魏以醋化

右為末，醋化阿魏，入陳米粉為糊，丸如梧子大，每服

末每服一百丸至二百丸，生姜湯下

【散】治傷暑吐利，煩渴

丁香七粒　菉豆三七粒

右為末，新汲水調下

【丸】治霍亂吐利，一服取效，方見九門

霍亂凡例

霍亂者，以陽明為表，宗筋會胃與大腸，今吐利暴吐津液，頻亡
以肝主筋，內傷七情，飲食飢飽，攻閉諸脈，枯削於筋，宗筋失
養，必致攣急，甚則卵縮舌卷，為難治

【散】治霍亂吐下，轉筋入腹則悶絕

木瓜乾一兩　吳茱萸半兩　茴香一分　甘草炙一錢

右為剉散，每服四大錢，水一盞，姜三片，紫蘇十葉，煎七
分，去滓，食前服

通治霍亂，以陰陽反戾，清濁相干，清氣不升，濁水與谷，併小便祕
澀，既在後而吐瀉，引水自救，渴必矣

【湯】治霍亂，吐利後，煩渴欲飲水

茯苓八兩　澤瀉四兩　甘草炙一兩　桂心二兩
白朮三兩

右為剉散，每服四大錢，水一盞，姜三片，煎七分，去滓，食
前服。一方有人參五兩

【丸】治伏暑傷冷，一致不調，霍亂吐利，口乾煩渴

黃丹　巴豆

右同研勻，用黃蠟作汁和為丸，如梧子大，每服五丸
以木瓜湯吞，別以新汲水下，不以時候

乾霍亂者，忽然心腹脹滿，絞刺疼痛，蠱毒煩冤，欲吐不吐，欲
利不利，狀若神靈所附，頃刻之間，便致悶絕，亦涉三因，或
因飲食，或腸胃素虛，致吐利不行

【湯】治乾霍亂，及蠱毒宿食不消，積冷，心腹煩滿，鬼氣
至湯三升，熱飲一升，刺口令吐，宿食便出，不吐更服，
吐訖復飲，三吐乃止。此法大勝諸治，俗人以為田舍淺近
而不用，守死而已。凡有此病，即先用之

嘔吐敘論

嘔吐雖本於胃，然所因亦多端，故有寒熱飲食血氣之不同，
皆使人嘔吐。蓋嘔吐，而不能飲食，氣在上，氣在下，二氣並爭，但出不
入，此亦一說。如氣屬內因，則有七種不同，寒熱
外因，則六淫分之，胃作逆，相搏，嘔吐則致
已有宿食不消，中酒而吐，五飲聚而吐
又瘀血停留，胃中有之，吐利，有此證，不可
不詳辨也

寒嘔證治

病者胃中寒，心下澹澹，四肢厥冷，食即嘔吐，名曰寒嘔，或因
傷食多，致胃氣虛，皆令汗下，致胃氣虛冷之所為也

【湯】治寒嘔，小便復利，身有微熱，見厥者，難治

甘草　乾姜　附子

右爲粗散每服三錢重水一盞半煎七分去滓食前溫服

生硫黃丸 治同前

硫黃不拘多少

右一味以柳木槌研細生薑汁糊爲丸如梧子大每服五十丸米湯下食前

靈砂丹 治胃中虛寒聚積痰飲食飲不化噫醋停酸大便反堅心胸脹悶惡聞食氣婦人妊娠惡阻嘔吐不納食者

硫黃打末　附子去皮臍各[illegible]　[illegible]豆蔻[illegible]一

右爲末生薑自然汁煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸米湯下食前服

[illegible]諸治

病者胃中伏熱積聚結澁使食入即吐名曰熱嘔或因胃熱伏暑及[illegible]不伏熱不散遂至嘔逆者是嘔之所爲也

小柴胡湯 治熱嘔 方見傷寒門

治法曰凡有寒熱發汗令陽微[illegible]氣虛脈乃數二爲客熱不能消穀胃中虛冷故吐當作寒嘔治之不可用此

寒嘔證治

病者素虛冷或因中脘寒二有声食入即嘔食與飲並出名曰寒嘔或因冷飲傷損或胃口弱或因四濕食甜冷果之所爲也

大半夏湯 治心氣不行鬱生涎飲聚結不散心下痞鞭腸中瀝有聲食入即吐

半夏[illegible]　人參[illegible]　白蜜[illegible]

右分四服每服水二盞蜜一錢重和水揚令勻入藥煎至七分去滓溫服 一法有生薑七片 治法曰嘔家先渴今反不渴者以心下有支飲故也治屬支飲

茯苓澤瀉湯 治同前 方見霍亂門

食嘔證治

病者胸膈脹滿或脅肋脹悶食飲食入即嘔胸膈痞塞吐噫食酸此名曰食嘔此由飲食傷脾胃谷不化之所爲也

大七氣湯 治飲食傷脾胃谷不化朝食暮吐暮食朝吐上氣複入或泄瀉致令脾胃虛不調及胃經寒氣在下二氣逆亂而上不入嘔不消食

厚朴去皮　生薑研細　肥棗[illegible]　白朮

山茱萸　人參　川芎　橘皮

當歸　五味子　藿香　甘草炙

半夏湯洗　白茯苓

右爲粗散每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎七分去滓空心服或爲細末米湯調下亦快

治中湯 治嘔而[illegible]治[illegible]飲食不化[illegible]見食則[illegible]

[illegible]嘔[illegible]

人參　白朮　乾姜炮

青皮　陳皮各等分　甘草炙

右爲粗散每服四大錢水一盞半煎七分去滓大便秘入大黃棋子大兩枚

血嘔證治

病者心下淡食入即嘔血隨食出名曰血嘔此由瘀蓄冷血聚積胃口之所爲也

茯苓湯 治[illegible]血大[illegible]嘔吐食飲及[illegible]

半夏[illegible]　白茯苓　熟地黃　陳皮

細辛　人參　川芎

桔梗　甘草[illegible]

右為剉散每服四大錢水二盞薑七片煎七分去滓空
腹服有瘀熱煩渴口燥者去桂及煩躁者加荊芥知母(?)
冷下利者去地黃入桂心 嘔者加生薑 大便祕者
去地黃加大黃一兩八錢黃芩六錢

**蒲黃散** 治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起或因
熱損發或因酒發並宜服之

蒲黃 乾薑炮 熟地黃 桑白皮
小薊 羚羊角鎊 阿膠炒各三兩 白朮
芍藥各半兩 黃芩 甘草炙各半兩

右為剉散每服三錢水一盞竹茹一塊如指大煎至八
分去滓入伏龍肝末一錢匕頭髮灰半錢匕蒲黃半錢匕
又煎至七分不以時溫服

氣嘔證治

病者心膈脹滿氣逆於胸間食入即嘔嘔盡却快名曰氣嘔胃
者足陽明合榮於足今隨氣上逆結於胃口故生嘔病也

**茯苓人參湯** 治氣嘔胸膈脹悶不納食嘔逆吐涎水頭疼
足冷 茯苓 黃芪 陳皮各五兩 人參三兩

右為剉散每服四大錢水一盞半薑五片棗二枚煎七
分去滓不以時服

**木香湯** 治心下虛痞飲食不入時時嘔噦短氣或大病
將理不復胃氣無以養日漸羸弱

木香 人參 桂心 桔梗
藿香 白朮各五兩 茯苓半兩 枳殼麩炒去瓤
甘草炙 厚朴薑製

右為剉散每服五錢水二盞入炒姜絲一分煎七分去
滓食前服

漏氣證治

病者身背皆熱肘臂攣痛其氣不續膈間厭悶食入則先吐
而後下名曰漏氣因上焦傷風開其腠理上焦之氣慓悍
滑疾遇開即出經氣失道邪氣內著故有是證

**麥門冬湯** 治上焦伏熱腹滿不欲食食入胃未定汗出身背
皆熱或食入先吐而後下名曰漏氣

麥門冬去心 生蘆根 竹茹 白朮各五兩
甘草炙 茯苓各二兩 橘皮 人參
萎蕤各三兩

右為剉散每服四大錢水一盞半薑五片陳米一
撮煎七分去滓熱服

走哺證治

病者下焦實熱大小便不通氣逆不續嘔逆不禁名曰走哺
此下焦氣起於胃下口別入回腸注於膀胱并與胃傳糟粕
而下大腸令大小便不通故知下焦實熱之所為也

**人參湯** 治下焦伏熱氣逆不續大小便不通嘔吐不禁名曰
走哺

人參 萎蕤 黃芩 知母
茯苓各三分 白朮 橘皮 生蘆根
梔子仁各半兩 石膏煆一兩

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服

**厚朴湯** 治上焦虛寒短氣不續語聲不出少冷多好唾白沫清涎噫氣吞
酸此由上焦虛寒

厚朴薑製 白茯苓 川芎 白朮
玄參 吳茱萸湯洗 桔梗 附子炮去皮臍
人參 橘皮各三分

右爲剉散每服四大錢水一盞半薑五片煎七分去滓
溫服

**猪苓散** 治嘔吐病在膈上思水者欲解也

猪苓去皮 白茯苓 白术各等分

右三味末之飲服方寸匕

凡例

凡先嘔却渴者此爲欲解先渴却嘔者爲水停心此屬飲家又復實者長飲熱在胃嘔者依傳義後證治之若胸弱脾瘀而嘔者此屬寒內攻宜急依腳氣門治之更有婦人懷娠惡阻嘔吐亦各從其門類或中毒而嘔以解毒藥解之酒家嘔吐當以解酒毒藥之其如三焦漏氣走哺嘔吐則見上門泄利則見下利門各從其類也　然嘔不得輒用利藥嘔而利則復其病後向下不利利之即愈

**咳逆論證**

咳者咳逆也亦曰吃則謂之咳逆凡吐利後多作咳逆大率胃實即噦胃虛則咳此由胃中虛膈上熱故咳或至八九声相連收氣不回至於驚人若傷寒久病得此甚惡內經所謂壞府者是也操上書釋云津泄者却臨當之病声嘶者却發欬之證葉篋若知橘木之推于此三物衰壞之徵以此嘔故知是病深之候也亦有咳而心下堅痞眩悸者以膈間有痰水所爲其能辨則各有治法

咳逆治法

**橘皮竹茹湯** 治咳逆嘔噦胃中虛冷每一咳至八九声相連收氣不回至於驚人

橘皮二兩 人參一兩 甘草炙半兩

右爲剉散每服四錢水一盞半竹茹一小塊薑五片棗二个煎七分去滓不以時服

**羌活附子散** 治咳逆

羌活 附子炮 茴香炒各半兩 木香
乾薑炮 丁香各一兩

右爲末每服二錢水七分盞鹽一捻煎數沸空腹服

**丁香散** 治咳逆噎汁

丁香 柿蒂各一分 甘草炙 良薑各半分

右爲末用熱湯點二錢乘熱服不以時

又一方羌活附子散方見嘔吐門

宿食證治

夫中脘有宿食留胃有宿食則酸出後酸而噫醋宿食者病人之脉見也

**紅丸子** 治中脘宿食留飲酸蜇心痛口吐清水噫宿食

荊三稜 蓬莪朮各二兩 青皮 胡椒 陳皮一兩

右爲末醋糊別炒神麯末煮糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸薑湯下不以時服

**感應丸** 治宿食留飲聚積中脘噫氣吞酸心腹疼痛并療中虛積聚及積臟腑滑泄赤白痢下

丁香 巴豆去皮 縮砂仁 胡椒
烏梅去核

右件各一兩爲細末以醋糊爲丸如綠豆大每服五七丸熟水下食後臨臥服

宿食叙論

夫宿食之證從口入者宿食也五味入口所以養五臟得之則生不得則死傷之則反爲害所以宿食爲雜病之先若五臟不正食不消化血氣留滯鬱起宿食所因

此治之當量其虛實淺深爲之，食生冷，或不得用巴豆
今所青者不能生人，豈有食積非巴豆不可，所謂極平可謂之亦
無畏

[illegible] 因傷生冷生果，最爲人脾胃不壯，不能消食積，而又食於
三焦，積然[illegible]，心腹脹滿，下利，不欲
食，各有所因，若胃實執食[illegible]，氣口脈數而滑，宜下
之，食在胃口，其脈浮大，按之反濇，尺脈亦微而濇，宜消

宿食治法

[illegible] 治[illegible]寒氣[illegible]，[illegible]悶痛，或吐利，不食，[illegible]
吐，大小便不通，泄瀉，及四肢浮腫

木香　硇砂　蓬莪朮　胡椒
巴豆　乾漆　縮砂仁　桂心
青皮　訶子　三稜　白姜　一兩

右爲末，糊丸如梧子大，每服二十丸，生姜[illegible]湯下
空心服

[illegible] 治宿食中積，冷氣弱有傷，不能消化，心下脹滿，
吞酸，噫氣，吐逆，心腹疼痛，胸膈痞悶，或傷寒泄瀉，久
痢赤白，膿血相雜，米穀不消，久病形羸，面黃，口淡，不能飲
食

丁香　川姜　百草霜　木香　一兩半
肉豆蔻　京三稜　巴豆　杏仁
酒蠟　油一兩　丁香一兩

右除巴豆、杏仁外，並爲細末，次下巴豆、杏仁，研和勻，先
將油煎蠟令化，傾在藥末內，和成劑，入臼內杵千餘
下，旋丸如綠豆大，每服三五丸，熟水吞下，食後臨臥服
小兒如黍米大，二三丸

泄瀉敘論

方書所載，瀉利與經中所謂洞泄、飧泄、溏泄、濡泄、水穀
注下等，其實一也，乃所因有內外不內外，差殊耳。經云：寒甚
爲泄，春傷風，夏必飧泄，論云：熱濕之氣，久客腸胃，滑而利下，皆
外所因，喜則散，怒則激，憂則聚，驚則動，臟氣隔絕，精神奪散，
必致溏泄，皆內所因，其如飲食生冷，勞逸所傷，此不內外因。
以此類推，隨證主治，則不失其病源也。

泄瀉治法

[illegible] 治臟腑虛，爲風濕寒所搏，冷滑注下不禁，老人虛人
危篤累效

附子　肉豆蔻　白茯苓　桂心
白姜　木香　丁香

右爲末，糊丸如梧子大，米湯下五十丸，空腹服

[illegible] 治腸胃虛冷，泄瀉注下，無度，脾虛氣閉，不進飲食
厚朴　白朮三兩　肉豆蔻　陳皮各三兩
訶子　赤石脂

右爲末，糊丸如梧子大，空腹米湯下五十丸，常服暖
脾胃

[illegible] 治脾胃虛弱，及腸胃冷，飲食不消，或泄瀉不止，或作滑
下，久變五色，穢臭

鍾乳粉　赤石脂　枯礬　乾姜
茯苓　石斛　五味子　桂心
澤瀉　桑寄生　遠志　人參
栢子仁　當歸　酸石榴皮　龍骨
天雄　牡蠣粉　白頭翁　甘草

右爲末，蜜丸梧子大，米湯下三十丸，空腹服

[illegible]治臟腑虛寒泄瀉腹痛及婦人產後泄瀉危篤
者
藿香葉　草荳蔻仁　青皮各四兩　甘草炙
丁香各半兩　肉荳蔻麵裹煨　烏梅去核
右剉散每服四錢水一盞半糯米一撮煎七分去滓空腹
服

[illegible]丸　治脾胃不和不進飲食泄瀉腸虛滑老人虛人尤
宜服之
[illegible]　白姜炮一兩　川椒去目炒
肉荳蔻麵裹煨　木香一兩　附子炮去皮臍　神麯炒
右為細末煮米飲為丸如梧子大食前米飲下五十丸

[illegible]丸　治[illegible]泄瀉無度
黃連[illegible]　烏梅肉　當歸　川椒去目
桂心　乾姜炮各等分
右為末糊丸梧子大每服三五十丸米飲[illegible]服

實熱泄瀉治法
承氣湯　治下痢譫語者有燥屎故也　大承氣湯[illegible]夫泄瀉
卻用大黃者乃通因通用也若大實熱物須用之

冷熱泄瀉治法
[illegible]姜散　治冷熱泄瀉
生姜四兩　黃連一兩
右皆剉如豆大一處慢火炒令姜焦赤去姜揀黃連為
細末每服二錢空腹臘茶清調下或用姜為末米飲調
治白痢亦效

[illegible]散　治五泄或青白五色雜下休作無時
烏頭[illegible]　厚朴[illegible]　甘草炙　乾姜[illegible]

右為末每服二錢水一盞[illegible]三片煎七分熱服

[illegible]
川芎[illegible]　[illegible]米[illegible]
右為末姜汁糊為丸梧子大空心米湯下五六十丸

[illegible]丸　治脾胃受濕泄利不止及米谷不化小兒疳痢並宜
服之
黃連　吳茱萸湯泡　白芍藥各等分
右三味同炒為細末米糊丸如梧子大每服二三十丸
米湯空腹下小兒量與之

[illegible]　治脾胃[illegible]不止食積不消癥瘕結大腸滑泄注下
利腹痛腸鳴
蒼朮炒二兩　神麴炒二兩　茴香炒　草果[illegible]
厚朴[illegible]　乾姜炮　陳皮各一兩　木香半兩
甘草[illegible]半兩
右為末脾泄瀉[illegible]湯入鹽調下二錢腸虛腸鳴氣不
和瀉不止炒姜酒調下常服鹽湯點空心食前服

料簡
凡治瀉須先理中焦如理中湯丸等是也次即分利水谷如
五苓散等是也治中不效然後斷下即用禹餘糧赤石脂等
是也玉機真藏論云五虛死謂脈細皮寒少氣前後泄利飲
食不入得此必死其有生者漿粥入胃泄注止則[illegible]也又金
匱云六腑氣絕於外者手足寒上氣腳縮五臟氣絕於內者
下利不禁甚者手足不仁脈沉弦者為下重脈大者為未止
泄利手足厥冷無脈灸之不溫脈不還微喘者死有微熱而
渴自汗脈[illegible]數頭汗出[illegible]而面少赤身
微熱[illegible]汗出而解[illegible]所以然者以其面戴陽下虛故

此泄利後腹脹滿，胃氣將[illegible]，宜四逆湯，後攻表，宜桂枝湯。上件金匱動文出於三因，不分明其脉，不可不究。既用四逆治病，不如用桂枝加附子治病，其本附加桂。泊傷濕五苓散治傷暑，可備[illegible]。又古方泄利与滯下共爲一門，千金又以宿食不消冷熱[illegible]後等[illegible]，明不可甄別也。

三因極一病證方論卷之十一

三因極一病證方論卷之十二

帶下敘論

經中所載，有血崩、血瘕、血便、帶下。古方謂有帶下瘕聚，血又帶下，共爲四門，未爲至當。近世並爲崩疾，其實一也。今以[illegible]執理而言，且崩中、帶下，血与利膿，但名狀大別，崩中、帶下赤白，當作溼論。而崩利清血与膿，皆作中帶下論之。帶下赤白者，宋當[illegible]，執相搏，非干崩漏，餘[illegible]帶下。利清血亦多与中熱有大異，若所須[illegible]不可道。所治法差互，並見夭傷，蓋之論之。

帶下三因證治

婦人帶下，人皆知赤爲熱，白爲冷，而不知此皆下，清血爲風，下如豆羹汁爲濕。夫六氣之傷人，初無輕重，以暑熱一氣，濕同原，故而爲四。則兼風溼不可勝處。古方云，風冷入於胞[illegible]，虛入容腸胃，或下[illegible]，或下[illegible]。下天度[illegible]之，如豆羹汁者，外所因之明文也。古方有[illegible]，其所發，使利膿血作青黃赤白黑，不同者，即內所因也。又飲服冷，挾傷[illegible]，或[illegible]，房[illegible]，[illegible]精血傷胃，[illegible]不內外因之，[illegible]其[illegible]，以乎其外，察其[illegible]，[illegible]其[illegible]，內外[illegible]，白不至[illegible]也。

白[illegible]治[illegible]下，[illegible]月不[illegible]

白[illegible]二兩　[illegible]　[illegible]皮

右爲[illegible]散，每服四大錢，水一盞半，煎七八分，去滓服。

[illegible]治[illegible]腹痛下如魚腦白[illegible]

赤石脂　[illegible]

右爲末，[illegible]米飲下二三五十丸。

胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛
滿腸鳴㽲痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜無度
並宜服之 方見失血門

[illegible]治[illegible]下積

杏仁 七個去皮尖 苦參 [illegible] 烏梅 兩個 草果 一個
酸石榴皮 半個 青皮 [illegible] 甘草 寸
右為剉散作一劑水二盞生姜三片煎七分熱服[illegible]
宿食早空心服

[illegible] 治脾胃虛弱泄利米穀不化
黃連 [illegible] 白芍藥 [illegible]
右為末每服一錢水一盞煎至七分溫服
[illegible]治冷熱下痢赤白如魚腦日夜無度腹痛不可
著
黃連 六兩 阿膠 [illegible] 當歸 [illegible] 乾姜 二兩
右為末醋煮米糊為丸如梧子大米飲下五十丸[illegible]

[illegible]丸 治冷熱痢
罌粟殼 [illegible] 甘草 [illegible]
右為剉散每服四錢以百沸湯[illegible]七分[illegible]急用[illegible]之候
溫澀治者服血痢入烏梅一個[illegible]不欲治痢
近用之極效其功不下[illegible]服之
則極不可不知

固腸湯 治腸虛下痢赤白頻併日久無度老幼產婦俱可服
罌粟殼 [illegible] 白芍藥 [illegible]
橘紅 當歸 甘草 [illegible] 訶子 [illegible]
木香 人參 白姜 [illegible]
右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

[illegible]丸 治下痢赤白日夜無度及泄瀉注下
[illegible] 入蒜 [illegible] 罌粟殼 [illegible]
右三物一處[illegible] 一宿次日慢火炒
香熟[illegible]不可[illegible]細為末
米飲[illegible]每服[illegible]米湯下

[illegible] 治下痢赤白無問久近長幼皆可服
罌粟殼 [illegible] 草果 [illegible] 白朮 [illegible] 甘草 炙
茯苓 一分
右為剉散作一劑水一大盞姜七片棗七個煎至一大
盞分二服空心溫下純赤加黑豆二十七粒白則加炮
乾姜 一錢

[illegible]湯 治[illegible]痢赤白
罌粟殼 [illegible] 地榆 六兩 白朮 紫蘇葉
木香 [illegible]
右為剉散每服四錢水一盞半姜七片棗一個煎七分去
滓空心服

[illegible]散 治腸胃虛弱風冷停滯腹脹泄瀉水穀不化下膿血㽲
痛[illegible]裏急後重日夜無度
當歸 芍藥 甘草 [illegible]
厚朴 [illegible] 青皮 陳皮 各一兩 訶子 [illegible]
木香 一分 罌粟殼 [illegible]
右為末蜜丸一兩作十丸每服一丸水一盞煎七分食
前溫服
升麻

不可[illegible]則[illegible]
二[illegible]利大[illegible]

遠近血等各有門類不可混雜古方云積冷積熱及水谷實而下利者並以大黃湯下之養生方亦云大則踈滌之更不知去冷熱虛風症虛實之不同後人尋即妄用誤害者多矣吁可傷哉

秘結論治

夫腎主大小腸膀胱者津液之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而入出者也人或傷於風冷暑濕熱盛發汗利小便走枯津液致腸胃燥澁秘澁不通皆外所因或臟氣不平陰陽關格亦使人大便不通名曰臟結皆內所因或飲食燥熱而成熱中胃氣強澁大便堅秘小便頻數謂之脾約屬不內外因既涉三因亦當隨其所因而治之燥則潤之澁則滑之秘則通之寒則溫之各有成法

〔□□丸〕治老人虛人風秘大便秘澁後重疼痛煩悶此藥當量虛

〔□□湯〕

大黃（酒浸）　人參二兩　訶子皮四兩　麻仁二兩（研）

右爲細末煉蜜丸梧子大每服二十丸溫湯溫酒米飲皆可服食後臨臥服

〔麻仁丸〕治趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則堅其脾爲約大便堅小便利而不渴

麻子仁（五兩）　芍藥　枳實（麩炒各八兩）　大黃（蒸）一斤

厚朴（薑汁炒）　杏仁（去皮尖炒研）五兩半

右爲末煉蜜丸如梧子大每服二十丸溫水下未知加五十丸一法麻仁一兩半杏仁三分大黃一兩枳實芍藥厚朴各半兩此依倣古方出本是湯方入湯之大黃枳實一斤正得今之一兩厚朴當用四兩杏仁當用六錢一字麻仁一兩二錢半芍藥一兩乃均制合宜用當以理推

〔半硫丸〕治年高風秘冷秘心腹一切痃癖冷氣暖元臟止泄瀉進飲食

硫黃（研細）　半夏（湯洗七次）

右等分以生薑汁同熬爲餅末搗勻杵數百下丸如梧子大空心溫酒薑湯下二十丸

〔□□丸〕治少壯老人虛秘不通不可服涼藥用此甚効方見霍亂門

〔蜜兌法〕

蜜三合熬少許則如餳出冷水中捏如指大長二寸許納下部即通

脫肛論治

肛門爲肺之候大腸肺之腑實則熱熱則肛門閉塞虛則大腸寒寒則肛門脫出又婦人產育用力過多及小兒叫呼及久利後皆使肛門脫出

〔釣腸丸〕治肛門腸風或內痔泄瀉或因用力脫出不收

蝟皮（燒存性）一個　磁石（煅醋淬）半兩　桂心半兩

右爲末飲方寸匕忌舉重及房室月後治女人陰脫

〔香荆散〕治肛門脫出大人小兒悉主之

香附子　荊芥穗（各等分）

加當歸一枚燒灰研入

右爲末每用三匙水一大碗煎十數沸淋

〔又方〕用五倍子爲末每用三錢水一碗煎減半入白礬一塊安小桶子內洗之立効

〔鐵粉散〕治脫肛歷年不愈

鐵粉研細每用少許摻之按令入即愈

〔又方〕用木賊不以多少燒存性

右為細末摻肛門上按之

【水聖散】治小兒脫肛不收用浮萍草不以多少

右杵為細末有患用前藥乾貼

【又方】用東刀水洗亦妙

淋閉論

淋古謂之癃名稱不同也癃者罷也淋者滴也今名虽殊其義為得古今皆以心腎氣鬱致小腸膀胱不利復有冷淋濕淋熱淋等屬外所因既言心腎氣鬱与夫驚憂恐思即內所因況飲啖冷熱房室勞逸及乘急忍溺多致此病豈非不內外因三因備明上淋通貫血證状不一皆可類推所謂得其要者一言而終也

淋證治

【諸淋大要】有五曰冷曰熱曰膏曰血曰石五種不同皆以氣為本多因淫情交錯內外兼并清濁相干陰陽不順結在下焦遂為淋閉

【生附湯】治冷淋小便秘澁數起不通竅中疼痛憎寒凜凜多因飲水過度或為寒泣心虛志耗皆有此證

附子去皮臍生 滑石各半兩 瞿麥 木通各三分 半夏湯洗七次三分

右為末每服二大錢水二盞姜七片灯心二十莖蜜半匙煎七分空心服

【石韋散】治熱淋多因腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或便出砂石

木通 石韋去毛各二兩 甘草 當歸 王不留行各一兩

滑石 白术 瞿麥 芍藥 葵子各三兩

右為細末每服二錢煎小麥湯調下食前日二三服治大病餘熱未解後為淋者

【地髓湯】治下焦有熱及諸淋閉不通

地膚子三兩 知母 黄芩 豬苓去皮

瞿麥 枳實麩炒 升麻 通草

葵子炒 海藻洗去鹹各一兩

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓空心服大便俱閉者加大黃女人房勞小便難大腸泄痛脉沉細者用花腎一枚水一盞煎至半去腎下藥煎七分服

【鹿角霜丸】治膏淋多因憂思失志意舍不寧濁氣干清小便淋閉或復黃赤白黯如脂膏狀疲劇筋力或傷寒湿多有此證

鹿角霜 白茯苓 秋石各等分

右為末糊丸梧子大每服五十丸米湯下

【[illegible]】治淋及尿血

葎草

右搗汁二升醋二合和空腹服一盞又濃煮汁飲亦治淋瀝尿血

【[illegible]】治血淋多因下焦結熱小便黃赤淋閉疼痛所出如血或外挾風冷風熱或內傷志勞神或房室過度丹石發動使然亦有為風熱傷心瘀血者為風冷傷腎及大小便俱出血者

瞿麥穗一兩 甘草炙三分 山梔子半兩炒

右同為末每五錢至七錢水一盞入連鬚葱根七本灯心五十莖生姜五片同煎至七分時時溫服不拘時候概云血冷則凝此藥未必能治耳宜木通湯下鹿茸鹿茸丸兎絲子丸等所以兼言之又不可專以血得熱則淖溢為說於理甚明不復評引鹿茸丸兎絲子丸方具

後集淋閟門

石燕丸 治石淋多因憂鬱氣注下焦結所食鹹氣而成令人小便碜痛不可忍出沙石而後小便通

石燕子(燒令通赤水中淬三次研) 滑石 石韋(去毛) 瞿麥穗(各一兩)

右為末糊為丸如梧子大煎瞿麥燈心湯下十丸食前服日二三服即以石韋去毛瞿麥穗木通各四錢陳皮茯苓各三錢為末每服三錢以水一盞煎七分去滓服

[illegible] 治諸淋疼痛不可忍受及沙石淋

大蘿蔔切一指厚四五片好白蜜淹少時安净鐵鏟上慢火炙乾則又蘸蜜炙令一兩蜜盡稍炙令香軟不可焦假溫細嚼以鹽湯一盞送下亦治

沉香散 治氣淋多因五內鬱結氣不得舒暢氣滯於陽而致閉小腹脹滿便溺不通大便分泄小便方利

沉香(不見火) 石韋(去毛) 滑石 王不留行 當歸(酒浸各半兩) 葵子(炒) 白芍藥(各三分) 甘草(炙) 橘皮(去白一)

右為細末每服二錢煎大麥飲調下飲調亦得食前

[illegible]散 治飲食忍小便或走馬及房勞皆致胞轉臍下急痛不通

亂髮(不拘多少燒灰存性)

右研細每用二錢米醋一合湯少許調服一法与葵子等分為末飲服二錢服之即炒黑二十粒存其一則通

豬苓散 治傷風感寒脈浮發熱渴欲飲水小便不利

豬苓(去皮) 茯苓 澤瀉 阿膠(炒) 滑石(各等分)

右為粗散每服四大錢水一盞半煎七分去滓不以時

五苓散 治傷暑煩渴小便不利用蔥白湯調尤佳(方見[illegible])

判斷

方書中所出淋病證狀不一所謂若冷若熱不能備尽若論其所因而命名如勞如氣如血如膏如風如石皆以五淋等由元寫論治不出三因之所致也當詳此推治耳施不可又有轉胞以胞系了戾小便不通證狀自別不可不辨其治之亦當利其小便宜多服腎氣八味丸其中有茯苓故也

遺尿失禁論治

經云膀胱不利為癃不約為遺溺皆乃心腎氣傳送失度之所為也故有小便而遺者有未覺而出不自知又婦人產蓐產理不順致傷膀胱遺尿無時又小兒胞冷尿出亦有盛人皆治之各有方

家韭子丸 治少長遺尿及男子虛劑陽氣衰敗小便白濁夜夢泄精此藥補養元氣進美飲食

家韭子(炒六兩) 鹿茸(四兩酥炙) 蓯蓉(酒浸) 牛膝(酒浸) 熟地黃 當歸(各二兩) 巴戟(去心) 菟絲子(酒浸各一兩半) 杜仲(炒) 石斛(去苗) 桂心 乾姜(炮各一兩)

右為末酒糊為丸如梧子大每服五十丸加至百丸空心食前鹽湯溫酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也別作一等小丸服

[illegible] 治小便遺失不禁

[illegible]兩 牡蠣(煅) [illegible] 鹿茸 [illegible]

右為剉散每服四大錢水一盞煎七分空心服(一方作細末酒調亦好)

[illegible]丸 治心腎俱虛神志不守小便淋瀝或不禁及遺精白濁

赤茯苓 白茯苓(各等分)

右為末以新汲水投洗澄去新末控乾別取𢈔黃一分研
与好酒銀石器內熬成膏搜和為丸如彈子大空心鹽
酒嚼下常服輕身延年

雞內金散 治遺尿失禁

雞肶胵一具并腸洗曬乾焙 雞腸男用雌者女用雄者

右研細每服方寸匕酒飲調服

又方 用羊肚系盛水令滿線繫兩頭煮熟取中水頓服

又方 用豬脬洗淨炙焦 上炙香熟嚼細溫酒下

九虫論

古方論列臟腑中九虫雖未必皆有亦當備識其名狀若蚘
虫則固不待言而知其它皆由臟虛弱食甘冷肥膩節宣不
時腐敗蓄積之所生也又有神志不舒精微失守及五藏勞
熱又病餘毒氣血積鬱而生或食果菜与夫畜獸內臟遺留
諸虫子類而生不可具載亦猶生殺各非九數可盡姑列諸
說為參考備

九虫例

九虫者一曰伏虫長四分為群虫之長二曰白虫長一寸相
生至多其母長至四五丈則殺人三曰內虫狀如爛杏令人
煩滿四曰肺虫其狀如蚕令人咳五曰胃虫狀如蝦蟆令人
吐逆嘔噦六曰弱虫狀如瓜瓣令人多唾七曰赤虫狀如生
肉令人腸鳴八曰蟯虫至微細狀如菜虫居洞腸間多則為
痔劇則為癩瘡疥癬無所不為九曰蛔虫長一尺貫心則殺人又
有尸虫与人俱生狀如犬馬尾或如薄筋依脾而居長三寸
許大害於人然多因臟虛寒勞熱而生治之各有方

九虫治法

烏梅圓 治蚘厥令病者靜而復煩此為臟寒蚘上入膈故煩須臾
復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人自吐蚘

烏梅三百個 當歸 川椒去目 細辛 附子炮去皮
桂心 人參 黃蘗各六兩 乾薑十兩 黃連八兩

右為末以苦酒漬烏梅去核蒸之五斗米下熟搗
成泥和藥相得內臼中与蜜杵二千下圓如梧子大
食前飲服十圓稍加至二十圓

檳榔圓 治因臟腑虛弱或多食甘肥致蚘虫動作心腹絞痛
發則腫聚往來上下痛有休止腹中煩熱口吐涎沫是蚘
咬定服此藥取虫下是服之亦愈又治下部有虫生痔

木香 鶴虱炒 檳榔 訶子煨去核
蕪荑炒 附子炮去皮臍 乾姜炮各半兩 大黃一兩半

右為細末蜜圓如梧子大每服三十圓食前橘皮湯下
婦人醋湯下

化虫圓 治寸白虫兼治諸虫

硫黃研 木香半兩 蜜陀僧 附子生去皮臍各一兩

右先以附子末用好醋一升熬成膏入三藥和圓如綠豆
大每服二十圓食前荊芥茶清下故治下虫即化為水

檳榔散 治諸虫在臟腑久不差

檳榔半兩

右為末每服二錢至三錢煎蔥茶湯調下空心食前服

咳嗽敘論

人之所以滋養其身者惟氣与血呼吸定息衛氣之常失常
則為咳嗽津液流潤榮血之常失常則為痰涎咳嗽吐痰
血已亂矣咳出於肺大率不外乎氣不能淨敷若論其致病
之因不一出謂五臟皆以其時而受之更之內因七情

六淫飲食起居房勞叫呼皆能單復緣互而為病故經云五臟六腑感寒熱風濕皆令人咳又微寒微咳厲風所吹聲嘶發咳熱在上焦咳為肺痿秋傷濕冬咳嗽皆外所因若喜則氣散怒則氣激憂則氣聚思則氣結悲則氣緊恐則氣劫驚則氣亂皆能發咳即內所因其如飲食生冷房勞役致咳冬冬皆不內外因其可一法而治之治之當推其三因隨脈證治療散之下之溫之吐之以平為期

外因證治

傷風咳者憎寒壯熱自汗惡風口乾煩燥傷寒咳者憎寒發熱無汗惡寒煩躁不渴傷暑咳者煩熱引飲口燥或吐涎沫聲嘶咯血傷濕咳者骨節煩疼四肢重著洒洒淅淅並屬外所因診其脈浮為風緊為寒數為熱細為濕隨其部位與人迎相應推其脈則見病源也

內因咳嗽證

喜傷心者咳而喉中介介如腫狀甚則咽腫喉痹名為心咳不已則小腸受之小腸咳狀與氣俱失怒傷肝者咳而兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿名為肝咳不已則膽受之膽咳之狀咳嘔膽汁思傷脾者咳而右脇下痛隱隱引肩背甚則不可以動動為脾咳不已則胃受之胃咳之狀咳而嘔嘔則長虫出憂傷肺者咳而喘息有聲甚則唾血名為肺咳不已則大腸受之大腸咳狀咳而遺屎恐傷腎者咳而腰背相引痛甚則咳涎名為腎咳不已則膀胱受之膀胱咳狀咳而遺溺久咳不已則三焦受之三焦咳狀咳而腹滿不欲食此等皆聚於胃關於肺肺取脈創最近故內因多先有所感由人並名肺咳嗽出並屬內所因診其脈隨其部位與氣口相應浮緊則虛寒沉數則實熱弦濇則少血洪滑則多痰以此類推無施不可

不內外因咳嗽

病者咳嗽發作寒熱引腰背痛或復喘滿此因房勞傷腎病者中滿腹脹抱心痛不欲食此因飢飽傷脾病者咳嗽左脇偏痛引小腹並膝腕疼此因疲極傷肝病者咳嗽吐白涎口燥聲嘶此因叫呼傷肺病者咳嗽煩熱自汗咽乾咯血此因勞神傷心並屬不內外因診其脈隨其類假如尺脈浮濇而數則知傷腎右關脈濡則知飲食傷脾左關脈弦短則知疲極傷肝但不應人迎氣口者即是不內外因皆可類推

咳嗽治法

[illegible] 治肺虛咳嗽或風寒暑濕及勞逸抑鬱憂思喜怒飲食飢飽致臟氣不平咳唾膿血漸成肺痿憎寒發熱羸瘦困頓皮毛[illegible]將成勞瘵

甜葶藶 炒 苦葶藶 [illegible] 人參

射干 [illegible] 桔梗 剉炒 杏仁 去皮尖

紫菀 款冬花 甘草 炙 陳皮 [illegible]

右為細末用羊肺一具不必血不透者切細研爛旋旋入藥於肺內再研勻藥盡為度泥土塗上以濕紙三重盖覆每日去紙曬乾候乾刮下再研羅為細末每服貳錢溫酒鹽湯調下米飲亦得空心日三服

五子湯 治秋冬之交皮膚為寒濕所薄寒氣內折咳嗽晝夜不已

陳橘皮 麻黃 去節 甘草 炙 杏仁 去皮尖

五味子 白茯苓 [illegible]

右為末每服貳錢水壹盞煎柒分去滓帶熱服食後臨卧日三服

白朮湯治五臟傷冷咳嗽痰涎憎寒發熱上氣喘急
白朮二兩 五味子 茯苓各一兩 甘草一分
半夏四個湯洗七次破作八片
右爲麤散分作十六服水一盞生薑五片半夏一片
煎至七分去滓服
丁香烏梅丸治陽氣虛寒外感風冷咳嗽痰涎胸膈痞滿
不能飲食口乾咽燥
烏梅去核四兩 紫蘇 木瓜各二兩 茯苓去皮二兩
甘草一兩 檀香半兩 人參七錢 麝香一字
右爲末用蜜一斤煉二兩爲丸如櫻桃大含化不以時
人參湯治肺虛不能制下大腸泄瀉上氣喘咳服諸藥
不效
人參 款冬花 罌粟殼去頂蜜炙各等分
右爲粗散每服四大錢水一盞半阿膠一片烏梅半个
同煎七分去滓臨卧止者唯急嗽者服
太白丹治肺氣衰咳嗽咽痛元虛
通明白礬枯研 陽起石 鍾乳 寒水石各等分
右研勻共爲細末丸如雞頭大每服一丸先嚼生姜胡桃
各一片令細吸太陽氣和藥咽下用茶清或溫酒送下
阿膠散治一切咳嗽老人虛人皆可服
阿膠炒 馬兜鈴去殼 五靈脂研 桑白皮蜜炙
甘草炙各一分
右爲末每服一錢水一盞煎六分通口食後夜卧服
五味子湯治一切咳嗽吐痰涎惡風不食
人參 白朮 川芎 當歸 五味子
甘草炙 木瓜去核 紫蘇子炒 伏神 烏藥去皮

杏仁去皮尖炒 桂心 白芷各等分
右爲末每服二錢水一盞薑三片棗一个同煎七分溫服
杏仁煎治暴嗽失聲不語
杏仁去皮尖研 桑白皮 生姜取汁 蜜
木通 貝母各一兩 紫菀 五味子各一兩 砂糖各半
右將桑白皮木通貝母紫菀五味子爲粗散以水三升
煎取一升半去滓入杏仁糖蜜並姜汁微火熬成膏
含化
紫菀散治元氣虛冷上氣咳嗽久年不差
蛤蚧一對酥炙 款冬花 肉桂
白礬枯研 甘草炙
右爲末每服半錢用薄荷紙裹或煎乾即用米飲調
下空心食前
款冬丸治遠年咳嗽諸藥不效者
款冬花
右一味爲末如上燒以筒吸熏咽下
以茶清送下
百部丸治久年咳嗽不愈者
附子
右爲末每服一錢入砂蜜一錢水一盞煎七分通口服
青金丹治肺虛咳嗽喘滿咯血
杏仁一兩 牡蠣
右研勻入黃蠟二兩溶和丸如彈子大壓扁如餅
用中日柿一个去核入藥在內濕紙裹煨約藥熔方取
出去火毒細嚼糯米飲送下一方治咳出血
片兼從內有血腥不問年久月深但一服效用青

鹽一分牡蠣粉一錢七杏仁七粒去皮尖研蠟丸了湯使也同前

治肺痿久欬嗽治氣壅痰嗽咯血及傷冷傷熱咯血嘔痛

方見熱痰門

神效散治老少喘嗽神效

杏仁去皮尖麩炒 甘草炙 旋覆花各二兩 白朮

蓮肉去心皮 射干米泔浸 前胡 御米罌粟炒

百合蒸 白扁豆姜汁炒 川芎各三兩 人參

白茯苓各四兩 神麯炒五兩 桑白皮炙 乾葛各六兩

桔梗七兩

右爲細末每服二錢水一盞姜三片棗一個煎七分食前溫服





痰飲敘論

人之有痰飲病者由榮衛不清氣血敗濁凝結而成也內則七情泊亂臟氣不行鬱而生涎涎結爲飲爲內所因外有六淫侵冒玄府不通當汗不泄蓄而爲飲爲外所因或飲食過傷嗜欲無度叫呼疲極運動失宜津液不行聚爲痰飲屬不內外因三因所成證狀非一或爲喘或爲咳爲嘔爲泄暈眩嘈煩忪悸懊憹寒熱疼痛腫滿攣癖癃閉痞隔如風如癲未有不由痰飲之所致也

痰飲證論

古方唯分四飲六證不說三因不知其因病無自斷夫治飲之法既用大小青龍桂枝防己五苓澤瀉等得非外因參蘇飲八味丸非內因十棗禹餘糧大小半夏控涎破飲不內外因理固明矣以此推求頗得倫類今敘列諸證以爲治法今因病用湯藥者自宜詳審所謂四飲者即懸飲溢飲支飲痰飲是也懸飲者飲水流在脅下咳唾引痛溢飲者飲水流於四肢當汗出而不汗身體疼重支飲者咳逆倚息短氣不得臥其形如腫痰飲者其人素盛今瘦腸間瀝瀝有聲又有留飲者背寒如手大或短氣而渴四肢歷節疼脅下痛引缺盆咳嗽則轉甚又有伏飲者膈滿喘咳嘔吐發則寒熱腰背痛目淚出其人振振惡寒身瞤惕故曰四飲生六證或云五飲者即留飲伏飲合爲一證也其脈皆弦微沉滑治之之法懸飲當下之溢飲當發其汗支飲則隨證汗下痰飲則用溫藥從小便去之其間或隨氣上厥伏留陰經使人恒吐頭眩背寒或一臂不遂有類風痹不可不知

痰飲治法

【十棗湯】治懸飲咳唾引脇下痛又治支飲咳煩胸中痛至百
日一歲脈弦者
芫花熬 甘遂 大戟炒
右等分爲末水一盞半煮棗十枚煎至八分去棗調藥強
人一錢羸人半錢平旦溫服不下者次日更加半錢下
後糜粥自養若已下不可再與之
【大青龍湯】治溢飲身體疼重汗不出拘急痛
麻黄去節 桂心 甘草炙各 石膏 杏仁去皮尖
右爲剉散每服肆大錢水一盞半薑伍片棗貳枚煎柒
分去滓空腹服溫覆一服汗者勿再服復服汗出多亡
陽虛逆惡風煩躁不得眠也
【小青龍湯】治溢飲支飲倚息不得臥及喘滿者
麻黄去節 芍藥 細辛 桂心
乾薑炮 甘草炙各 五味子貳兩 半夏湯洗
右爲剉散每服肆大錢水一盞半煎柒分去滓空腹服
渴者去半夏加栝樓根叁錢微利去麻黄加芫花
壹雞子大炒入噎者去麻黄加附子壹枚炮小便不利
者去麻黄加茯苓半兩喘者去麻黄加杏仁叁錢叁字
欬而上氣肺脹其脈浮心下有水氣者胸中痛引缺盆
加石膏一錢半研
【木防己湯】治膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其
脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈
漢防己叁兩 桂心貳兩 人參肆兩 石膏雞子大
右四味爲剉散每服四大錢水一盞半煮柒分去滓溫
服虛者即愈實者三日復發再服不愈宜去石膏加茯
苓芒消壹兩半微利則愈

【厚朴大黄湯】治支飲胸滿
厚朴 大黄 枳實
右爲剉散每服肆大錢水一盞半煎柒分去滓不拘時
【茯苓桂心五味甘草湯】治支飲手足冷多唾口燥氣從小腹上衝胸
咽手足痹面翕熱如醉因復下流陰股小便難時復
冒眩
茯苓肆兩 桂心 甘草炙各 五味子貳兩半
右爲剉散每服肆大錢水一盞半煎柒分去滓空腹服
服之衝氣即低反更咳滿者去桂加乾薑細辛各叁兩
咳滿止而復渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱藥也此法
不當遂渴反止者爲支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔
者復加半夏貳兩半以去其水飲去嘔則止其人形腫
與者加杏仁貳兩半若面熱如醉以胃中熱上熏加大
黄叁兩以利之
【小半夏加茯苓湯】治膈間有飲卒嘔吐心下痞眩悸
半夏 茯苓叁兩
右爲剉散每服肆大錢水一盞半薑柒片煎七分去滓溫
服
【小半夏湯】治支飲嘔吐不渴
半夏湯洗七次
右爲剉散每服四大錢水一盞半薑拾片煎七分去滓溫
服
【葶藶大棗瀉肺湯】治支飲不得息方見[illegible]門
【[illegible]】治瘦人臍下有悸者吐涎沫而癲眩者飲也方見傷寒門
【茯苓湯】治心氣不行鬱而生涎聚結不消月[illegible]以胸中有痰
飲也

茯苓(去皮)　桂心　白朮(各叁兩)　甘草(炙貳兩)
右爲剉散每服肆大錢水壹盞半煎柒分去滓空腹服
小便利則愈

**茯苓飲** 治胸中停痰宿水自吐出痰後心胸間虛氣滿不能食
茯苓　人參　白朮(各叁兩)　枳實(麩炒)　橘皮(去白)
右爲剉散每服四大錢水貳盞煎七分去滓空
腹溫服

**八味圓** 治失精腎虛而生涎疸氣喘嗽當從小便去之中
有茯苓故(方見消渴門)

**參蘇飲** 治痰飲停積胸中中脘閉嘔吐痰涎眩暈嘈煩忪悸
或逆及痰氣中人停留關節手腳嚲痹口眼喎邪半身不
遂食已即嘔頭疼發熱狀如傷寒
前胡　人參　紫蘇葉　茯苓(各三分)　桔梗
木香(各半兩)　半夏(湯洗)　陳皮　枳殼(炒)　甘草(炙各半兩)
右爲剉散每服肆錢水壹盞半姜七片棗壹枚煎七
分去滓空腹服嘔者加乾葛腹痛加芍藥

**破飲圓** 治五飲停蓄胸腹結為癥癖支滿胸脇傍攻兩脇搶
心疼痛飲食不下反胃吐逆九種心痛積年宿食不消久
瘧久痢遁尸疰忤瘕癖癥塊心氣不足憂愁思慮婦人諸
疾但是腹中諸病悉能治療久服不傷臟氣
蓽撥　丁香　胡椒　縮砂仁　烏梅肉
青皮　巴豆(去皮)　木香　蝎梢(等分)
右以青皮同巴豆漿水浸宿次日漉出同炒橘皮焦
去巴豆將所浸水淹烏梅肉炊一熟飯細研為膏丸如
綠豆大每服五七圓臨臥用薑湯下津液下尤佳

**控涎丹** 凡人忽患胸背手腳頸項腰胯隱痛不可忍連筋骨
牽引釣痛坐臥不寧時時走易不定俗醫不曉謂之走注
便用風藥及針灸皆無益又疑是風毒結聚欲為癰疽亂
以藥貼亦非也此乃是痰涎伏在心膈上下變為此疾或
令人頭痛不可舉或神意昏倦多睡或飲食無味痰唾稠
粘夜間喉中如鋸聲多流唾涎手腳重腿冷痹氣脈不通
誤認為癱瘓亦非也凡有此疾但以是藥不過數服其疾
如失
甘遂(去心)　紫大戟(去皮)　白芥子(真者各等分)
右為末煮糊丸如梧子大曬乾食後臨臥淡姜湯或熟
水下五七丸至十丸如疾猛氣實加丸數不妨其效如神

**溫中丸** 治胃脘虛寒冷痰留滯痞塞不通氣不升降口苦無
味不思飲食
高良薑　乾薑(炮)　陳皮　青皮(各一兩)
半夏(湯洗)　一法上件並不炒等
右為末用生薑自然汁煮糊為丸如梧子大每服二
十丸至三十丸生薑湯下凡中滿氣痞服之甚妙

凡例
前證用藥多出漢方但古今劑料有不同已詳前說從今用
見如救定備見前說唯外所因者風寒暑溫
濕皆能閉塞經絡而生涎不待飲水流入四肢而致上溢痰
痛也當以理推無專執

## 喘病證治
夫五臟皆有上氣喘咳但肺為五臟華蓋百脈取氣於肺喘
既動氣故以肺為主病者右手寸口氣口以前脈實者手
太陰經肺實也肺必脹上氣喘逆咽中塞如嘔吐自汗皆
肺實證若氣口以前脈虛者必咽乾無津少氣不足以息也

乃肺虛氣乏也

杏參散 治上氣喘滿倚息不能臥

杏仁 桃仁(麸炒) 桑白皮(各二兩) 人參(一兩)

為細末每服二錢水一盞薑三片棗一個煎七分不以時

補肺散 定喘補心腎下氣

阿膠(炒一兩三錢) 糯米(炒) 馬兜鈴(焙各一兩) 白仙茅 人參(一分)

右為末每服二錢糯米飲調下食後服

定喘(散) 治喘急不能眠臥不拘老幼者

白石英

右為末以官局款冬花散二錢入米末一錢用桑白皮二寸生姜三片棗子一個水一盞半煎至七八分通口服

不可哭只不得用鹽醋調和

麥門冬湯 治大逆上氣喘急咽喉不利止逆下氣

麥門冬(去心) 半夏(湯洗) 人參(一分) 甘草(炙一分)

粳米(一分)

右為粗散每服四大錢水二盞棗二個煎六分去滓空心服

清肺湯 治上氣喘嗽咽喉中外喘息不通呼吸欲絕

紫苑茸 杏仁(去皮尖) 訶子(各二兩) 漢防己

右為粗散每服四錢水一盞半雞子白皮一片煎七分去滓食後服

補肺湯 治上氣不得臥

橘皮 桔梗 紫菀 人參 五味子(各等分)

右為剉散每服四錢水一盞煎六分去滓食後

(知母圓)

貝母 知母 款冬花 阿膠 紫苑茸 白部(去心) 糯米(炒各) 杏仁

右為末將羊肺以水灌洗候水清即以訶子令肺入肺中以糯米泔煮熟如梧子大

每服五十圓食前桑白皮湯下

補氣圓 治氣不足動便喘嗽遠行久立皆不任汗出鼻乾心下急痛若熱不治

杏仁 桑白皮 乾薑

右為末如梧桐大以鍾乳粉為衣每服三十圓空腹米飲下

鍾乳圓 方見

白散子 方見中風門可用

肺痿肺癰敘論

肺為五臟華蓋百脈取氣運動血脈衛養臟腑灌注皮毛將理失宜氣與血亂則成肺痿肺癰矣然五臟皆有癰而獨論此者以肺為金最居于陽而為五臟長多致此病故獨論此餘如內癰兼五臟此病多生故列于嗽飲門之後云

肺痿證治

病者寸口脈數而虛之渴身冷內煩多唾小便反難大便如爛欲咳咳吐乾沫中心中溫溫液液而渴者多因發汗利小便或消渴數服快藥重亡津液致熱故成肺痿

甘草乾薑湯 治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩不渴不咳

泌遺溺所以然者上虛不能制下也

甘草炙四兩　乾薑貳兩炮

右為剉散每服肆錢水壹盞半棗兩個煎柒分去滓溫服

服不拘時候

**人參甘草湯** 治肺痿咳唾涎沫不止咽燥而渴

人參壹兩　甘草炙壹兩半

右為剉散每服肆錢水壹盞半薑伍片棗兩個煎柒分去滓溫服

**甘草湯** 治肺痿咳唾涎出血心中溫溫液液

甘草炙

右為剉散每服肆錢水壹盞半煎柒分去滓溫服

肺癰證治

病者寸口脈數而實按之滑咳唾膿血口中辟辟燥胸中隱痛口乾喘滿咽燥不渴咳唾腥臭時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥故為肺癰始萌可救膿成則難治

**葶藶大棗瀉肺湯** 治肺癰胸膈脹滿一身并面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛咳逆上氣喘鳴迫塞

葶藶 炒令黃研細丸如彈子大

右壹味用水叁盞棗拾枚煎至壹盞去棗入藥煎至柒分食後服金匱令先投小青龍湯壹服乃進此藥

**小青龍湯** 方見咳門

**桔梗湯** 治咳而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿若粥者為肺癰

桔梗壹兩　甘草炙貳兩

右為剉散每服肆錢水壹盞半煎柒分去滓不以時服

治喉痺咽痛

**桃仁湯** 治肺癰

薏苡仁　瓜蔞仁　桃仁去皮尖各壹兩

右為剉散每服肆大錢水貳盞先以葦葉壹握煎取一盞去滓入藥煎至壹盞分食後服或吐膿血勿怪

腰痛敘論

夫腰痛雖屬腎虛亦涉三因所致在外則臟腑經絡受邪在內則憂思恐怒以至房勞墮墜皆能致之方書五種之說未為詳論但古聖論述之諸論既難以討論雖是缺文不可盡廢其有細目綱目庶幾後學以類推尋為治療之典據

要

外因腰痛論

太陽腰痛引項脊尻背如重狀陽明腰痛不可以顧顧則如有所見善悲少陽腰痛如針刺其皮循循然不可俛仰不可以顧太陰腰痛煩熱腰下如有橫木居其中甚則遺溺少陰腰痛引脊內廉厥陰腰痛腰中強急如張弩弦狀此幸六經以為外因治備大抵太陽少陰多中寒少陽厥陰多中風熱太陰陽明多燥濕以類推之當隨脈別其如經中有解脈散脈同陰會陰陽維衡絡直陽飛陽肉里尻交等亦皆不出六經流注但別行各有所主不欲繁引詳繁內經刺腰痛論以備明之準此從所因汗下施治

內因腰痛論

失志傷腎鬱怒傷肝憂思傷脾皆致腰痛者以肝腎同系脾胃表裏脾滯胃閉最致腰痛其證虛羸不足面目黧黑遠行久立力不能支失志所為也腹急脅脹目視䀮䀮所祈不得意淫於外宗筋弛縱及為白淫鬱怒所為也肌肉濡漬痺而

不仁飲食不化骨節煩腫滿脹或陰壅腫痛是氣所為也推此
類而調理施治

不內外因腰痛論

腎著腰痛腰冷如水身重不渴小便自利食飲如故腰以下冷重如帶五千錢因作勞汗出衣裏冷濕久久得之　腎瀝腰痛者傷損腫痛引牽腰痛因於墜墮惡血流滯及房勞疲力耗竭精氣致腰疼痛此屬不內外因隨其施治

腰痛治法

**獨活寄生湯** 夫腰痛皆由腎氣虛弱臥冷濕地當風所得不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痹緩弱疼重或腰痛攣脚重痹宜急服此

獨活 三兩　桑寄生　杜仲 炒斷絲
細辛 去苗　牛膝 酒浸　秦艽 去蘆　茯苓
白芍藥　桂心 不見火　芎藭　防風 去蘆
甘草 炙　人參　熟地黄　當歸 各二兩

右為剉散每服四大錢匕水一盞半煎七分去滓空心服氣虛下利除地黄并治新產腹痛不得轉動及腰脚攣痛痹弱不得屈伸此湯最除風消血 附後有附子無寄生與寄生人參甘草當歸近人將治歷節風并脚氣流注甚效

**小續命湯** 治風腰痛最妙 加桃仁炒去皮尖

**牛膝酒** 唐筠州刺史王紹顏傳信方云頃年予在姑孰得腰痛不可忍醫以腎傷風毒攻刺此方即製一劑服之便減五分步履輕捷

牛膝　川芎　羌活　地骨皮　五加皮
薏苡仁 各一兩　甘草　生地黄 十兩　海桐皮 二兩

右為剉散以帛裹入無灰酒貳斗浸冬貳拾日夏月分數服旋添三五盃每服壹盃日三盃長令酒氣不絕為佳一法入杜仲一兩炒絲斷入

**杜仲酒** 治風冷傷腎腰痛不能屈伸并補腎虛

杜仲 薑汁炒去絲

右用無灰酒三升浸拾日每服二三合日四伍服
一方為末溫酒調壹錢空心服

**腎著湯** 治腎虛傷濕身重腰冷如水洗狀不渴小便自利食飲如故腰以下冷痛重如帶五千錢

乾薑 炮　茯苓 各四兩　甘草 炙　白术 各二兩

右為剉散每服四大錢水一盞半煎七分空腹冷服又治胞痺汗出亦效

**二至圓** 治腎虛及傷冷冷氣入腎其痛如掣

鹿角 屑　附子 炮去皮臍　桂心 各三分

右為末糊圓如梧子大鹽酒下三五十圓空心服

**安腎圓** 治腎虛腰痛陽事不舉膝骨痛耳鳴口乾面色黧黑耳輪焦枯

補骨脂 炒　葫蘆巴 炒　茴香 炒　川楝 炒　續斷 炒各三兩
桃仁 麩炒去皮尖　杏仁 炒去皮尖　山藥 炒　茯苓 各二兩

右為末蜜圓如梧子大鹽湯下五十圓空心服

**青娥圓** 治腎虛腰痛兼治風濕脚氣常服壯筋補虛填精益髓

杜仲 炒去皮　生薑 炒各十兩　破故紙 十兩炒

右為末用胡桃肉二十個湯浸去皮研成膏入少熟蜜圓如梧子大每服五十圓溫酒鹽湯任下食前服

**補腎圓** 治腎經不足風冷乘之腰痛如折或引背膂俛仰不

利轉側亦難或役用過度勞傷於腎或寢臥冷濕地氣傷腰或墜墮傷損並宜服之

威靈仙（酒浸） 附子（炮去皮） 桂心 當歸各一兩

右為末以酒煮麵糊圓如梧子大每服三伍拾圓煎茴香湯或炒茴香酒下食前服婦人煎桂心湯下有孕婦人不得服一方添破故紙桃仁地骨皮等分

**安腎圓** 治元臟腰痛常服補腎強腰腳治腳氣

破故紙（炒） 續斷（炒） 木瓜（乾） 牛膝（酒浸）

杜仲（去皮銼薑汁炒） 萆薢（各二兩）

右為末煉蜜圓如梧子大每服伍拾圓鹽湯鹽酒任下

**五積散** 治感寒濕與脾胃氣滯腰痛最效（方見傷寒門每服加桃仁七粒）

**熟大黃湯** 治墜墮閃肭腰痛不能屈伸

大黃（切如豆大） 生薑（各半兩切）

右同炒令焦黃以水一大盞浸一宿五更去滓頓服天明所下如雞肝者即惡物也

**橘子酒** 治打撲腰痛惡血蓄瘀痛不可忍

橘子（炒去皮）

右壹味研細每服貳錢匕酒調服未知再作或用豬腰子壹隻去筋膜破開入藥同葱白茴香鹽濕紙裹煨熟細嚼溫酒下

**桃仁酒** 治腎虛風勞所傷毒腫掣痛牽引小腹連腰痛

桃仁（去皮尖麩炒）

右壹味研細每服抄四錢匕熱酒調下即汗愈

虛損證治

雜經論損從皮毛至于筋骨者此乃將氣脈淺深次第也原其所因屬不內外或大病未復便合陰陽或疲極筋力飢飽失節尽神度量叫呼走氣所以諸證蜂起百病交作吐血衄血便血瀉血遺泄白濁冷滑洞泄白汗黃汗嘔吐咯唾涎沫痰飲遂使榮衛走本虛勞損傷皆自此始蓋由背於人身常理而致然也況婦人產蓐過於大病虛損尤多不可不知列而論之證狀亦一姑舉數條以為治備要當考脈理推其元氣實虛以扶助陰陽辨別標本蓋不可隨證冷熱妄行施治要論曰粗工嘻嘻以為可之言熱未已寒病復始同證異形迷氣亂經學者達之精思宜審

**正元散** 治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽氣漸微手足厥逆及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒（見自汗門）

**沉香鹿茸圓** 治精氣耗散血少不能養陽道不興服此調榮衛利腰腳補精血主諸虛百病

鹿茸（酥炙一兩） 熟地黃（一兩） 沉香（三錢） 麝香（一錢別研）

右為末入麝香研勻蜜圓梧子大空心溫酒鹽湯任下三十丸

**大山芋圓** 治諸虛百損五勞七傷肢體沉重骨節酸疼心中煩悸唇口乾燥面體少色情思不樂咳嗽喘乏傷血傷氣夜多異夢盜汗失精腰背強痛臍腹弦急嗜臥少起喜驚多忘飲食減少肌肉瘦瘁又治風虛頭目眩暈心神不寧及病後氣不復常漸成勞損久服補不足愈風氣百病

山芋（七兩半） 當歸 桂心 神麴（炒）

熟地黃 大豆黃卷（各二兩半） 甘草 人參（一兩七錢）

川芎 芍藥 白朮 麥門冬（去心）

杏仁（去皮尖麩炒） 柴胡 白茯苓 桔梗（各一兩一分）

阿膠（炒一兩七錢半） 乾薑（炮三分） 白歛（半兩） 防風（去叉一兩半）

棗一百个去皮核

右爲末蜜丸与棗肉同和丸如梧子大每服一丸温酒

米湯任下加號用一兩遠志去心炒二兩茯苓二兩

半即是秦艽心川歸芳讀川白鶴加龍骨二兩

**羊肉圓** 治真陽耗竭下元傷憊耳輪焦枯面色黧黑腰重腳

弱陽事不興常服壯元陽補真氣益精駐顔

補骨脂炒 葫蘆巴炒 茴香炒 川楝炒 續斷

附子炮去皮臍 茯苓各三兩 桃仁去皮尖麩炒 杏仁同上 山藥各二兩

右爲末精羊肉四兩酒煮研細入麵煮糊丸如梧子大

鹽湯温酒空心任下三五十丸

**蓯蓉圓** 治元臟虛憊血氣不足白濁遺泄自汗自利口苦舌

乾四肢羸瘦婦人諸虛皆主之

木香炮 附子炮去皮臍 茴香炒 蓯蓉酒浸 川楝

桃仁去皮尖 葫蘆巴 牛膝酒浸 巴戟去心 五味子

黃耆 白蒺藜炒去刺 澤瀉各五錢 羌活 檳榔

天麻 川芎 桂心各二兩

右爲末蜜丸梧子大鹽湯酒空腹任下三五十丸

**菟絲子圓** 治腎氣虛損五勞七傷小腹拘急四肢酸疼面色

黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦

喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿腳膝

緩弱小便滑數房室不舉股內濕癢水道澀痛小便出血

時有遺瀝

菟絲子酒浸 桂心不見火 鹿茸去毛酥炙 附子炮去皮 澤瀉

石龍芮一兩去土 蓯蓉酒浸 杜仲去粗皮炒 茯苓 熟地黃

巴戟去心 山茱萸 蓽澄茄 沉香 茴香炒

補骨脂炒 石斛 牛膝酒浸 續斷 川芎

五味子 覆盆子 桑螵蛸

右爲末酒糊丸如梧子大每服三十丸温酒鹽湯任下

腳膝無力木瓜湯下滑關木通湯下

**沉香丸** 治脾元氣弱久積陰冷心腹疼痛面色青黃羸瘦

弱怠惰嗜臥食少多傷噫氣吞酸噦逆惡心腹中虛鳴大便

泄利宿食不消飲食不下霍亂嘔吐肌冷轉筋及五膈五

噎久痛久痢方見痢門

**[illegible]湯** 治諸虛不足小腹急痛脅肋䐜脹臍下虛滿

中煩悸面色痿黃唇乾口燥手足逆冷體常自汗腰背強

急骨肉痠疼吸吸短氣不能飲食或因勞傷過度或因病

後不復

黃耆 人參 橘皮 當歸

桂心 細辛 前胡 甘草炙

茯苓 麥門冬去心 芍藥各一兩 附子炮去皮臍

熟地黃各一兩 半夏湯洗七次 遠志去心各二分

右爲剉散每服四錢水一盞半姜五片棗一個煎七分

去滓食前服腹痛食少去棗下焦虛冷不甚渴小便數

者倍人參當歸附子煩渴引飲加栝樓根遺泄白濁加

龍骨白斂小腹急引心痛者加乾姜

**[illegible]湯** 治積勞虛損四肢沉滯骨肉酸疼吸吸少氣行動喘

喘小便拘急腰背強痛心虛驚悸咽乾唇燥飲食無味陰

陽衰弱悲憂慘戚多臥少起久者積年急者百日漸至瘦

削五臟氣竭難可振復又治肺與大腸俱虛欬嗽下利喘

乏少氣嘔吐痰涎

黃耆 當歸 桂心 甘草炙

橘皮 白朮 人參各一兩 白芍藥三兩

熟地黃　五味子　茯苓各二分　遠志[illegible]心炒

右爲剉散每服四大錢水一盞半薑三片棗一个煎至七分去滓空心服服便精遺泄加龍骨一兩咳嗽加阿膠甚效

**七補丸**治真氣虛損下焦傷竭臍腹強急腰脚疼痛亡血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴疾飲食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五臟行榮衛益精髓進飲食

附子炮去皮臍　乾薑炮　桂心　兔絲子酒浸

厚朴去皮薑汁炙　巴戟去心　遠志去心　破故紙炒

赤石脂煅　川椒[illegible]各一兩

右爲末酒糊丸梧子大每服[illegible]溫酒鹽湯任下

**[illegible]丸**治心腎氣不足[illegible]不安遺精面少色足[illegible]

**[illegible]丸**

遠志去心　山藥炒　熟地黃　天門冬去心

龍齒水飛　麥門冬去心　五味子　車前子炒

白茯苓　茯神去木　地骨皮　桂心各五兩

右爲末煉蜜丸梧子大每服二十丸至五十丸空心服溫酒米湯任下

**[illegible]丹**治房室過度或用意思淫精滑自出腰脊疼痛不能舉動飲食不生肌兩腳痿痛不能步履

草烏頭[illegible]　杜仲[illegible]　牡蠣[illegible]　五倍子[illegible]

右爲末糯米糊丸如梧子大空心服鹽湯下三五十圓

**[illegible]子丹**治真氣虛憊口苦舌乾心常恍惚夜多異夢盡少精神感夢鬼交通遺泄白濁小便餘瀝陽事不舉目暗耳鳴面色黧黑

新蓮肉[illegible]　白龍骨[illegible]　甘草二分

右爲末車前草汁入麪少許煮糊丸如菉豆大每服三五十丸鹽湯任下

**家韭子丸**方見[illegible]門

**威喜丸**治精氣不固餘瀝常流小便白濁夢中頻泄及婦人血海久冷白帶白漏白淫身常溫小便如米泔或無子息

白茯苓四兩　木豬苓[illegible]　黃蠟四兩

右只以茯苓一味爲末鎔黃蠟爲丸彈子大空心細嚼令口生津徐徐咽下以兩耳虛鳴口乾

**[illegible]丹**治脫精滑不禁

桑螵蛸[illegible]　龍骨[illegible]　白茯苓一兩

右爲末麪糊爲丸梧子大每服七十丸煎茯苓鹽湯下食前服　一方用茯苓豬苓各[illegible]和皮子切各等分爲末　又方用破故紙茴香[illegible]等分同炒香爲末並每服二錢米飲調下

**[illegible]丸**補心腎虛怔忪驚悸恍惚神志不寧睡卧不安故經曰心有所傷則有所倚人不能懸其病則卧不安

當歸　熟地黃　白茯苓　白茯神去木

人參　黃芪　阿膠炒　酸棗仁炒

柏子仁[illegible]　山茱萸[illegible]　遠志[illegible]　肉桂各一兩

辰砂別研　龍齒[illegible]

右爲末別研五味蜜丸如梧子大每服二十丸食後[illegible]湯下

**宣和賜[illegible]丸**治少年色欲過度精血耗竭心腎氣憊遺泄白濁腰背疼痛面色黧黑耳聾目昏口乾脚弱消渴便利夢與鬼交陽事不舉

當歸[illegible] 柏子仁[illegible] 菟絲子[illegible] 酸棗仁
茯神(去木) 石蓮肉(去皮) 鹿角霜 龍骨[illegible]
右爲末，用薯蕷二斤，碎，水六升，煮一宿，次早搜洗，取汁去滓，於銀石器中熬，化成膏，搜和得所，杵數千杵，丸如梧子大。每服五十丸，加至百丸，米湯溫酒任下，空心食前服。常服安心腎，消心驚，益氣駐顏，延年不老。

茯苓湯 治心氣不寧，諸虛百損，肢體沉重，情思不樂，夜多異夢，盜汗失精，恐怖煩悸，喜怒無時，口乾咽燥，渴欲飲水，飲食減少，肌肉瘦瘁，漸成勞瘵。常服補精血，調心氣，進飲食，安神守中，功效不可盡述。

人參 黃芪 白茯苓 白朮
山藥 蓮肉(去心) 縮砂仁 烏藥
橘紅 乾姜(炮，各二兩) 甘草(炙，三分) 南木香
丁香 檀香(各一分) 沉香(分)

右爲麤末，每服四錢，水一大盞，姜三片，棗子一個，煎七分，去滓，食前服。一法有炮熟附子半兩。

三因極一病證方論卷之十三



水腫敘

夫腎主元氣，天一之水生焉；肺主冲化，地四之金屬焉。元氣乃水中之火，所以太陽合少陰主精髓以滋血；冲化乃土中之金，所以太陰合陽明主肌肉以養氣。今腎虛則火虧，致暘水凝滯；肺滿則土溢，使陽金沉潛，則氣閉；凝滯則血冷，經絡不通，上爲喘急，下爲腫滿。故經曰：腎爲少陰，肺爲太陰，其本在腎，其末在肺，皆至陰以積水也。所以能聚水而生病者，蓋由腎爲胃關，關鍵不利，樞機不轉，水乃不行，滲透經絡皮膚，浮腫諸證不同，廣如經說。治法曰：平治權衡者，察脈之浮沉也；去菀陳莝者，疏滌腸胃也；開鬼門潔淨府者，發汗利小便也。原其所因，則冒風寒暑濕屬外，喜怒憂思屬內，飲食勞逸背於常經屬不內外，皆致此疾。治之當究其所因及諸禁忌，而爲治也。

水腫證治脈例

古方十種證候，以短氣不得臥爲心水，兩脇疼痛爲肝水，大便鴨溏爲肺水，四肢苦重爲脾水，腰痛足冷爲腎水，口苦咽乾爲膽水，乍虛乍實爲大腸水，腹急肢瘦爲膀胱水，小便秘澀爲胃水，小腹急滿爲小腸水。各隨其經絡，分其內外，審其脈證而甄別之。然此十水，謂之正水。外有風水、皮水、石水、黃汗，以義考之，風合歸肝，皮合歸肺，黃汗歸脾，石合歸腎。雖名理不賒，奈證候少異，古方備列，不可不辨。但風水脈浮，必惡風；皮水亦浮，按不沒指[illegible]，不惡風[illegible]。○石水脈沉，腹滿不喘；黃汗脈沉遲，發熱多涎，久而不愈，必致癰膿。正水寸口脈浮而遲，浮則熱，遲則潛，熱潛相搏，名曰沉；趺陽脈浮而數，浮則熱，數則止，止熱相搏，名曰伏。沉伏相

摶名曰水沉則絡脉虛伏則小便難虛難相摶水走皮膚即爲正水此金匱要文所以用寸口趺陽二脉者蓋水氣不在一經也大抵浮脉帶數即是虛寒潛止於其間久必沉伏沉伏則陽虛陰實爲水必矣要知水脉必沉論曰脉出者死與病不相應也唇黑則傷肝缺盆平則傷心臍出則傷脾足平則傷腎背平則傷肺凡此五傷必不可療也治法曰腰以上腫宜發汗腰以下腫宜利小便學者當知之

復元丹 治水腫夫心腎真火能生脾肺真土今真火氣虧不能滋養真土故土不制水水液妄行三焦不瀉氣脉閉塞樞機不通喘息奔急水氣盈溢滲透經絡皮膚溢滿足脛尤甚兩目下腫腿股間冷口苦舌乾心腹堅脹不得正偃偃則咳嗽小便不通夢中虛驚不能安卧

附子 南木香 茴香 川椒 獨活 厚朴 白术 陳橘皮 吳茱萸 桂心 澤瀉 肉豆蔻 檳榔

右壹拾叁味爲末糊圓梧子大每服伍拾圓紫蘇湯下不以時此藥世傳屢驗未嘗示人其間君臣佐使與造物同妙服者自知要當屏去諸藥一日三服先次旋利如傾次乃腫消喘止蓋藥能助真火以養真土運動樞機安平必矣法當禁鹽并絕醎半年乃不再作

當歸散 治如前

當歸 木香 赤茯苓 桂心 檳榔 赤芍藥 牡丹皮 陳皮 木通 白术

右爲末脚膝頭面腫大小便不快每服貳錢水壹盞紫蘇貳葉淡木瓜壹片如指大同煎八分温服日叁如已愈常服早晚貳服氣下或小便快是效藏寒去檳榔服

已乃添大腹皮木猪苓各壹兩忌鳥雞肉醎酸海味物

玉腸丹 治水腫

宣木瓜 乾 人參 大豆 附子 銀朱

右爲末入銀朱研勻以木瓜膏圓如梧子大每服伍拾圓米湯下食前

消腫圓 治水腫喘滿小便不利

滑石 木通 白术 黑牽牛 通脫木 茯苓 茯神 半夏 陳皮 木香 瞿麥穗 丁香

右爲末酒糊圓如梧子大每服叁拾圓灯心麥門冬湯温服

消脹散 治水氣浮腫喘呼不得睡煩熱躁擾渴燥大小便不利

大黄 山梔 甘草 乾葛 橘皮 麻黄 馬牙硝 川芎

右爲細末蜜湯調下貳錢

葉仁散 治水氣浮腫無問久新老少悉可服唯禁鹽必效

葉仁 赤茯苓 桂心

右爲末每服貳錢米飲調下

禹餘糧圓 治十腫水氣凡脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆主之

蛇黄 [illegible] 禹餘糧 [illegible]

[illegible] 以三物爲主其次量人虛實入下項

藥 [illegible]

別本作腿 別本作 別本 別本作 同上 別本作

羌活　木香炒　茯苓　川芎
牛膝酒浸　白豆蔻炮　上茴香炒　蓬术炮
桂心　乾薑炮　青皮去瓤　京三稜炮
白蒺藜　附子炮　當歸[illegible]
右為細末拌極勻以湯浸蒸餅捩去水和藥再擣極勻
圓如梧子大食前溫酒白湯下叁拾圓至伍拾圓唯忌
鹽雖毫末許不得入口若无以為味即水病去後且以
醋少許調和食不能忌鹽勿服果欲去病切須忌鹽但
試服藥即於小便內旋去不動臟腑病去日日三服兼
以溫和調補氣血藥助之真神方也

**第一退水圓** 能化氣退水腫去死基利濕通小便
蓬术炮　三稜煨　桂心　青皮
益智各半兩　巴豆貳兩去殼出油別研[illegible]
右為末麵糊圓如梧子大用黃栀拾箇劈破荊芥黑牽
牛酸漿草各少許煎湯空腹下貳叁拾圓

**第二退水餅** 服前藥未效即服此方
甘遂　大戟各半兩
右為末入麵打水調為餅如棊子大火煨熟五更淡茶
湯嚼下壹餅

**第三大腹子散** 取轉後調正胃氣進食
大腹子炒　桂心　茴香炒　陳皮各半兩
右為末每服貳錢米飲調下食前

**桃紅散** 治正水脹急大小便不利逆欲死方
甘遂[illegible]　坯拾文別研
右為末研勻每用壹錢以白麵肆兩水調入藥搜和切
作棊子白水煮浮更不得使鹽料物只淡食候大小便

利去伍陸分卻用後藥調補
平胃散壹兩　附子炮　白术各壹兩　丁香半兩
右為末和勻每服貳錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎柒分
不拘時候日叁伍服若腳未退可灸三陰交及風門穴
腫退必矣

**大圓** 治通身腫滿及痰氣食積傷寒感風脾氣橫泄
莪朮　白术各半兩　陳皮　木通
黃芪　桑白皮各叁分　木香壹分　黑牽牛頭末伍兩生
右為末蜜圓如彈子大治風痰散腹脇壅滯清頭目濃
煎生薑湯下取食傷上赤白痢煎棗湯下小便不利燈
心湯下傷寒茶下如未快用稀粥投之用熱茶湯亦
可須索日後方可服已得瀉急欲止之投冷白粥即自
止婦人產前並宜服之既服此藥須住他藥叁日及不
得喫生冷葷腥及滋味壹日只軟飯淡粥可也次日早
進千金散
藿香　甘草炙　乾薑炮　神麴炒　茯苓各壹兩
人參　桂心各半兩　陳皮　厚朴薑製各貳兩
右為末每服貳錢水壹盞薑叁片煎七分鹽壹捻通口

**羊脬大圓** 治腫滿腹大四肢枯瘦小便澀濁歷良方
甜葶藶紙隔炒　蘿菜根等分
右為末蜜圓如彈子大每服壹圓陳皮湯嚼下只叁圓
小便清數圓腹當依舊

料簡
病有風水皮水石水黃汗皆与正水同為治自別

**大豆湯** 治風水通身腫骨節疼惡風自汗眼合不得短氣欲
絕其脈浮

大豆　杏仁(去皮尖炒)　麻黃(去節)　防風　防己
猪苓(去皮各肆兩)　澤瀉　黃芪　烏頭(炮去皮臍各二兩)　半夏(湯洗七次)
茯苓　白术(各四兩)　甘遂(炒)　甘草(炙各貳兩)
右㕮咀每服伍錢水二盞酒半盞薑柒片煎柒分去滓
不計時服以大小便利腫消則停藥未知加生大戟伍
兩芫花貳兩熬炒香無不快利甘草反甘遂似不當同
用之却效非人情所可測也

**五皮飲** 治皮水四肢頭面悉腫按之没指不惡風其腹如故
不喘不渴脉亦浮
大腹皮　桑白皮(炙)　茯苓皮　生薑皮　陳橘皮(各等分)
右㕮咀每服四錢水壹盞半煎柒分去滓熱服日二三近
人磨木香水少許同煎亦妙

**澤漆湯** 治石水四肢瘦腹腫不喘其脉沉
澤漆(洗五兩)　桑白皮(炙三兩)　射干(泔浸)　黃芩
茯苓　白术(各肆兩)　澤瀉　防己(各貳兩)
右㕮咀每服五錢水叁盞先煮烏豆壹合煎貳盞內藥同煎
柒分去滓空腹溫服日叁
黃汗依五疸法治之用黃芪酒

料簡
病有水腫相類者曰膚脹鼓脹腸覃石瘕脾氣橫泄五種治
法亦復不同除鼓脹見脹滿門腸覃石瘕見婦人門今具膚
脹及脾氣橫泄如后

**附子菉豆湯** 治寒客皮膚㱿㱿然而堅腹大身腫按之陷而
不起色不變病名膚脹一劑未知再作
大附子(生去皮臍切作二片)　菉豆(貳兩)
右以生薑壹兩切水貳椀煎至壹椀絞去滓分叁服空
腹溫服次日將前附子破作肆片再用菉豆貳兩薑壹
兩如前煎服第三日復將附子作捌片如前煎

**[illegible]圓** 治脾氣橫泄四肢浮腫心腹脹滿喘不得卧
蓬术(煨)　三稜(煨各[illegible])　大腹皮([illegible]兩)　木香(炮)　檳榔(生各壹分)
右為末炒麥蘖搗粉為圓如梧子大每服貳拾圓生薑
湯下

**三[illegible]湯** 治如前方見癥瘕門

**[illegible]散** 治脾胃不和胸膈痞塞腹脇疼痛氣促喘急心
下脹滿飲食不進嘔吐不止兼脾氣橫泄四肢浮腫
五味子　桔梗　茯苓　甘草(炙)　陳皮
桑白皮　草果(去皮)　大腹皮　紫蘇葉(各等分)
右為麄末每服肆錢水壹盞薑叁片鹽少許煎七分去
滓食前服

**麻黃甘草湯** 治氣急積久不差遂成水腫如此者衆諸皮中
浮以水攻面目身體從腰以上腫當以此湯發汗
麻黃(去節四兩)　甘草(壹兩)
右為剉散每服肆錢水壹盞半煎柒分去滓空腹溫服

**[illegible]子圓** 治面腫小便澀心腹脹滿
茯苓　蘇子　杏仁(去皮尖各壹兩)　橘皮
防己　葶藶(隔紙炒各壹兩)
右為末蜜圓如小豆大以桑白皮湯下叁拾圓食後服

料簡
夫洪腫門類極多自正水之餘有風水皮水石水黃汗等分
入水門如脾氣橫泄脚氣支滿膚脹鼓腸覃石瘕與夫造作
千犯土氣皆作浮腫偏血風氣理自不同亦外證相類未易
分別若不預學臨病必迷錯亂汗下皆盡殺之更有氣分血

分亦入腫門類治法頗別其可不學古方類例雖明多見不學者抄寫數方一道施治懽非其病妄投其藥縱者致困因者必死況有飲食禁忌種種不同學者勉循不可輕玩以病試藥甚為不仁戒之戒之（血分方見婦人門 氣分方論附于后）

氣分證治

氣分與胸痺中滿皆相類但胸痺屬氣實中滿為氣虛氣分則挾涎飲氣為涎飲所隔榮衛不利腹滿脇鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣不通則骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺乃知氣挾涎飲之所為也其脈寸口遲而濇遲則為氣不足濇則為血不足趺陽脈微而遲微則為氣遲則為寒斯證也名曰氣分

桂附湯 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

桂心（叁兩） 甘草（炙） 麻黃（去節） 細辛（去苗） 附子（炮去皮臍）

右為剉散每服肆錢水壹盞半生薑柒片棗叁箇煎柒分去滓溫服汗出如虫行皮中即愈（食前服）

枳朮湯 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實（壹兩半） 白朮（叁兩）

右為剉散每服肆錢水壹盞半煎柒分去滓溫服腹中軟即當散也

陰㿉敘論

夫陰㿉屬肝係宗筋胃陽明養之世多不識謂之外腎并特名義差錯亦使內臓不分其可不辨古方雖出四證但曰腸㿉氣㿉水㿉卵脹殊不別其所因如腸㿉則因房室過度元臓虛冷腸邊脊系不收墜入㿉中上下無定謂之腸㿉屬不內外因病若久蓄憂思恐怒兼并隨臓氣下墜陰㿉腫脹急痛名曰氣㿉屬內所因病者久坐冷濕濕氣下墜致陰腫脹名曰水㿉屬外所因病者勞役無節及跨馬坐車致卵核腫脹或偏有大小上下無常名曰卵脹亦屬不內外因有小兒生來便如此者乃宿疾也卵脹腸㿉皆難治氣㿉水㿉治之易愈又寒疝下注入于㿉中名為狐疝亦屬㿉病世人因此並以㿉病為疝氣不審之甚婦人陰門挺出亦稱㿉病名義不分有如此者

陰㿉證治

凡㿉病唯腸㿉無問貴賤多有之有睡卧脊系延入脇下者有墜入囊中者或遇疲勞及天色變動逼上囊根腫急作痛過於寒疝得煖則下其如卵脹有作熱生膿為癰潰爛者比比有之

[illegible]圓 治陰㿉偏大上攻臍腹疞痛[illegible]膚腫脹或生瘡瘍時出黃水腰腿沉重足脛腫滿行步艱辛服之內消不動臓腑

川楝（[illegible]兩） 大腹皮 五味子 海藻（洗）

玄胡索（各壹兩半） 茴香（炒） 桂心 川烏（炮去皮尖）

吳茱萸 石茱萸 白蒺藜（炒去刺各壹兩） 枳實（去穰麩炒）

橘紅 桃仁（去皮尖麩炒各半兩） 木香（壹兩） 桔梗

青皮（各貳兩） 山茱萸（去核各壹兩半）

右為末酒糊圓如梧子大溫酒下叁拾圓

大戟圓 治陰㿉腫脹或小腸氣痛

大戟（去皮剉炒） 葫蘆巴（炒） 木香（壹兩） 附子（炮去皮臍）

舶上茴香 訶子（煨去核） 檳榔（各壹兩） 川楝（各伍兩）

麝香（半錢別研）

右為末獨留川楝以好酒煮貳升葱白柒枚長叁肆寸

黃川練去皮核取肉和上件爲圓如梧子大空心溫
酒下伍柒圓至拾圓薑湯亦得鹽湯艾醋熱酒下
拾伍圓 [illegible]

橘核丹 治陰器下墜腫脹卵核偏大堅如石痛不可忍
玄胡索 [illegible] 海藻 洗 昆布 洗 青皮
茴香 炒 川練 去核 馬蘭花 各壹 木香 千兩
大戟 [illegible]
右爲末別將硇砂阿魏安息香各壹分用酒醋各壹升
淘硇砂去砂石熬成膏入麝香壹錢沒藥壹分入前藥
和圓如菉豆大用綿灰酒下拾圓至拾伍圓空心服

[illegible]圓 治膀胱有熱多因天氣熱而發疼痛腫痛亦痛大便
秘欲飲水按之臍腹痛
續隨子 薏苡仁 郁李仁 茴香 白牽牛 [illegible]
右爲末滴水圓如梧子大伍圓用博濟方香[illegible]散下
昏服五更利下惡物效

[illegible]金圓 治熱入膀胱臍腹上下兼脇肋疼痛便燥欲飲水按
之痛者
大黃 [illegible] 硝石 桂心 甘草 炙各 桃仁 [illegible]
右爲末蜜圓梧子大米飲下伍柒圓至拾圓婦人血閉
疼痛亦宜服之

[illegible]圓 治敗精惡物不去結在陰囊成疝爽痛不可忍久服
去病
阿魏 [illegible]
檳榔 [illegible] 乳香 [illegible]
右同研爲末入硇砂壹錢赤芍藥末壹兩同爲末[illegible]
和圓如梧子大溫酒鹽湯下拾圓至貳拾圓食前服

[illegible]圓 治寒疝堅大行動艱辛發作來往偏墜疼痛
白蒺藜 炒 海藻 [illegible] 澤瀉 各壹兩 茴香 炒壹兩半
桂心 木通 牛膝 五味子
木香 檳榔 [illegible] 茯神 人參
遠志 [illegible] 川練 [illegible] 桃仁 [illegible] 赤芍藥
續斷 山茱萸 蓯蓉 酒浸 青皮 [illegible]
右爲末蜜圓梧子大空心食前溫酒鹽湯下叁伍拾圓

三白散 治膀胱蘊熱風濕相乘陰癩腫脹大小便不利
白牽牛 [illegible] 白朮 千兩 桑白皮 陳皮
木通 [illegible]
右爲末每服貳錢薑湯調下空腹服初進壹服未覺再
進此藥不損臟氣只導利留滯此方大率多用熱藥此
方唯癃熱[illegible]宜服之

蜘蛛散 治陰狐疝氣偏有小大時時上下服人
蜘蛛 [illegible] 桂心 [illegible]
右爲末蜜圓梧子大米飲下拾圓

牡丹散 治癩偏大氣不能動坐臥不安
牡丹皮 防風 等分
右爲末酒服方寸匕小品有桂枝豉鐵精共五味與兒以
乳汁調壹字許

香附散 治癩服
香附子 不以多少
右爲末每用酒壹盞煎海藻壹錢重至半盞先撈海藻
嚼細用所煎酒調香附末貳錢服

[illegible]散 治陰腫大如斗核痛人所不能治
雄黃 [illegible] 礬 貳兩研 甘草 生壹兩

右為剉散以水五升煎洗之

## 癰疽敘論

發背癰疽者該三因而有之論云癰疽瘰癧不問虛實寒熱皆由氣鬱而成經亦云氣宿於經絡與血俱澀而不行壅結為癰疽不言熱之所作而後成癰者此乃因喜怒憂思有所鬱而成也又論云有熱被風冷搏之血脈凝泣不行熱氣壅結而成亦有陰虛陽氣湊襲寒化為熱熱成則肉腐為膿者此乃外因寒熱風濕所傷而成也又服丹石及炙煿酒麪溫床厚被所致又盡力房室精虛氣節所致者此乃因不內外所傷而成也故知三因備矣又論云癰者壅也疽者沮也如是但陰陽不平有所壅節皆成癰疽又曰陰滯於陽則發癰陽滯於陰則發疽而此二毒發無定處當以脈別之浮洪滑數則為陽微沉緩濇則為陰陰則熱治陽則冷治

治之之要雖有四節八事所謂初覺則宣熱拔毒已潰則排膿止痛膿盡則長肌傅痂次序固明若不別其因虛實治亦昧故治法中有用遠志宣熱者得非內因乎至於外因則用大黃不內外因則用甘草世醫但泥方書多用五香連翹與漏蘆二湯更不知三因所自其可守一法而普攻之況得其因又須觀病淺深與證候吉凶寒則溫之熱則清之虛則補之實則瀉之導以針石灼以艾炷破毒潰堅以平為期各有成法近胡承得一方甚寶秘之特以獻洪丞相丞相與之作序言重於世已遍行矣其方乃千金內補散去黃芪加人參威靈仙間有輕者服之稍效若真癰疽為害反甚內補散當用在第四節膿潰時服內消等藥候膿盡方得援者專用之亦所謂守一法也孔子不嘗未達之藥旨良有旨哉士夫當深味斯言無輕信曝方書以天下後世謹之謹之

## 癰疽證治

病者脈數身無熱而反洒淅惡寒若有痛處皆發其癰欲知有膿無膿以手掩上熱者為有膿不熱為無膿此亦大略說也自有脈不數不熱而疼者蓋發于陰也不疼尤是惡證不可不知凡熱盛脈數即用漏蘆升麻大黃等湯不甚熱脈緩弱只投五香連翹湯其它依四節八事次序及推三因以用藥未有不全濟也

遠志酒 治一切癰疽發背癤毒惡候浸大有死血陰毒在中則不痛傅之即痛有憂怒等氣積而內攻則痛不可忍傅之即不痛或蘊熱在內熱逼人手不可近傅之即清涼或氣虛血冷潰而不斂傅之即斂此本韓大夫宅用以救人極驗若七情內鬱不問虛實寒熱治之必愈神方

遠志 [illegible]

右壹味為末酒壹盞調藥參錢遲頃澄清飲之以滓傅病

大黃湯 孫真人石經急單煮大黃壹味為湯服即快利此勇法

[illegible] 治服金石及食炙煿飲酒房勞發為癰疽及諸惡瘡疼痛

甘草 [illegible]

右壹味以水壹斗浸壹宿煎至伍升以下去滓入銀石器煎發為膏分貳服溫酒下臨卧壹服次日五更壹服當取下惡物為效

[illegible] 治傷風寒暑濕或泣或散使氣血滯凝肉腐為膿結成癰疽隨處發作

大黃 [illegible]　木鱉 [illegible]　防風　枳殼

桔梗　甘草 各壹分

右爲剉散每服肆大錢水壹盞煎柒分去滓入朴消兩錢重煎鎔熱服得疎轉壹兩次即服万金湯若陰證只服萬金不可用通聖藥行也

二

【[illegible]】治癰疽發背發眉髮腦鬢發嬭婦人乳癰等定痛去毒

甘草（各兩） 没藥（壹分） 茯苓（去皮）

右爲剉散以无灰酒叁升熬至壹升去滓放温重旋飲盡或出血或出黄水是效

【[illegible]】治一切惡核瘰癧癰疽惡腫等病

青木香 沉香 薰陸香 丁香

麝香 升麻 桑寄生 獨活

連翹 射干 木通 大黄

右爲剉散每服肆大錢水貳盞煮至壹盞以上去滓取汁空腹熱服半日以上未利再服以利下惡物爲度未生肉前服不妨以折去毒熱之氣本方有竹瀝芒消恐澀者不能斟酌故缺之知者自當量入

【[illegible]】治癰疽發背附生瘡瘻惡肉時行熱毒發作赤腫及眼赤生瘡

漏蘆 白及 黄芩 麻黄（去節）

白薇 枳殼 升麻 芍藥

甘草 大黄

右爲剉散每服肆錢水貳盞煎柒分空腹熱服以快利爲度本方有芒消可去之只加大黄作伍兩

【忍冬酒】治癰疽腫毒甚效

忍冬草（取嫩苗壹握） 甘草（錢炙剉）

右同研入酒壹升半砂瓶塞口煮去滓温服仍以滓傅腫毒上又木蓮葉肆拾玖片揩去毛研細酒解温服功與忍冬草不相上下又龍鱗薜荔壹握細研以酒解汁温服亦能洩下惡物去其根本

【[illegible]】治發背癰疽不問淺深大小利去根本不動元氣神效

車螯 甘草（生壹分） 輕粉（半錢重）

右以鹽泥固濟火煅取末壹兩入甘草末同輕粉研勻濃煎栝樓酒調下肆錢匕五更初服轉下惡物爲度未知再作栝樓一箇用壹升酒煎至壹盞爲壹劑

【[illegible]】治發背癰疽痊熱拔毒排膿止痛

大木鼈子 胡桃 乳香 白蜜（壹斤）

右以銀石器內熳火熬成膏每服兩大匙温酒調下不以時候服

【[illegible]】治癰疽欲發未潰及已潰服之內托不使毒過膜

木鼈子 鬼箭 皂角刺 射干

天羅 茴香 木鱉 漢椒

右焙乾爲末攪調作餅炙乾爲末每服貳錢酒調下不飲酒以木香湯下

【[illegible]】收斂癰疽令不黄衍切忌用冷藥外貼逼毒氣入裏殺人

杏仁 川椒 清油 酒蠟（半兩）

右文武火熬用柳青枝打紫黑色綿濾過再熬滴水成珠收淨器內看瘡大小作新月樣紙花圍貼作暈收更促小豬頭與用後藥傅

【[illegible]】治癰疽瘡腫未潰已潰皆可傅

擯榔　黃連　川山甲

右爲末先點好茶以翎毛刷過瘡仍以茶清調藥傅瘡上如熱甚則以雞子清調傅膿已消則用長肌藥未快則用替針圓

[illegible]治癰疽雖潰而膿不出用之即快

雄雀糞　硇砂　陳倉米　沒藥

右研勻以米飲圓如粟米每用一粒貼在瘡頭或瘡眼中即潰膿出

[illegible]傅癰疽瘡毒即生肌

黃狗頭骨　膩粉　桑白皮

右爲末生麻油調傅自通明萬金神異白玉搥連替針生肌凡七方是一家行用均濟二因皆良藥也

[illegible]治癰疽已潰排膿止痛利小便

瞿麥　芍藥　桂心　赤小豆　川芎

黃芪　當歸　白斂　麥門冬

右爲末每服貳錢酒調下空腹服

[illegible]治癰疽熱退膿血不止排膿止痛

防風　茯苓　白芷　桔梗　遠志

甘草　人參　川芎　當歸　黃芪

桂心　附子　厚朴　赤小豆

右爲末每服貳錢溫酒米湯調下

[illegible]治癰疽發背惡肌不盡服此消肌生肉

當歸　桂心　人參　川芎　厚朴

防風　甘草　白芷　桔梗

右爲末每服貳錢匕酒調空腹服不能飲酒以木香湯調下

[illegible]治癰疽潰後長肌傅瘢

白芷　黃芪　甘草　黃臘　黃丹

右前三味爲麁末春秋用麻油四兩半夏四兩冬五兩熬藥紫赤色綿濾去滓再入黃蠟黃丹以柳枝不住手攪滴水成珠即止用如常法

[illegible]洗發背癰疽

豬蹄　黃芪　黃連　芍藥

黃芩　薔薇根　狼牙

右判散以水貳碗煑豬蹄熟澄清得汁一斗許入藥煎至二三分去滓洗瘡以帛拭乾日二如疼痛加當歸甘草各一分

[illegible]治癰腫惡肉不盡膿水淋漓傅此能消肌長肉

白礬　好朱砂　血竭

右研細用桑根旋搜爲膏量瘡大小貼之忌鯽魚酒麪毒物等

經云陷脉爲漏留連肉腠脉得寒即下陷凝滯肌肉故曰留連肉腠肉冷亦能爲膿血故爲冷漏須用溫藥方如右瘡漏脉例

[illegible]治漏瘡及貳叁拾年瘻瘤或大如杯盂久久不差致有漏潰令人骨消肉盡或堅或軟或潰令人驚惕寐卧不安躰中掣痛愈而復作

乾薑　琥珀　大黃　附子　丹參

石硫黃　白石英　鍾乳粉　烏賊魚骨

右爲末貯以磁合韋囊勿令泄氣若瘡濕即傅無汁即煎豬脂和傅之以乾爲度或死肌不消加芒硝貳兩益佳一法用胡燕窠壹枚

桂附圓　治氣漏冷漏諸瘡

桂心　附子[illegible]　厚朴（薑製）

甘草（炙）　白朮（各壹兩）　木香（半兩）　乳香（別研）

右為末煉蜜丸梧子大空腹米飲下貳叁拾圓

癰疽灸法

夫癰則皮薄腫高疽則皮厚腫堅初發並宜灼艾唯癰成則宜針疽成則宜烙若能審其名證早早施治仍用藥以攻利其根補托其裏不必生疑爾昔人所以冠癰疽於雜病之先者知為大病也世醫失治療之序顛倒錯亂多致枉夭良可歎息故備集得效灸法以貽學者庶不致妄投也

治初生癰疽發背神效灸法累試有驗江寧府東極觀閂趙得石碑載之

凡人初覺發背欲結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立視候之其紙先乾處即是結癰頭也取大蒜切成片如當三錢厚薄安其頭上用大艾炷灸之三壯即換一蒜片痛者灸至不痛不痛灸至痛時方住最要早覺早灸為上壹日貳日拾灸拾活三日四日陸柒活五六日三四活過七日則不可灸若有拾數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄餅鋪頭上聚艾於蒜餅上燒之亦能活也若背上初發赤腫一片中間有一片黃粟米頭子便用獨頭蒜切去兩頭取中間半寸厚薄正安於瘡上却用艾於蒜上灸拾肆壯多至四十九壯





瘰癧證治

夫九漏形證皆瘰癧於項腋之間發作寒熱其根在臟腑千金所敘雖名九漏別錄方證其名更多狼漏根於肝得之憂怒鼠漏根於胃得之食鼠毒螻蛄漏根於大腸得之食果蜂漏根於脾得之飲流水有蜂毒蚍蜉漏根於腎得之食中有蚍蜉毒蠐螬漏根於心得之喜怒哭泣浮沮漏根於膽得之思慮瘰癧漏根於肺得之新沐髮轉脈漏根在小腸得之驚卧失枕此等因證文義不明未知所始若以理例較之狼根在肝鼠毒在胃食瓜果在大腸蜂水在脾姑且通俗易曉如轉脈因驚根當在膽却云在小腸浮沮因思慮根當在脾却云在膽瘰癧因沐髮亦不當在肺名義不通似難考據又況哭泣得蠐螬之名思慮則浮蛆之名此尤不可曉也其外更有風漏冷漏蝸漏[illegible]漏等名狀不一諸皆出於七情傳變所名雖數以考其治治法惟其末著於肌肉而外為膿血者從本引末可使衰去針之灸之傅之角之從其所因宜通本臟當有成法千金又有決死生反其目視其中有赤脉從上下貫瞳子見壹脉壹歲死見壹脉半壹歲半死貳脉二歲死三脉三歲死赤脉不下貫瞳子可治雖有此證驗之病者少有此證亦勢然按此往往是三陽傳諸陰經方有之君本臟發未必有是審者知之

[illegible]　治瘰癧不以年深日近及腦後兩邊有小結連復數箇兼勞瘵腹內有塊

鯽魚（一个去腸肚并子入雄黃一塊如[illegible]子大[illegible]）

右為末別用皂角二挺去皮搥碎以水三梳揉汁去滓

煮精羊肉肆兩爛軟入輕粉五匣男子乳汁半兩同研成膏和藥末圓如菉豆大朱砂為衣溫酒侵晨下十圓日一服至晚下肉疙瘩子若項有五箇則以五服藥取之視其所生多少以為服數既可更進數服如熟毒瘡瘉未有頭腦者一服亦須消散

**白花蛇散** 治九漏瘰癧發於項腋之間增寒發熱或痛或不痛

白花蛇 生犀 黑牽牛 青皮半兩

右為末每服二錢膩粉半錢研勻五更糯米飲調下巳時利下惡物乃瘡之根也更候十餘日再進一服忌發風壅熱物如已成瘡一月可效用之神驗

**四聖散** 治瘰癧用花蛇散取轉後須用此補之永去根本

海藻洗 石決明煅 羌活 瞿麥穗各等分

右為末每服二錢米湯調下日三服下清水尽為妙

**蝸牛散** 治瘰癧潰與未潰皆可貼

蝸牛

右為末入輕粉少許豬骨髓調用紙花量瘡大小貼之

一法以帶殼蝸牛七个生取肉入丁香七枚於七殼內燒存性与肉同研成膏用紙花貼之

**[illegible]圓** 治少長臟氣不平憂怒驚恐諸氣抑鬱結聚瘰癧滯留項腋及外傷風寒燥濕飲食百毒結成諸漏發作寒熱遍于項腋无問久近悉主之

旱蓮子 連翹子 威靈仙 何首烏 蔓荆子

三稜 赤芍藥各壹兩 木香貳兩 大皂角

右為末糊圓梧子大建茶清下三十圓至五十圓日三服小兒量与之食後服

## 瘻瘤證治

夫血氣凝滯結瘻瘤者雖與癰疽不同所因一也瘻多着於肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石瘻皮色不變即名肉瘻筋脉露結者名筋瘻赤脉交絡者名血瘻隨憂愁消長者名氣瘻五瘻皆不可妄決破決破則膿血崩潰多致夭枉瘤則有六骨瘤脂瘤肉瘤膿瘤血瘤石瘤亦不可決潰肉瘤尤不可治治則殺人唯脂瘤破而去其脂粉則愈

**破結散** 治石瘻氣瘻勞瘻土瘻憂瘻等證

海藻洗 龍膽 海蛤 通草 昆布洗

礬石枯 松蘿各三分 麥麯四分 半夏二分

右為末酒服方寸匕日三忌鯽魚豬肉五辛生菜諸難毒物十日知二十日愈

**[illegible]** 治一切風熱毒腫及臟氣鬱結丹石發動結為癰疽瘰癧諸瘡腫未破即令消散九漏浸淫膿汁淋漓諸治不差者悉主之

白蘞 白薇 白芨 白芷 薤白

黃芪 甘松 藿香

零陵香 防風 當歸

定粉 黃蠟 寒水石

右兩煎滴水成珠為度磁器盛之以膈子少許攤其上煎時忌鐵器以柳枝攪

## 附骨疽證治

附骨疽与白虎飛尸歷節風皆相類歷節則走注不定白虎飛尸痛淺按之則便附骨疽痛深按之无益又一說白虎飛尸亦能作膿着骨而生及其腐潰碎骨出尽方愈如是則附骨疽与白虎飛尸是一病但深淺不同耳白虎飛尸又俗名

風熱然病附骨疽少有骨出者宜拔毒熱不可一向泥五香
連翹漏蘆之屬當先溫腎如靈寶膏乃神藥唯在針烙淺深
剌拔其毒根則易愈不爾則順脉流走遍身洪腫卒致不救

**[illegible]** 治附骨疽久不差膿汁敗壞或骨從瘡孔出

大蝦蟆壹枚　亂髮雞子大　猪脂油壹斤

右同煎二物略盡濾去滓凝如膏貼之凡欲貼瘡須先
以桑白皮烏豆煎湯淋洗拭乾以龍骨煅爲粉糝瘡口
邊令易收然後方用貼藥

**[illegible]** 治附骨疽腫熱未破已破或膿出不愈

黑色鯽魚一个去腸肚入白礬令滿以綫縛定

右銅石器中煑一盞水盡魚乾焦爲末脂油調傅已破
則乾摻少痛勿怪

**[illegible]圓** 治附骨疽膿出淋漓久久不差已破未破皆可服

赤朮壹斤[illegible]

破故紙[illegible]　川楝[illegible]　茯苓

舶上茴香炒　杜茴香　白芷　桃仁去皮尖

右爲末煉蜜丸梧子大每服五十圓溫酒鹽湯任下

**一方** 用槲樹皮燒灰爲末飲方寸匕

**一方** 用蜜陀僧爲末以猪脊骨髓調傅之兼治痔漏不愈

## 丁腫證治

世醫謂傷寒在諸風之上癰疽冠雜病之先言此二病重大
急切然方論丁腫又在癰疽之前其意謂急切甚矣但江左
少見此病醫者不以爲事病源既有不可不知且依千金斷
例具列于後既不能究其源亦不敢妄有改作一曰麻子丁
肉上起頭如黍米色稍黑四邊微赤多痒忌食麻子及麻衣
并入麻田中行二曰石丁皮肉相連色烏黑如黑豆甚硬刺
之不入肉陰陰微疼忌瓦礫磚石之屬三曰雄丁皰頭黑黶
四畔仰瘡皰漿起有水出色黃大如錢孔忌房事四曰雌丁
瘡頭稍黃向裏黶亦似灸瘡四畔皰漿起如錢孔心凹色赤
忌房事五曰火丁狀如湯火燒灼瘡頭黑黶四邊有皰漿起
如赤粟米忌火炙爍六曰爛丁色稍黑有白斑瘡中潰潰有
膿水流出瘡形大小如匙面忌沸熱食爛帛物七曰三十六
丁頭黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日生一明日生二
三日生三若滿三十六藥亦所不治俗名黑皰忌嗔怒蓄積愁
恨八曰蛇眼丁瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼大體
硬忌惡眼看之并嫉妬人見及毒藥九曰鹽膚丁狀如匙面
四邊皆赤有黑粟粒起忌鹹食十曰水洗丁形如錢[illegible]
頭白裏黑黶汁出中硬忌飲漿水水洗渡河十一曰刀鐮丁
瘡闊狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒烙忌刺及刀鐮切
割鐵刃所傷可以藥治十二曰浮漚丁瘡體曲圓少許不合長
而狹如薤葉大內黃外黑黑處刺不痛內黃處刺之則痛十
三曰牛拘丁肉皰起掐不破此十三證初發必先痒後痛先
寒後熱熱定則寒多四肢沉重頭痛心驚眼花大重者嘔逆嘔
逆則難治麻子丁始末唯痒所錄忌者不得犯犯即難治浮
漚丁牛拘丁無忌縱不治亦不殺人欲知犯觸但脊強瘡痛
極甚不可忍者是犯之狀也

**治十三種丁** 皆以此方治之

以緋帛壹片[illegible]取匝爲限亂髮雞子大攤布帛上牛
黃如梧子大反鉤棘針貳拾壹枚赤小豆柒粒爲末並
布髮上捲緋帛作團外以髮作繩十字縛之熨斗中急
火燒灰研摋細以枸杞或子或根皮枝葉隨得爲末用
枸杞末二匕緋白灰一匕共成三匕研勻分二服空腹

**蒼耳散**治一切丁腫神良方

蒼耳根莖苗子但取一色便可用

右燒爲灰醋泔淀和如泥塗上乾即易之不過十度即拔根出

## 腸癰證治

癰疽初無定處隨其所發即命名在外則爲發背發腦在內則爲腸癰內癰心癰腎癰脇癰脈癰等治得其法則生失法則死外證易識內證難明不可不備述也腸癰爲病身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無聚積身無熱脈數此爲腸內有癰久積陰冷所成也故金匱用附子溫之小腹腫痞按之痛如淋小便自調發熱身無汗復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血洪數者膿已成不可下此以內結熱所成也故金匱用大黃利之最若腹脹大轉側聞水聲或遶臍生瘡或膿從臍出或大便出膿血不治必死其如五內生瘡亦止分陰陽利而已不比外癰須依四節八事之次第也千金引宦羽林婦病明之其脈滑數滑則爲實數則爲熱滑則爲榮數則爲衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血爲敗濁少腹痞堅小便或澁或復汗出或復惡寒膿爲已成設脈遲緊即爲瘀血血下即愈更內經所載有息積病此見有得之二三年遍身微腫續乃大腸與臍連日出膿遂致不救此亦腸癰之類也不可不審

**薏苡仁附子敗醬散**治脈數身无熱腹无積聚按之濡此爲腸癰

薏苡仁 附子 敗醬

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓空心服小便利爲效

**大黃牡丹湯**治腸癰小腹腫痞按之即痛如淋小便自調時時發熱自汗出復惡寒其脈遲緊者膿未成可下之當有血脈洪數者膿已成不可下

大黃 牡丹皮 桃仁 瓜子 芒消

右爲剉散作五服以水三盞煎取八分盞去滓入芒消再煎沸頓服不以時

**薏苡仁湯**治腸癰腹中疞痛煩毒不安或脹滿不食小便澁婦人産後虛熱多有此病縱非癰但疑是便可服就有差互亦無害

薏苡仁 牡丹皮 桃仁 瓜瓣仁

右爲剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓不以時

## 五痔證治

經云腸澼爲痔如大澤中有小山突出爲峙人於九竅中凡有小肉突出者皆曰痔不特於肛門邊生亦有鼻痔眼痔牙痔等肛門中證狀不一方書分出五種曰牡曰牝曰脈曰腸曰氣牡痔者肛邊腫痛突出一枚五六日後潰出膿血自愈牝痔者肛邊發瘰數个如鼠乳狀脈痔者无頭脈中迸小竅注下清血腸痔者生在腸內更衣時挺出接揩不入氣痔者遇憂怒則發肛門腫疼氣散則愈治之之法切勿用生砒毒氣入腹反至奄忽近見貴人遭此痛不忍言因書以戒後學

**五灰散**治五痔不問內外牡牝寒溫勞濕悉主之

鱉甲 蝟皮 猪左足懸蹄甲

蜂房 蛇蛻

右燒存性隨證倍一分爲末井花水調二錢空心臨卧時服

熏法

蝟皮 方寸大切　熏黄 研棗大　熟艾 雞子大

右為末用瓶器以灰實半如燒香法安長桶內坐其上薰之煙氣從口出為佳凡三度薰永差勿犯風冷忌雞肉毒物

洗法

海桐皮 剉　蛇床子 各壹兩　香菌藤 剉　葱白 切各叁莖

右用水壹斗入藥伍兩煎減半去滓候温着手輕輕洗以絹拭乾 一法 止用槐白皮煎湯淋洗最佳

貼藥

蜀葵子 半兩　蟾蜍 伍個　檳榔 壹箇並為末

右用棗三枚取肉研細搜和藥末如膏更搽滴少蜜研成膏量大小貼於病處

腸風論

夫有五痔人每圊則下血或點滴或洴箭或清或濁面黄唇白心忪脚弱頭目眩暈此因飽食坐久腸澼所為亦有飲酒房室過度所致世醫多指此為腸風臟毒然腸風臟毒自是滯下門藏毒即是藏中積毒腸風即是邪入藏純下清血謂之風利今五痔下血乃是酒痔脉痔其血自肛門邊別有一竅如鍼孔大滴淋而下與泄物不共道不可不知

[illegible] 治脉痔下血不止量冷熱加減法

黄連 去鬚　烏頭 炮去皮尖各等分

右為剉散每服貳錢水壹盞半煎柒分去滓空心服熱則加黄連冷加烏頭

酒連丸 治酒痔下血伏暑久治不效

黄連 不以多少剉去鬚酒浸瓷器中重湯煮乾焙為末以酒煮糊丸

加味四君子湯 治五痔下血面色萎黄心忪耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味

人參　茯苓　白术　甘草 炙　黄芪　白扁豆 炒各等分

右為末每服二錢匕湯點服此方人未之信服者頗効所謂看不上手面自有奇功者

荆芥[illegible] 治脉痔下血

荆芥穗　槐花 炒各壹兩　石菖蒲 壹兩

右為末米飲調下二錢食前服日二服

白玉丹 治久年腸痔下血服百藥不效者

凝水石 火煅多少研細入糯米糊中同擣

右糯米糊丸如梧子大陳米飲下五十丸只一服愈

又方 單服烏梅亦効

瘡瘍論治

瘡疥雖不至害人淫不已亦有數年不愈者多因心腎不交傷神失志或飲食不節積滯腸胃致氣血凝留發於肌肉皮膚之間色目極異所謂馬疥栗瘡反花瘑瘡種狀不同或痒或痛汁水淋漓愈而復發諸治不差要當調養心腎去肥甘節慾理無不愈

升麻和氣飲 治瘡疥發於四肢臀髀痛痒不常甚至增寒發熱攻刺疼痛膚生瘡或腫及癩風入臟陰下濕痒耳鳴眼痛者

蒼术 米泔浸　桔梗　升麻　乾葛　陳皮

甘草　芍藥　半夏 湯洗　當歸　白芷

茯苓　枳殼　厚朴　乾姜　大黄 蒸

右為剉散每服四大錢水一盞半薑三片燈心十五莖

煎七分去滓食前服

治風毒入胃及心腎經絡攻注百節疼痛頭目虛腫痰涎不利下注腰脚緩弱生瘡婦人血風男子癩風及風濕脚氣攻注皮膚瘙痒癮疹偏正頭風

川烏頭　草烏頭

荊芥穗　乾薄荷　杜當歸

右爲末醋糊丸梧子大茶清下三十圓此方与□門加味烏荊丸相類但此方入草烏并没藥不同尔

**拔毒散**

羊蹄根　生姜　礬　硫黃　草烏頭

右以米泔淹一宿研極細入釅醋和勻入浴時抓破瘡傅之遲頃以温湯先去淨妙

治一切惡瘡不問乾濕痛痒日近年深百藥不差

羊屎

右一味上下以瓦盆盖柴木燒令煙盡末之麻油調傅痒者入輕粉少許痛者入麝香少許神効

**一方**用杏仁經粉取殺虫

### 癩風證治

男子精血不調外爲風冷所襲致陰下濕痒搔之不已流注于脚遂生瘡瘍名曰癩風世謂腎臟風者乃誤癩爲腎也癩屬宗筋系於肝胃陽明養之陽明主肌肉循經流入四肢故使四肢生瘡正謂之癩風非腎藏風也

**四生散**治癩風上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下注陰濕四肢搔痒遍身生瘡及婦人血風

白附子　沙苑蒺藜　黃芪　羌活 各等

右爲末每服二錢塩酒調下有人將豬腎破開入塩摻淨於其間爛服亦佳癩屬宗筋胃陽明養之故有是證

治元臟氣虛癩風入胃上攻頭疼眼赤彤淚昏澁口乾咽燥下注四肢疼痛腰節重著陰下濕痒足脛腫脾漏生瘡瘍及風水浮腫

川烏頭　蒼术　吳茱萸

京三棱　白塩

右爲末米糊丸梧子大每服五十丸空腹温酒塩湯任下凡水病以忌塩此藥用塩無所忌也　一名正元丹

**升麻和氣飲**治如前　方見瘡癬門

治如前　方見瘡癬門

### 癬證治

凡癬種類亦多所謂古癬瓦癬荷葉癬雖以皮膚氣血虛熱所爲或有風濕搏成者或爲人傳染得之者種狀不同治之各有方

治一切癬無問風濕氣血与夫相染而生者

胖葉荷草　枯礬　雄黃

右爲末以羊蹄菜根先蘸醋措癬上令痒破即以藥末重傅不過三兩次即愈

### 妬精瘡證治

夫遇欲人多患妬精瘡者以婦人陰中先有宿精男子与之交接虛熱即成初發在陰頭如粟拂之則痛甚矣兩日出清膿作臼孔蝕之大痛婦人亦有此病生在玉門內正似疳蝕瘡不痛爲異耳

治妬精瘡

麝香　黃礬　青礬 各等分

右爲末小便後傅之

【□□散】治婦猪瘡痒不可忍者及皮膚諸瘡手抓疽瘡
晋礬（不拘多少枯）　輕粉（少許腦入）
右研勻擦瘡上立差如治漏瘡每挑一錢入黃蘗末一錢輕粉半錢

【□□散】治婦猪瘡膿汁淋漓臭爛
黃連　款冬花（各等分）
右為末以地骨皮蛇床子煎湯洗用軟帛挹乾以津調藥傅之最忌不得用生湯洗諸瘡皆然

【□□散】治陰蝕瘡
蒲黃（二兩）　水銀（一兩）
右研勻先以猪肉湯淋洗挹乾以藥摻之（一方）治男女陰瘡以硫黃末傅之

## 大風叙論

經所載癘風者即方論中所謂大風惡疾癩是也雖名曰風未必皆因風大率多是嗜慾勞動氣血熱發汗泄不避邪風冷濕使淫氣與衛氣相干致肌肉憤䐜氣有所凝則肌肉不仁榮氣泣濁則胕熱不利故色敗皮膚瘍潰鼻柱壞千金所謂自作不仁極猥之業雖有悔言而無悔心良得其情然亦有傳染者又非自致此則不謹之故氣血相傳豈宿業緣會之所為也原其所因皆不內外所因而成也證候多端并見諸右

## 大風治法

凡治大風須推其所因凡因風寒濕熱勞逸飲食與夫傳染不可混濫散寒溫風滲濕清熱調和氣血氣然不同若例以瀉風藥治之則失其機要矣昔見一僧得病狀如白癩卒不成瘡但每旦起白皮一升許如蛇蛻醫者謂多吹炙爆所致與局方解毒雄黃圓三四服而愈豈非得其因耶治之各有方

一【□□浴法】
麻黃根　地骨皮　草烏頭（各等分）
右為剉散研朴硝二兩勻和每用藥二兩水一桶椒一合葱冬十莖艾葉一兩同煎十沸入米醋一中盞打白去滓坐溫室中且用手巾搭四肢候湯可浴即浴令汗透面上如珠流更坐室中或睡片時尤佳候汗解方許衣避風而出五日再浴如此兩上浴便服換骨丹

二【換骨丹】
九肋鱉甲（去裙）　海蜈蚣（十條）
右以鹽泥固濟候乾火煅存二分性為末巴豆半兩去皮膜類手研青州棗七个去核入巴豆膏在棗中火燒令焦存巴豆五分性將棗巴豆爛研如泥入前二味末同研勻以醋煮糊為丸如菉豆大每服七丸虛者四五圓用溫蠶汁下候利惡物如膿血爛魚腸即住服此三兩服未利更加一二丸次服遇仙丹

三【遇仙丹】
人參　紫參（各壹兩）　苦參　白殭蠶（去觜各一兩炒）
右為末白麪糊圓梧子大每服二十丸溫鹽湯吞下食前日二次服踈風散

四【踈風散】
山梔子仁（壹兩）　大黃　白滑石　熟地黃　綠豆
右為末入朴硝半兩令勻每服一錢食後濃茶清調下次以佛手膏去瘡

五【佛手膏】去黑紫瘡核（一方生油上黑紫瘡核）
斑猫（七个去翅足）　巴豆（七粒去殼）　杏仁（七粒去皮尖）　紅娘子（七个去翅足）

以本作方有入乃上而定之

六 七 八 九 十

砒霜 研 盆硝 壹錢 黄蠟 半两 韶粉 半两
瀝青 各半两 硫黄 黄丹 各壹錢 膩粉 十
菉豆 壹合 猬角 三個 麻油 四两 亂髮 雞子大 壹两
右用油煎令髮化次下紅娘子次下巴豆猬角等逐味
下候焦者漉出方下硫黄盆硝及丹粉等以箄子不住手
攪令勻滴水成珠爲度用時先將針輕手刺瘡拔用藥
一粟米大放針処次日揭瘡有黒臭膿血出三兩日血
淋少次服去毒丹

**去毒丹**
赤芍藥 甘草 滑石 各半两 巴豆 去皮 研 別入
黒牽牛 壹两半 朴消 一两 大黄 壹分
右為末麪糊丸菉豆大臨卧時服十五丸金銀薄荷湯
下加至二十丸次服甘草散

**甘草散**
甘草 滑石 各半 山豆根 壹两 大黄 壹分
右為末每服一錢蜜熟水調下日二服次服解毒丸

**解毒丸**
大蓋根 三两 甘草 半两 大黄 壹分 朴消 別研
右為末麪糊丸如菉豆大每服二十丸至三十丸白湯
下次服福神丹

**福神丹**
訶子 炮 四个 巴戟 炒 黒牽牛 半两 甘遂 生
赤小豆 四十九 生
右為末麪糊丸如菉豆大每服十丸至二十五丸薄荷湯
下次用水膏藥

**水膏藥** 傳貼破処及面脚上瘡令生肉

廿

陳皮 去白 炒紫色 陳麥米 炒黄 藿香
馬蹄香 各壹两 麝香 別研
右同為末入麝香用冷水調搽傳瘡上有膿処如損破
即煎桃枝湯洗再上藥此十方乃倪処士秘傳曾用有
驗大要病人須能如法將息理會敬而信之

**通天再造散** 治大風惡疾
鬱金 生 壹两 大黄 壹两 白牽牛 六錢 皂角刺 壹两
右為末每服伍錢日未出面東以無灰酒下尽量為度
晩利黒頭小虫病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌毒半
月但食稀粥軟飯漸生眉毛皮膚如常甚者不過三兩
次須斟理不可妄有勞動及終身不得食牛馬驢騾等
肉犯者死不救

**[illegible]** 治如前
當歸 熟地黄 川芎 荊芥穗 各弐两
防風 細辛 各壹两 桂心 壹分
右為細散先以醋一升浸一宿漉出焙乾再以生地黄
壹斤搗汁浸一宿焙乾再一升浸一宿焙乾旋入乳香
半两以餘酒醋地黄汁釋蒸餅為丸如梧子大用好川
烏頭一个炮裂剉荊芥穗半两以酒三升旋溫下藥五
十圓

**八葉湯** 洗渫大風瘡
桑葉 荷葉 地黄葉 皂角葉 葉
蒼耳葉 菖蒲葉 何首烏葉
右等分曬乾燒存性為末如面藥洗手面身躰

料簡
大風惡疾瘡痍荼毒膿汁淋漓眉鬢隳落手足指脱頑痺痛

瘡頞色枯瘡鼻崩眼爛齒落揭病證之惡无越於斯負此病者百无一生猶且家絕妻娶復者若利不仁之行仍欲更作死而无悔深可悲傷凡遇此疾切須斷塩及一切口味公私世務悉宜屛置能不犯俗事絕慶弔幽隱林下依法治療非但愈疾亦能因是而至神仙所謂因禍而得福也

三因極一病證方論卷之十五

# 三因極一病證方論卷之十六

## 斑瘡證治

夫斑瘡病內經与張仲景皆不載巢撫方論蓋自魏朝方有以白頭赤根者俗呼為豌豆即斑瘡也細粟如麻者俗呼為麸即膚疹也又有大者俗呼為芋為疹此皆輕重之不齊故命名異耳百問云偏不得轉利以瘡疹發於表利之則毒氣入裏龐安常云身狀壯熱須少解散使開毒攻非利不愈必令汗下初虞世亦云瘡疹發於肌肉屬陽明古人治法皆以承氣湯利之諸說矛盾不無疑誤今皆存之要當分其未發已發為治若其始發必作寒熱如傷寒狀方論所載耳後冷疹疫者若皆瘡疹證又小兒初得手足搐搦如風癇者亦瘡疹候便可与宣熱拔毒必須利之千金治豌豆瘡初發欲發者與黃大黃服之即明文也若其已發只須解肌用升麻紫草輩是也如是分之諸說自泮又此病多因傷寒失於汗下或時氣勝復歲主客氣及天行疫病長幼相染者當隨因辨證治之其間唯倒靨最危宜早為治

**三豆飲子** 治天行豆瘡但覓有此證預服則不發

赤小豆　黑豆　菉豆各壹升　甘草半兩

右淨淘豆入甘草以水煮熟逐日空心任性食豆飲汁七日瘡自不發

**升麻湯** 治大人小兒傷風寒溫疫頭痛寒熱壯疾斑瘡已發未發並可服

升麻　乾葛　甘草炙　芍藥各等分

右為剉散每服抄五錢重水二盞煎七分去滓熱服小兒量与一法加紫草茸煎

**[illegible]** 治傷寒斑瘡毒氣咽喝不利声不出痰痛

鼠粘子炒　丹參　升麻　甘草炙　乾薄荷各等分
右為剉散每服三錢水一盞半煎七分去滓不拘時小
兒量与之
龍腦膏　治斑瘡倒黶
猪心血調腦子成膏以紫草茸煎湯解開稀稠得所服
無腦子用辰砂一法白藭葉燒灰為細末每服二錢入
麝香少許沸湯調下
仙靈散　治斑瘡入眼
仙靈脾　威靈仙各等分
右為末每服二錢食後米湯調下
豆皮飲　治小兒因小兒因出瘡毒入眼生翳
黑豆皮　白菊花　真穀精草去根各等分
右為末每服一大錢乾柿一个粟米泔一盞同煎候泔
尽只將乾柿去核日服三

丹毒叙論

經云諸痛癢瘡皆屬心心虛寒則痒心實熱則痛丹毒之病
由心實熱也心生血主於脉血熱肌浮陰滯於陽即發丹毒
方論有云以其色赤如丹砂塗故得丹名然又有水丹白丹
五色油丹豈專以赤為名也又有赤䃃天火殃火尿灶燄
野火等古方以為小兒出入游行觸犯所致此因容或有之
若小兒在襁褓中未能出入亦患此者是豈因觸犯耶大率
皆血熱之所為也叙例于後

丹毒證治

天火丹者肉中忽赤如丹塗之色痛痒不定甚至徧身白丹
者肉中腫起痒痛如吠狀雞冠丹者亦名粟𠕋丹肉上粟起
如雞冠水丹者偏肝熱起黃色如水在皮中五色油丹者亦
名油腫赤䃃丹腫熱赤色流入四肢以上皆不問大小如天
火骨火殃火尿灶朱田野火等丹多着少小但自腹內生出
四肢者則易愈自四肢生入腹者則難治
赤鮮火丹　治諸種丹毒發於四肢腰背頭面或赤或白或痒
或痛或寒或熱
香桑皮壹兩
右以一大椀水同煎取半椀以翎毛刷患処神效
伏龍肝散　治少小諸種丹毒
伏龍肝不拘多少
右為末以雞子白和傅之日三次
八神化飲　治一切丹毒
鬱金　黃芩　甘草　山梔　大黃
黃連　糯米
右七味各壹兩生為末蜜和冷水調以鵝毛上患処

料簡

治丹毒方千金外臺甚多無出用至冷物凡至冷物无過藻
菜如有患丹毒熱腫等取渠中藻菜細切熟搗傅丹上厚三
分乾則易之最良

癮疹證治

世醫論癮疹無不謂是皮膚間風然既分冷熱冷熱即寒暑
之證又有因浴出湊風冷而得之皆豈非湿也則知四氣備
矣經云諸痒痛瘡皆屬於心心實熱則痛虛寒則痒又陽明
主肌肉屬胃与大腸亦有冷熱分痛痒不可不審世人呼白
者為婆眹赤者為血風名義混殽當以理曉內則察其臟腑
虛實外則分其寒暑風湿隨證調之無不愈
加味羌活散　治風寒暑湿外搏肌膚發為癮疹憎寒發熱遍

身搔痒隨臟氣虛實或赤或白心迷悶亂口苦咽乾
羌活　前胡各壹兩　人參　桔梗
甘草炙　枳殼麩炒　川芎　天麻
茯苓各半兩　蟬蛻去足　薄荷各三錢
右為末每服二大錢水一盞姜三片煎七分不以時服
烏荊圓　治癧瘍上攻頭面赤腫搔痒搔之皮便脫落作
瘡作痒或痛淫液走注有如虫行
川烏湯洗浸三日去皮尖切作片　荊芥穗各半
當歸酒浸一宿焙　薄荷各一兩
右為細末好醋煮米粉糊為丸梧子大每服五十丸溫
酒茶清下
白朮散　治因浴出後風冷遍身瘾疹搔之隨手腫突及眩暈
嘔噦
白朮壹兩　神麯炒貳兩　甘草壹分
右為末每服二錢米飲調下　一方以上朱研炒冷酒調
下二錢不飲以茶調之
又方　景天壹斤細擣取汁傅上熱炙手摩之再三度差

胡臭漏腋證治

胡臭与漏腋雖不害人性命而害人身奉親事君乃至交遊皆非所宜修身之士務為清潔者或得此患不可不思有以去之夫胡臭者多因勞逸汗漬以手摸而嗅之致清氣道中受此宿穢故傳而為病方論有天生臭之說恐未必皆然多凡為人相染者蓋其氣吸上元宮逆散百脈多相沾染思之為得漏腋者亦由腋下挾汗致污衣數重皆透然未必臭以二證致之其病自別古方共作一病未為至論

五味散　治胡臭熏人不可嚮邇者
大蜘蛛壹個
右一味研細臨卧入輕粉一字用釅醋調成膏傅腋下明早登廁必瀉下黑汁臭穢不可聞於遠僻處傾棄埋之免致染人神良
六物散　治漏腋腋下足心手掌陰下股裏常如汗濕污衣者
乾枸杞根　乾薔薇根　甘草各半兩
商陸根　滑石各壹分　胡粉
右治下篩以苦酒少許和塗當微汗出易衣更塗之不過三着便愈或一歲後發又塗之

頭痛證治

頭者諸陽之會上丹崖于泥丸宮百神所聚凡頭痛者乃足太陽受病上連風府眉角而痛者皆可藥愈或上穿風府陷入于泥丸宮而痛者是為真頭疼不可以藥愈夕發旦死旦發夕死責在根氣先絕也原其所因有中風寒暑濕而疼者有氣血食飲厥而疼者有五臟氣鬱厥而疼者治之之法當先審其三因三因既明則所施無不切中

芎辛丸　治傷風寒生冷及氣虛痰厥頭疼如破兼眩暈欲倒嘔吐不定
附子生去皮臍　烏頭生去皮尖　天南星　乾薑
甘草炙　川芎　細辛各等分
右為剉散每服四大錢水二盞姜五片茶芽少許煎七分去滓食後
□□丸　治傷風挾涎飲上厥頭疼偏正夾腦諸風
藿香半兩　川烏頭
乳香　草烏頭

右爲末每服一字薄荷茶清調下食後服

[illegible]散 治傷寒發熱頭疼腦痛

石膏　甘草生　麻黃去節各等分

右爲末每服二錢水一小盞茶半錢葱白三寸研碎煎

三伍沸先噹葱白細嚼下去枕仰卧如發熱再投一服

出汗立愈

[illegible]散 治傷寒發熱涎潮上厥伏留陽經頭疼眩暈不可忍者

石膏煅

右研細每服茶白點茶調下二錢小兒量大小加減与之

芎朮湯 治着濕頭重眩暈苦極不知食味暖肌補中益精氣

川芎半兩　白朮半兩　附子生去皮臍半兩　甘草　桂心各一分

右爲剉散每服四大錢水二盞生姜七片棗一个煎七分

去滓食前服

救生散 治外傷風冷內積憂思氣鬱聚涎隨氣上厥伏留陽

經頭疼壯熱眩暈或胸膈寒痰兼服寬中圓并攻之

菊花蒂　川芎　石膏煅各一兩　甘草[illegible]

右日乾爲末每服三錢煎葱湯調下如覺胸痞即調此

下寬中圓不計時服

寬中圓 治氣滯不快飲食不消胸膈痞塞凝痰聚飲狀如傷

寒頭疼胸痞

大附子炮去皮臍　木香炮　青皮　大黃濕紙裹煨各等分

右爲末醋煮糊圓梧子大每服十圓姜湯下頭疼甚則

調救生散送下

天南星圓 治腎厥頭疼不可忍

硫黃　石膏　天南星炮　焰硝各等

右爲末糊丸如梧子大每服三十圓空心食前溫酒下

[illegible]圓 治腎厥及痰厥頭疼諸藥不效

硫黃　川烏頭炮去皮各半兩　朱砂水飛一兩　天南星炮一兩

右爲末姜汁煮糊圓梧子大每服十五圓生姜薄荷湯下

[illegible]巴豆丸 治氣攻頭痛如破者

萌蘆巴炒　三稜[illegible]　乾薑炮各[illegible]

右爲末每服二錢生姜湯或酒調下

[illegible]圓 治八般頭風及眩暈惡心吐逆諸藥不治

通明雄黃一兩　川烏頭生去皮尖[illegible]

右二味爲末滴水圓如梧子大每服十丸煨葱白茶清

下即用後藥搐鼻

[illegible]散

華撥　良薑各一分　白芷一錢　細辛半錢

右爲末每服一小字先含水一口分搐鼻內吐水即止

大附圓 治元氣虛壅上攻偏正頭疼不可忍

大附子炮去皮[illegible]

右爲末葱汁糊圓菉豆大每服十圓至十五圓茶清下

一法以川烏頭炮去皮尖爲末用韭葉自然汁和圓治

風虛痰涎頭疼

[illegible]餅子 治氣厥上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏正頭

疼痛連腦顛吐逆惡心目暝耳聾常服清頭目消風[illegible]

川烏頭生去　天南星　乾薑各一兩　甘草

川芎各二兩　天麻　防風　半夏洗去滑各半兩

右爲末湯浸蒸餅和丸雞頭大捻作餅子曬乾每服五

餅同荊芥三五穗細嚼茶酒任下熟水亦得不拘時候

眼叙論

夫眼者五臟之精明一身之至寶如天之有日月其可不保

譏之然骨之精爲瞳子屬腎筋之精爲黑眼屬肝血之精爲
絡果爲心氣之精爲白眼屬肺肉之精爲約束屬脾契筋骨
血氣之精與脉并爲系系上屬於腦後出於項中故六淫外
傷五臟內鬱飲食房室遠視悲泣抄寫雕鏤刺繡博弈不避
煙塵刺血發汗皆能病目故方論有五輪八廓內外障等各
各不同尤當分其所因及臟腑陰陽不可混濫如日決其面
者爲兌皆屬少陽近鼻上爲外眥爲太陽下爲內眥屬陽明
赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病
此三陽病不可混也睛色赤病在心色白病在肺色青病在
肝色黑病在腎色黃病在脾色不可名者病在胃中此五臟
三陽病不可混也仍敘三因于后

三因證治

病者喜怒不節憂思兼并致臟氣不平鬱而生涎隨氣上厥
逢腦之虛侵淫眼系蔭注於目輕則昏澀重則障翳眵淚胬
肉白膜遮睛皆內所因或數冒風寒不避暑濕邪中於項乘
虛循系以入於腦故生外翳醫論中所謂青風綠風紫風黑
風赤風白風白翳黃翳等隨八風所中變生諸證皆外所因
或嗜慾不節飲酒無時生食五辛熱啖炙煿馳騁田獵冒涉
煙塵勞動外精喪明之本所謂恣一時之游佚爲百歲之固
疾皆不內外因治之各有方

**千金神麴圓** 明目百歲可讀細書常服益眼力
神麴 四兩 磁石 光明砂 壹兩
右爲末煉蜜爲丸梧子大米飲服五丸食前日三服不禁

**羌活散** 治風毒氣上攻眼目昏澀翳膜生瘡及偏正頭疼目
小黑花累累者
羌活 川芎 天麻 旋覆花
青皮 天南星 炮 藁本 各壹兩
右爲末每服二錢水一盞薑三片薄荷葉煎七分食
後服一法入牽牛末貳兩以生薑汁煮糊圓如梧子大
酒任下二三十圓

**白蒺藜散** 治腎臟風毒上攻眼目赤腫熱淚昏澀胬肉攀睛
白蒺藜 炒去刺 防風 甘草 炙 殭蠶
南星 甘菊花
右爲末每服二錢煎甘草湯下食後服忌炙煿

**洗肝散** 治肝熱赤脉貫睛澀痛衝風淚下兼治熱血攻心
白蒺藜 去刺 防風 羌活 各兩 馬牙硝 甘草 壹分
右爲末每服二錢白湯調下食後服

**椒紅圓** 明目暖水臟補虛方久服駐顏縮小便
川椒 巴戟 去心 金鈴子 剉炒 茴香 炒
附子 炮去皮臍
右爲末山藥半兩爲末酒煮糊爲圓梧子大空心鹽
湯下三五十丸

**羊肝散** 治眼赤有耳痒甚則用四生散入羊子肝煮甚妙
**四生散** 方見風門 每服四錢匕鹽酒入羊子肝煮空心溫
服

**驅風散** 治風毒上攻眼腫痒澀痛不可忍或上下瞼眦赤爛
翳肉侵睛
五倍子 蔓荊子 壹兩
右爲剉散每服三錢水二盞銅石器內煎及一盞澄清
熱洗留滓二服再煎

**立勝散** 治風毒攻眼及時眼隱澀羞明腫痛
黃連 黃檗 秦皮 去麤皮 甘草 等分

右為剉散每服四錢水一盞棗一枚煎七分去滓
去滓以新羊毫筆蘸刷眼候溫即用手沃之一法不用
黃蘗甘草有黃芩防風

**神仙照水膏** 治瞖障

蠟（壹兩） 黃丹（壹兩水飛） 蛇蛻（壹條燒） 水銀（壹錢）
初生烏雞殼（壹箇）
右用柳木槌研細滴蠟為餅臨臥用之候天明將水照
眼藥墮水中膜尽去

**葉竹煙方** 治一切赤眼障瞖

慈竹（壹段） 黃蘗
右用磚對立置竹磚上兩頭各安淨瓶以乾竹火燒令
瀝出尽收之以銀股銅筯點

**日用方** 治眼赤澁翳膜遮障時多熱淚

杏仁（貳拾壹箇） 乳香（皂子大） 輕粉（壹字）
右旋入口中都嚼候津液滿口吐出於盞中置火上令
四邊沸以綿濾別盞中入生腦子如皂子大研勻再濾過
以銅筯點之

**通神膏** 治眼生翳膜赤脉努出澀痒疼痛有淚

沙蜜（肆兩） 青鹽 麝香（各壹字） 乳香
硇砂 枯礬（各半錢） 當歸（半錢） 黃連（壹錢）
右件乳鉢內研破同蜜入青竹筒內密封閉定煮半日
厚綿濾過點眼

**蛤粉圓** 治雀目不拘久近但日落便不見物

上色蛤粉（細研） 黃蠟（等分）
右鎔蠟搜粉為丸如棗大每用猪肝一片二兩許批開
裹藥一丸麻線纏定罨內水一椀煮熟取出乘熱熏眼

至溫喫肝以知為度

## 鼻病證治

肺為五臟華蓋百脈取氣於肺鼻為肺之關闢吸引五臭衛
養五臟升降陰陽故鼻為清氣道或七情內鬱六淫外傷飲
食勞佚致清濁不分隨氣壅塞遂為清涕鼻洞濁膿腦𧊑
血息肉久而為齆雖種種不同未始不從三因有致況尤泪
亂変生諸證

**羊肺散** 治肺虛壅鼻生息肉不聞香臭

羊肺（壹具） 白朮（肆兩） 蓯蓉 木通
乾薑 川芎（各貳兩）
右以水量打稀稠得所灌肺中煮熟細研焙乾為末食
後米飲服二三錢

**辛夷膏** 治鼻塞腦冷清涕出不已

細辛 川椒 乾薑 川芎 吳茱萸
附子 皂角 桂心（壹兩） 豬脂（陸兩）
右煎豬脂成油先一宿以苦酒浸前八味取入油煎附
子黃色止以綿裹塞鼻孔

**通草散** 治鼻齆氣息不通不聞香臭并有息肉

木通 細辛 附子
右為末蜜和綿裹少許內鼻中
一法以瓜蒂為末綿裹內鼻中或吹入亦可
一法以枯礬研為面脂和綿裹少許內鼻中數日息肉
與藥俱落

**瀉肺散** 治肺熱鼻發赤瘰俗謂酒皶

硫黃 
輕粉 烏頭尖

右研勻以面油調臥時傳早晚洗去以齏調尤佳

一法用乳香硫黃細辛輕粉等分為末水調傳

一法梔子為末蜜丸小彈子大茶酒任下一丸

凡鼻頭微白者亡血也赤者血熱也酒客多有之若時行衄血不宜斷之或出至一二升不已即以龍骨為末吹入凡九竅出血皆用此法甚良餘衄方見失血門

## 唇病證治

唇者脾之候也意舍之所榮燥則乾熱則裂風則瞤動寒則揭氣鬱則生瘡血枯則瀋而無色治之之法內則隨證調其脾外當以藥傳之

**[illegible]** 治脾風過度蘊熱於脾口乾唇燥瀋裂無色

黃芪 香白芷 升麻 人參 甘草炙 半夏

右為㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗二個小麥二十粒煎七分去滓不以時服

**羌活散** 治風濕入脾致唇口瞤動揭搖頭暈目眩及四肢浮腫如風水狀

羌活 茯苓 薏苡仁

右為末每服二錢水一大盞煎七分入淡竹瀝一匙許再煎服

**菊花丸** 治脾肺氣虛憂思過度榮衛枯耗唇裂瀋緊或口吻生瘡容色枯顇男子失精女子血衰並主之

甘菊花 枸杞子 肉蓯蓉 巴戟去心

右為末蜜丸梧子大每服三五十丸米湯下

**[illegible]** 治唇緊燥裂生瘡面無顏色

青布燒灰

右研細以豬脂調夜傳睡一法以頭垢傳之

凡瘡唇緊唇上生瘡唇裂並以甲煎傳之亦効

## 口病證治

夫口乃一身之都門出入榮養之要道節宣微爽病必生焉故熱則苦寒則鹹宿食則酸煩躁則澀虛則淡疸則甘五味入口藏於胃脾行其精華分布津液於五臟臟氣偏勝味必偏應於口或勞鬱則口臭凝滯則生瘡不可失睡失睡則

**[illegible]** 治上焦壅熱口舌生瘡咽嗌腫痛以少許摻患處

寒水石 硼砂 生腦子半字

右為末日夜數次用小兒瘡疹攻口先以五福化毒丹

**[illegible]** 治口瘡疼痛掃卻用此藥摻立効

五倍子 黃柏 滑石

右研細末每服半錢許摻患處吐津不妨便可飲食

**[illegible]** 治口瘡臭氣瘀爛久而不差

黃柏 螺青

右研細臨卧置一字在舌下不妨咽津迨明差

一法以銅綠易螺青

**[illegible]** 治蘊毒上攻或下虛邪熱病口生瘡

細辛 黃連

右為末先以熟水揾帛指淨揩瘡患處良久涎出吐之

**[illegible]** 治口瘡以涼藥傳之不愈者

杏仁 輕粉

右研杏仁細調勻臨卧傳瘡上少頃吐之勿嚥

**[illegible]** 治口氣熱臭

甜瓜子去殼

右一味研細蜜麩少許調成膏食後含化或傳在齒間

仁方用香附子炒去毛爲末每早晚揩少許牙上

齒病證治

齒爲關門腎之榮骨之餘也腎衰則齒豁精固則齒堅又大腸支脉在牙齗主灌注於牙大腸壅則齒爲之浮大腸虛則宣露挾風則攻目頭面疳䘌則齗脫爲痔皆氣鬱而生諸證不同治之各有方安腎丸八味丸並治虛壅牙齒疼痛浮腫

**還少丹** 方見腰痛門 **八味丸** 方見脚氣門

西嶽蓮華峯神傳**齒藥方** 嶽生方法皇統甲子[illegible]

猪牙皂角及生薑　西國升麻熟地黃
木律旱蓮槐角子　細辛荷葉要相當
青鹽等分同燒煅　研細將來使最良
揩齒牢牙髭鬢黑　誰知世上有仙方

**常用牢牙散** 牢牙去風冷蚛牙宣露不問老少用之甚効

槐枝　柳枝 [illegible]　皂角 [illegible]　鹽 [illegible]

右同入甆瓶內黃泥固濟糠火燒一夜候冷取出研細用如常法有石佛庵主年七十餘云祖上多患齒疼脫落得此方效數世用之齒白髮烏乃良方也

**玉池散** 治風蚛牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口氣

地骨皮　香白芷　川升麻　防風　細辛
川芎　槐花　當歸　藁本　甘草 各等分

右爲末每用一字許揩牙或大段痛即取二錢水一盞半黑豆半合生姜三片煎至一盞去滓稍溫嗽候冷吐之或用金沸草散熏漱亦佳

舌病證治

舌者心之官主嘗五味以榮養於身資於脾以分布津液於五臟故心之本脉係於舌根脾之絡脉係於舌傍肝脉循陰器絡於舌本凡此三經或爲風寒濕所中使人舌卷縮而不能言或憂怒思恐所鬱則舌腫滿而不得息心熱則破裂生瘡肝壅則出血如湧脾閉則白胎如雪諸證雖異治之各有方

**升麻柴胡湯** 治心脾虛熱上攻舌上生瘡舌本強頰兩邊腫痛

柴胡　升麻　芍藥　梔子仁　木通 各等分
黃芩　大青　杏仁 [illegible]　石膏 [illegible]

右爲剉散每服四大錢水一盞姜五片煎七分去滓食後服

**金沸草散** 治風寒傷於心脾令人憎寒發熱齒浮舌腫

荊芥穗 [illegible]　旋覆花　前胡　麻黃 [illegible]
甘草 [illegible]　芍藥 赤者　半夏 [illegible]

右爲剉散每服四大錢水一盞半姜七片棗一个煎七分去滓熱漱口以一半喫一半世醫用此發散傷風傷寒及加杏仁五味子治咳嗽皆効獨未知治舌腫牙疼辛未年有人患舌腫如吹滿塞其口中粥藥不入其勢甚危大煎一劑乘熱以紙籠氣熏之遂愈又一婦人牙疼治療不差致口頰皆腫亦以此藥熏漱而愈故特記之

**[illegible]法** 凡舌腫舌下必有噤虫狀如螻蛄臥蠶有頭尾頭小白可燒鐵烙烙頭上即消

**黑散子** 治舌忽然腫破

釜底煤 研細

右以醋調傅舌上下脫去再傅能先決出血竟傅之弥佳一法用鹽等分調

**薄荷蜜** 治舌上生白胎乾澁語話不真

薄荷自然汁　白蜜 等分

右先以生薑片蘸水揩洗竟傅之良

**文蛤散** 治熱壅舌上出血如泉

五倍子洗 白膠香 牡蠣粉各等分

右為末每用少許摻病處或燒鐵篦熱烙孔上

**礬石散** 治風濕寒舌強不能語

枯礬 桂心各等分

右為末每壹錢安舌下或用正舌散治之方見中風門

凡失欠頰車蹉但開不能合以酒飲之令大醉睡中吹藥搐其鼻嚏透即自正

## 咽喉病證治

夫喉以候氣咽以嚥物咽接三脘以通胃喉通五臟以系肺氣穀攸分皎然明白有為水梅穀喉之說者謬說也千金復云喉嚨假脾胃咽門應肝胆亦非至論智者當以理推不可強存乎人焉諸臟熱則腫寒則縮皆使喉閉風燥亦然五臟久咳則声嘶嘶者喉破也非咽門病咽腫則不能吞乾則不能嚥多因飲啖辛熱或復嘔吐咯傷致咽系乾枯之所為也與喉門自別又有懸癰累腫閉塞喉嚨亦如喉閉但懸癰在上腭俗謂鷰翁又謂之蒂聚俗語聲訛不可不備識

**小續命湯** 治卒喉痺不得語方見中風門

加杏仁去皮尖七箇煎甚効

**玉鑰匙** 治風熱喉痺及纏喉風

焰消壹兩半 硼砂半兩 腦子壹字 白殭蠶壹分

右為末研勻以竹管吹半錢許入喉中立愈

**神效散** 治喉閉熱腫語聲不出

荊芥穗 蓖麻去皮別研各等分

右入生蜜少許丸如皂子大以綿裹含化急則嚼化

一法用朴消不用荊芥

**蜜附子** 治府寒咽門閉不能嚥

大附子生去皮臍

右切作大片蜜塗炙令黃含嚥津甘味盡更塗炙用

**玉屑無憂散** 治纏喉風咽喉疼痛語聲不出嚥物有礙或風涎壅滯口舌生瘡大人酒癥小兒奶癖或誤吞骨骨哽塞不下

玄參 貫衆 滑石 縮砂仁

黃連 甘草 茯苓 山豆根

荊芥穗各半兩 寒水石煆 硼砂各叁錢

右為末每服壹錢先抄入口以新水嚥下此藥除三尸去八邪殺九蟲辟瘟疫

**荊芥湯** 治風熱肺壅咽喉腫痛語聲不出喉中如有物哽嚥之則痛甚

荊芥穗半兩 桔梗貳兩 甘草炙壹兩

右為剉散每服四錢水壹盞薑三片煎六分去滓溫服

一法去荊芥穗名如聖湯

**解毒雄黃圓** 治纏喉風及急喉痺卒然倒仆失音不語或牙關緊急不省人事或上膈壅熱痰涎不利咽喉腫痛

雄黃研 鬱金壹分 巴豆去皮出油

右為末醋糊圓菉豆大熱茶清下七圓吐出頑涎立省未吐再服如未至死心頭尚溫灌藥下喉无有不活

**[illegible]散** 治懸癰熱卒暴腫大

乾薑 半夏湯洗等分

右為末以少許着舌上嚥津

一法用鹽抹筯頭張口拄之日五六次

**杏仁煎**治穀賊尸咽咽喉中癢此因誤吞穀芒搶刺痒痛

脂麻（炒，不以多少）

右爲末湯點服凡穀賊屬咽馬喉風屬喉不可不分

**馬鞭草散**治馬喉痺洪腫連頰吐氣數者

馬鞭草根

右搗自然汁每服抄壹合許㊀法用馬銜鐵汁服亦妙

凡治哽之法皆以類推如鸕鷀治魚哽磁石治針哽髮灰治髮哽狸虎治骨哽亦各隨其類也

**薤白通**治諸哽

煮薤白令半熟以線繫定手捉線少嚼薤白嚥之度薤至哽處牽引哽即出矣

**玉屑無憂散**治一切物哽（方見前治咽喉風下）

㊀法綿一小塊以蜜煮用如食薤法

耳病證治

腎爲寄竅於耳當知耳爲腎之會主納五音外則宮商角徵羽內則嗞吾八大咽內關五臟外合六淫故風寒暑濕使人聾聵耳鳴憂思喜怒多生內塞其如勞逸不言而喻復有出血生膿聤耳底耳或耵聹（上自頂切下乃頂切）不出飛走投入諸證既殊治各有法

**菖蒲圓**治耳疼痛及聾塞不聞聲

菖蒲 附子（炮去皮臍，各等分）

右爲末以醋丸如杏仁大綿裹內耳中日二易之

**補腎圓**治腎虛耳聾或勞傾傷氣中風虛損腎氣升而不降致耳內虛鳴

山茱萸 乾薑（炮） 巴戟 芍藥 澤瀉

兔絲子（酒浸） 遠志（去心） 桂心 黃芪 石斛

乾地黃 細辛 附子（炮） 當歸 牡丹皮

蛇床子 甘草 肉蓯蓉（酒浸） 人參（各壹兩） 菖蒲（壹兩）

防風（壹兩半） 茯苓（半兩） 羊腎（貳對）

右爲末以羊腎研細酒煮麵糊爲圓如梧子大食前鹽酒任下參拾圓至伍拾圓

**蠟彈圓**治耳虛聾

白茯苓（貳兩） 山藥（炒，參兩） 杏仁（去皮尖，炒，壹兩半） 黃蠟（壹兩）

右以前參味爲末研勻鎔蠟爲丸如彈子大鹽湯嚼下

有人止以黃蠟細切嚼爛好建茶送下亦效

**乾蝎散**治耳聾因腎虛所致十年內壹服效

乾蝎（...）

右向晚勿食初夜以酒調作壹服至貳更以來徐徐盡量飲五更耳中聞百十攢笙響便自此聞聲

**解倉飲子**治氣虛熱壅或失飢冒暑風熱上壅耳內聾閉徹痛膿血流出

赤芍藥 白芍藥（各半兩） 當歸 甘草（炙）

大黃（蒸） 木鱉子（去殼，各壹兩）

右爲剉散每服四錢水壹盞半煎七分食後臨臥服

**麝香散**治聤耳底耳耳內膿出

桑螵蛸（壹拾箇，慢火炙及八分熟存性） 麝香（壹字，別研）

右爲末研令勻每用半字摻耳內如有膿先用綿撚紙以藥摻之㊀法用紫坯枯礬等分爲末以葦管吹入耳中即愈或入麝香尤佳

**治百蟲入耳**用麻油灌之即効

**治耳中出血**以龍骨末吹入即止

三因極一病證方論卷之十六

## 婦人論

夫天地造端於夫婦，乾坤配合於陰陽，雖清濁動靜之不同，而成象效法之有類。況婦人之病與男子不同者，亦有數焉。古方以婦人病比男子十倍難治，亦言之深乎。但三十六病，產蓐一門，男子無之，其如外傷風暑寒濕，內積喜怒憂思，飲食房勞，虛實寒熱，悉與丈夫一同也。依源治療，可得而知之。

## 求子論

夫有夫婦，則有父子，婚姻之後，必求嗣續。故聖人謂不孝有三，無後為大，言嗣續之不可斷也。凡欲求子，當先察夫妻有無勞傷痼害之屬，依方調治，使內外和平，則婦人樂有子矣。

**蕩胞湯** 治婦人立身以來全不產，及斷緒久不產三十年者。

朴消　牡丹皮　當歸　大黃（蒸一飯久）

桃仁（湯去皮尖，各二兩，麩炒）　細辛（去苗）　厚朴（姜制）

赤芍藥　桔梗　人參　茯苓

桂（去皮）　甘草（炙）　牛膝（酒浸）　橘皮（各一兩）

附子（炮去皮臍）　虻蟲（去翅足，炒）　水蛭（炒焦）

右為剉散，每服四大錢，水、酒各半盞，煎至七分，去滓，空腹服，日三夜一，溫覆得少汗，必下積血及冷赤膿如小豆汁，斟酌下盡。若力弱大困不堪者，只一二服止；如惡物不盡，不得藥力，能卻服，盡好，不爾，著坐導藥。

**坐導藥** 治全不產及斷緒，服前湯惡物不盡，用此方。

皂角（去皮子）　吳茱萸　當歸

五味子　乾薑（各二兩）　大黃　礬石（枯）

戎鹽　蜀椒（各半兩）

右為細末，以絹袋盛，大如指，長三寸，盛藥令滿，縛定，納婦人陰中，坐臥任意，勿行走，小便時去之，更安新者，一日一度。必下清黃冷汁，汁盡止。若有所去，乃可十日安之。本為子宮有冷惡物，故令無子，但天陰冷則發疼痛，須候病出盡乃止，不可中輟，每日早晚用苦菜煎湯薰洗。

**秦椒丸** 治婦人無子，或斷緒，上熱下冷，此方見千金。

秦椒（去目）　桂（去皮）　不見火　杜仲（去皮，炒）　防風（各二分）

厚朴（姜制）　附子（炮）　茯苓（各一兩半）　白薇

乾薑（炮）　牛膝（酒浸）　沙參　半夏（湯洗）

人參　細辛（去苗）

右為細末，煉蜜丸如梧子大，每服五十丸，空心食前溫酒鹽湯任下。如未效，更加圓數，有孕者則止。神效無如此說。

**探胎散** 治斷經三月，不知是胎驗之方。

不復發熱

川芎（不拘多少）

右為末，空腹煎艾湯調下二錢，腹中微動則有胎。

## 脈例

經云：陰搏陽別，謂之有子。搏者近也，陰脈逼近於下，陽脈別出於上，陰中見陽，乃知陽施陰化，法當有子。又少陰脈動甚者，妊子也。少陰屬心，足少陰屬腎，心主血，腎主精，精血交會，投識於其間則有娠。又三部脈浮沉正等，無病者有妊也。

餘並如脈經說。

## 惡阻

婦人中脘宿有風冷痰飲，經水不行，胃氣與血相搏，多喜病阻。其狀顏色如故，脈理順時，不知所患，但苦頭目

胎漸凝，閒食臭，喜啖鹹酸，至三四月則大劇，吐逆不自勝持，
多臥少起，由經血既閉，水漬於臟，二氣不得宣通，所以然悶，
經脉擁遏，故使四肢沉重，挾風則頭目眩暈，胃弱則泄瀉亦時
竹茹湯 治妊娠擇食嘔吐頭疼眩運四肢不和煩悶
人參 橘皮 白朮 麥門冬去心各一兩
甘草炙一分 白茯苓 厚朴製各半兩
右爲剉散每服四大錢水一盞半薑五片入竹茹一塊
如指大同煎至七分去滓溫服
半夏茯苓湯 治妊娠惡阻心中憒悶頭目眩暈四肢怠惰百
節煩疼痰逆嘔吐嫌聞食氣好啖鹹酸多臥少起不進飲食
半夏湯洗 赤茯苓 熟地黃各一兩 橘皮
細辛 人參 芍藥 川芎
紫蘇葉 桔梗 甘草炙各一兩
右爲剉散每服四大錢水二盞薑七片煎七分去滓空
腹服 有客熱煩渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母
腹冷下利者去地黃入桂心炒 胃中虛熱大便閉小便
澀加大黃一兩八分去地黃加黃芩六分
茯苓丸 治妊娠阻病心中煩悶頭重眼暈聞飲食氣便嘔逆
吐悶顛倒四肢垂弱不自勝持服之即效要先服半夏茯苓
湯兩劑後可服此方
茯苓 人參 桂心 乾薑炮 半夏湯洗
橘皮 白朮 葛根 甘草炙 枳實麩炒去穰各一兩
右爲末煉蜜丸如梧子大每服三五十丸米飲下日三服
小地黃丸 治妊娠惡阻心吐清水腹痛不能食
人參 乾薑炮各等分
右爲末用生地黃汁丸如梧子大每服五十丸米湯下



養胎大論

夫養胎須分能所，母之能養子，爲所養，各有義焉，珠玉致養亦別，故謂之重身。父母交會之初，子假父之精、母之血，攝於其間，此後成妊也，元氣資始之謂也。一月血聚謂之始胚，二月精凝謂之始膏，三月成形謂之始胎，四月亦有象中分乎道生一，一生二，二生三，三生萬物，所以三月而成，故不得不數月而分也。成形之後，陰陽施化，男女始分，故隨月分屬而有感於內。四月始受少陰君火氣以養精，五月受太陰濕土氣以養肉，六月受少陽相火氣以養氣，七月受陽明金氣以養骨，八月受太陽水氣以養血，九月受厥陰木氣以養筋，十月受氣滿俱備，神明已全，俟時而生，此皆所養胎息之所成始成終也。若能養者，能在乃母，必須經所戴而時養之，元妄服食針灸勞逸，要不特傷胎，亦乃自傷，不可不備察也。茲錄保胎最宜察識之，謹備列母之能養避忌諸法，以繼諸後。

避忌法

一月足厥陰脉養，內屬於肝，肝臟血，不可縱怒及疲極筋力，冒觸邪風，亦不可妄針灸其經。二月足少陽脉養，內屬於膽，膽合於肝，共榮於血，不可驚動，及針灸其經。三月手心主脉養，內屬右腎，二主精，不可縱慾及悲哀，觸冒寒冷，亦不得針灸其經。四月手少陽脉養，內屬三焦，三焦精府合腎以養精，不可勞逸及針灸其經。五月足太陰脉養，內屬於脾，脾養肉，不可妄思及飢飽，觸冒卑濕，亦不可針灸其經。六月足陽明脉養，內屬於胃，胃爲臟腑之海，合於脾以養肉，不得雜食及針灸其經。七月手太陰脉養，內屬於肺，肺以養皮毛，不可憂鬱及叫呼，觸冒寒躁，亦不得針灸其經。八月手陽明脉養，內屬

於大腸合肺以養氣毋多食燥物致氣逆及針灸其經 九月足少陰脉養內屬於腎以養骨不可懷娠及灸勞倦百生於亦不得針灸其經 十月足太陽脉養內屬於膀胱以合腎太陽爲諸陽主氣故使兒脉續縷皆成六腑調暢与母分氣神氣各全俟時而生唯不說手少陰心養者蓋以爲五臟大主如帝王不可有爲也若將理得宜无傷胎臟更能知轉男胎勢之法斯爲盡善敘列于后

## 轉女爲男法

論曰陽施陰化所以有娠遇三陰所會多生女子但懷娠三月名曰始胎血脉不流象形而變是時男女未定故令於未滿三月間服藥方術轉令生男也其法以斧置妊婦床下繫刃向下勿令人知恐不信者令待雞抱卵時依此置窠下一窠尽出雄雞此雖未試亦不可不知凡受胎三月逐物變化故古人立胎教能令生子良善長壽忠孝仁義聰明无疾蓋須十月之內常見好境象无近邪僻真良教也如有癖所傷胎治各有法擬除之才逐月養胎傷胎等方備則備矣事貴少用故不服録識者當自關今出安胎方如后

**安胎飲** 治妊娠胎氣不和腹痛或胎熱多驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下或頓仆閃肭飲食毒物或感時疾寒熱往來致傷胎臟

川芎　枳殼麸炒去瓤　熟地黃二兩　糯米二合

右爲粗散每服四大錢水一盞半姜五片棗一枚金銀少許同煎至七分食前服

**白术散** 治妊娠宿有風冷胎痿不長或失於將理動傷胎氣多致損墮常服保護胎臟

白术　川芎各四兩　川椒去目并合口者炒出汗三兩　牡蠣二兩煅

右爲末每服一錢溫酒調下腹痛加白芍藥心下毒痛加川芎心煩嘔吐加細辛一兩半夏二十枚湯洗入若渴者以大麦汁調服病雖愈尽服勿置味尤多用之宜作丸服亦佳至分娩無疾

**枳殼湯** 治妊娠傷食大熱悶乱燥渴恐傷胎臟

枳殼麸炒一兩　蚌粉花半兩

右爲末每服二錢入蜜少許新汲水調下食前服

## 漏胎門

懷妊全假經血以養胎忽因事驚恐或從高墜下頓仆失據或因呼叫暴怒辛熱所衝邪氣致暴卒下血胎乾不動奔上搶心腹中急痛或血從口出皆傷胎證也

**膠艾湯** 治妊娠不問月數淺深因頓仆胎動不安腰腹痛或有所下或胎奔上刺心短氣安胎

熟地黃一兩　艾葉炒　當歸　甘草炙
芍藥　川芎　阿膠炒　黃芪一兩

右爲粗散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前溫服胸中逆冷加生姜五片棗三枚同煎

**安胎散** 治胎无故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如小豆汁者

野苧根二兩剉炒　金銀各一兩

右爲一劑水酒各一盞煎至一盞去滓分二服不以時

**桂枝茯苓丸** 治婦人宿有癥瘕妊娠經斷未及三月而動此癥也經斷三月而得漏下不止胎動在臍上者爲癥痼害當去其癥又論妊娠六月動者前三月經水利時胎下血者後斷三月衃也所以下血不止者其癥不去故也當下其癥

桂心　茯苓　牡丹皮　桃仁去皮尖　芍藥各等分

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸嚼細溫酒米湯任
下食前服

【千金保生丸】養胎益血安和子臟治妊娠將理失宜或因勞
役胎動不安腰腹痛重胞阻漏胎[illegible]
[illegible]或受妊不能[illegible]胎氣不產日月氣滿
轉動乏力或致損墮及死胎[illegible]
至惡露先下胎胞枯燥致令產難或横或逆痛悶乱連
日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑口中出沫或產後
血上衝運悶不省喘促汗出及瘀血未盡臍腹疼痛寒熱
往來或因產勞損虛羸未復面黃體瘦心怔盜汗飲食不
進漸成蓐勞入月常服壯氣養胎正順產理滑胎易產二
後常服滋養血氣和調陰陽[illegible]
甘草炙　貝母　秦椒[illegible]
桂心　黃芩　石斛[illegible]
糯米炒　大豆卷[illegible]
右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸[illegible]溫酒或米
湯化下細嚼空心服

子煩證治

【竹葉湯】治妊娠苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六
月受少陰相火氣以養氣若母心驚膽怯多好煩悶名子煩
防風去叉　黃芩　麥門冬去心各三兩　白茯苓四兩
右為剉散每服四大錢水一盞半竹葉十數片煎七分
去滓溫服

腹痛下利治法

【當歸芍藥湯】治妊娠腹中絞痛心下急滿及產後血暈內虛
氣乏崩中久痢常服通暢血脉不生癰瘍消痰養胃明目

白芍藥八兩　當歸　茯苓　白朮各二兩
澤瀉四兩　川芎[illegible]
右為末每服二錢溫酒調下食前服元和紀用經云本
六氣經緯丸能祛風補勞養真陽退邪熱緩中安和神
志潤澤容色散邪寒溫瘴時疫安期先生賜李少君久
餌之藥後仲景加減為婦人懷妊腹痛本方用芍藥四兩
澤瀉茯苓川芎各一兩當歸白朮各二兩亦可以蜜為丸服

【產寶方】治懷身下痢赤白絞刺疼痛
雞子一个[illegible]
黃丹一錢[illegible]
右為末每服二錢以米飲調下一服愈者是男兩服愈者
是女○凡冷熱利斷下門中選無毒者皆可

小便病證治

凡妊娠胎滿逼胞多致小便不利或心腎氣不足不能使
胞冷清濁相干為諸淋病或胞系了戾小便不通名曰轉胞
又胎滿尿出不知時名遺溺治之各有方

【貝母丸】治妊娠小便難飲食如故
當歸　貝母炒　苦參各三兩　滑石半兩
右為細末蜜丸小豆大米飲下二十丸不拘時服

【葵子散】治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫者
葵子五兩　茯苓三兩
右為末每服二錢以米飲調下小水利則愈（又方）入榆
白皮一兩

【八味丸】治婦人病食飲如故煩熱不得臥而反倚息以胞系
了戾不得溺故致此病名轉胞但利小便則愈以八味丸
中有茯苓故也方見小便脚氣門

白朮散治妊娠遍身腫不知孔時

白朮　芍藥各等分

右為末酒服方寸匕日二三服

胎水論治

凡婦人宿有風冷胎妊娠喜脚腫俗呼為皺脚亦有遍身
腫滿心腹急脹名曰胎水

鯉魚湯治妊娠腹大胎間有水氣

白朮五兩　芍藥　當歸各三兩　茯苓四兩

右剉散以鯉魚一頭修事如食法煮取汁去魚不用每
服藥四錢入魚汁一盞半薑七片陳皮少許煎至七分去
滓空心服

商陸赤小豆湯治妊娠手脚腫滿攣急

赤小豆　商陸乾各等分

右為剉散每服一兩水一盞煎至七分去滓溫服

茯苓湯治妊娠腰脚腫痛

茯苓　白朮各四兩　乾薑　甘草　杏仁

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

滑胎例

凡懷妊已滿十月形體成就神識咸備分氣趣產宜服滑胎
湯藥

枳殼散瘦胎易產湖陽公主服效

枳殼五兩麩炒去穰　甘草一兩

右為末每服一錢空心沸湯調服至七月方可服過月
忌登高廁

榆白皮散治臨產須服滑胎

榆白皮　瞿麥　木通　大麻仁

右為剉散每服五大錢水二盞煎至七分去滓日二服

產難論治

婦人產育多元論妊產須刻之間便至人生害故以陣面為兒急
比下亦危矣凡欲生產切不得喧鬧選一年高善老娘并
謹諳家人扶持不可惶疑令產婦憂恐如腹中痛甚且令
扶行或痛急陣眼中出火方是正產若行不得方好上蓐產
自有時痛不甚者名曰弄痛須見數忍時自產戒用力
定見進理切忌抵搖或家人恐產難亦不可見恐傷子須
依產有文位凡致國形卷忌急為催產當見太醫局方

催生散治產婦陣疎經三兩日不生或胎死腹中或產
母氣乏委頓產道乾澀才見陣痛破水便可投之

蒼朮　桔梗一兩　陳皮六錢　白芷
桂心　甘草三錢　當歸　川烏頭去皮
乾薑炮　厚朴　芍藥　半夏湯洗
茯苓　附子炮去皮　南星炮　川芎
枳殼麩炒　白木香　杏仁去皮尖　阿膠炒

右為末每一大錢溫酒下食前調用炒鹽湯水調亦服

水銀丸催生及難產橫逆

水銀二兩　黑鉛

右用軟絹帛包出水銀細研以汁杉角紙微丸子如豆
大每服半草時香水一二丸立效仍須敬仰

產科大例序

世傳產書甚多有十全外臺合經產寶馬氏王氏崔氏皆有產
書集要世有衛生室集十冊於產婦之書俗則備矣但會其之間
未易歷識唯李師聖序郭稽中產科經驗保慶集二十一論
凡十八方用之頗效但其間藥餘未為至當始用料理顧辨

於評治之下以備識者非敢妄辨也

産科二十一論評

第一論曰妊娠胎死腹中者何荅曰因母患熱病至六七日以後臟腑極熱熏煮其胎是以致死緣兒身死今不能自出但服黑神散暖其胎須臾胎氣寬則自出何以知其胎之已死但看産婦舌色青者是其候也

【黑神散】

桂心　當歸　芍藥　甘草炙

生乾地黄　乾姜各一兩　黑豆炒去皮二兩　附子炮去皮臍半兩

右為末每服二錢空心溫酒調下　一法無附子有蒲黄

評曰大抵妊娠謂之重身一人命係二人命也得失其理安能損胎不特病熏煮亦能致死或因顛仆僵仆氣逆心入腹冒及寒冷有熱病溫瘧之類胎既已死其舌青自出知子死矣然胎論云面青舌赤母死子生唇青吐涎子母俱死又有雙懷二胎或一死一活其候尤難知自非臨歧觀察未易論述不可不備善也然以黑神散溫胎不若以滑胎助産母使其氣正免致虛乏用頓胎自下矣催生湯琥珀黑神散

【催生丹】治胎死腹中或産母氣乏委頓産道乾澀方見産寶

第二論曰難産者何荅曰胎側有成形塊爲兒枕子欲生時枕破與敗血裹其子故難産但服勝金散逐其敗血即自生若逆生横生並皆治之

【勝金散】

麝香一錢　鹽豉一兩舊青布裹了燒紅急以乳鉢研細

右為末取秤錘燒紅以酒淬之調下一錢

評曰産難不只胎側有兒枕破與敗血裹其胎也因縣自有難易其如横逆多因坐草太早努力過多兒轉未逮或以破水其血必乾致胎難轉若先露脚謂之逆産先露手謂之横産當以鍼刺兒之手足使自縮入用水調神應黑散以固其血必自轉生養生方云君臣之間兩命所係不可不屬傳黑散以治之或以鹽塗兒脚底抓搔之

【神應黑散】治横生逆生難産

百草霜　香白芷各等分

右為細末每服二錢童子小便好醋各一茶脚許調勻更以沸湯浸四五分服止一服見功甚者再服已分娩矣一名烏金散

第三論曰胎衣不下者何荅曰母生子訖血流入衣中衣為血所脹是故不得下治之稍緩脹滿腹中以次上衝心胸疼痛喘急者但服奪命丹以逐去衣中之血血散脹消胎衣自下而無所患更有牛膝湯用之甚效録以附於

【奪命丹】

附子炮半兩　牡丹皮一兩　乾漆一分碎之炒令煙盡

右為末以酸醋一升大黄末一兩同熬成膏和藥丸梧子大温酒下五七丸不以時服

【牛膝湯】治産兒已出胞衣不下臍腹堅脹急痛甚及子死腹中不得出

牛膝酒浸　瞿麥各四兩　滑石八兩　當歸酒浸

木通各六兩　葵子五兩

右為剉散每服三錢水兩盞煎至七分去滓不以時服

第四論曰産後血暈者何荅曰産後去血過多血氣虛極未得安靜血隨氣上逆亂心神故眼前生花極甚者令人悶絶不知人口噤神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但服清魂散自差

清魂散

澤蘭葉一分 人參一分 荊芥穗一兩 川芎半兩

右為末，溫酒熱湯各半盞調一錢，急灌之，下咽即開眼，氣定即省人事。

評曰：產後眩暈須分者，人須審虛實為治。若有痰飲因病以而發，多致眩暈，又血盛氣弱，不使血逆而上攻，此等若用清魂可療眩暈，仍川芎茯苓湯。血虛須用牡丹散，但此藥尤雖不用當歸，對使所謂接子可接之，亦以接若氣血平人因去血多致暈者，芎藭湯尤佳。

牛膝散 方見眾疾門

牡丹皮散 治產後血暈悶絕狼狽，若口噤則拗開灌之必效。

牡丹皮 大黃煨 芒硝各 冬瓜子 桃仁各三十個去皮尖

右為剉散，每服五錢，水三盞，煎至一盞半，去滓入芒硝，又煎，分二服。欲產先煎下，以備緩急。金篋以此治產難，但分兩小異。

抵聖湯 方見眾疾門

第五論曰：產後口乾痞悶者何？答曰：產後榮衛大虛，血氣未定，食麵太早，胃不能消化，麵毒結聚於胃脘，上熏胸中，是以口乾燥渴，心下痞悶。醫者不識，認為胸膈壅滯，以藥下之，万不得一，但服見現圓。

見現圓

姜黃 京三稜各 蓽澄茄 陳皮 人參 高良姜 蓬莪朮各等分

右為末，用蘿卜慢火煮爛，研細，將汁煮麵糊丸如梧子大，用蘿卜湯下二三十丸。

評曰：產後口乾痞悶，未必止因食麵，或產母内積憂煩，外傷燥熱，飲食甘辛，以致咽乾病乾渴，當以其所因調之可也。凡須宜四物湯去地黃加人參、烏梅煎；若外傷燥熱，看屬何經，當隨經為治，難以備舉；飲食所傷，見寧圓却能作效。

四物湯 方見下第八論

第六論曰：產後乍寒乍熱者何？答曰：陰陽不和，敗血不散，能令乍寒乍熱。產後血氣虛損，陰陽不和，陰勝則乍寒，陽勝則乍熱，陰陽相乘則或寒或熱。若因產勞臟腑血弱，不得宣越，故令敗血不散，入於肺則熱，入於脾則寒。醫人若誤作瘧疾治之，則謬矣。陰陽不和，宜增損四物湯；敗血不散，宜奪命丹。又問：二者何以別之？答曰：時有刺痛者，敗血；但寒熱無它證者，陰陽不和。增損四物湯不一，皆隨病加減。

增損四物湯

當歸 人參 芍藥 川芎 乾姜炮各一兩 甘草炙四分

右剉散，每服四錢，水一盞，姜三片，煎六分，去滓熱服，不以時候。

評曰：乍寒乍熱，榮衛不和，難以輕議。若其敗血不散，豈止入肺脾二臟耶？大抵一陰閉一陽即作寒熱，陰勝故寒，陽勝故熱。只可云敗血循經流入，閉諸陰則寒，閉諸陽則熱，血與衛氣解則休，遇又會而復作。大調經散、五積散入醋煎。

奪命丹 治產後血流入胞衣中，脹滿衝心，不淋陰陽相乘，滑火發熱，或自汗，或渾身疼，此血未平之所為也。

附子炮去皮 牡丹皮 茯神一兩 真琥珀一分

右為末，淵調如梧子大，煎當歸湯調下。

調經散 方見後第八論

第七論曰：產後四肢浮腫者何？答曰：產後敗血乘虛停積於

五藏循經流入四肢留淫日深却還不得腐壞如水故令四肢面目浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水氣多用導水藥極是虛人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往因致夭枉但服調經散血行腫消即愈

**調經散**

沒藥(別研) 琥珀(別研) 桂心 赤芍藥
當歸(各一分) 細辛 麝香(各半分別研)

右為末每服半錢生薑汁溫酒各少許調勻服

評曰產後浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者亦有產後失於將理外感寒暑風濕內作喜怒憂驚血與氣搏留滯經絡氣分血分不可不辨要當隨所因脈證治之宜得其情調經散治血分固效但力淺難憑不若吳茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也

**吳茱萸湯** 治婦人臟氣本虛宿挾風冷胸膈滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄利不止少氣羸困及因生產臟氣暴虛邪冷內勝宿疾轉甚

吳茱萸(湯洗七次焙一兩半) 桔梗 乾薑(炮) 甘草(炙)
麥門冬(去心) 半夏(湯洗七次) 防風 細辛
當歸(各半兩) 茯苓 牡丹皮 桂心(各一兩)

右為麤末每服四錢水一盞半煎七分去滓食前熱服

**枳朮湯** 治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實(麩炒去瓤一兩半) 白朮(二兩)

右剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服腹中軟即當散也

**奪魂散** 治婦人產後虛腫喘促利小便則愈

生薑(三兩取汁) 白麵(三兩) 半夏(七個湯洗去滑)

右以生薑汁搜麵裹半夏為七餅子炙焦熟為末熟水調一錢小便利為效

**大調經散** 治產後腫滿喘急煩渴小便不利(方見第六論)

第八論曰產後乍見鬼神者何答曰心主身之血脈因產傷耗血脈心氣則虛敗血停積上干於心心不受觸遂致心中煩躁臥起不安乍見鬼神言語顛倒醫人不識呼為風邪如此治之必不得愈但服調經散每服加龍腦一捻得睡即安

**調經散** 方見第七論每服加龍腦一捻

第九論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服七珍散

**七珍散**

人參 石菖蒲 川芎 生乾地黃(各一兩)
細辛(一分) 防風 朱砂(各半兩別研)

右為末每服一錢薄荷湯調下不以時服

第十論曰產後腹痛又瀉利者何答曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於肓膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水谷不化洞泄腸鳴或下赤白胠脇䐜脹或走痛不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之則[illegible]禍不旋踵謹之謹之

**調中湯**

高良薑 當歸 桂心 芍藥
附子(炮) 川芎(各一兩) 甘草(炙半兩)

右為剉散每服三錢水二盞煎至一盞去滓熱服

評曰產後下利非止一證當隨所因而調之既云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜怒憂思還從自性況勞逆

飲飾皆能致病若其洞泄可服調中赤白湯下非此能愈者
隨門類別有正方今錄桃膠散白頭翁湯以備用餘從痢下
門選用之

**桃膠散** 治產後利下赤白裏急後重疞刺疼痛等證

桃膠焙乾 沉香 蒲黃紙隔炒各等分

右為末每服二錢陳米飲調下食前服

**白頭翁湯** 治產後下利虛極

白頭翁 甘草炙 阿膠炒 黃連
蘗皮去皮 秦皮各去粗皮

右為㕮咀散每服四錢水一盞半煎七分去滓空心服

第十一論曰產後遍身疼痛者何答曰產後百節開張血脈流走遇氣弱則經絡分肉之間血多留滯累日不散則骨節不利筋脈急引故腰背不得轉側手腳不能動搖身熱頭痛也若醫以為傷寒治之則汗出而筋脈動搖手足厥冷變生它病但服趁痛散以驅除之

**趁痛散**

牛膝酒浸 甘草炙 薤白各一分 當歸 桂心
白朮 黃芪略炙 獨活各半兩 生薑半兩

右㕮咀散每服半兩水三盞煎至一盞去滓食前分二次熱服

評曰趁痛散不特治產後氣弱血滯兼能治太陽經感風頭疼腰背痛自汗發熱若其感寒傷食憂恐驚怒皆致身疼發熱頭痛況有蓐勞諸證尤甚趁痛散皆不能療不若五積散入醋煎用卻不妨

**五積散** 方見傷寒太陰經

第十二論曰產後大便秘澀者何答曰產卧水血俱下腸胃虛竭津液不足是以大便秘澀不通也若過五六日腹中悶脹者此有燥糞在臟腑以其乾澀未能出耳宜服麻仁丸以津潤之若誤以為有熱而投以寒藥則陽消陰長變動百出性命危矣

**麻仁丸**

麻仁研 枳殼麩炒 人參 大黃各等分

右為末蜜丸如梧子大空心溫酒下二十丸未通又加丸數

評曰產後不得利者百無一生去血過多藏燥大便秘澀澀則固當滑之大黃似難輕用唯葱涎調臘茶為丸復以葱茶下之必通

**阿膠枳殼丸** 治產後虛羸大便秘澀

阿膠 枳殼麩炒去瓤各等分

右為末蜜丸如梧子大別研滑石為衣溫水下二十丸半日來未通又服

第十三論曰產後血崩者何答曰產卧傷耗經脈未得平復而勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因咸酸不節傷蠹榮衛氣衰血弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急服**固經丸**以止之

艾葉 赤石脂煅 補骨脂炒 木賊各半兩
附子一個炮去皮臍

右為末陳米飲和丸梧子大食前溫酒米湯下二三十丸

評曰血崩不是輕病況產後有此是謂重傷恐不止咸酸不節而能致之多因憂驚恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸以澀劑有力不若大料煮芎藭當歸加芍藥候血清以調經合用藥治之為得

[illegible]抵聖湯 方見[illegible]門加生姜半分

第十四論曰產後腹脹悶滿嘔吐不定者何答曰敗血散於脾胃脾受之不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥療之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治但服抵聖湯

抵聖湯

赤芍藥 半夏湯洗 澤蘭葉 人參

陳皮去白 甘草炙各一

右為末每服半兩水一盞半生姜半兩煎至一盞去滓分二服不拘時

第十五論曰產後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脈之海起於鼻交頞中還出挾口交人中左之右右之左上挾鼻孔[illegible]產後氣消血散榮衛不理散亂入於諸經卻還不得故令口鼻黑氣起及變鼻衄此緣產後虛熱變生此證其疾不可治名胃絕肺敗此乃不可治不出方

第十六論曰產後喉中氣急喘者何答曰榮者血也衛者氣也榮行脈中衛行脈外相隨上下謂之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為難治若惡露不快敗血停凝上熏於肺亦令喘急但服奪命丹血去喘息自定

奪命丹 方見[illegible]

評曰產後喘急固可畏若是敗血上熏於肺猶可責奪命丹若感風寒或因憂怒飲食咸冷等奪命丹未可均濟必孤陽絕陰乎若榮血暴竭宜大料芎藭湯亦自可救傷風寒宜旋覆花湯性理鬱發宜小調經散用桑白皮杏仁煎湯調下傷食宜見現丸五積散

旋覆花湯 方見[illegible]

治產後傷風感寒暑濕咳嗽喘滿痰涎壅盛坐臥不寧

旋覆花 赤芍藥 半夏麴 前胡

荊芥穗 五味子 甘草炙 茯苓

麻黃去節 杏仁去皮尖

右為粗散每服四大錢水一盞半生姜五片棗一枚煎七分去滓食前服

大料芎藭湯 方見[illegible]

小調經散 方見[illegible]

見現丸 方見[illegible]

第十七論曰產後中風者何答曰產後五七日內強力下床或一月之內傷於房室或懷憂怒擾蕩沖和或因著艾傷又傷動臟腑得其病者初則眼澀口噤肌肉瞤搐漸至腰背筋急強直者不可治此乃人作非偶然也

評曰[illegible]作不可[illegible]者若[illegible]房室[illegible]病不[illegible]

第十八論曰產後心痛者何答曰心者血之主人有伏宿寒因產大虛寒搏於血血凝不得消散其氣上衝擊於心之絡脈故心痛[illegible]以大岩蜜湯治之寒去則血脈溫而經絡通心痛自止若誤以為[illegible]傷心之正經則為真心痛朝發夕死夕發朝死[illegible]不可輕用如此

乾熟地黃　當歸　獨活　吳茱萸炒
乾姜炮　白芍藥　桂心　甘草炙
小草各一兩　細辛半兩

右剉散，每服半兩，用水三大盞，煎至一盞，去滓，溫熱服。

評曰：產後心痛，雖非產蓐常病，痛或有之。凡痛未必便是血痛。設是，芎歸湯豈可用熟地黃？熟地黃能行血，安能止痛？此方本出千金，用生乾地黃，另是一方。今唯五兩，乾姜三兩，細辛治陳寒在下焦，方本一兩，却能作半兩，制奇制耦，是病者深自省吾數，不可妄意加減。然以芎歸湯治血痛，不若失笑散用之有效。

**失笑散** 治心腹痛欲死，百藥不效，服此頓愈。

五靈脂　蒲黃各等分

右末，先用釅醋調二錢，熬成膏，入水一盞，煎七分，食前熱服。

熱服

第十九論曰：產後抗悶氣上，喘急欲絕者，何也？答曰：產畢血虛，生產後以營衛取之過多也。營血暴竭，因產後之所以營衛為孤陽，氣貞狀抗悶，喘促，吐氣，此皆其候，此可服小續命湯兩三劑，必愈。若惡露甚者，以逐敗血藥攻之，則血去而疾益增劇。

**小續命湯** 方見中風門

評曰：脚氣固是常病，未聞產後能脚氣，若往三讀千金見有產婦多此疾之語，便以是證，文辭告意可緊見矣。設是抗悶氣上，如何令服續命湯？此藥本主少陽經中風，非均治諸經脚氣，要須依脚氣方論，陰陽經絡調之，此涉專門，未易輕論，况非產後要病，更不繁引。

第二十論曰：產後汗出多而變痓者，何也？答曰：產後血虛，肉理不密，故多汗，因遇風邪搏之，則變痓也。痓者，口噤不開，背強而直，如發癇狀，搖頭馬鳴，身反折，須臾十發，氣息如絕，宜速斡口灌小續命湯，稍緩即汗出，如兩手拭不及者，不可治。

**小續命湯** 方見中風門

評曰：產後汗出多變痓，亦令服續命湯，此又難信。既汗多，如何更服麻黃、官桂、防己、黃芩輩？不若大豆紫湯為佳。大豆紫湯局方大豆散亦良藥也。

**大豆紫湯** 方見產難門

第二十一論曰：產後所下過多，虛極生風者，何也？答曰：婦人以榮血為主，因產血下太多，氣無所主，唇青肉冷，汗出，目瞑，神昏，命在須臾，此但虛極生風也。如此，則急服濟危上丹，若以風藥治之，則誤矣。

**濟危上丹**

乳香　太陰玄精　五靈脂　硫黃
陳皮　桑上寄生　阿膠炒　卷柏去根各等分

右將上四味同研勻，石器內微火炒，勿令焦了，又研極細，復入餘藥為末，用生地黃汁和丸，梧子大，溫酒或當歸酒下二十丸，食前服。

評曰：所下過多，傷損少血，展令汗出神昏，此皆虛脫證，何以謂之生風？其外證必因感冒中傷經絡然後發動，臟腑豈能自生風也？風之為義，蓋因肝經虛弱，風乘虛乃病，蓋合法作入肝則為風，在腎則為虛，後學不識，便謂風虛是一病，謬濫之甚，學者當知。

保慶集二十一論，人用既多，因取其說，仍將得效方附行，外有產科諸論，備敘于后。

三因極一病證方論卷之十八

蓐勞證治

婦人因產理不順，疲極筋力，憂勞心慮，致令虛羸喘乏，寒熱如瘧，頭痛自汗，肢體倦怠，咳嗽痰逆，腹中絞刺，名曰蓐勞。

**石子湯** 治蓐勞

豬腎一對（去脂膜，四破，無則以羊腎代之） 香豉 蔥白 粳米 當歸 芍藥（各二兩）

右為剉散，分兩劑，每一劑用水三升，煮取一小碗，去滓，分三服，任意服。

陰脫證治

婦人趣產勞力，努咽太過，致陰下脫，若脫肛狀，及陰下挺出，逼迫腫痛，舉重房勞皆能發作，清水續續，小便淋露。

**硫黃散** 治產後勞陰脫

硫黃 烏賊魚骨（各半兩） 五味子（一分）

右為末，糝患處。

**當歸散** 治陰下脫

當歸 黃芩（各二兩） 芍藥（一兩一分） 蝟皮（燒存性，半兩） 牡蠣（煅，二兩半）

右為末，每服二錢，溫酒米飲任意調下。忌登高舉重。

**又法**

蛇床子五升，炒熱，布裹，熨患處，亦治產後陰痛。

**桃仁膏** 治產後陰腫妨悶

桃仁（去皮尖） 枯白礬 五倍子（各等分）

右以下二味為末，研桃仁膏，拌勻傅之。

**硫黃湯** 治產勞，玉門開而不閉

硫黃（四兩） 吳茱萸 兔絲子（各一兩半） 蛇床子（一兩）

右為剉散，每服四錢，水一碗，煎數沸，帶溫洗玉門，日再洗。

下乳治法

產婦有二種乳脈不行：有氣血盛而壅閉不行者，有血少氣弱澀而不行者。虛當補之，盛當疏之。盛者當用通草、漏蘆、土瓜根輩；虛者當用成煉鍾乳粉、豬蹄、鯽魚之屬，概可見矣。

**漏蘆散** 治乳婦氣脈壅塞，乳汁不行，及經絡凝滯，乳內脹痛，留蓄邪毒，或作癰腫，此藥服之，自然內消，乳汁通行。

漏蘆（二兩半） 蛇蛻（十條，炙） 瓜蔞（十個，急火燒存性）

右為末，每服二錢，溫酒調下，不以時，仍與熱羹湯助之。

**成煉鍾乳散** 治乳婦氣少血衰，脈澀不行，乳汁絕少。

成煉鍾乳粉

右研細，每服二錢，濃煎漏蘆湯調下。

**豬蹄湯** 治奶少

母豬蹄（一隻，治如食法） 通草（四兩）

右以水一斗，浸煮得四五升，取汁飲。不下，更作。

**[illegible]** 治乳[illegible]作痛

[illegible]（各等分）

右末，飲調[illegible]貼病處。千金云：凡患乳癰，四十已下可治，五十已上不可治，治之則死，不治自得終其天年。

[illegible]治

產後兒枕不散，乃血瘕堅硬，疼之[illegible]手，日晡增劇，疼痛淋露不快，上攻心[illegible]，服黑龍丹，當歸湯下，保命丹治之。

**[illegible]丹** 治產後一切血疾，垂死者，[illegible]藥元有不効者，神驗不可言。

當歸 五靈脂 川芎 高良姜 乾地黃（各等分一兩）

並細剉入一沙合內，赤石脂泥縫，紙筋鹽泥固濟

封合炭火十斤煅通紅去火候冷開取合子看成黑糟
乃取出細研入後藥
百草霜 別研 硫黃 乳香 各半錢 花乳石
琥珀 各一錢
右為細末米醋煮糊丸如彈子大每服一圓炭火燒通
紅投童子小便自然汁與無灰酒各一合小便半盞研開頓服
立效

**黑神散** 治產後敗血衝心或兒枕痛或發或止及新產乘虛
風寒內搏惡露不快臍腹堅脹
當歸 去蘆 [illegible] 紅花 各一兩
右為粗散每服二錢以一大盞煎七分去滓食前溫服

**[illegible]** 方見前第 一 論

虛羸論治

產後虛羸調理所失 [illegible] 問男女又不許見飢飽者皆古人預
[illegible] 以得男則喜得女則憂二者大早致
心虛煩悶多自此始蓋去血過多血氣則陰虛陽盛生內熱
內熱曰痾其證心煩口乾三症氣喘頭痛骨節疼痛
時發時止與大病後虛羸相類

**人參當歸湯** 治產後煩悶不安
人參 當歸 麥門冬 去心 熟地黃
桂心 各等分 白芍藥 二兩
右為粗散每服四大錢水二盞先將粳米一合淡竹葉
十片煎至一盞去米葉入藥并棗二枚煎七分去滓食
前服地黃宜用生乾者虛甚則用熟

**蒲黃湯** 治產後虛煩心渴
蒲黃 不以多少 上炒
右一味每服一錢以東流水調下不以時候

虛渴論治

產後去血過多津液不足因皆氣虛弱多使人煩渴引飲無度
雖非三消其證頗同治之當養血通氣和津補 方效

**熟地黃湯** 治產後虛渴不止少氣腳弱眼昏頭眩飲食無味
熟乾地黃 一兩 人參 三兩 麥門冬 二兩
栝蔞根 四兩 甘草 半兩
右為粗散每服四錢水二盞糯米一撮生薑三片棗三
枚煎七分去滓食前服

**[illegible]** 治同前 方見前胎嗽門

淋閉論治

論曰產前後淋閉其上因不同產前當安胎產後當去血如其
冷熱膏石氣淋等為治則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃
最為產後要藥惟當尋其所因則不失機要矣

**茅根湯** 治產後諸淋無問冷熱膏石氣結悉主之
白茅根 八兩 瞿麥穗 白茯苓 四兩 蒲黃
桃膠 滑石 甘草 各一兩 紫貝 十個
葵子 人參 各二兩 石首魚腦骨 [illegible]
右為粗散每服四大錢水一盞半薑三片燈心二十莖
煎七分去滓溫服亦可為末煎木通湯調下二錢如惡
甚用木通燈心煎湯調下

產後泄瀉病論治

**[illegible]** 治產後惡露不散疼痛及惡露不快臍腹
堅脹兼室女經候不通赤白帶下心腹腰腳疼痛
當歸 赤芍藥 牡丹皮 延胡索 [illegible] 桂心 各一兩
右為末煉蜜丸如梧子大溫酒米飲下三五十丸食前溫服

痛且細閻閻下

當歸散 治產後留血不消積聚作塊急切疼痛狀如遁尸及
心腹絞痛下利
當歸　芍藥　川芎　乾姜炮各等分
右為末每服方寸匕溫酒調下

丁香散 治產後咳逆
石蓮肉十枚去心　丁香十枚
右為末水半盞煎數沸服

黃芪湯 治產後虛羸腹痛不可轉側壯熱自汗身體強
氣短
黃芪二兩　當歸三兩　芍藥二兩
右剉散每服四大錢水一盞半姜五片煎七分去滓食
前溫服

竹葉防風湯 治產後傷風發熱面正赤喘而頭痛
葛根三分　防風　桔梗　桂心
人參　甘草炙各一分　附子炮去皮臍
右㕮咀剉散每服四錢水一盞半姜五片棗二个竹葉十
片煎七分去滓空腹服嘔者加半夏

□□散 治婦人產後一切疾病不問大小以至危篤不能者
牡丹皮　白芍藥　桂心　陳皮　青皮各半
當歸　百合炒　川芎　甘草炙　乾姜炮各一兩
人參　神麯　麥芽炒各三分　紅花半分
右為末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚煎七分空腹
服孕婦不得服

調補法
產後氣血既衰五臟俱損惟得將補不可轉利雖惡血未盡
亦不可便服破血藥須俟七日外臍下塊散方可投之若痛甚
切者或崩傷血利並氣喘之別生他疾帶赴宿患宜參閱諸
方參詳調理不必拘以日數也如黑神散却不妨

黑神散 治產後諸疾
當歸　白芍藥　甘草炙　白薑炮
桂心　黑豆炒去　蒲黃　熟地黃各等分
右為末溫酒或小便任意調下空心服忌如常一法去
蒲黃加附子

四順理中圓 治新產血氣俱傷五臟暴虛肢體羸乏少氣多
汗產後百日宜每日常服壯氣補虛調養臟氣蠲除余
疾消進飲食兼治產後臟虛嘔吐不止
甘草二兩　人參　白朮　乾姜炮各一兩
右為末煉蜜丸如梧子大每服二三十圓溫米飲下空心食
前服

當歸建中湯 治產後勞傷虛羸不足腹中㽲痛吸吸少氣小
腹拘急痛連腰背時自汗出不思飲食產訖直至滿月每
日一二服令人丁壯強健
當歸四兩　桂心三兩　白芍藥六兩　甘草炙二分
右剉散每服四大錢水一盞半姜三片棗一枚煎至七分
去滓入餳糖一塊再煎消服崩傷內衄加阿膠地黃塩

□□□ 治產後百疾百日內常服除宿血養新血 方見後

人參鱉甲圓 治產後出月羸瘦不復常 方見後

羊肉湯 治產後腹中疾痛虛勞不足裏急脇痛并治寒疝
當歸三分　生姜一兩　精羊肉四兩　橘皮半兩
右剉散水三椀酒少許煎至一椀去滓分二服或少加
葱豉亦佳

婦人女子衆疾論證治法

婦人三十六病未論所述名品不同或云七癥八瘕九痛十二帶下共三十六病有名數不見證狀又論云十二癥者是所下之物不同一如清血二黑血三紫汁四赤肉五膿痂六豆汁七葵羹八凝血九清血上米汁十一如月浣十二經不應期九痛者熱傷痛陰中痛小便時痛經來時痛腰脹痛汁出如虫嚙痛脇下分痛腰胯痛七害者竅孔不利陰中寒熱小腹急堅藏內不仁子門掣痛月浣乍多乍少吐五湯者兩脇支滿心引腰痛氣結不通邪思泄利前後痛寒三痼者羸瘦不生肌肉斷緒不產經水閉塞亦名三十六病名品雖殊無非血病多因經水未盡而內作七情外感六淫陰陽勞逸飲食生冷遂致榮衛不輸新陳干忤隨經上肢留滯為證瘀血流溢損惡積害傷胞門子臟疾成若秋毫之伏而丙重之山岳古人所謂婦人之病七倍男子艱于治之大抵所以明識約之切也

治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風怯寒咳逆煩滿拘急短氣心脇腰背腹肚與子臟相引痛漏下五色心常恐懼遇恚怒憂勞即發皆是內傷所致

白堊 煅　白石脂 煅　紫石英 煅　烏賊魚骨

牡蠣 煅　龍骨 煅　細辛 各一兩半　當歸

芎藭　黃連　白茯苓　乾姜 炮

桂心　人參　石韋 去毛　肉蓯蓉

白芷　附子 炮　白蘞　甘草 炙　川椒 出汗 各半兩

右為末蜜丸梧子大空心酒下二十丸至五十丸

治婦人久冷无子及數經墮胎胞門閉塞之必須胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁以上疾證皆令孕育不成以至絕嗣此藥治産後百病百日內常服除宿血生新血令人有孕及生子充實亦治男子亡血諸疾

木香 炮　茯苓　京墨 燒　桃仁 各一兩　秦艽

甘草 炙　人參　桔梗 炒　石斛 酒浸　蚕布 燒

藁本 各二兩　當歸　桂心　乾姜 炮　細辛

牡丹皮　川芎 各一兩　川椒 炒　山藥 各三　澤蘭

熟地黃　香附 各一兩炒　蒼朮 八兩　大豆卷 各一兩　糯米 炒

右為末蜜丸每兩作六丸每一丸嚼細食前溫酒醋湯任下

治婦人百病

吳茱萸 湯泡　白姜 炮　當歸

赤芍藥　延胡索 炒　破故紙 炒　川椒 炒

生乾地黃　劉寄奴　蓬莪朮　橘皮

青皮　川芎 各一兩　荷葉灰 四兩

右為末醋糊丸如梧子大每服三五十丸日湯使如左

月經不通紅花蘇木酒下　白帶牡蠣粉調酒下

子宮久冷白茯苓煎湯下　赤帶建茶清下

血崩豆淋酒調絹灰下　胎不安蜜和酒下

腸風陳米飲調百草霜下　心疼菖蒲煎酒下

漏阻下血烏梅溫酒下　耳聾蠟點茶湯下

胎死不動斑猫二十個煎酒下　腰脚痛當歸酒下

胞衣不下芸臺研水下　頭風薄荷點茶下

血風眼黃丘甘草湯下　生瘡地黃湯下

身體疼痛黃芪末調酒下　四肢浮腫麝香湯下

咳嗽，用杏仁去皮尖，白皮湯下。腹痛，炒芍藥調酒下。
產前後，以荆白者白姜湯下。赤者甘草湯下。雜者二宜
湯下。常服温酒醋湯任下，並空心食前服。

**[illegible]地黃丸** 治婦人衆病，無所不治。

熟地黃　川芎　防風　檳榔　蕪荑炒
蟬蛻　柏子仁　[illegible]　人參　黃芪
白薇　川椒　[illegible]　晚蠶[illegible]　當歸
木香　附子炮去皮臍　石膏　[illegible]　藁本
厚朴　甘草　白姜　[illegible]

右爲末，煉蜜和，杵數千下，丸如彈子大，每服一丸，具
湯使如右。
血瘕，[illegible]湯下。　　[illegible]生温酒細嚼下。
血勞，[illegible]煎下。　　血崩，[illegible]湯及酒下。
血[illegible]痛，白姜酒下。　　血風，荆芥酒下。
血暈悶絶，胎死腹中，胞衣不下，並用生地黃汁、童子小
便、酒各一盞，煎二沸，調下。常服醋湯温酒化下，並空心
食前服。

**交感地黃煎圓** 治婦人產前產後，眼見黑花，或即發狂，如見
鬼狀，胞衣不下，失音不語，心腹脹滿，水穀不化，口乾煩渴，
寒熱往來，口内生瘡，咽中腫痛，心虚忪悸，夜不得眠，產後
中風，角弓反張，面赤牙關緊急，崩中下血如豚肝狀，臍腹
㽲痛，血多血少，結爲癥瘕，恍惚昏迷，四肢腫滿，產前胎不
安，產後血刺痛。

生地黃二斤[illegible]　當歸一兩　延胡索[illegible]
生姜二斤[illegible]
蒲黃四兩炒香　南番琥珀一兩別研

右爲末，蜜爲丸，彈子大，當歸湯化下一丸，食前服。

**[illegible]血圓** 調補衝任，温暖血海，治胞絡傷損，宿挾乾血不散，受
胎不牢，多致損墮，常服去風冷補血。

當歸　牛膝　延胡索炒　芍藥
茴香　蒲黃炒　香附去毛　蒼术
菊花　熟地黃　桂心　烏豆

右用醋煮烏豆乾，取豆爲末，再入[illegible]一[illegible]煮至一[illegible]留在
作糊爲丸，如梧子大，酒飲任下五十丸。

**[illegible]圓** 治女人稟受怯弱，血氣虚損，常服調補衝任，調血
脉，宣通[illegible]
[illegible]治婦人[illegible]身[illegible]叙痛，口乾不食，崩傷，眩暈，及
產出月，[illegible]不復常者。

人參　赤芍藥　川芎　當歸[illegible]
[illegible]　熟地黃五兩　烏賊魚骨三兩

右爲末，[illegible]下丸如梧子大，每服三五十丸，至[illegible]
丸，温酒米湯任下，食前服。

**[illegible]** 治衝任虚損，月水不斷，臍腹㽲
痛，胎中漏下，血瘀塊[illegible]
自不安，血下不止，及產後[illegible]
瘕聚，小腹堅痛，時作寒熱，又治血藏虚冷，崩中去血。

熟地黃　當歸　川芎　白芍藥[illegible]

右爲粗散，每服四錢，水一盞半，煎七分，去滓，空心服[illegible]
[illegible]

**[illegible]** 治衝任虚損，月候不勻，或來多不斷，或過期不來，或
崩中去血過多不止，又治曾經損墮，損娠瘀血停留，小
腹中痛，發熱下利，手心煩熱，唇口乾燥，治小腹有寒，久不

受胎

半夏湯洗七次 當歸酒浸 川芎 人參

白芍藥 牡丹皮 桂心 阿膠炒各等分

甘草二兩 吳茱萸湯泡 麥門冬去心各二兩

右為剉散每服三錢水一盞半生姜五片煎八分去滓

熱服空心食前

**牡丹散** 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰

赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不利

臍腹脹痛寒熱如瘧又治室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽

潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

牡丹皮 芍藥 甘草 桂心

没藥 延胡索 紅花 當歸 烏藥各一兩

陳皮 蘇木 鬼箭 莪朮

右為末每服二錢白水煎七分食遠生冷

**伏龍肝散** 治氣血虛傷衝任脈虛經血非時忽然崩下或如

豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛日久

未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

無子

伏龍肝 赤石脂煅 牡蠣煅各等分

烏賊骨 禹餘粮 桂心各等分

右為細末空心溫酒飲任調下二錢白多者加牡蠣烏賊

骨赤多者加赤石脂禹餘粮黃多者加伏龍肝桂心隨

病加之 一方有龍骨

**艾煎丸** 治崩傷淋瀝小腹滿痛常服補榮衛通經脈

食茱萸 當歸 熟地黃 白芍藥

石菖蒲 川芎 人參各一 熟艾

右五味為末酒煮糊為丸梧子大每服五十丸酒飲任下

**滋血湯** 治婦人血風血熱血虛經候不調經脈不通四肢疲

木肌體浮腫身疼痛倦怠將成勞瘵

馬鞭草 荊芥穗各四兩 桂心 當歸

枳殼 赤芍藥 川芎 牡丹皮一兩

右為末每服四大錢水一盞半烏梅一個煎七分去

滓空心服

**抵當湯** 治婦人經水不利

水蛭 虻蟲 桃仁 大黃

右為粗末每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服血未

利更服亦治男子膀胱血

**万病丸** 治室女月經不通臍下堅結大如杯升發熱往來下

痢羸瘦此為血瘕若生肉癥不可為也

乾漆 牛膝

右以地黃汁入下二味為末慢火熬候可丸即丸如梧

子大空心米飲或溫酒下二丸日再勿妄加

婦人氣血虛經絡不行若服破血行經藥見效之

**礬石丸** 治婦人經水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物

礬石三分燒 杏仁一分去皮尖

右研杏仁細入礬石加少蜜丸如棗核大綿裹內陰中未

知再作

**三棱煎** 治婦人血瘕血積食積痰滯

三棱 蓬朮各二兩 青皮 半夏 麥蘗各三兩

右用好醋六升煮乾焙為末醋糊丸梧子大醋湯下三

四十丸痰積姜湯下

**大溫經湯** 治婦人血氣虛損血風勞心煩躁筋骨疼痛四肢

好黑豆〔治所〕 沒藥 當歸〔各半兩〕

右先將黑豆不犯水淨拭用沙瓶一隻入豆在內以瓦

片蓋鹽泥固濟留一小竅炭火二斤煅煙出存性以鹽

泥塞瓶嘴退火候冷取出豆如鴉翎者研細次入後藥研勻

不拘時候溫酒調下一錢重者不過三五服

由水母之類

**晞露丸**治腸覃病因寒氣客於腸外與胃氣相搏正氣不榮

癖而內著惡氣乃起其生也始如雞卵久久而成狀如懷

胎按之堅推則移月事時下故曰腸覃小治

一塊不利并會有伏蟲臨服根每腫久其邪氣

烏喙 去皮 半兩 硇砂 別研 石菖蒲

硇砂 一錢 桂心 當歸 巴豆 去油

右為末蜜丸如梧子大每服三五丸食後溫酒下

子宮痛

**木香散**治婦人臟氣血氣血蟲氣蟲水蟲石蟲

木香 沉香 乳香〔研〕 甘草 川芎

胡椒 陳皮 人參 桂心

乾薑 縮砂 茴香 天茄

右為細末空心日午溫陳米飲調下一錢

**石燕丸**治婦人血結胞門或為癥瘕在腹脇間心腹脹滿

急痛石水狀治謂之血蟲

石燕 一兩 當歸尾 馬鞭草 紅花

烏梅肉 蓬莪茂 三稜 蘇木

沒藥 琥珀 甘草

右為末濃煎蘇木酒調下二錢不飲酒者

**大腹皮飲**治婦人血腫單單腹脹

大腹皮 防己 木通 厚朴

栝樓 黃芪 枳殼 桑白皮

大黃 陳皮 青皮

右㕮咀每服秤一兩水一盞煎至六分盞去滓入酒一

分溫服不以時候

**大黃甘遂湯**治婦人小腹滿如敦狀小便微難而不渴產

後者為水與血并結在血室也

大黃 甘遂 阿膠

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服其血當下

**小柴胡湯**治婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適

斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時

方見小腸傷寒門

**甘麥大棗湯**治婦人藏燥喜悲傷欲哭狀若神靈所作數欠伸

小麥 一升 甘草 三兩

右㕮咀散每服半兩水一盞棗四枚煎至六分

心溫服亦補脾氣

**溫經湯**治婦人月病血刺痛 方見經門

**柏葉散**治婦人血崩 方見崩門

**川芎湯**治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹 熟地黃 人參 白芍藥 桔梗

川芎 當歸 甘草 桂心 各一兩

右為㕮咀散每服四錢水一大盞煎七分去滓不以時候

**膏髮煎**治婦人穀氣實胃氣下泄陰吹而正喧

頭髮灰 豬膏

右調勻絲如棗大納陰中

**雞子湯**治

凡婦人少陰脉數而滑者陰中必生瘡名曰䘌瘡或痛或痒如虫行狀淋瀝膿汁陰蝕幾尽皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡皆屬心又云陽明主肌肉痛痒皆屬於心治之當補心養胃外以薰洗坐導藥治之乃可

補心湯 方見心藏虛實門

狼牙湯 治婦人陰中蝕瘡爛潰膿水淋漓臭穢

狼牙一味剉碎濃煎汁以綿纏筯頭大如蚕浸湯汁瀝陰中日數次

溫經湯 方見調經門凡蝕瘡久不愈者宜服此藥以裏之外下部則洗宜合湯洗

[illegible] 方見五疳門

小兒論

凡小兒之病與大人不殊唯回氣斷臍風禁口重舌木舌客忤驚熱驚癎斷臍變蒸瘡痘病不行數證大人無之其如傷風傷寒發瘡□□調用藥則一但多少異耳諸方前已類編可按而治故不重引然養小之書隋唐間猶未甚設將 宋則有錢氏要方張氏鄭氏明王備錄幼幼新書及單行小集方論證狀數計百白不勝僑矣今畧取保生要方其前數證以防緩急之需將推君子不妨廣覽

小兒初生回氣法

小兒初生氣欲絶不能啼者必是難產或冒寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置炭火爐中燒之仍撚大紙撚蘸油點火於臍帶上往來燎之蓋臍帶連兒臍得火氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可浴洗了即斷臍帶

小兒初生斷臍灸法

小兒初生急以綿裹指拭兒口中惡血若不急拭啼聲一出即入腹成百病矣亦未須与乳且先与拍破黃連浸湯取濃汁調朱砂細末抹兒口中打下腹中舊屎方可与乳兒若多睡聽之勿強与乳則自然長而少病

小兒初生通大小便法

小兒初生大小便不通腹脹欲絶者急令婦人以溫水先漱口了吸咂兒前後心并臍下手足心共七処每一処凡三五次漱口吸咂取紅赤為度須臾自通不尓無生意有此證遇此方可謂再生

小兒臍風撮口證

小兒初生一七日內忽患臍風撮口百無一活坐視其斃者皆是也今幸有一法然驗世罕有知者凡患此兒齒齦上有小泡子如粟米狀以溫水蘸熟帛裹手指輕輕擦破即口開便安不用服藥神効

千金變蒸論

凡小兒自生三十二日一變再變為一蒸凡十變而五小蒸又三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小兒所以變蒸者是榮其血脉改其五臟故變者上氣蒸者體熱其輕者體熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚目珠子微汗出其重者體壯熱而脉亂或汗或不汗不欲食食輒吐哯目白睛微赤黑睛微白變蒸畢自明矣此其證也單變小微兼蒸小劇凡蒸平者五日而衰遠者十日而衰先期五日後之五日爲十日之中熱乃除耳或遇日數不除切不可妄治及灸刺但少与乳食微下之熱歇便止若身熱耳熱尻亦熱此乃他病可作別治

紫霜丸 治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗後熱不歇及

腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哯食癇先寒後熱者

代赭石 赤石脂各一兩 巴豆二十粒去皮心熬 杏仁五十粒去皮尖

右以上二味為末別研巴豆杏仁為膏相和更搗一二千杵當自相得若硬入少蜜同杵之密器中收三十日兒服如麻子大一粒与少乳汁令下食頃後与少乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明日更与一粒百日兒服如小豆一粒以此準定增減夏月多熱喜令發疹二三十日輒一服佳紫丸无所不治雖下不虛人

夜啼四證

小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰重舌口瘡四曰客忤寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲腰而啼此寒證也熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹暖啼時或有汗仰身而啼此熱證也若重舌口瘡則要乳不得口到乳上即啼身額皆微熱急取燈照口若无瘡舌必腫也客忤者見生人氣忤犯而啼也

**蒜乳丸**治冷證腹痛夜啼

大蒜一顆慢火煨香熟取出細切爛研 乳香半錢細研

右研勻丸如芥子大每服七粒乳空時乳頭以乳汁送下

**燈花散**治熱證夜啼

燈花一兩

右研細用燈心煎湯調塗口中以乳汁送下日三服

又治小兒重舌

真蒲黃微炒以綿裹

右研細每抄些小摻舌下時時摻之良久更以溫水灌熟帛裹指輕輕按掠之按破揩藥

**[illegible]散**治小兒口瘡

牡蠣燒通赤取出以土中出火毒細研如粉 甘草炙一分

右和勻時時抹少許按口中或揩之吐出亦無害

**禳夜啼法**

用本家廚下火柴頭一个火滅者以朱書曰吾是天上五雷公將來作神將能收夜啼鬼一縛永不放急急如律令咒頭以火燒焦頭為上書了勿令兒知立在床下倚床前腳男左女右

**黃土散**治小兒卒客忤

竈中黃土 蚯蚓糞各等分

右研勻和水塗兒頭上及五心良

積熱證治

小兒積熱者表裏俱熱遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便焦黃先以四順清涼飲子利動臟腑熱則去或既去後熱者內死已解而表熱未解也當用惺惺散紅綿散加麻黃微發汗表熱退去表熱去後又發熱者何也世醫到此尽不能曉或再用涼藥或再解表或以謂不可醫藥致夭傷者甚多此表裏俱虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非熱證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽氣歸內身体便涼熱重者用銀白散

**四順飲子**治小兒頭昏煩赤口內熱小便赤大便火此裏熱

大黃 當歸 赤芍藥 甘草各等

右為末三歲上下小兒每服一大錢水一盞煎至七分作二服 [illegible]用芍藥欲利小便則用赤芍藥若虛熱者加甘草下利者減大黃 月風邪加麻黃去節中風身体強直服者加獨活並於一兩中加減半錢

**惺惺散**

川芎 細辛 人參 甘草炙

白茯苓 防風 白术

右等分爲細末每服一錢水一小盞薄荷三葉同煎四

分溫服不拘時候

**[illegible]散**

殭蚕炒 白术 天麻 天南星 [illegible]末[illegible]

右爲末每服一錢水一小盞入紅綿少許同煎至六分

溫服凡小兒風熱頭目不清此藥服之若傷寒有表證

發熱者每服入去節麻黄末半錢以下有裏熱以瀉滿

者入滑石末半錢以下同煎服之

**[illegible]散**

人參 白茯苓 乾山藥 白术

白扁豆 甘草[illegible]

右爲末每服一大錢水一小盞棗一个生薑二片同煎

至五分通口服此藥用以安養治胃冷加附子治風證

加天麻治痢加罌粟殼

**銀白散**

乾山藥 白术 白茯苓 人參

白扁豆 知母 甘草炙 升麻

右等分爲末一錢水一小盞棗一个煎七分溫服不拘

時候

急慢驚風證治

小兒發搐俗云發驚風有陰陽二證身熱面赤而發搐搦上視

牙關緊硬者陽證也因吐瀉或只吐不瀉日漸困睡面色白脈

沉或冷而發驚不甚搐搦微微目上視手足微動者陰證也

陽證用凉藥陰證用溫藥不可一概作驚風治也又有一證

欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當服發散藥

**[illegible]丸**

朱砂 膩粉 麝香 蘆薈

白附子 甘草 胡黄連 蠍梢 七个

殭蚕十條 金箔七片 赤脚蜈蚣一條

右爲末二歲以上服半錢匕以金銀薄荷湯調下三錢

以上服半錢如口不開搐入鼻中

**[illegible]**

黑附子 天南星 半夏 白附子

右研細井花水浸七日每日換水浸訖控乾入朱砂一

錢麝香一錢研勻每服一字薄荷湯調下量兒加減一方

用附子生去皮臍爲末每服一錢以水一盞半生薑一

片同煎至半盞分三二服量兒加減吐者入丁香五分

同煎乳空麻服或用水浸炊餅爲丸如粟米大每服一

十粒亦可○鹵見顖顇門

**三辛散** 治小兒頭骨應合而不合頭骨開者名曰解顱

細辛 桂心 乾薑

右爲末以乳汁和塗顱上乾復傅之兒面赤即愈

解顱治法

又方

蜣蜋

用猪頰車中骨髓傳頂上日三四度曾有人作頭巾

裹頭遮護之久而合良法也

魃病證治

千金論小兒有魃病者婦人妊娠被惡神導其腹中令兒病也

魃亦小兒也致病微微下利寒熱去來毫毛鬢髮不悅

者是也宜服龍膽湯婦人怨有小兒未能行而母更有娠
使兒飲此作魃也假令兒言瘦痩骨立發熱髮落
龍膽湯 治小兒出腹血脈未盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱吐𡀔
若能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解中客人鬼氣
并諸癇驚
龍膽草 柴胡 黄芩 桔梗 鈎藤皮
芍藥 炙草 茯苓各半 蜣蜋二枚 大黄一兩
右剉散以水一升煮取五合爲一劑十歲已下小兒
可服若兒生一日至七日分一合爲三服八日至十
五日爲二服或三服生十六日至二十日分二合爲
三服小兒生二十日四十日盡以五合爲三服皆以
得下即止此爲出腹嬰兒所作若日月長大者以次
日例爲其有客忤及有鬼氣可加人參當歸各一錢
半百日者加一錢如一歲二百日兒加一錢半一歲兒
者加五錢餘皆准此

疳病證治
小兒疳病多因缺乳其食太早所致或因久病臟腑皆虛
蟲動日漸羸瘦足不能行髮堅發熱無精神肥兒丸主之

**肥兒丸**
川連 神曲 大麥芽炒 木香二分
肉果麫裹煨 檳榔各五 [illegible]
右爲末神曲糊丸如梧桐子大每服二三十丸量兒歲數
開水送下

六神丸
史君子 訶子 肉豆蔻 [illegible]
肉果 [illegible] 蘆薈 [illegible]

右爲末煮棗肉和丸如麻子大每服五丸至七丸溫米
飲湯下

龍膽丸 治病發熱
龍膽草 川連 史君子肉 青皮各等
右爲末猪膽汁和丸如梧桐子大每服二十粒以意
加減臨卧時滾水送下

五加皮散
治小兒生三歲不能行者由受氣不足體力虛怯腰
脊腿膝脚筋骨軟不能行
五加皮
右味以粥飲調用酒少許每服一栗殼許日三服

鹿茸地黃丸
治小兒足軟不能行
鹿茸 熟地 山藥 萸肉各四兩
丹皮 茯苓 澤瀉各三兩
右爲末熟蜜和丸如梧子大每服三錢青鹽湯下

三因極一病證方論第十八

雍正七年仲夏影上古堂吴氏宋本補全

高氏鑑定宋刻版書

# 新刊仁齋直指方論二十六卷小兒方論五卷醫脈真經一卷傷寒類書活人總括七卷

（宋）楊士瀛撰

宋景定元年至五年環溪書院刻本

仁齋直指二十六卷附傷寒類書活人總括七卷 浙江巡撫採進本

宋楊士瀛撰。士瀛字登父、仁齋其號也、福州人。始末無考。前有自序、題景定甲子。甲子爲景定五年、次年卽度宗咸淳元年、則宋末人矣。此本爲明嘉靖庚戌所刻。前有余鍰序、稱直指列爲二十八卷、析七十九條。今考七十九條之數、與序相符、而其書實止二十六卷。焦竑國史經籍志載有此書、亦作二十六卷。蓋序文偶誤。然士瀛所撰本名仁齋直指。其每條之後題曰附遺者、則明嘉靖中朱崇正所續加。崇正字宗儒、號惠齋、徽州人、卽刊此本者也。焦志旣題曰仁齋直指附遺方、乃惟註楊士瀛撰、則倂附遺屬之士瀛、亦未免小誤也。其傷寒類書活人總括七卷、焦志不著錄。據仁齋直指自序、其成書尚在直指前。此本以卷帙較少、故附刻於後。卷首標題、亦稱朱崇正附遺。然核其全編、每條皆文義相屬、絕無所謂附遺者。惟卷一活人證治賦後有司天在泉圖、五運六氣圖、傷寒脈法、指掌圖、目錄中註一附字耳。或因此一卷有附遺、而牽連題及七卷。或因直指有附遺、而牽連題及此書。均未可定。宋槧舊本旣已不存、無從證其虛實、疑以傳疑可矣。

全幼撫活人總括嬰兒指南[seal]
皆以活名識及緣書一行於世
斂肅而揖告曰識不易也誰肯
傾囷竭橐以猶人哉余曰不亦
聞有天乎天將寓其濟人利物
之心故資我以心通意曉之學
既以於天還以事之其善遺物
細心之所期也或者隱光自韜
藏諸己而不傳諸人致怨玉毀
櫝中草木俱腐矣雖然人有四
百四病或出於前三捫之外者
可不考證擇方揭為直指之捷

徑乎明白易曉之謂直發蹤以
示之謂指剖前哲未言之蘊摘
諸家已效之方濟以家傳參之
肘後使讀者心目瞭然對病識
證因證以藥猶繩墨誠陳之不
可欺焉幾仁意周流貫之相續
非深與歟余嘗懼而語曰天之
予人以其物必使之有以用其
物有其物而不能用非惟暴天
物亦自棄於天者也俾書此為
同志勉景定甲子良月朔三山
楊士瀛登父序

# 仁齋直指方論綱目


○卷第一
總論
○卷第二
證治提綱
○卷第三
風　寒
暑　濕
○卷第四
風緩　歷節風
脚氣
○卷第五
諸氣
○卷第六
心氣　脾胃
○卷第七
痰涎 附 水飲　嘔吐
○卷第八
咳嗽 附 喘嗽　聲音
○卷第九
虛勞 附 虛汗　勞瘵
○卷第十
漏濁　夢泄
○卷第十一
眩運　驚悸
○卷第十二
痎瘧
○卷第十三
吐瀉 附 霍亂　泄瀉
○卷第十四
瀉痢　脫肛
○卷第十五
積熱　痼冷
秘澁
○卷第十六
五疸　諸淋

○卷第十七
消渴　脹滿
虛腫
○卷第十八
身體（附腰）　腎氣（附木腎）
○卷第十九
腎臟風癢　頭風
○卷第二十
眼目
○卷第二十一
耳　鼻
唇舌　咽喉
齒
○卷之二十二
癰疽　乳癰
癌　瘑
瘭　丁瘡
○卷第二十三
瘰癧　癭瘤
腸癰　便毒
腸風　諸痔
○卷第二十四
癮疹風　丹毒
癩風　諸瘡
疥癬
○卷第二十五
諸蟲　蠱毒
挑生毒　諸毒
○卷第二十六
婦人　血氣
拾遺　小兒（後集）
活人總括　醫學真經

仁齋直指方論綱目

新刊仁齋直指方論目錄

環溪書院刊行

○卷之一

# 總論

五臟所主論　五臟病質論　諸陰諸陽論
血榮氣衛論　脉病逆順論　男女則一論
問病論　易簡方論

○卷之二

# 證治提綱

得病有因　治病當先救急　治病如操舟
調藥中病即止　經常用藥有功　論肝脾之病
病人只脉洪大　水氣腎氣血氣風毒傳變治法
治痢要訣　調經治痢　蜜茶治痢
治禁口痢　瘧痢用藥　治瘧要訣
發瘧但吐用藥　瘧有水有血　瘧發寒熱有根
常山治瘧須用大黃為佐　寒熱似瘧
吐汗下治瘧　瘧後調理　退熱
柴胡退熱不及黃芩　退熱有法
小兒泄瀉解熱有二　瀉血發熱
佐助小柴胡湯　腎熱用五苓散　下後大腸熱服陰
通利大便有法　飯後隨即大便　脾泄腎泄
腎泄　大便脫泄向臟　脫肛
小便不通　石淋　轉脬
孕婦似瘧　下焦蓄血　產婦血暈聚痛
身體血滯作痛　身體疼腰膝熱證痰咳指要足冷

血滯　血崩　吐血
治湯有法　酒家有病用藥　治傷寒前後肉脹
蟲證　胃脘痛引背上面　面肉浮手疾
肚皮痛　胃上氣痛　治喉痛耳聾

○卷之三

# 風

風論　諸風證治　心中風
肝中風　腎中風　肺中風
脾中風　胃中風　中風惡證
治卒中法又法　小續命湯　排風湯
人參順氣散說又　烏藥順氣散　攝生散
三生飲　附香飲　星香散
大醒風湯　左經圓　蠲青丹
鐵彈圓　拒風丹　麝香圓
增味五痺湯　瓜蒂散　拂痰散
鉤藤風痺方　灸風方　烏龍丹
黑豆治產良方附大豆風毒證　荊歸湯方見婦門
獨活酒方見婦門

# 寒

中寒方治　中寒證治　不換金正氣散
養胃湯　蘇桂湯　附子理中湯
沉附湯　薑附湯　附子散
五丹圓　藿香人參散　敗毒散
傷寒證治格法方在傷寒門

# 暑

中暑方論　中暑證治　五物香薷湯
香薷縮脾飲　香薷散　五苓散方見水門
小柴胡湯方見…　竹葉石膏湯　六和湯
二陳湯方見…　小半夏茯苓湯方見…門
消暑圓　來復丹　大黃龍圓
道途中暑方

## 濕

中濕方論　中濕證治　加劑除濕湯
伏苓白朮湯　腎著湯　黃耆建中湯
不換金正氣散方見…　神朮圓方見…　生附除濕湯
桂枝附子湯　甘草附子湯　朮附湯
五苓散方見…　茵陳湯　濕溫身痛方



## 風緩

風緩方論　風緩證治　排風湯方見…
續命湯方見…　蘇合香圓方見…　白圓子方見…
安腎圓　不換金正氣散方見…　大聖一粒金丹
大鐵彈圓　烏附散　四斤圓方見…
虎骨酒　鐵骨丹方見…　鐵彈圓方見…

## 歷節風

歷節風論　歷節風證治　虎骨散
麝香圓方見…　海桐皮散　獨活寄生湯方見…
麝香圓方見…　虎骨酒方見…　硫黃酒
吹用歷節風… 返魂丹… 神授圓
白虎風走注疼痛　麝香圓方見…

## 脚氣

脚氣方論　脚氣證治　二十四味輕脚圓
木瓜散　降氣湯　檳榔散
排風湯方見…　生木瓜圓　止嘔湯
檳榔管物湯　海桐皮酒　杉節湯
三和散方見…門　枳殼散　脾約圓
大黃湯　追風毒剉散　敗毒散方見…
竹茹湯方見…　木香飲　降氣湯方見…
養正丹方見…門　和劑流氣飲方見…　椒瓜圓
越婢湯　小續命湯方見…　乾薑甘草湯
香薷剉散　獨活寄生湯方見…　石南圓
加劑除濕湯方見…　五苓散方見…　換腿圓
獨活湯　不老地仙丹　烏[illegible]圓
蹙濟圓　四斤圓方見…　大流氣飲方見…
虎骨散方見…　金液丹方見…　安腎圓方見…
二陳湯方見…　艾瓜圓方見…　烏藥順氣散
不換金正氣散方見…



## 諸氣

諸氣方論　諸氣證治　和劑七氣湯
和劑治中湯方見…　沉香降氣湯　大沉香圓
三因七氣湯　易簡二陳湯　和劑枳殼散方見…
和劑流氣飲　指迷七氣湯　順氣木香散
三和散　五皮散　分氣紫蘇湯
蘇子降氣湯　蘇合香圓方見…　秘傳降氣湯
五膈寬中散　紅圓子　異香散

調氣散 神保圓 蓮煎圓
生料五苓散 青木香圓 俞山人降氣湯
青娥圓 感應圓 麻仁圓
撞氣阿魏圓 三稜煎圓 二薑圓
香橘湯 桔梗枳殼湯 薑桂散
沉香開膈散 良薑湯 白豆蔻散
如意圓 頂珠圓 楊氏麝香圓
橘皮一物湯 氣鬼石燕散 分心氣飲 方見氣



## 心氣

心疼方論 心疼證治 沉香圓 方見血類
和劑七氣湯 方見氣類 沉香降氣湯 方見氣類 大沉香圓
蘇合香圓 方見厥門 桂枝四七湯 勝金散
靈脂酒 生地黃膏 靈砂丹
五丹圓 方見血類 薑桂飲 生薑枳殼湯
拈痛圓 心腹痛方

## 脾胃

脾疼方論 脾疼證治 良薑拈痛散
和劑抽刀散 調痛散 桂花散
積聚脾疼方 沉香圓 方見血類 靈脂酒 方見心疼
和劑七氣湯 方見氣類 和劑沉香降氣湯 方見氣類 橘桂湯
薑桂飲 方見心疼 檳榔散 金液丹
二物湯 乾薑甘草湯 治脾痛脹痛方
脾痛氣痛方 和胃承治 治中湯 方見[illegible]
沉香磨脾散 安胃散 人參開胃湯
助胃膏 宮方七香圓 丁香半夏圓

千金五套圓



## 痰涎

痰涎方論 痰涎證治 橘皮湯
前胡半夏湯 人參飲 星香飲
二聖飲 大半夏湯 半夏圓
鉛砂圓 神朮圓 辰砂化痰圓
強中二薑圓 養正丹 方見痼冷門 白圓子 方見[illegible]
二陳湯 方見嘔門 控涎良方

## 水飲

水飲方論 水飲證治 芎夏湯
大半夏湯 方見痰涎 小半夏伏苓湯 五苓散 方見[illegible]門
桂苓湯 平肺湯 青木香圓
香薷湯 十棗湯 安腎圓
五皮散 方見[illegible] 三和散 方見[illegible] 消飲圓
倍朮圓

## 嘔吐

嘔吐方論 嘔吐證治 附子理中湯 方見[illegible]
二薑湯 四逆湯 吳茱萸湯
小柴胡湯 方見血類 大半夏湯 方見[illegible] 小半夏伏苓湯 方見[illegible]
治中湯 二陳湯 方見[illegible] 地黃湯
加減七氣湯 藿香正氣散 養胃湯 方見[illegible]
參橘湯 丁香煮散 附子散
養正丹 方見[illegible]門 靈砂丹 蘇合香圓 方見厥門
感應圓 方見[illegible] 翻胃[illegible] 橘皮湯

瀉白散　温肺散

○卷之八

## 咳嗽

咳嗽方論　咳嗽證治　華蓋散
加減麻黃湯　温肺湯　三拗湯
金沸草散　人參款花膏　天麻防風圓
清肺湯　解毒雄黃圓（方見□□）　黃連阿膠圓
不換金正氣散（方見□□）　大阿膠圓　桑白皮散
小青龍湯（方見□□）　十棗湯（方見□門）　真武湯
養正丹（方見□□）　潤肺湯　理中圓
加味理中湯　養胃湯（方見□□）　人參飲
養肺湯　寧嗽湯　冷嗽寒痰方
橘皮半夏湯　大七氣湯　白圓子（方見□□）
人參潤肺散　南星散　加味半夏茯苓湯
人參芎歸湯　黃芪建中湯　消脹飲
人參胡桃湯（方見□門）　定肺湯（方見□門）　七寶散
雄黃散　蘇合香圓　嗽逆方（□□）

## 喘嗽

喘嗽方論　喘嗽證治　九寶湯
定肺湯　調降湯　杏蘇飲
五味子湯　人參胡桃湯　三拗湯（方見咳嗽門）
玉華散　小青龍湯（方見咳嗽門）　神秘湯
小半夏茯苓湯（方見□門）　五苓散（方見□門）　四七湯
桔梗枳殼湯（方見□門）　指迷七氣湯（方見□門）　分氣紫蘇飲（方見□門）
二陳湯（□□）　安腎圓（方見□門）　八味圓（方見□門）
五靈圓　雄黃圓　皂莢圓方（方見□門）

虛勞喘嗽□□方

## 聲音

聲音方論　聲音證治　星香飲
荊蘇湯　金沸草散（方見咳嗽門）　人參款花膏（方見咳嗽門）
二物湯　歸荊湯（方見□門）　小柴胡湯（方見□類）
不換金正氣散（方見□□）　三因七氣湯（方見□門）　犀角地黃湯
朱砂圓（方見□□）　二陳湯（方見□□）　金花散
□□□散（方見□□）　治□桃仁湯　人參平補湯
山藥圓（方見□門）　杏仁煎　木通湯

○卷之九

## 虛勞

虛勞方論（□□）　虛勞證治　十補湯（方見□門）
雙和湯　地骨皮散　枳殼散（方見□□）
加味人參紫菀散　大阿膠圓（方見□門）　紫蘇湯（方見□□）
□蘇湯（方見血類）　薏苡湯（方見血類）　人參湯（方見血類）
人參飲（方見□□）　人參芎歸湯（方見□門）　地黃飲
大寧嗽湯　遠志圓　龍齒湯
養心湯　十四友圓（方見□門）　辰砂妙香散（方見□門）
□□□□圓　還少丹　黃芪十補湯
鹿茸大補湯　黃芪六一湯　當歸散
沉香鱉甲散（方見□門）　參苓白朮散　治中湯（方見吐門）
人參養胃湯（方見□門）　二陳湯（方見□□）　桃仁煎
神授圓　□□方　蘇合香圓（方見□門）
黃芪益損湯

## 虛汗

虛汗方論　虛汗證治　建中湯
黃芪建中湯　當歸建中湯　桂枝附子湯
黃芪六一湯 方見□門　當歸六黃湯 方見□門　朮苓湯
牡蠣散　麻黃散　防風散
溫粉止汗法

## 勞瘵

勞瘵論　勞瘵證治　芎歸血餘散
北斗符　鱉甲生犀散　虎牙圓
雄麝圓　五枝散　藍汁方
獺肝方　木香檳榔圓　參青散
金蟾圓　神授圓 方見□門　服藥食忌
論瘵虫形狀



## 漏濁

漏濁方論　漏濁證治　約精圓
蓮子六一湯 方見□門　清心蓮子飲　辰砂妙香散 方見□門
蠟苓圓 方見□門　五苓散 方見□門　雞清圓
寧志膏 方見□門　伏兎丹　平補圓 方見□門
牡蠣圓　金櫻子圓　小菟絲子圓 方見□門
桑螵蛸散　生料四君子湯 方見□門　龍齒補心湯
煉鹽方　山藥圓　還少丹 方見□門
鹿茸益精圓　家韭子圓　震靈丹 方見□門
二陳湯 方見□門　白圓子 方見□門　分清飲
蒼朮難名丹

## 夢泄

夢泄方論　夢泄證治　伏苓圓
蓮子六一湯 方見□門　雞清圓 方見□門　鹿角散
還少丹 方見□門　鹿茸益精圓 方見□門　家韭子圓 方見漏濁門
十補湯 方見□門　震靈丹 方見□門



## 眩運

眩運方論　眩運證治　理中湯 方見□門
伏苓桂枝白朮甘草湯　芎朮除眩湯
來復丹 方見□門　養正丹 方見□門
乾薑甘草湯 方見□門　附子理中湯 方見□門　桂苓圓
香薷散 方見□門　消暑圓 方見□門　十四友圓 方見□門
安腎圓 方見□門　和劑七氣湯 方見□門　芎辛湯 方見□門
千金五套圓 方見□門　[illegible]　蘇合香圓 方見□門
蘇沈九寶圓　芎辛湯 方見□門　五苓散 方見水門
要嚏丹 方見□門　黑錫丹 方見□門　二陳湯 方見□門
芷蓮圓　白附子圓　人參前胡湯

## 驚悸

驚悸方論　驚悸證治　養心湯
寧志圓　參乳圓　十四友圓
朱雀圓　蜜陀僧散　溫膽湯
加味四七湯　茯苓甘草湯　薏木湯
小半夏茯苓湯 方見□門　炙甘草湯　寧志膏



## 痎瘧

痎瘧方論　痎瘧證治　麻黃白朮湯

五積散　黃芩湯　解毒雄黃圓
養正丹 方見首門　蒜附湯 方見　附子理中湯 方見
皂果飲　小柴胡湯 方見　香薷散
五物香薷湯　香薷縮脾飲　常山飲
七寶剉散　加料不換湯　木附湯 方見
柴胡桂薑湯　二陳湯　四獸湯
紅圓子　烏頭七棗湯　治瘧木香圓
地龍飲　觀音圓　芎歸鱉甲散
万勞圓　經效瘧丹　消癖圓
驅瘧湯　生熟飲　蒜丹圓
七物湯　截瘧丹　勝金圓
治瘴湯　灸瘧方　六物湯
脾積圓

○卷之十三

# ○吐瀉 附霍亂

吐瀉方論 附霍亂　吐瀉證治　藿香正氣散 方見
五苓散 方見　良薑散　治要除濕湯
胡椒湯　治中湯 方見　香薷散 方見暑門
木瓜湯　四順附子湯　薑鹽飲
鹽湯法　蘇合香圓 方見　鹽熨方

# ○泄瀉

泄瀉方論　泄瀉證治　理中湯
調中散　肉豆蔻散　治要除濕湯
香薷剉散 方見　平胃散　生料五苓散 方見
黃連阿膠圓 方見　洞泄方　橘皮湯
薑附湯 方見　木附湯 方見　大巳寒圓

戊己圓　真人養臟湯　雞舌香散
三棱散　固腸散　[illegible]
安腎圓 方見　和劑七氣湯 方見氣門　震靈丹
木香散　二神圓　當歸厚朴湯

○卷之十四

# ○瀉痢

瀉痢方論　瀉痢證治　敗毒散 方見
不換金正氣散 方見　治要除濕湯 方見　理中湯 方見
艾薑圓　人參豆蔻散　香薷剉散 方見
五物香薷湯 方見暑門　六和湯 方見暑門　升麻湯
黃連阿膠圓 方見　橘皮湯 方見　香連圓
真人養臟湯 方見　三棱散 方見　感應圓 方見
解毒雄黃圓 方見　和劑流氣飲 方見　大理中散 方見
五膈寬中散 方見　牛乳湯　茱連圓
胃風湯　肉豆蔻散 方見　附子理中湯 方見
香茸湯 方見　禁口痢方　斷下湯
固腸散 方見　玉華白丹　赤石脂禹餘糧湯
治痢乳豆湯　熱痢方

# ○脫肛

脫肛方論　脫肛證治　蝟皮散
蟠龍散　磁石散　香荊散
鉤腸圓　縮砂湯　黃連阿膠圓
鐵粉散　蒲黃膏　桑螵蛸湯
槐子膏　木賊散　獨虎散
石灰方　敗毒散 方見　熏洗方
小兒灸法　蒸洗散

卷之十五

## 積熱

積熱方論 積熱證治 小柴胡湯方見血證
敗毒散方見瘟疫 三黃湯 三黃圓
洗心散 四順清涼飲 八正散
甘露飲 木通散 甘豆湯
黃連湯 牛黃凉膈圓 解毒雄黃圓
消痰黃連圓 黃連阿膠圓方見痢門

## 痼冷

痼冷方論 痼冷證治 十補湯
附子理中湯方見霍亂 沉附湯方見虛損 薑附湯方見虛損
麝香鹿茸圓方見虛損 八味圓 黑錫丹
養正丹 靈砂 椒附散
治腎虛血寒方

## 秘澁

小便不通論 小便不通證治 萆薢湯
蒲黃湯 八正散方見積熱 五苓散方見
參香湯 平補圓 茴香圓
桃仁承氣湯方見血證 腰腎圓 掩臍法
轉胞方
大便秘澁方論 大便秘澁證治 大黃飲子
三黃湯方見積熱 三黃圓方見積熱 甘豆湯方見積熱
金液丹方見 半硫圓 膠蜜湯
潤腸圓 脾約圓 木香逐氣圓
二香圓 通腸 脾約麻仁圓方見

追風毒剉散方見 踈風散 桔梗枳殼湯方見
寬快湯 降氣湯 蘇感圓
探病方 掩臍法 熏方
調導飲

卷之十六

## 五疸

五疸方論 五疸證治 茵陳湯
桂枝黃耆湯 必效散 一清飲
茵陳湯 五苓散方見 酒蒸黃連圓
山茵陳散 甘露飲 黃連阿膠圓方見
柴胡甘草湯 生髮方 紅圓子方見
二陳湯方見 辰砂妙香散 當歸白朮湯
六物湯 土瓜方 小菟絲子圓
芎藭湯方見血證 加減四君子湯 解熱方

## 諸淋

諸淋方論 諸淋證治 消石散
二神散 車前子散 血餘散方見血證
黃芩一物湯 八正散方見積熱 琥珀散
增味導赤散 車前草方 苦參湯
海金砂散 五苓散方見 茯苓調血湯
薑蜜湯方見 甘豆湯方見積熱 導赤圓
秋石圓 滑石散 鵝砂散
木香湯 沙石淋方

卷之十七

## 消渴

消渴方論　消渴證治　茯菟丹
降心湯　生地黃膏　黃芩湯
猪肚圓又方　川黃連圓　玉泉圓
止渴劑散　衛生天花圓　[illegible]方又二方
蠟苓圓　繰絲湯　辰砂妙香散方見[illegible]門
天花粉圓　瓜連圓　玉壺圓
天花散　錢氏白朮散　伏神圓
小兔絲子圓　枸杞子圓　八味圓方見[illegible]門
平補圓　雙補圓　殺虫方

# ○脹滿

脹滿方論　脹滿證治　十膈散
大異香散　五膈寬中散方見膈門　草蔻茹圓
調氣散方見氣門　大半夏湯方見[illegible]門　和劑流氣飲方見[illegible]氣門
調降湯方見[illegible]門　沉香降氣湯方見氣門　人參芎歸湯
溫胃湯　撞氣木香散方見氣門　枳殼剉散
蘇合香圓方見氣門

# ○虛腫

虛腫方論　虛腫證治　青龍湯方見[illegible]門水
十棗湯方見[illegible]門水　安腎圓方見[illegible]門水　青木香圓方見[illegible]門水
溫白圓　五苓散方見[illegible]門　集香湯
蘿蔔子飲　三和散方見[illegible]門　枳殼散方見[illegible]門
沉香降氣湯　神助散　行水圓
葶藶散　桑皮散　防風散
消蠱湯　加味枳朮湯　調榮散
續斷飲　七物方　虛腫方
和劑流氣飲[illegible]外有腫大塞物水泡通明方

虛腫方

○卷之十八

# 身體

身疼方論　身疼證治　人參順氣散方見風門
左經圓方見風門　麝香圓方見風門　增味五痺湯方見風門
加劑除濕湯方見濕門　牡附除濕湯方見濕門　五苓散方見[illegible]門
黃芪建中湯方見虛門　大半夏湯方見痰門　消痰茯苓圓
天仙飲　千金五套圓方見[illegible]門　白圓子
二陳湯方見痰門　婆蒿根酒　消飲圓
倍朮圓方見[illegible]門水　沉香鱉甲散　十補湯方見虛門
舒筋散　補髓丹

# 腰

腰痛方論　腰痛證治　青娥圓
調氣散方見氣門　安腎圓方見虛門　獨活寄生湯
小續命湯方見風門　生附湯　朮附湯方見濕門
甘豆湯方見[illegible]門　敗毒散方見寒門　蘇沉麝圓方見[illegible]門
人參順氣散方見風門　烏藥順氣散方見風門　腎著湯方見濕門
青木香圓方見氣門　乳香趁痛散　茴香酒
和劑七氣湯方見氣門　麝香鹿茸圓方見虛門　八味圓方見虛門
十補湯方見虛門　調肝散　沉香降氣湯
橘香圓　神麴酒　腰重痛方

# 腎氣

腎氣方論　腎氣證治　牡丹圓
[illegible]汁方見[illegible]門　調氣散方見氣門　沉附湯
蟠蔥湯　蘹香圓　茴香[illegible]酒

川椒散　梔子散　甘豆湯
海浮石散　金連散　五苓散（方見瘧門）
柴胡桂枝湯　解毒雄黃圓（方見瘡門）　枳殼散（方見痢門）
二物湯　青木香圓（方見水氣門）　五苓散（方見[illegible]門）
金鈴散　根棗方　蝸牛散
夫笑散　茴前散　金蝎延胡散
胡蘆巴散　葱白散　寸金圓
秘傳茱萸內消圓　胡蘆巴圓　鎮痛圓
腰子散　伏苓桂枝湯　敵金圓
川楝散（方見腎門）　金山老丈瓜圓　腎氣方

## 木腎

木腎方論　木腎證治　川楝散
金鈴散（方見腎門）　四神圓

○卷之十九

## 腎臟風瘡

腎瘡方論　腎瘡證治　宣風散
不換金正氣散（方見[illegible]）　青木香圓（方見水[illegible]）　安腎圓（方見[illegible]門）
活血驅風散　蒺藜散　烏荊圓（方見[illegible]門）
神授圓（方見[illegible]）　堊物腫爛流汁方
堊頭三五孔小漏常出血攪膿刻方
乳香龍骨散　除汗濕瘡方　婦[illegible]蝕瘡方
大學治腎臟風發瘡疥方（見[illegible]）

## 頭風

頭風方論　頭風證治　消風散
追風散　川芎茶調散　究原抽刀散

芎芷散　香芷散（見[illegible]）　二陳湯（方見[illegible]門）
如聖餅子　芎辛湯　活人葛根湯
桂枝葛根湯　頭風方

○卷之二十

## 眼目

眼目方論　眼目證治　人參羌活散
敗毒散（方見[illegible]）　消風散（方見[illegible]門）　治眼壅赤腫方
寄光散　菩薩散　羌活散
菊花散　白蒺藜散　開明散
海明散　蟬花無比散　蟬花散
治眼流淚方　千金[illegible]湯　八珍飲
[illegible]湯　瀉肝散　洗肝散
眼痛方　消毒麻仁圓　龍膽散
和劑[illegible]散　[illegible]散　遠志圓（方見[illegible]門）
參芪湯　生地黃圓　朱僧熱[illegible]方
道人開障散　杏仁方　花草膏
夏枯草散　神授退翳太師方　蒼朮散
仙朮飲　觀音圓　羊肝圓
大仙飲　前[illegible]明目散　真珠退翳散
退[illegible]散　五退散　還睛圓
明眼生熟地黃圓　駐景圓　山藥圓
菊睛圓　大流氣飲　千金神麴圓
湯泡散　水淋法　黃連滴眼方
[illegible]風散　立消膏　[illegible]膏
南硼砂散　洗心散（方見[illegible]）　[illegible]眼方
甘石散　前[illegible]膏　傳眼方
雀目散　治偷針方　[illegible]血方

〇卷之二十一

## 耳

耳論　耳病證治　治耳聾方
桂香散　排風湯（方見風門）　加味宣風散
地黄圓　益腎散　芎芷散
耳鳴方　耳鳴暴聾方　蔓荊子散
耳熱出汁方　聤耳方　聤耳方
耳聾方（又一方）　雞峰方　又聾方
耳痛方　虫入耳方　蟻入耳方
蜈蚣入耳方　耳聾塞耳方（又方）　大治耳聾通神散
治膿耳妙方（又七方）　耳鳴妙方　生料五苓散（方見[illegible]）
育木香圓（方見[illegible]門）

## 鼻

鼻論　鼻病證治　生地黄湯
川芎三黄散　敗毒散（方見[illegible]）　雞蘇圓
蘇子降氣湯（方見氣門）　衄血方（又[illegible]方）　川椒散
南星飲　芎藭散　通頂散
鼻乾雄黄圓　千金息肉方　人參順氣散（方見[illegible]）
藿香正氣散（方見[illegible]）　治鼻痛方　甘露飲（方見[illegible]門）
黄連阿膠圓（方見[illegible]）　治鼻瘡方　酒査鼻方
酒査鼻并鼻上紫黑面粉刺雀斑方
酒査鼻面上肺風瘡方　衄血方

## 唇口舌

唇舌大論　唇舌證治　升麻散

龍石散　五福化毒丹　生地黄膏
綠袍散　洗心散（方見[illegible]）　四順清涼飲（方見[illegible]門）
甘露飲（方見[illegible]）　牛黄涼膈圓（方見[illegible]門）　黄連阿膠圓（方見[illegible]門）
硼砂圓　雞蘇圓（方見[illegible]門）　舌出方
舌腫大方（又方）　舌腫強方　口舌生瘡腫方
唇舌焦燥口破生瘡方　口瘡方（又二方）
麥門冬圓（方見[illegible]）

## 咽喉

咽喉方論　咽喉證治　膽礬散
山豆根圓　青解毒圓　吹喉散
絳雪散　玉屑無憂散　牛黄涼膈圓（方見[illegible]門）
如聖湯　僵蠶圓　遠志散
白礬散　救喉方（又二方）　口瘡赤爛方
和劑七氣湯（方見[illegible]）　指迷七氣湯（方見[illegible]）　半夏桂甘湯
喉閉方（又方）　喉風喉閉方　解毒雄黄圓（方見[illegible]門）
玉鑰匙方　熱閉方（又方）　喉風喉痺方（又七方）
通關散（又方）　懸雍腫痛方（又方）　喉痺閉方
咽熱閉喉方　喉閉方　喉痛方

## 齒

齒論　齒病證治　荊芥湯
消風散（方見風門）　溫風散　安腎圓（方見[illegible]）
八味圓（方見[illegible]門）　香椒散　開笑散
皂莢散　二陳湯（方見[illegible]）　甘露飲（方見[illegible]門）
荊芥散　[illegible]金散　[illegible]
[illegible]散　[illegible]散　虫蛀牙疼方
雄黄圓　齒痛通用方　[illegible]荊散
虫痛方（又[illegible]方）

齊峰川椒散　傳藥痛方　通用方(凡四)
麝香散　牙痛貝方　牙痛方
牙蛀痛方(凡四)　牙宣出血方　消齒痛方

○卷之二十二

## 癰疽

癰疽方論　癰疽證治　灸法(凡四)
遠消方　拔毒散　追毒散
癰疽宣毒方(凡二)　宣毒一醉膏　宣毒方(凡四)
癰疽托毒排膿方　皂角散　芎歸托裏散
癰疽毒入腹則嘔吐惡食方　癰疽腫毒傳藥方
妙勝散　消腫散　退毒散
川烏散　夜明砂膏　乳豆膏
星香散　斂毒散　退腫散
收毒外消膏　乳香膏　保安妙功散
蜀葵膏　皂角膏　四虎散
洗水膏　蜂峰散　湧泉膏
麝香散　蛤蝎散　不換金正氣散
護肌膏　神功妙貼散　內消散
大全內消散　小車螯散　皂刺散
萬金一醉膏(凡二方)　粉乳托裏散　粉乳散
蠟礬圓　明膠酒　排膿內消散
究原排膿內補散　五香散
加味不換金　沉香散　黃芪托裏散
當歸酒　神授香附湯　消毒散
罌粟散　萬病內消散　紅內消散
清心散　消毒　癰疽煩渴方
加味八味圓　癰疽腹痛方　癰疽泄瀉方

癰疽虛弱寒戰方　山藥圓　[illegible]　內托黃芪圓
特異萬靈散　洗瘡方　升麻湯(凡二)
桑灰散　癰疽方　瘡口大寬方(凡二)
消蝕散　消蝕方　蒼耳圓
斂瘡散　保安斂瘡方　斂瘡生肌方(凡四)
生肌散　太一膏　神效膏
神異膏　陽仙膏　癰疽方
神仙截法　將理法　灸法
保安灸甘草法　癰疽大便秘方　斂瘡膏
去水膏　收瘡口方　溫洗方
瘡口深大方　諸惡核方　薰頭方
論瘡背發大毒　論癰疽[illegible]

## 乳癰

乳癰方論　乳癰證治　究原五物湯
萬金一醉膏[illegible]　乳癰方(凡[illegible])　生薑甘桔湯
乳初腫方　下乳方

## 癌

癌瘡方論

## 瘑

瘑瘡方論

## 瘭

瘭瘡方論　瘭瘡證治　瘭疽[illegible]方
瘭方(凡二)　諸瘡[illegible]方　治瘭瘡方(凡四)
瘡方　又[illegible]方[illegible]

瘭瘡方

# 丁瘡

丁瘡方論　丁瘡證治　拔丁瘡方（又條方）

# 瘰癧

瘰癧方論　瘰癧證治　是齋立應散
薄荷丹　必效圓　神秘散
雄黃散　木香膏　粉乳托裏散（方見…門）
蠟礬圓（方見…門）　山豆根方　[illegible]方
洗瘡方　究原斂瘡口方

# 癭瘤

癭瘤方論　癭瘤證治　[illegible]圓
蠟礬圓（方見…門）　針灸方　治小瘤方
治瘤方

# 漏瘡

漏瘡方論　漏瘡證治　溫解散
猪腎酒　猬皮散　保安炙甘草方（方見…門）
乳香雲母膏　神效圓（方見…門）　代赭石圓（方見…門）
冷漏乳香圓　蠟礬膏　黑靈散
血竭散　生地黄膏　蟾芳散
蜈蚣散　人牙散　平肌散
鐵箍膏　熏漏瘡方　洗漏瘡方
諸漏瘡方　熨枝漏瘡方　灸漏瘡方
灸瘻方



# 腸癰

腸癰方論　腸癰證治　牡丹散
木通散　四聖散　薏苡湯（方見…）
究原排膿內補散　雲母膏　蠟礬圓（方見…門）
[illegible]

# 便毒

便毒方論　便毒證治　雙解湯
連翹湯　復元通氣散　退毒飲
五苓散（方見…門）　追風毒散（方見…）　清涼飲（方見…門）
和劑流氣飲（方見…門）　究原排膿散（方見…門）　蠟礬圓（方見…門）
四聖散（方見…）　傅方　皂角膏
貼方　蕪葉方（又方）

# 腸風

腸風論　腸風證治　敗毒散（方見…）
不換金正氣散（方見…）　地榆散　橘皮湯（方見…）
酒蒸黄連圓（方見…門）　黄連阿膠圓（方見…門）　附子理中湯（方見…）
理中湯（方見…）　芎歸湯（方見…）　小烏沉湯
枳殼散（方見…門）　參苓白术散（方見…門）　四君子湯（方見…門）
烏荊圓　白圓子（方見…門）　不換金正氣散（…）
猪臟圓　撥撥散　蒜連圓（…）
法製香附子（方見…）　黑散子（…）　黑玉丹
腸風黑散　木賊散　槐角圓
真人養臟湯（方見…）　黑聖散　鯽魚方
震靈丹（方見…）　玉華白丹（方見…）　黄龍圓
消風散（方見…）　腸風久血方（又方）　腸風方

## 諸痔

諸痔方論　諸痔證治　清心湯
黃連阿膠圓（方見[illegible]）　枳殼散（方見[illegible]門）　追風對毒散（方見[illegible]門）
清涼飲　五痔散　聖圓子
[illegible]烏金散　槐角圓　蝟皮圓
收痔圓　[illegible]圓　猪甲散
青蛙圓　穿山甲散（又方）　地榆散
皂刺圓　皂角煎圓　芎歸圓
乾葛湯　猬皮湯　代赭石圓
荊枳湯　芎歸湯（方見[illegible]）　傅痔方（又二方）
止血方　通用方（又[illegible]方）　熏洗方（又八方）
治諸痔方　逐瘀湯　治痔五聖丹
治痔皆[illegible]膏　熏痔方　治痔方
傅藥　傅洗方

○卷之二十四

## 癮疹風

癮疹風論　癮疹證治　天麻散
加味羌活散　消風散（方見[illegible]門）　川芎茶調散（方見[illegible]）
胡麻散（方見[illegible]）　人參羌活散（方見[illegible]門）　惺惺散
[illegible]參散　傅藥（又方）

## 丹毒

丹毒方論　丹毒證治　[illegible]散
防己散　[illegible]散　人參羌活散（方見[illegible]）
惺惺散（方見[illegible]）　諸丹冷熱洗方　疎風解毒散（方見[illegible]）
傅方（又[illegible]）　洗方　小兒風疹方

## 癩風（附 [illegible]風）

癩風方論　癩風證治　通天再造散
本事神效追命散（方見[illegible]）　皂消圓
硫黃酒　黑虎丹　烏蛇圓
[illegible]朮散　雷圓散　[illegible]圓
[illegible]荊圓　又用[illegible]風方　[illegible]圓（方見[illegible]門）
千金治大風方　癩風灸法　癩風方（又方）

## 諸瘡

諸瘡方論　諸瘡證治　[illegible]散（又方）
乳香蠟油膏　傅洗方　臙脂散
苦楝散　胡粉散　[illegible]散
烏梅[illegible]（又方）　疥瘡方（又八方）　滑石粉
紫草膏（又三方）　[illegible]散　赤豆散
烏羊膏　頭爛瘡方　竹葉膏
[illegible]瘡方（又二方）　麝香散（又方）　治陰汗濕癢方
百[illegible]散　神[illegible]散　[illegible]瘡發歇不止方
[illegible]瘡圓（方見[illegible]門）　疎風解毒散　惡瘡方（又[illegible]方）
諸瘡頭瘡方　頭瘡方　頭禿瘡方
頭瘡頭[illegible]方　治瘡方（又方）　胎毒頭熱[illegible]瘡方
諸惡瘡方（又四方）　白禿頭方

## 疥癬

疥癬方論　疥癬證治　諸疥方（又八方）
濕疥方　疥瘡[illegible]方　大[illegible]全蝎散（方見[illegible]）
諸癬妙方（又三方）　[illegible]癬方　[illegible]方
久癬方（又方）　乾癬方　濕癬方

癬方（又方） 牛皮癬方 身生皮癬方

卷之二十五

## 諸蟲

諸虫方論 諸虫證治 蕪荑散

木香檳榔圓 錫灰圓 妙應圓

雄砂圓 化虫散 貫衆酒

解毒雄黃圓 雞子酒 蠟膏

## 蠱毒

蠱毒方論 蠱毒證治 治蠱毒挑生神呪

保靈丹 雪黃圓 萬病解毒圓（方見諸毒門）

治蠱毒方 生漆圓 平胃散（方見脾胃門）

東坡雄黃圓 廣南衛生治蠱毒單方（又方）

七寶圓（方見痔門） 治蠱毒挑生方

## 挑生

挑生方論 挑生證治 萬病解毒圓（方見諸毒門）

治挑生方

## 諸毒

立勝散（又方） 蜈蚣方 天蛇毒方

辟妖魅瘟疫方 治挑生毒蠱毒野菌毒方

解諸藥毒殺腹內毒虫方 五絕救死方

頭風方（又方） 身風方 獺腸散

卷之二十六

## 婦人

產婦傷寒方論 婦人方論 孕育備論

論王叔和劉元賓別男女法 論崩中帶下

## 血氣

血論 血疾證治 芎歸湯（方見…）

藕節汁（方見…門） 膠艾湯（方見…） 產寶固經圓（方見…）

局方澤蘭圓（方見…） 當歸建中湯（方見…門） 大阿膠圓（方見…）

金井草散（方見…門） 真料治中湯（方見…） 舌出血方

理中湯（方見…門） 芍藥七氣湯（方見…） 甘草乾薑湯（方見…）

木香理中湯 五丹圓 來復丹（方見…門）

黑錫丹（方見…門） 金液丹（方見…門） 養正丹（方見…門）

生料理中湯 蘇合香圓（方見…門） 參苓白朮散（方見…門）

枳殼散（方見…門） 四君子湯（方見…門） 小烏沉湯（方見…）

桔梗枳殼湯（方見…門） 二陳湯（方見…門） 蘇虎沉麝圓

桂香圓 調經湯 縮砂湯

交加散 小柴胡湯 桃仁承氣湯

加減四物湯 半夏圓 黑散子

芎藭湯 豆蘇湯 阿膠散

地黃煎 黃芪湯 艾葉湯

荷蓮圓 人參湯 續斷飲

血餘散 小便出血方（又方） 治婦人血附方（又方）

燒鹽酒 桂枝酒 朱砂圓

咯血方 九竅出血方（又方）

療痔方（又方） 跌破出血方 頭破傷風方

失欠頰車蹉方 腳前冷縮頑痺方

新刊仁齋直指方論目錄

新刊仁齋直指方論卷之一

三山名醫仁齋楊士瀛登父　編撰

[illegible]　洪道　校定

五臟所主論

夫在天之風在地為木在人為肝惟肝則主風在天之熱[illegible]
[illegible]之所也在地為火在人為心惟心則主熱在天之濕在
地為土在人為脾惟脾則主濕在天之燥在地為金在人為肺
惟肺則主燥在天之寒在地為水在人為腎惟腎則主寒此
天地自然之氣也[illegible]在人而人不能[illegible]所
由生故風喜傷肝熱喜傷心濕喜傷脾燥喜傷肺寒喜傷腎
暑喜傷心包絡[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
東家六氣為人之迎可以知風寒暑濕燥火所從入之門[illegible]
氣口可以別臟氣[illegible]
易耗心神[illegible]
[illegible]
都為五臟之脈因其所主而察其[illegible]所受之處則得之矣
心主血所藏者神[illegible]
味苦其液汗肝主筋所藏者魂[illegible]
青其臭臊其味酸其液泣[illegible]
腎[illegible]其色黑其臭腐其味鹹其液唾[illegible]
肺主氣所藏者魄[illegible]
其味辛其液涕脾主肌肉所藏者意[illegible]
其色黃其臭香其味甘其液涎故心肺在上[illegible]
腎在下脾居中[illegible]所以為精血脈氣[illegible]
平脈浮大而散肝之平脈弦細而長腎之平脈沉濡而滑肺之

平脈浮濇而短脾之平脈和緩而[illegible]皆五臟本然之正脈也
[illegible]和云[illegible]
當旺者又木火金水四時各旺七十有二日[illegible]季脈每季
之月旬旺一十八日春則弦夏則洪[illegible]冬則沉[illegible]
合四季而論則亦七十有二日矣和緩者[illegible]細弱而長
是也夏脈若鉤大而散[illegible]秋毛者[illegible]輕[illegible]
以浮是也冬石者沉濡而滑[illegible]
平臟腑之中和不可得見[illegible]
時而呈見其中須有胃氣之和若[illegible]
帶[illegible]毛如吹毛石如[illegible]
胃氣[illegible]則[illegible]若夫春得金脈夏得水脈秋得火
脈冬得土脈四季得木脈此[illegible]
脈[illegible]脾之脈[illegible]心[illegible]
以[illegible]人[illegible]然[illegible]小腸[illegible]大腸[illegible]
[illegible]
[illegible]其[illegible]者[illegible]古人所謂[illegible]若又何如[illegible]
[illegible]日二[illegible]四[illegible]
[illegible]
五[illegible]色[illegible]
[illegible]不同而[illegible]
[illegible]皆弦吾知其病出於肝[illegible]
[illegible]知其病出於肺[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

五臟病證虛實論

五臟各有所主至其病證莫不以其所主而見焉而亦甚矣[illegible]

口乾不得寐數心痛而臍上有動氣者心家病也向背多惡
腹下痛硬痛逆目脹[illegible]痛而臍左有動氣者肝家
病也[illegible]黑
而咳嗽[illegible]喘[illegible]腰脊痛小腹[illegible]
飧泄而裏急後重臍下有動氣者腎家病也通曰善噫[illegible]
咳喘唾氣逆咽喉不利[illegible]若有動氣者肺
家病也面黃[illegible]善噫善嗜中脘脹滿飲食不消身體重腹
脹[illegible]怠惰嗜臥四肢不收當臍有動氣者脾家之病也[illegible]
先生有曰肝受病則目不能視腎受病則耳不能聽脾受病則
口不能食心受病則舌不能言[illegible]病證以此觀之不待智者
而後知矣然而心之惡熱者何熱則脈濁也肝之惡風者何
風則筋燥急也腎何以惡燥燥則精竭也肺何以惡寒寒則
氣留滯也脾何以惡濕濕則肉傷也五臟之病
原其本實有不從所從中來哉是以[illegible]有餘有不足

足胃[illegible]之候口乾舌苦身熱汗出而痛[illegible]
胃實之候目赤[illegible]頭[illegible]痛引手兩脇小腹之下[illegible]
[illegible]腹[illegible]少氣不言[illegible]泄而小便[illegible]
[illegible]而胃中[illegible]至腹[illegible]
而不[illegible]脹承[illegible]而若[illegible]有餘[illegible]也[illegible]
則[illegible]少色咳唾[illegible]則[illegible]痛
[illegible]如[illegible]則心[illegible]
[illegible]呼吸少[illegible]肺中[illegible]
[illegible]下[illegible]
[illegible]其[illegible]泄[illegible]
無力則[illegible]氣不足謂之[illegible]此也大抵[illegible]
[illegible]過不及以平[illegible]則[illegible]不足
而[illegible]先生所[illegible]
[illegible]知[illegible]隨便有死生禍福之[illegible]心痛而直[illegible]

面[illegible]病而[illegible]而[illegible]而[illegible]
病而臍[illegible]則五臟之氣絕也[illegible]
[illegible]不如之何雖[illegible]不有虛實之證不同耳[illegible]
[illegible]中虛脈[illegible]腹[illegible]後不通曰五實脈細皮寒氣少
後泄利[illegible]不[illegible]曰五[illegible]入者[illegible]
[illegible]言[illegible]
則[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
而[illegible]汗[illegible]法當解[illegible]脈浮而緊無汗[illegible]法當發汗此表
病之一虛一實脈伏而尖[illegible]法當下之脈沉而弱厥冷
自利法當溫之此裏病之一實一虛以[illegible]之證心下牢[illegible]
痛滿[illegible]而[illegible]物出者死內虛之證厥逆煩燥而吐
利不止者[illegible]是又不可不知也故併及之

諸陰諸陽論

稟五行之氣而[illegible]物之最靈者人也人稟五行之氣而生曰
陰[illegible]陽[illegible]心為手少陰腎為足少陰肺為手太陰脾
為足太陰肝為足厥陰心包絡為手厥陰此手足三陰之
經也小腸曰手太陽膀胱曰足太陽大腸曰手陽明胃曰足陽
明膽曰足少陽三焦曰手少陽此手足三陽之經也[illegible]
[illegible]合而[illegible]之[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]所以為陽之[illegible]

者隨陰入呼吸之間解㑊者則一身之陰陽也自其脈者
推之關前為陽陽得九分陰得一寸所以有主治之
分浮之實大沉之損小曰陽盛陰虛沉之實大浮之損小曰陰
盛陽虛所以有表裏之別脈居陽部而陰脈見脈居陰部而陽
脈見陽虛則陰出而乘之陰虛則陽入而乘之所以見寒暑
則變之機至若陽生於尺動於寸陰生於寸動於尺其候數
之為陽虛損結代動細之為陰浮滑長實洪緊之為表微沉
緩濇遲伏濡弱之為裏皆陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死其
則六脈之陰陽也自其病者求之寸口浮疾陽中之陽病主身
熱頭痛煩滿內熱寸口沉細陽中之陰病主少氣汗出悲傷不
聊尺脈浮滑陰中之陽病主小腹痛滿大小便難尺脈沉細陰
中之陰病主兩股酸痛陰痿濇泄陰出於陽其病發熱陽入於陰
其病發寒病欲得寒欲去衣又欲見人者為陽臟病欲得溫
惡聞人聲閉戶獨處者為陰腑病屬陽陽主動故其痛多走注
而不止臟病屬陰陰主靜故其痛有常處而不移也病日靜夜
病夜[illegible]陽病[illegible]陰虛[illegible]陰勝則寒陽勝則熱陰動則發熱
陽動則有汗陰勝則寒客邪陽受之飲食陰受之陽受風氣陰
受濕氣風者先於上濕者先於下其或邪居陽脈之間則
四[illegible]而為狂邪入陰脈之內則六經凝滯而為癲與陽即
厥無陰則陽[illegible]不能呼吸陽病不能俯陰病不能
仰重陽者狂重陰者癲脫陽者見鬼脫陰者目盲是則皆病之
陰陽也噫亦是周狀矣抑古人所謂陰維陽維陰蹻陽蹻者又何
如哉曰脈有陽維陰維陽蹻陰蹻衝任督帶此奇經八脈也[illegible]
道而行如溝渠[illegible]以備水潦之溢不拘於十二經之[illegible]
入之也維者維持諸脈之綱維[illegible]蹻者
捷也行走之機要[illegible]陽脈之會也任[illegible]原
也濇者陰脈之通[illegible]氣血[illegible]帶[illegible]
東諸脈取束帶之義[illegible]陽維之病苦寒熱陰維之病苦心

蹻陽蹻之病陰緩而陽急陰蹻之病陽緩而陰急衝病則氣逆
而裏急督病則脊強而折厥任病則男疝氣而女帶瘕帶病則
腹脹滿而腰溶溶其衝任二經是又婦人乳血月候之所從出
奇經之脈其如是乎關前為陽脈當九分而浮若溢併而上至
魚際者為溢溢則外關內格是為陰乘陽關後為陰脈當一寸而
沉若連併而下入尺澤者為覆覆則內關外格是為陽乘陰寸脈
[illegible]
不至[illegible]
是乎[illegible]人事不可不知也[illegible]
多寡逆從[illegible]情所發[illegible]之劑以
之助陰有志活人者又當識此

血氣營衛論

人之一身所以得全其性命者氣與血也蓋氣取諸陽血取諸
陰人生之初具此陰陽則亦具此血氣血氣者人身之根本
乎血何以為營營行脈中滋營之義也氣何以為衛衛行脈外
護衛之意也然營衛之生無所自來哉曰人受穀氣於胃
胃為水穀之海[illegible]
清者為營濁者為衛[illegible]
度平旦以來[illegible]會於手[illegible]
[illegible]

血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血凝氣有一息之不運則血有一息之不行病出於血調其氣猶可以[illegible]然調血何如焉故人之一身調氣爲上調血次之[illegible]後陰之意也若夫血有敗瘀滯泣乎諸經[illegible]所壅遏又當審所先而決去之經所謂先去其血而後調之又不可不通其變矣然而調氣之劑以之調血而兩得調血之劑以之調氣而乖張如木香官桂細辛厚朴以至烏藥[illegible]之類治氣可也治血亦可也若以[illegible]以調此然其[illegible]六腑之氣亦然矣[illegible]

又爲血之主肝爲血之藏脾爲氣之[illegible]中滲者可知血之出於心而不知血之納於肝[illegible]而不知氣之納於腎[illegible]作六以[illegible]行其心以巴豆大黃[illegible]

## 脈病逆順論

脈有可凡人形盛脈細少氣不足以息者危形瘦脈大而胸中多氣者死形氣相得者生參伍不調者病[illegible]之不可不察病也蓋人有[illegible]而脈[illegible]

陰陽虛實之不同而病之吉凶[illegible]脈所形證相應而不相反每萬舉而萬全少有乖張良工不能施其巧矣故脈之與病有利浮大而不利沉小者有利沉小而不利浮大者有大小無[illegible]而以浮沉滑濇[illegible]爲順逆者又有五行反剋而賊邪鬼[illegible]爲凶逆者諸[illegible]折而[illegible]脈之兆[illegible]脈浮大而疾者生沉小者[illegible]脈緊大而數者生沉細者死[illegible]脈洪大者生厥逆而脈細者死[illegible]脈實大者生虛濇而小伏者死諸氣中毒可洪大緊急不可細小而不[illegible]可堅者強不可沉小而虛弱腹脹者浮大則[illegible]小則[illegible]諸者浮大則安短濇則[illegible]之[illegible]貴乎[illegible]大緊實不貴乎微細浮短[illegible]水氣[illegible]貴浮浮而其大不[illegible]虛細沉[illegible]血順則脈堅強反則脈小弱中惡[illegible]則脈沉細順則脈浮洪前所謂剋浮大而不利沉小者此也傷寒已得汗沉小之脈安浮大之脈危自汗不止[illegible]之脈[illegible]之脈死[illegible]腹脹緊細則可[illegible]心

腹痛[illegible]則可堅洪則[illegible]之脈順則沉而濇逆則大而浮其[illegible]之脈順則散而虛逆則堅而疾嘔吐[illegible]若小弱沉滑洪若[illegible]洪全[illegible]血多順者微細而虛逆若[illegible]而大久嗽[illegible]者其正則脈微其反則洪急大腸[illegible]若其正則脈細其反則堅洪泄瀉[illegible]其正者纖細小[illegible]其反若[illegible]浮洪全[illegible]下血其正者細滑而沉其反若[illegible]疾大[illegible]可虛小而不可緊急[illegible]可沉小而不可疾[illegible]所謂剋沉小而不利浮大者此也傷寒脈躁盛而不得汗者陽之極其治也[illegible]已得汗而脈躁[illegible]者陰之極其候即死中風口噤而四肢不收脈浮遲而[illegible]若存脈洪數而氣[illegible]著亡上氣當[illegible]而目[illegible]脈[illegible]而手足溫若行脈[illegible]濇而四肢厥者亡[illegible]心下[illegible]則沉濡水病腹脹[illegible]則脈[illegible]則[illegible]則緩[illegible]而堅卒中惡者[illegible]則洪[illegible]則[illegible]血[illegible]若[illegible]

若脉絶弦腸癖腫結沽者脉浮弱若脉沉緊血諸疾沽以滑細短以堅強腸澼下膿沽以其沉弱以其浮有遲滑而無堅數則前中滿下不以虛有滑實而無浮虛則月經閉塞何以安補腸澼身不熱而脉和滑者易愈身熱而脉浮滑者難治諸吐血者溢不焦而脉浮數者易安弦絶沉堅或伏而大者難治泄而堅強順而濇滑其於上氣為可推反則堅正則和緩其於厥逆為可驗耳聾之脉沉而滑者可療浮而濇者難療虛之脉數而軟者可愈數而堅者難治[illegible]前所謂大小無拘而以浮沉滑濇堅軟為順逆若此也心病面赤喜笑心煩掌熱口乾閉目妄語臍上動氣脉當洪緊而數反得沉濇而微者水之尅火一不治肝病面青筋急多怒目痛目閉不欲見人臍左動氣脉當弦急而長反得浮濇而短者金之尅木二不治腎病面黑恐欠足寒泄痢腹痛泄後重臍下動氣脉當沉而滑反得緩而大者土之尅水三不治肺病面白悲愁噴嚏吐咽交血喘嗽寒熱臍右動氣脉當沉細而濇反得浮大而牢者火之尅金四不治五者脾病面黄善噫善嗜體重節痛四肢不收怠惰嗜臥腹滿泄利飲食不消當臍動氣脉來緩大者脾家正形也設或反是弦長而緊是非木邪之尅土乎前所謂五行反尅而賊邪剋虛為禍患者此也雖然使人之脉病病人之脉和陽病得陰脉陰病得陽脉凡此皆反也而劉元賓以為形病脉和人不死張長沙以為陰病見陽脉者生其言豈厚或經云脉病人不病曰行尸人病脉不病曰內虛此二者雖皆非順然形病而脉和猶可用力形和而脉病其死無疑況脉和之與脉健不可不同剛駁異操之謂健調平而有胃氣之謂和疑似之間學者當於此而致其辨矣經云陽病得陰脉者死[illegible]此二者雖皆非正然張長沙之論特為傷寒設耳[illegible]傷寒六腹痛酒而脉浮大之類矣爾腹滿[illegible]病在太陰浮大之脉陽小脉[illegible]

家之本體故能生焉學者當於此而通其故矣逆順之說故備論之以俟大賢之折衷云[illegible]

[illegible]

## 男女氣血則一論

血氣即陰陽也不論男女長幼均具之人之有病皆知調氣而血之一字往往不到焉至於調氣不愈加以消痰逐水無所不至其病自如是皆血之為患伏於冥冥之中而不可測識矣假如婦人得病於經水未來之時用何可驗而知若其非經脉久遏而不行與夫腸熱而傷血變生他證者又何而見之況由[illegible]者其能以男子之診為血證乎夫肝藏血而心主之動則血運於諸經靜則血歸於肝臟肝受血則能視足受血則能步掌受血則能握指受血則能攝故血凝於膚者為痹凝於脉者為泣凝於足者為厥凡神志昏昧往往閉煩渴喘吐語短內熱鼻衄唾紅脹紅面赤骨熱痛悶腸燥痰多咳痛喉痹之甚至兩肋脉痛不知人不問男子婦人皆血證目據脉之按血者脉來下濇下數閃灼明滅或沉細而隱伏也若夫血交攻則左手寸關按之洪盛蓋心主血肝藏血[illegible]經曰血上逆則忘血下蓄則狂上焦發血小便必難下焦[illegible]小便必自利血之所在當以此推治人總括所載[illegible]皆其要[illegible]中入酢為[illegible]而[illegible]抑有所謂血[illegible]時皓酒血入於酒則為酒[illegible]分潤烊敗血作生則為[illegible]之行[illegible]人之喉下發人之肚或附於背[illegible]其大則[illegible]如錢良可怪也[illegible]

二者可以救其毒嗣此則以[illegible]安胃
血常常服飲以消腸之如其不以甚和為重可從事於[illegible]
之剛悍君子未保其往[illegible]
餘氣脈脫而血自下者則[illegible]以此觀之他病伏熱之人[illegible]
氣與血而作吐者亦其病之有[illegible]

## 問病論

東坡先生嘗曰吾平生求醫蓋於平時默驗其工拙至於有疾必先盡告以所患而後診視使醫者了然知厥疾之所在虛實冷熱先定於中則脈之疑似不能惑也故雖中醫療疾常愈吾求疾愈而已豈以困醫為事哉誠哉斯言真[illegible]世之[illegible]也何者脈之與證相依而行脈者所以剖其證之未明證者所以索其脈之猶隱據脈以驗證問證以[illegible]察脈所謂醫者意也是與焉可舉一而廢一哉私竊怪夫近世以求多於所患以求診以此驗醫者之能否醫亦不俯下問盡[illegible]一診以自挾其所長甚者頻[illegible]前誤藥或飲食失節所[illegible]雖問之而不以實告遂至病於冥漠之間難療實熱於疑似之間意推千里不委命一擲與人試仗乎此余於經論所以特舉前輩格言以解世俗之惑不然難經有謂問其所欲五味以知其病之所起所在者又果何意耶[illegible]

[illegible]

## 論易簡方

易簡方論前後活人不知其幾近世之士類以春秋之法繩之曰易簡編[illegible]增[illegible]易簡[illegible]其議說[illegible]王氏何負於人哉余謂易簡方論後學指南四時治要議論似之自有人心權度存焉耳況王氏晚年[illegible]不一日月[illegible]何損於明[illegible]之所不予中

楊氏直指方論一卷終

[illegible]



# 證治提綱

## 得病有因

[illegible]

## 治病當先救急

[illegible]

## 治病如前用

[illegible]

[illegible]至於[illegible]況[illegible]至於[illegible]所[illegible]

一[illegible]血[illegible]用[illegible]法

經[illegible]用藥[illegible]有奇功

人有中年以上素[illegible]脹中時痛[illegible]或[illegible]雖[illegible]被[illegible]寒邪[illegible]之[illegible]有因風寒[illegible]俱作者[illegible]功但用[illegible]參二陳湯加[illegible]木香白豆蔻作劑入生薑[illegible]同煎[illegible]或酒[illegible]下[illegible]丸[illegible]連[illegible]服[illegible]止[illegible]自然[illegible]以[illegible]皮白豆蔻[illegible]調之若通小便則於內加[illegible]以之若通大便則於內加[illegible]以[illegible]丸[illegible]丸大小腑一通[illegible]之喜

論肝脾主病

經曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食蓋肝脈可以知風寒之出入脾脈可以驗飲食之[illegible]肝[illegible]也血脾[illegible]以其脈之虛實而[illegible]以其病之[illegible]而對治也[illegible]若

病人又脈洪大

此病在下部也當疏利而出之脈洪大主熱多是大小便不通或小腹結急臍下蓄血或腎氣攻刺發作有時或下焦停水外腎虛腫或風邪攻腎腳弱腫或腎臟風毒身下瘡痒[illegible]證[illegible]以對治之劑主之大[illegible]通利為[illegible]

水氣腎氣血氣風毒[illegible]治法

此等[illegible]候先以[illegible]解其寒邪通其衛氣然後[illegible]用[illegible]丹若加以川[illegible]及[illegible]木香圓以五苓散入[illegible]煎湯嚥下[illegible]敢亦可以疏利風毒使大便通快流行其痛已減然是二[illegible]加當歸川芎木香[illegible]之

治痢要訣

痢出於積滯積物積也[illegible]氣滯也物積欲出氣滯而不與之出所以下墜裏急乍起乍止日夜凡百餘度[illegible]家所謂其不[illegible]其

止[illegible]知物積氣滯[illegible]有如是之[illegible]人[illegible]見[illegible]上項[illegible]候[illegible]論也之亦白膿之大小[illegible]宜以通利行之物[illegible]川[illegible]氣[illegible]用[illegible]者[illegible]能收功其[illegible]以[illegible]能[illegible]熱毒[illegible]而後用[illegible]大腸之要藥有熱毒留[illegible]則能兼[illegible]熱毒留[illegible]則[illegible]則[illegible]以[illegible]進[illegible]則入[illegible]可[illegible]能[illegible]自[illegible]閘是知以[illegible]之人自[illegible]食[illegible]則[illegible]入於大腸然後[illegible]可止則止矣

簡捷治痢

治熱痢血痢及痢後大腸疼痛用[illegible]截碎研細[illegible]清汁[illegible]小[illegible]兼水相半[illegible]盞同煎早午食前服[illegible]以米飲[illegible]圓白梅[illegible]子代之又法[illegible]水各半煎服冷痢[illegible]水各半煎服仍兼[illegible]

為[illegible]最[illegible]痢

[illegible]茶治痢法

[illegible]能助陽[illegible]能助陰二者皆能消散又且調平陰陽況於[illegible]每[illegible]合每[illegible]能解[illegible]之也不問赤白冷熱通用之[illegible]切如豆許[illegible]用[illegible]水煎服[illegible]又[illegible]公作效

禁口痢

下痢禁口不食[illegible]門脾虛[illegible]亦[illegible]熱[illegible]閉隔心胸所致也俗用[illegible]則失之溫用[illegible]則失之閉性[illegible]加[illegible]木以消地[illegible]米[illegible]更熱調[illegible]或用人參[illegible]入[illegible]之留次一開[illegible]然思食

瘧痢[illegible]用常山[illegible]

[illegible]治瘧[illegible]治痢人皆[illegible]之因也然下痢日久[illegible]腸則[illegible]不[illegible]以[illegible]水作[illegible]當吐痰逐水又宜[illegible]之吐下於斷時也不[illegible]之劑[illegible]何[illegible]生[illegible]

但中間行事輔之耳、

治瘧要訣

凡瘧皆因腹中停蓄黃水惟水不行所以寒熱不歇此瘧家受病之處也治法暑瘧纔熱以香薷飲加青皮北大黃兩[illegible]同煎侵晨溫服欲瀉多寒以二陳湯加青皮良薑多用薑同煎侵晨吞神保丸五粒並欲取下毒水則去其病根寒熱自解

發瘧嘔吐勿用常山

有中年人臟腑久虛大便常滑忽得瘧疾嘔吐異常惟專用人參為能止嘔其他瘧劑並不可施遂以參苓二陳湯加人參縮砂而倍用白豆蔻進一二服病人自覺氣脈頓消於是寒熱不作蓋白豆蔻能消能磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平繼今遇有嘔吐發瘧之證或其人素嘔而發瘧謹勿用常山惟以[illegible]各研自然汁半盞入蜜二四匙[illegible]兩個同煎[illegible]一四粒俟其利下惡血痰水即以人參[illegible]調之薦一嘔不止而熱不退却用[illegible]小柴胡湯多加生薑主治其或嘔吐大作而又發熱者先與治瘧生熟飲[illegible]定之以小柴胡湯[illegible]之、

瘧有水有血

水即水飲也血即瘀血也惟水飲所以作寒熱惟瘀血所以增寒熱常山逐水利飲固也苟無行血藥品佐助其間何以收十全之效耶驗自今瘧家或衂血或唾血或大便血或月候適來適去皆見血證當以[illegible]作劑於內加[illegible]桃仁為佐入[illegible]同煎以主治之、

瘧發寒熱不歇有根

凡瘧當以脈為憑寒者溫之熱者涼之而治之或汗或下或吐或溫活人書之格法雖瘧當不能違矣然者見瘧之證久而不歇其故何耶有根在也根者何以飲曰水曰敗血是爾惟水飲為瘧之母惟敗血為暑熱之毒雖[illegible]水[illegible]寒熱[illegible]之脈緣水與敗之脈結聚狹水飲蓄之遂[illegible]者[illegible]之攻瘀者取血暑者[illegible]而踈利之寒熱不除者未之信、

常山治瘧須用大黃為佐

瘧家多蓄痰涎黃水常山為能吐之利之[illegible]有紲熱發[illegible]或[illegible]熱以[illegible]之纔投以常山大便點滴而下似泄不泄須用北大黃為佐大泄數行然後獲效或用巴豆肉[illegible]相伴而行所取泄也是又不然[illegible]於下積為飲濁泄熱[illegible]不可以無大黃也瘧方來與正發不可服藥服藥在於未發兩時之先否則藥病交爭轉為深害、

寒熱似瘧

此傷寒一證而實非瘧也其人肝胆多盛頭痛怯風大抵[illegible]柴胡湯加[illegible]已[illegible]嘔者多用[illegible]熱者多加[illegible]可也[illegible]寒熱之根非[illegible]不能除也[illegible]又當以[illegible]

[illegible]亦先解後攻之意、

吐汗下治瘧

治瘧[illegible]要不過吐汗下而已當下而下不盡腹中尚有餘滴以大便一泄之後不復再泄但時時滴滴而出須再下之大黃以佐常山可也當汗而汗不透或纔汗至胷而手足無汗者以周身一身而汗之青皮以佐[illegible]可也所謂吐者須出盡其水飲若作吐劑常山苦參[illegible]以泥於二者究竟為收效必矣、

瘧後調理

瘧之久為瘧大抵連綿有病後以後或飲食太多或[illegible]傷或[illegible]洗或風又再發者何以斷之[illegible]熱少者二陳湯加青皮良薑[illegible]實熱而[illegible]二陳湯加[illegible]若水何[illegible]以進劑[illegible]用巴豆肉[illegible]用[illegible]以泄毒氣其何[illegible]有或[illegible]過[illegible]可用[illegible]煎湯溫和解之[illegible]

退熱、

退熱用涼藥不可十分令盡或餘熱些小未去不可用以何然無事否則熱去則寒起古人戒之、一方多用四君子湯少用白术以陳米水煎病後和胃收斂浮陽最試得效

柴胡退熱不及黃芩

黃連解毒湯雖治熱疾世俗治熱例用[illegible]殊為[illegible]若黃芩一味則指為大寒不敢用之不思藥病不相當則病有[illegible]

今退熱而熱不去者須用黃芩、

退熱有法、

小兒熱自[illegible]用柴胡黃芩大黃解利之下後熱[illegible]而不退當用[illegible]作散或用[illegible]同前[illegible]熱入[illegible]心[illegible]為主之其效亦速當[illegible]川芎[illegible]血入血一掃其熱自退

小兒風瘡解熱湯二、

[illegible]大便秘結當以[illegible]利之小便赤澁心熱[illegible]當以導赤散[illegible]入心行之既利大腸矣小便[illegible]矣而風證作[illegible]常有[illegible]之狀何耶[illegible]熱未[illegible]未解也又[illegible]加[illegible]主之[illegible]亦可矣

瘀血發熱、

其人脉澁必有漱水之證必有[illegible]之證必有兩脚厥冷之證亦必有小腹結急之證或唾紅或鼻衄此皆瘀血作熱之明驗也用藥不止柴胡黃芩當以川芎白芷[illegible]等佐之大便秘結者於中更加大黃[illegible]血一通黑物流利則熱不復作、

在[illegible]小柴胡湯、

傷寒留[illegible]惡血内外俱熱[illegible]亦有目[illegible]狀似陽經受病相似如服小柴胡湯不效當以[illegible]分[illegible]半分對和入[illegible]煎與之男女通用凡大小產熱入血室[illegible]

以[illegible]力所不及者於内加[illegible]佐之[illegible]心主血[illegible]有用以涼血之劑所以收功若夫疎利血毒則活人書[illegible]湯[illegible]有餘力矣

腎熱用五苓散、

腎氣内虛邪熱流入於腎經比[illegible]大小便頻數所出澁少赤[illegible]而滴此不可以[illegible]行之[illegible]

[illegible]滲泄其熱[illegible]水[illegible]一通[illegible]

下後大腸熱膽[illegible]

諸[illegible]熱[illegible]通利大便然下後[illegible]頭熱[illegible]而[illegible]重者此更有熱[illegible]血[illegible]氣而[illegible]住下焦也[illegible]用[illegible]大[illegible]下之於[illegible]以炒[illegible]為佐多入[illegible]同前[illegible]門五片可也、

通利大便有法、

凡通利大便[illegible]大黃[illegible]等藥而大便不通者陰陽關隔水火不[illegible]降[illegible]熱者[illegible]同[illegible]湯下[illegible]煎湯下[illegible]飯後[illegible]即大便、

解者[illegible]所以有水穀之分脾氣強而腎氣不足故飲食下[illegible]為之發泄也治法[illegible]用[illegible]主之[illegible]腎之氣交通則水穀自然[illegible]化此所謂[illegible]者也

脾泄腎泄、

有脾泄有腎泄脾泄者[illegible]也[illegible]有[illegible]面色[illegible]黃腹肚[illegible]腎泄者[illegible]腰[illegible]冷[illegible]治脾泄[illegible]治腎泄用[illegible]

腎泄、

諸有泄瀉用[illegible]以去風邪以安脾胃

此上品藥也次則溫脾養胃之劑投之與病正法※用之而不作效抑且腹痛走上走下或臍間隱痛腰痠腳痠骨節軟弱面色黃悴人脉虛弱將安在哉曰此腎泄也當以炒[illegible]主以[illegible]爲主之仍用[illegible]爲佐俱或腎水下涸心火上炎燥渴多引飲無度此陰陽離絕也識者憂焉

大便脫泄白膿

大人小兒泄痢無已期後變作白膿點滴而下或於糞尾見之多以溫脾不愈法當溫腎蓋腎主骨髓白膿者骨髓之異名也要之始作白痢其氣腥臭門戶緊縛下而且淹延日久無所謂痢矣今之白膿全無腥臭而已微覺骨力衰弱的見腎虛合用炒[illegible]主之[illegible]是少[illegible]或[illegible]爲佐雖然又有婦人一證似痢非痢泄下白膿心腹緊痛叫不忍聞此當爲之通血投通血之劑却以[illegible]輔之

脫肛

脫肛一證氣聚不散也裏急而不得出外脹而不得入先以[illegible]作劑又以[illegible]燒灰存性細末摻傳或津唾調傳氣散則腫消矣仍用[illegible]調[illegible]如常入新水研散略煎吞[illegible]然此論肛門挾熱而腫脹也其或腸中虛寒不收則[illegible]主治[illegible]傳之[illegible]

小便不通

大凡水道不行其本在腎合用[illegible]其末在肺合用[illegible]二者得兼必然中病其間更以[illegible]佐之又能疏達雖然大便小便脉絡相貫也人有多日小便不通但用[illegible]大瀉數行小腸自利

石淋

沙淋嶽腑而易散石淋結塊而難消凡療石淋專以[illegible]空心食前吞[illegible]爲妙仍恐[illegible]不得其貫[illegible]得其料而常服之然[illegible]開通恐[illegible]大便滴泄石塊自小便出

轉胞

轉胞諸證孕婦多有之患在忍縮小便或喜食煎爆或飽後爲熱所迫遂使小腸之氣逆而不通大腸之氣與之俱滯外水不能入膀胱內水不能出膀胱淋瀝急數每欲發時痛不可言大便亦裏急頻併似痢非痢必以手從前陰按至臍下庶可立出小便否則逆上出而不禁是其因此腹脹浮腫治法用疏藥疏利小腸中熱仍與通泄大腸迫其腹中搗痛大便大下則淵胞豁然歸正於是小便頻數[illegible]見附婦人摘奇方

孕婦胎熱似痢

孕婦七八箇月傷於濕熱以致子煩胎氣迫近於上咽喉窒礙心腹脹滿下墜似痢每登廁時坐一炊久忽覺氣下方得大便一[illegible]俗率用痢藥不知病在胎熱子煩可[illegible]下[illegible]或用[illegible]各壹分[illegible]十之一分作兩劑[illegible]服俟其大便調導却以[illegible]若[illegible]非其治也

下[illegible]血

迎之[illegible]狂燥[illegible]汗多骨熱辰今此外證雖然細[illegible]以知其當在下焦曰臍下結急外熱內痛又脈洪而數也[illegible]利而後之

産婦血塊築痛

此候因産時提血未盡所致世俗收生多無踐拔提血不思生産之時已坐草近地久矣産罷臟腑虛空又且近地提血冷濕乘之邪入之便散瘀滯爲血塊是謂血母傷築硬痛[illegible]所能療也治法[illegible]加[illegible]同煎[illegible]入法醋[illegible]服冷濕風邪一散[illegible]自然散[illegible]從大小便而出凡新産須就牀上提血下[illegible]風

身[illegible]血[illegible]作[illegible]

骨節疼痛，非風則寒濕也。人有被刀銘之傷而又筋在其中，爲風寒水濕所傷，致使心腹攣痛於其經絡，壅閉血不流行，腸肉間即爲之刺痛，治法當用[illegible]川芎以[illegible]白芷[illegible]木香官桂利之，黑物小片而下，其痛自止。

身體胃腸濕熱腹痛拘急足冷。

此血之爲病也。以其飲酒嗜炙煿以致受毒之，惟熱毒善傷，酒毒爲能傷血，致血未去，新血不榮，身體所以腹痛拘急，其裏熱足冷者，血之證也。用[illegible]作劑，多入大黃以利之，俟其流利已盡，小腹略無結痛，即以[illegible]川芎當歸[illegible]等劑治之，調其氣血，於其有瘀血凝於心，不通，以消其心，寬以散瘀，通經絡之流行，可知矣。

血蓄。

人之一身，不離乎氣血，凡病經多日，疾治不痊，須當爲之調血。血之外證，或發[illegible]，[illegible]健忘，常[illegible]水，[illegible]口不開，男婦也少。血之一字，諸加意焉。用藥川芎、[illegible]桃仁、[illegible]大黃[illegible]爲要。惟甚者多加[illegible]以此先利其宿瘀，後用茯苓[illegible]川芎[illegible]調理之。

血崩。

書勝云：陰虛陽搏謂之崩。此即血得熱則宣流之意也。[illegible]可以助陰，[illegible]可以抑陽，其間更以茯苓[illegible]和之，使陰陽兩得其平，血自循於經絡矣。若夫衝任不固，下元久虛，以致血氣崩墜，則用膠艾湯加[illegible]下[illegible]妙。

吐血。

血隨氣行，氣逆而上奔，則血不循於經絡，而湧吐矣。人知吐血出於上焦有熱固也，然能用[illegible]等劑，而不能用[illegible]佐之，又不能用通利圓子以開其[illegible]，使其大便，則[illegible]何而下，瘀血何而下行，吾恐逆奔而上有不可得而止之者。若夫依前治法，血止而後又當以[illegible]川芎[illegible]爲之調理，虛則加木香，熱則加[illegible]，寒則加[illegible]丸在[illegible]。

治渴有法。

凡病人燕有燥渴之證，用[illegible]數種皆不作效，淡淡引飲過多而腳浮腫，此證不可以爲裏熱，蓋腎水不上升，心火不下降，故也。須用[illegible]爲主，却以[illegible]煎湯，熟之，腎水一升，心火一降，其渴自止，腳亦不復腫矣。

酒家有病，勿用溫藥。

有人飲酒過多，因酒作病，胃脘不快，其氣捫隔，服[illegible]竟無寸效，由是不喜飲食，使以[illegible]投之，致發大熱，日後只用[illegible]圓以就痊愈，乃知胃脘閉渴熱在上焦，使然耳。又有人酷好飲酒，復感寒邪，服不換金正氣散以致內熱，欲擬煩渴，且開汗出如雨，身體怯寒，繼後以小柴胡湯加[illegible]退熱，[illegible]覺中[illegible]調察，止汗頓然痊愈。然則酒家抱病，其可妄以溫藥嘗試一中乎。

傷寒筋惕肉瞤治法。

筋惕身瞤，發汗大過所致也。古人以真武湯主之，然[illegible]能止其汗，而不能安其瞤。瞤者，動也。汗出表虛，外風必入於腠理，人知風以動之，所以惕惕而自瞤，而不知汗多則傷血，血虛無以榮筋，筋愈急而四體百骸愈爲之瞤動，治不用驅風升發散，並性人參[illegible]川芎[illegible]作劑，以[illegible]爲佐，入[illegible]煎，自有神效。右藥專於生血，血生血乃所以收汗，其或大便秘澀，少加大黃以通之，血脈一和，不反掌而安矣。

婦產評證。

[illegible]江劉寶云：世寶所載方，產後評無產後中風角弓反張一證，按產後中風，[illegible]多[illegible]生[illegible]使經乳[illegible]之[illegible]

津液內竭，穢地太早，脫者不時，以致風邪乘虛入於足太陽之
經，其證發熱，頭項或時不熱，惡寒汗出，或口語不倫，斷齒牙關緊
急，十指微動如摸物之狀，加以項背強直，或啼或叫，甚時自汗，
腸滑不禁，身如反弓，甚須不二，如此十無一生。治人書謂太陽
發痙，是所危。產後初得發熱，常須審視，若覺[illegible]手指微動，
便以中風藥品急治之，用[illegible]附在[illegible]門[illegible]
[illegible]見附婦人方中，男女通用。

胃脘痛引背上頭面兩手浮腫

腎虛不能納氣歸元，氣逆而上奔，故胃脘滿痛，以手按之痛是
背上，又徹背膂，以則其氣循脇，故後分而痛，不休矣。此氣之
為病，固也。其何腎虛又不能行水，故水隨氣奔上，泛於肺頭面
兩手浮腫，氣短而喘，由是血化為水，與之俱[illegible]。凡其人陽衰有
寒，曰風，曰水，曰血，曰氣，四者合而為病，其痛非常，如[illegible]
[illegible]之類，不能施其巧治法，將何如？曰：先以[illegible]
[illegible]加[illegible]入[illegible]同煎[illegible]
[illegible]氏拾[illegible]粒，升降水火，引導大便，次用[illegible]
[illegible]大有作[illegible]
[illegible]取達大便黑物，可收全功。

肚皮痛

腎虛不能行水，加之酒麵無度，醉後輒睡，酒與水交聚於腹中，
而酒毒復留滯其氣，是以水參於肚皮而作痛矣。治法[illegible]
[illegible]不煎嚥下，[illegible]俟其大便流利，然後以[illegible]
壹分，[illegible]倍之，用[illegible]入少鹽，并生薑同煎，空心嚥下，脾
腎氣復，自然向安。

胃虛氣喘

有肺經伏熱而氣隔者，有積水在上而氣喘者，大腑以[illegible]
[illegible]為治，肉其肺熱者，如[illegible]佐之。心下水
氣者，[illegible]皆須活人書用[illegible]

諸風

新編仁齋直指方論卷之三

# 諸風

風論

風[illegible]於內者也，寒暑燥濕於外者也。人之一身
血氣[illegible]陰陽不守，飲食居處，嗜慾無節，[illegible]風則地濕且不加
於是經絡[illegible]，腠理開[illegible]，風邪乘其虛而入之，中風諸風，皆是
物耳。風之為病，善行數變，其中人也，卒其暴人也，罕數人之逝
[illegible]寒則[illegible]，熱則[illegible]，拘攣自[illegible]
之入人也，邪氣[illegible]，正氣引邪，[illegible]
[illegible]反張，在於陽則皮膚[illegible]緩，則四肢
不能收舉，則一身不能御，皆[illegible]邪氣所至，表裏淺深而有驗
也。[illegible]大要有四：血氣偏虛，半身不遂，肌肉枯瘦，骨間疼
[illegible]神智不亂，身體無痛，四肢不舉，一臂不隨，謂之風
[illegible]忽然迷仆，舌強不語，喉中窒塞，噫噫有聲，謂之風
[illegible]風寒濕三氣合而為痺，其人肉厚身頑，不知痛痒，風氣多
則走注，寒多則為痛，濕多則重著，在筋則筋屈而不伸，在脈則
血凝而不流，在肉則不仁，在骨則重而不舉，大率之謂痺風，一
[illegible]頭目眩，[illegible]惡風自汗，蓋風能散氣，故有汗也。風家
脈[illegible]在表[illegible]在裏[illegible]治法在上
[illegible]則[illegible]則發汗，在裏則下之，從其上而溺之[illegible]
[illegible]少吐之，俗謂熱則生風，大[illegible]然濕多有胃[illegible]虛
血[illegible]而生風者，若[illegible]天道[illegible]又不可
[illegible]治[illegible]以[illegible]先[illegible]
有[illegible]用[illegible]
[illegible]勿[illegible]入胃則[illegible]
[illegible]人治[illegible]然[illegible]主不主
氣須以[illegible]住既[illegible]闔氣一流行，則[illegible]

眼安至若口開手散遺尿眼合不開汗出不流吐沫氣
粗聲如鼾睡面赤面黑鼻青頭搖手足口角青冷口噤而肥人
骨高不治之證其餘前風種類余於此見端緒指環例論之

○諸風證治

心中風

心風膈間熱而語　唇赤其舌有汗生
白黑青黄唇上見　倚倚時時休而驚

心中風但得偃臥不能傾側發熱失音其舌焦赤汗流唇赤者可
治灸心俞若唇上白黑青黄乃心壞為水面目亭亭時時悚
動者並不治[心俞]二穴在第五椎骨下兩傍各一寸半○臍
俞在千金翼所載近六十七難注同取分寸法男左手女右
手以中指第一節為一寸

肝中風

肝家踞坐不低頭　左脇偏疼筋急攣
線目唇青為可療　目黄目白使人愁

肝中風踞坐不能低頭上視多怒左脇偏疼諸筋攣急口
嘔動其目青繞兩目連額微青面黄者可治灸肝俞若大青
青黑面目一黄一白者不治[肝俞]二穴在第九椎骨下兩傍
各一寸半

腎中風

腎中踞而腰背疼　面浮耳黑賊風生
脇無黄時能飲食　直髮兌齒口無顏

腎中風踞坐腰痛不得俯仰小腹面上浮腫其耳黑左右脇未
有黄點者可治灸腎俞若面…
此及齒不治[腎俞]二穴在第十四椎骨下兩傍各一寸半

肺中風

肺風喘促冒悶生　偃臥胸滿氣息憤
口燥之間頭眼白　多汗肺傷氣不清



肺中風但偃臥而胸滿短氣冒悶汗出視其鼻兩邊下行
鼻口色白者可治急灸肺俞若色黄者為肺傷為血
其鼻不收四肢拘急不治[肺俞]二穴在第三椎骨下兩傍各
一寸半

脾中風

脾中風乃汗如雨　腹滿身黄吐鹹酸
唇赤肢體節通黄　手足皆青病已難

脾中風踞坐而腹滿身通黄四肢放縱其唇黄身通黄吐鹹汁出
者可治急灸脾俞若手足青面目冷或口下青面不治[脾俞]二
穴在第十一椎骨下兩傍各一寸半

胃中風

胃病根原飲食來　撮肩喘息氣難開
口張額汗腹中滿　手診脈時脈大哉

胃中風但撮肩喘息塞不通張口喘息額上多汗孫真人所
謂飲食不下風在胃風見此證曰胃中風不要論所載亦
一說然胃為水穀之海五臟皆取氣於胃故並存之三因云
[胃俞]二穴在第十二椎骨下兩傍各一寸半

中風死證

中風氣粗細推求　口吐真涎髮直豎
眼合不開牙齒緊　面赤面黑手撒收
口開吐沫氣逆大　髮直搖頭汗不流
與喘喉聲兼鼾冷　遺尿吐血脈洪林

中風多是邪氣自汗心脈浮洪肝脈弦腎脈沉滑脾脈
脈所見肺脈浮澀以三部兼之或以本臟取之不
可一例論也醫者當明辨之

治中法

風…　南木香　苦木香
…脈…林檎…

甘草生　石菖蒲[illegible]

右件剉散分作二服水一盞半生薑七片煎取其半食前

調蘇合香圓三圓灌下痰盛者加全蝎二枚尖治一切卒中

不論中風中寒中暑中濕中氣及久厥氣厥之類初作皆可

用此先以皂角去皮弦[illegible]為末揭以管子

吹入鼻中俟其噴嚏即進前藥牙噤者中指[illegible]南星[illegible]末

并以烏梅肉揩牙自開

又法

南木香[illegible]　生南星七片　生薑七片　石菖蒲一寸

右㕮咀取薑汁煎調[illegible]木香末[illegible]蘇合香圓三圓灌之

小續命湯治中風諸風迷仆涎潮舌強語澀或昏冒或

或拘攣不論表裏虛實服之皆驗

麻黃去節　人參　防己　官桂

黃芩　杏仁去皮尖　白芍藥　芎藭

甘草[illegible]　防風[illegible]　附子[illegible]各一兩

右剉散每服三錢重薑五厚片棗一枚水一盞半煎一盞服

[illegible]加白附子[illegible]骨節煩痛有熱去附子[illegible]大便[illegible]加[illegible]

[illegible]加[illegible]大便[illegible]加[illegible]

[illegible]

[illegible]加[illegible]

排風湯治[illegible]風亦治風毒腳氣腫痛

白鮮皮　白朮　白芍藥　肉桂[illegible]

當歸　川芎　杏仁[illegible]　防風

甘草[illegible]　麻黃[illegible]　白茯苓各[illegible]二兩

獨活[illegible]每服一錢水一盞[illegible]煎一盞溫服

[illegible]治[illegible]風戰[illegible]拳[illegible]麻痺疼痛

[illegible]　黃芪　白朮　白芷



陳皮　甘草各一兩　麻黃去節

天台烏藥[illegible]　枳殼炒　人參　白薑[illegible]半兩

右為末每二錢薑棗煎服

[illegible]治同前亦主腳氣

烏藥去心　麻黃去節　陳皮[illegible]　川芎

枳殼炒　桔梗　白芷　白僵蠶炒去絲

甘草[illegible]　白薑[illegible]

右為末每二錢薑棗煎服

[illegible]治一切卒中不論中風中寒中暑中濕及痰厥飲厥氣

厥之類初作可用此

圓白南星[illegible]　南木香　半夏[illegible]

各[illegible]　辣細辛　蒼朮生　甘草生

細剉　石菖蒲各[illegible]

右剉分二服每服水一盞半薑七厚片煎取其半乘熱調蘇合

[illegible]加炙[illegible]貳枚先以[illegible]

右為末[illegible]吹入鼻中俟噴嚏即進藥牙噤者

揩牙自開

[illegible]治[illegible]中昏不省人事[illegible]口眼喎斜半身不遂但脈沉無

熱者可服

南星[illegible]　川烏生　附子[illegible]

南木香[illegible]

右㕮咀每服三錢水一盞半薑十厚片煎取半微溫服

[illegible]治如前

附子[illegible]　木香[illegible]

右㕮咀分兩服每用水一盞半薑十片煎取半微溫服[illegible]可用

[illegible]治如前

南星[illegible]　木香[illegible]

右剉分二服每用水[illegible]盞半薑十片煎六分溫服[illegible]人用此

大[illegible]治卒中諸風涎潮發厥語澀神昏
附子 南星生 川芎
防風
右剉散每三錢薑十片煎服氣不和加木香
[illegible] 南星 防風 甘草
右剉每服三錢薑十片煎服氣虛人加附子 [illegible] 加 [illegible]
[illegible] 頭痛而暈加白芷 痰多加 [illegible]
[illegible] 治諸風癱瘓拘攣強直或痛或麻或疼痛亦主之
草烏 川烏 没藥 乳香
黑豆 [illegible]
[illegible] 治諸風癱瘓卒暴半身不遂
右細末醋和豆為細圓梧桐子大每服三十圓温酒下
川烏頭 草烏頭 川芎
當歸 [illegible] 桂 川續斷 細辛
楠骨脂炒 烏蛇 [illegible] 虎骨
木鱉子 天麻 [illegible] 防風
酒乳香 没香 麻黃 羌活
獨活 [illegible] 白南星 [illegible] 薏苡仁
蒼朮 萆薢 杜仲
牛膝 虎脛骨 自然銅
白附子 川五靈脂 麝香 秦艽
全蝎
右細末 [illegible] 入拌和 [illegible]
研為圓彈子大每服壹圓温酒 [illegible] 湯下
淋酒下不拘時服 [illegible]
如未服藥前須以 [illegible]
大同 [illegible]



半為末糕糊圓櫻桃大每服拾圓老酒下先去其風根
[illegible]圓 治諸風癱瘓
川烏 川五靈脂 四兩
乳香 没藥
右乳香以乾竹葉包裹用熨斗火熨過即研成末餘藥末之
拌和再碾滴水為圓彈子大每壹圓薄荷酒嚼下
[illegible] 治一切風
川芎 防風 甘草
細辛 天麻
右末煉蜜和丸每兩作三十圓每服壹圓細嚼荊芥酒下傷
風鼻塞頭痛頭眩薑湯下
[illegible] 治白虎歷節風走注疼痛遍身癢如虫齧晝靜夜劇
川烏 全蝎 地龍 黑豆
麝香
右細末糯米糊圓豆大每服七圓甚者十圓夜卧令膈空温
酒下微出冷汗便瘥
[illegible] 治風寒濕合而為痺肢体麻痺不仁
羌活 防己 片子薑黃 白朮
海桐皮 當歸 白芍藥 甘草
右剉每服三錢薑十片煎服病在上食後病在下食前
[illegible] 吐法
右瓜蒂末壹錢熟水調下若風癱涎須以瓜蒂散吐痰
[illegible] 治風涎潮塞上膈氣閉不通
猪牙皂角 明晋礬
右細末輕者半錢重者三字溫水調下但少吐之切不可
吐用 [illegible] 一二十圓研細 [illegible] 煎湯調下仍與 [illegible]
[illegible] 不能言 [illegible] 氣

風

〔[illegible]風方〕

朱砂（一錢） 輕粉（一錢） 巴豆（[illegible]）

全蝎（[illegible]） 蟬殼（[illegible]）

右末之研和大人[illegible]用薄荷泡湯調下小兒分半用乳汁

調下或吐痰或泄毒物化[illegible]

烏龍丹 治諸風癱瘓口眼喎斜語言不正

真川烏（[illegible]） 好五靈脂（[illegible]）

右末入腦麝少許同研滴水爲小彈大陰乾每服一丸先以生薑汁

研開次好酒調下空心食前日兩服似鐵彈圓

[illegible] 治風痓昏迷吐沫抽掣背脊強直産後中痓通用

當歸 荊芥穗

右等分末之每服二錢水一盞酒少許煎七分灌下如牙緊用

鋼匙斡以雞羽蘸藥入口或用童尿調下或以[illegible]代[illegible]

一人

[illegible]

又方

黑豆（[illegible]）

右每酒[illegible]一盞[illegible]到二錢煎七分溫服又連進[illegible]

[illegible] 則[illegible]腹痛喘息[illegible]則牙緊頭[illegible]指

微動漸加項背強直轉側不仁甚者昏困失音目睛直視[illegible]

不禁身腰反張如此則十不救一新產血虛[illegible]

[illegible]危絕[illegible]手指微動[illegible]作風[illegible]

[illegible]

人爲邪氣所干[illegible]而[illegible]病若[illegible]若[illegible]若[illegible]若風

若寒若暑若濕若[illegible]各有受病之[illegible]用

藥之法必當其原而後可以觀病[illegible]所謂[illegible]不

知[illegible]一人[illegible]之[illegible]可以人[illegible]

[illegible]

寒

# 寒

中寒論

寒者天地殺厲之氣也人以腎爲根本惟腎則受寒惟寒則傷

腎[illegible]一陰寒邪交作[illegible]拘急或[illegible]強直昏迷厥冷口噤失

音此中寒也[illegible]汗[illegible]寒[illegible]面[illegible]拘急手足[illegible]寒出[illegible]

也[illegible]霍亂[illegible]洞泄下[illegible]乾嘔吐逆[illegible]此寒邪入腸胃也

以至[illegible]嘔[illegible]爲[illegible]爲[illegible]爲[illegible]爲遺精爲[illegible]

[illegible]寒亦[illegible]之人惟[illegible]不[illegible]特[illegible]之謂

寒或[illegible]天[illegible]月[illegible]取[illegible]使寒邪之[illegible]

[illegible]經絡自經絡而入[illegible]如前[illegible]以[illegible]四出[illegible]溫

[illegible]寒[illegible]之[illegible]此[illegible]霍亂中

物[illegible]知溫[illegible]不知溫[illegible]必有十全之功是

則[illegible]又溫血之[illegible]不然古人何以[illegible]寒[illegible]云

中寒證治

不換金正氣散 治[illegible]寒邪

蒼朮（炒） 橘紅 半夏（麴） 厚朴（製）

藿香葉 甘草（炙）

右剉散每服三錢薑五片棗二枚煎服

養胃湯 治外感寒邪內傷生冷

蒼朮（炒） 厚朴（製） 半夏（麴） 人參

茯苓 草果 藿香 橘紅

甘草（炙）

右剉每服三錢加[illegible]薑七片烏梅半個煎服

[illegible] 治中[illegible]寒

乾薑 良薑（[illegible]） 肉桂 木香

半夏 甘草（[illegible]）

右剉散每服三錢薑五片棗一個煎服

附子理中湯 治中寒中濕嘔逆虛弱

人參　白朮　乾薑炮　熟附子各一兩

甘草半兩炙

右㕮咀每三錢薑五片食前煎服少血加當歸

沉附湯 治虛寒無陽胃弱乾嘔

熟附子　乾薑炮各半兩　沉香　白朮各一分

甘草炙一錢

右剉每三錢薑五片煎食前服

薑附湯 治中寒厥冷強直失音口噤吐沫或陰盛發燥

熟附子　乾薑炮各等分

右㕮咀每服一錢水半盞煎半空心溫和服亦治洞泄嘔吐

附子回陽湯 治傷寒陰證唇青面黑身背強痛四肢厥冷及諸虛沉寒

熟附子三分　官桂　當歸　白朮各二分

乾薑炮　半夏麯各一分

右㕮咀每服三錢薑五片棗一枚食前煎服

[illegible]一方治沉寒痼冷方見血證類

人參敗毒散 治傷寒身熱頭疼亦主瘴疫

人參　白朮　白芷　乾葛

桔梗　青皮各三分　甘草炙二兩　乾薑炮[illegible]

右為末每服二錢[illegible]煎服

[illegible] 治傷寒熱證通用

人參　赤茯苓　川芎　桔梗

羌活　獨活　前胡　柴胡

枳殼炒　甘草炙[illegible]

右剉散每服三錢薑五片煎服人參羌活散用藥亦同

[illegible]治法 活人[illegible]備述其詳

暑



中暑論

人有冒暑傷暑故此百般病其果何緣哉蓋暑之入人伏於三焦腸胃之間□有積暑或累月而不可測識者如嘔吐如中滿如泄瀉如下利如渴如□□如瘧如腹痛如下血以至諸□等證皆因暑得之其根未除雖百藥□□□□則以入人心胞絡與胃口相應胃氣□□或因飢□□暑氣自口鼻而入凝之於牙暑□之於心胞絡如□□□□暑以□□□口而勿□可也若□暑□□□□□咽喉不□□□□而吐之傷暑脈□而均自汗身熱背寒□悶大渴□□小氣□□□□□或頭疼或霍亂或四肢厥冷但身□□□□云熱則清毛孔開故□然□□□□□不精安□□□□□□□□人不□□然而暑家何以脈虛者□能消氣□消則血散脈虛得而不虛其或□脈沉伏冷汗自出悶絕□皆不知人此則中暑□假又加重耳治之大要雖貴於□暑尤貴於和中二者並行則其間雖□不□而自愈若□□若下若用□差今古人處□□□□冒伏陰在內□□□□□□□□□或飲水過多或冷□無度傷動其中嘔吐不食自利不渴此則□熱□寒無疑手□□□□□□□□□□□不可也又有冷痹渴□□□□水□□□而□或身熱煩□□則陽浮於外而不內□□□□□□□不可也抑猶有□□□暑家脈虛面□□汗□□□□是白□□明□其□□□□□以□□□之□□不□黃則發斑□□□□□□□□□□可畏哉

中暑證治

五物香薷湯 [illegible]和中通用

香薷□兩　白扁豆炒　厚朴[illegible]　白茯苓各[illegible]

甘草炙[illegible]

右剉每服[illegible]錢水[illegible]溫服

縮脾飲 解伏熱和中除煩止渴

縮砂仁二兩　草果仁　烏梅肉　香薷

甘草 白扁豆 白朮

右剉每服一錢薑五片水煎微溫服

香薷[illegible]

香薷 厚朴 茯苓 陳皮

甘草 [illegible]

右剉細每服二錢半鹽一捻水煎服

五苓散 治傷暑煩渴引飲過多小便赤澁心下水氣 [illegible]

小柴胡湯 治傷暑外熱內渴 [illegible] 於內更加生薑為妙

竹葉石膏湯 治伏暑內外熱熾煩躁大渴

石膏 半夏 [illegible] 麥門冬

人參 甘草

右麄末每服二錢薑五片青竹葉七片粳米百粒水煎服

六和湯 治冒暑伏熱嘔吐不甚渴

人參 半夏 杏仁 甘草

縮砂 [illegible] 茯苓 藿香 宣木瓜

扁豆 厚朴 香薷

右剉每服三錢薑五片煎服內傷生冷通用

[illegible] 治傷暑傷寒及內傷生冷

半夏 橘紅 茯苓 甘草

右㕮咀每服三錢薑七片小烏梅煎服 [illegible] 更添七錢

[illegible] 治 [illegible] 暑伏熱 [illegible] 頭痛中暑

半夏 [illegible] 茯苓 甘草

右末之以醋 [illegible] 薑汁 [illegible] 糊丸桐子大每服十丸 [illegible]

水下暑藥皆可下

[illegible] 治 [illegible]

透明硫黃 硝石

元精石 五靈脂



陳橘皮 青橘皮

右為細末次入元精末及硫黃硝石末和勻以

好醋打糊圓豌豆大每服五十圓空心米飲下或五苓散下

或水研亦得

[illegible] 治中暑 [illegible] 分利陰陽

透明硫黃 硝石 白礬 雄黃

滑石 [illegible] 飛 [illegible] 白麵四兩

右為細末入麵和滴水圓梧桐子大每服十五圓至二三十

圓新汲水下 [illegible] 加 [illegible] 以五苓散 [illegible]

[illegible] 大抵性溫

道途中暑昏仆即扶起以手巾蘸熱湯熨其臍腹即漸甦醒

次以來復丹為末井水調下無藥則以大蒜細研新水調灌

之仍以 [illegible] 少許置鼻中 [illegible] 中暑最忌得冷 [illegible] 來復丹 [illegible]

以水調下者何蓋其藥性溫因寒而用也

# 濕

## 中濕論

天氣下降地氣上騰二氣薰蒸此即濕也豈必水流濕而後為濕哉且風之撼動人知其為風寒之嚴凝人知其為寒暑之炎熱人知其為暑惟濕之入人行住坐臥實薰染於冥冥之中人居其間受濕最多況夫濕能傷脾脾土一虧百病根源發軔於此矣滯而為喘嗽漬而為嘔吐滲而為泄瀉溢而為浮腫濕熱則發黃濕 [illegible] 則 [illegible] 濕入關節則一身盡痛濕 [illegible] 則昏不知人至於為身熱為鼻塞為直視為鄭聲為虛汗為 [illegible] 腹中脹脾 [illegible] 大便 [illegible] 自利 [illegible] 上則發痓熱而 [illegible] 下則 [illegible] 小便 [illegible] 小便為 [illegible]

[illegible]

則用茯苓防己輩自有奇功人能暴之寒暑勞動至沉滯則謂之
餘論肌汗浹體則時也須以朮附桂枝作大劑與之療則相接
病當滲濕不可以其滲而責效要之治濕當先補脾木附海任
滲濕諸方

除濕湯 治氣虛傷濕身重腰痠四肢微冷或嘔逆或溏泄
並主之

蒼朮炒 白朮 甘草炙各二兩 乾薑炮
茯苓各一兩 橘紅 辣桂 厚朴製各半兩

右剉每服三錢薑棗煎服

茯苓白朮湯 治受濕身体痛重

茯苓 乾薑炮 甘草炙 白朮
辣桂 蒼朮炒各等分

右剉每二錢水煎服

腎著湯 治腎虛受濕小便自利腰冷而痛重

乾薑炮 茯苓各二兩 甘草炙 白朮各二兩

右剉每二錢半水煎服加桂亦得

滲濕湯 治傷濕鼻塞身痛

芎藭 辣桂各半兩 甘草炙一兩 白芍藥半兩

右麄散每服二三錢薑四片棗一枚煎食前服

五積散 治濕客經絡腰腳痛重加茯苓半錢 方見

大陷胷 治宜消飲 方見 可用 正氣散 送下

生附除濕湯 治寒濕交攻身體冷痛

附子生 蒼朮各一兩 白朮 厚朴製 宣木瓜 甘草炙各半兩

右剉每服四錢水一盞薑十片煎一盞食前微溫服

甘草附子湯 治風濕相搏汗出短氣身体腫痛惡風不欲去衣

辣桂二兩 白朮 附子炮 甘草炙各二兩

右剉散每服二錢半水一盞半薑七片棗一枚煎一盞食前微
溫服小便不利或氣加茯苓腫加防己腹痛加芍藥

生附湯 治中濕小便不利大便自利

附子生去皮臍 辣桂各半兩 白朮 甘草炙各一兩

右剉每服三錢薑七片煎食前微溫服汗出加防己氣加茯苓

朮附湯 治濕大小便皆自利

白朮二兩 甘草炙一兩 附子炮半兩

右剉細每服三錢薑七片水一盞半煎一盞食前微溫服

五苓散 治濕證小便不利經云治濕之法不利小便非其治也

茵陳湯 治濕熱發黃小便秘澀渴引水漿

茵陳蒿一兩 大黃半兩 小紅梔子十枚

右剉每服三錢水煎服五苓散亦治發黃一藥大抵煎丸穩

濕病身痛五苓散加蒼朮煎熟隨意

新編仁齋直指方論卷之三

新刊仁齋直指方論卷之四

# 風緩 附 歷節風 腳氣

風緩方論

風緩者風邪深入而手足為之緩弛也夫人四肢百骸[illegible]肇意遇熱則弛緩病在陽經氣行遲而關以緩病在陰經氣行疾而關以收此物理之常然也然脾主肌肉四肢胃為水穀海所以流布水穀之氣周養一身脾胃既虛肢體失其所養於是風邪襲虛由腠理而入肌肉由肌肉而入脾胃安得不為之緩廢乎若曰驅風之劑與助胃之劑不同亦顛吾活法用之何如耳抑余聞人之一身筋骨為壯肝主筋腎主骨肝腎氣虛風邪襲之亦有肢體緩弱之證然則先散其風而後益之於此尤當加意

風緩證治

排風湯 方見風類 加[illegible]以此散風毒邪氣

[illegible] 用井湯泡生薑汁調開吞[illegible]貳拾圓日貳服治手足風緩或[illegible]夾用食前服 [illegible]

不換金正氣散 方見[illegible]類 加[illegible]煎食前吞[illegible]治脾胃俱虛風入四體筋骨緩弱不仁仍早辰常服炒黑豆淋酒

大聖一粒金丹 治中風昏仆舌強涎潮癱瘓偏枯頑痺麻痺[illegible]搐倒地閉目作聲項強反張口噤直視

大川烏 炮 大附子 炮去皮臍 新羅白附子 各貳兩
川五靈脂 白僵蠶 炒去絲嘴 白蒺藜 炒去刺 各壹兩
白礬 枯 朱砂 沒藥 麝香 各半兩別研

右細末合和用松煙墨半兩新汲水磨汁搜圓每兩作陸圓金箔貳伯片為衣令自乾每服壹圓以生薑半兩取自然汁磨開溫酒半盞調服盡取微汗為效



[illegible] 治中風癱緩口眼喎斜筋骨攣疼行履艱難
自然銅 燒紅醋淬 虎脛骨 酥炙 當歸 [illegible] 木
白附子 炮 川烏 炮去皮臍 五靈脂 [illegible] 麻黃 去節
沒藥 乳香 全蝎 焙 安息香 [illegible]
白芷 直僵蠶 炒去絲 烏蛇肉 酒浸焙乾
木鱉 去殼 [illegible] 朱砂 麝香 各壹分

右為末以酒煮[illegible]入飛白麪為糊圓彈子大每壹圓溫酒嚼下

[illegible] 治肝腎氣虛風入筋骨手足緩弱
小附子 去皮 生草烏頭 炮去皮臍 蒼朮 炒
牛膝 酒浸焙 川芎 當歸 天麻 各半兩
防巳 白芷 黃耆 蜜炙 全蝎 焙 [illegible]分

右末每壹錢黑豆淋酒調下兼用核桃肉研酒下食前服

[illegible] 治風寒濕毒與血氣搏筋骨緩弱四肢酸疼痒痺
宣木瓜 去瓤 天麻 [illegible] 牛膝 [illegible]
茯苓 [illegible] 熟附子 虎骨 酥炙 各壹兩

右為末用浸藥酒調麪糊圓梧子大每服叁肆拾圓食前溫酒或豆淋酒下

[illegible]方 加[illegible]叁分[illegible]各半兩[illegible]名大[illegible]

[illegible] 用[illegible]煎湯下亦治腳氣

[illegible] 治諸風緩弱及歷節風骨節酸疼
虎脛骨 酥炙

右搥碎如米每骨壹升以酒參升浸伍日空心服壹盞冷則暖之

[illegible] 治諸風緩弛其他用藥風類求之詳

# 歷節風

歷節風論

歷節風之狀短氣自汗頭眩欲吐手指攣曲身體魁瘰其腫如脫漸至摧落其痛如掣不能屈伸盖由飲酒當風汗出入水或體虛腠理[illegible]護不謹以致風寒濕之邪徧歷關節與血氣搏而有斯疾也其痛如掣者為寒多其腫如脫者為濕多肢節間黄汗出者為風多遍身走疰徹骨疼痛晝靜夜劇發如虫嚙者謂之白虎歷節治法當以温藥解其風寒濕之毒或用和淡則可

[illegible]藥可也其白虎歷節遊走疼痛[illegible]主肌肉虛則為所傷或因進飲食[illegible]而虫亦[illegible]其間不至於損[illegible]也書曰若藥不瞑眩厥疾弗瘳似此證候一名歷風須當大作湯圓不可拘以平常淺近之劑

歷節風證治

**虎骨散** 治白虎歷節走疰痒痛不得屈伸

虎脛骨[illegible]　白花蛇[illegible]　天麻　自然銅[illegible]

防風　白附子[illegible]　檳榔　官桂

當歸　羌活　牛膝　白芷

川芎　僵蚕[illegible]　全蝎[illegible]　地龍去土

乳香　没藥　雄黄各半兩　麝香壹分

右末每服貳錢食前以煖豆淋酒調下

**[illegible]圓** 治歷節風骨節疼痛肢體[illegible]

安息香　五靈脂　天麻各壹兩　地龍[illegible]

白殭蚕[illegible]　全蝎[illegible]　雄黄各半兩　麝香[illegible]

烏蛇[illegible]　天雄[illegible]　當歸　川烏[illegible]

川芎　南星[illegible]　官桂　虎脛骨[illegible]

川獨活貳兩

右末煉蜜杵圓梧子大每服拾伍圓食前温酒下

**[illegible]** 治歷節走注骨節疼痛

獨活　萆薢[illegible]　川芎　當歸各叁分

桃仁去皮尖　天麻　辣桂　牛膝



麻黄去節　枳殼[illegible]　海桐皮　白芍藥

川烏[illegible]　松節　防風　杜仲[illegible]

甘草[illegible]　麝香壹分　虎脛骨[illegible]

右麤末每服貳錢水壹盞生薑伍片煎[illegible]食前服

**[illegible]** 治歷節風亦治脚氣方見脚氣門

**[illegible]** 治白虎歷節遊走疼痛狀如虫嚙方見風門

**[illegible]** 治歷節諸風百節疼痛方見風門

**[illegible]** 治[illegible]風頭面肢體[illegible]

透明雄黄[illegible]

右每服叁錢乳鉢內研細入醇酒再研空心飲其清者滓又研細入酒飲之連日如是流黄能殺惡虫自大便下

**[illegible]方** 治手指攣曲臂節間痛甚

葶藶子[illegible]　黄連[illegible]

右用新水貳升[illegible]

[illegible]以[illegible]水吞[illegible]日[illegible]不妨以[illegible]

**[illegible]** 治大風癩疾

川大黄[illegible]　獨生皂角刺壹兩半

右末每服貳錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄虫如虫口黑色乃是多年虫口赤色是為方近三數日又進壹服直候無虫則絕根也[illegible]

**[illegible]圓** 治風癬[illegible]合而為瘅遍身或[illegible]麻木不仁[illegible]

方見[illegible]門用[illegible]湯下空心服[illegible]

**[illegible]方**

雖[illegible]指[illegible]遍[illegible]

[illegible]者下飯用[illegible]

**[illegible]圓** 治白虎風[illegible]節[illegible]痛[illegible]如虫[illegible]

[illegible]剉方見[illegible]

# 脚氣

脚氣方論

腎司於下一身之根本繫焉脚者腎之外候也夫人所以戕所伐者不自覺腎氣內虛真元不守[illegible]冷久坐卑濕涉冒溺水受濕猶感受也氣於其身之中不為脚氣者幾矣脚氣為病雖起於足實周乎身或壯熱頭痛或身體冷疼或百節拘攣或十指走注或轉筋急痛或小腹不仁以至胸滿喘息煩悶亂恍惚憒羞明語言錯謬腹痛下利或嘔噦食飲或見食即吐大便小便多是秘澀自腿至膝自脛及踝或赤或腫酸疼或緩縱不收或腫或不腫皆其候也其自汗惡風者[illegible]寒下熱傳與六經外證與傷寒頗類但卒然脚痛為異耳治法究其所自來挾風者發汗挾寒者溫之挾暑者[illegible]大泄熱煩挾濕者腫滿重墜則內氣積有則推其多者解之新病疏藥固在權衡然古人以此名為壅疾謂其感於風毒所致則忽之之法大要疏導大便使毒氣得泄而後乃以補不可遏焉[illegible]脉洪者可補之大戒也雖然脚氣治法以疏導為先為其盡泄乎氣實而死矣然表裏之有異證亦猶之有異證或因他病而後發或致他病之續生又不可以不通其變所謂寒則溫之熱則寒之在表則散在裏則下大虛氣之挾其中焦食經毒發之溫利其又胃中之治法矣其或[illegible]入腹衝心攻注作痛喘滿上氣嘔吐異常此則漸入腎經或者自貽[illegible]

脚氣證治

**二十四味流氣飲** 治脚氣通用

當歸酒浸焙 川芎 [illegible] 羌活

杜仲薑製炒 石南葉 薏苡仁 大腹檳榔

萆薢 細辛 枳殼各壹兩 蒼术炒 五加皮



防風 獨活 續斷洗焙 牛膝酒浸焙

威靈仙 海桐皮 木香 木瓜

麻黃去節 川五靈脂 沒藥別研 乳香別研

右細末酒浸蒸餅為圓梧子大每服伍拾圓細嚼[illegible]茶或食前荊芥湯下或[illegible]木瓜煎湯下

**木瓜散** 脚氣通用

大腹 紫蘇 羌活 木香

茯苓 陳皮 甘草炙各半兩 宣木瓜乾壹兩

右細末每服貳錢[illegible]煎服

**[illegible]** 脚氣通用

半夏製 紫蘇子 [illegible]各 當歸 厚朴製

甘草炙 北前胡 肉桂 陳皮各壹兩

右剉散每服貳錢薑伍片棗兩枚煎服如無蘇子以蘇葉貳兩代之

**[illegible]** 治風毒脚氣腫痛

橘葉 杉木節[illegible]

右童子小便[illegible]酒半盞[illegible]煎[illegible]食前服[illegible]湯通用 方見[illegible]

**生木瓜圓** 脚氣通用

宣州生木瓜[illegible]

右入[illegible]末和圓梧子大日乾每服柒拾圓食前酒下

**[illegible]湯** 治脚氣嘔逆吐瀉轉筋

宣木瓜壹味細剉每服肆錢新水煎服神効

**[illegible]** 治脚氣攻注手足不能舉

雞心大檳榔

右末每服貳錢用[illegible]片煎湯乘熱調下治脚氣衝心痛[illegible]用童尿煎服[illegible]脚心痛溫酒調下

海桐皮散 治風毒脚氣腿肚疼痛
海桐皮　五加皮　川獨活　枳殼製
防風　杜仲薑製炒　牛膝酒浸　薏苡仁炒各壹
生地黃拾兩
右末用絹袋以醇酒壹斗春浸七日秋浸拾肆日每日空心
溫服壹盞[illegible]
[illegible] 治脚氣攻心痛悶脹滿不食
青皮　陳皮　天台烏藥　雞心檳榔
宣木瓜　乾杉木節　半夏製　枳殼製
縮砂仁　赤茯苓各半　丁香　茴香炒
大腹皮　紫蘇子炒　蘿蔔子炒　桔梗
甘草各等分
右剉每服叁錢薑伍片煎
[illegible]加大黃[illegible] 方見水腫門 [illegible] 方見腹痛門
[illegible] 方見喘門 [illegible] 方見 脚氣通用
枳殼散 治脚導毒氣
枳殼 　甘草壹兩半
右末每服貳錢濃煎木瓜湯調下如要快利更加大黃
[illegible] 治脚氣大便秘澀
麻仁別研　杏仁去皮尖　枳殼製
厚朴製　芍藥各半兩　大黃壹兩蒸切焙
右末煉蜜圓梧桐子大每服拾圓食後熱水下或[illegible]加大
[illegible] 通用
[illegible] 治脚氣風熱壅閉大便不通
木香　大黃　升麻各分
右剉每服[illegible]水煎服
[illegible] 治脚氣熱毒疏泄風毒
羌活　雞心檳榔　防風　[illegible]各半兩



郁李仁　大黃各[illegible]
右剉散每服叁錢[illegible]大便秘再加大黃
[illegible] 方見風類 治脚氣熱[illegible]則加[illegible]無汗惡寒
則加[illegible]又治風濕脚氣發熱腫加[illegible]
利為度
[illegible] 治脚氣胃熱煩渴嘔吐 方見積熱門 加[illegible]
[illegible] 方見血類 加[illegible]治未諸脚氣
[illegible] 治脚氣入腹攻心喘悶
南木香　甘草炙　青木香　吳茱萸
宣木瓜　陳橘皮　紫蘇　雞心檳榔各壹兩
右剉散每服叁錢薑五片烏梅壹枚煎服
[illegible] 方見[illegible] 香蘇[illegible] 方見[illegible] 治脚氣衝心築痛嘔吐
川[illegible] 通用 方見腹痛門
[illegible] 治脚氣[illegible]
大王[illegible]
右研貳味為圓梧桐子大每肆拾圓溫酒下 扶老用[illegible]
湯下
[illegible] 治脚氣風多證
麻黃[illegible]　爛石膏　白朮壹兩　熟附子
甘草[illegible] 右剉散每服叁錢薑伍片棗壹枚煎服
[illegible] 治脚氣寒多證加[illegible]治脚氣風多證
[illegible] 方見[illegible] 加[illegible] 治[illegible]脚氣
[illegible]加[illegible]治風濕脚氣[illegible]者宜可服最除風毒
[illegible] 治風毒脚腫生瘡[illegible]
石南葉　薏苡仁　[illegible]　牽牛炒
大腹子[illegible]　川[illegible]　[illegible]

赤小豆　陳皮　當歸　麻黃[illegible]

五加皮　牛膝各去蘆一兩　宣木瓜　獨活

萆薢一　杜仲薑汁炒各半兩

右細末以酒浸蒸餅研糊圓如梧子大每服五拾圓酒[illegible]

[illegible]加[illegible]方見濕門[illegible]治脚氣[illegible]多發

[illegible]治風濕脚氣緩弱痺痛上攻肩背

石南葉　南星炮　石斛酒浸焙　牛膝酒浸焙

羌活　薏苡仁炒　防風　萆薢

黃耆蜜炙　天麻　當歸酒浸焙　續斷各七錢半

檳榔貳兩半　宣木瓜焙　加蒼术炒　川芎各壹兩半

右末酒麪糊圓桐子大每伍拾圓食前橘皮煎湯下

[illegible]

羌活　麻黃[illegible]　熟附子　生乾薑

川芎　牛膝　白芍藥　白茯苓

黃耆蜜炙　人參　杜仲薑汁炒[illegible]

辣桂　當歸　白术　木香[illegible]

右麄末每服叁錢水盞半薑伍片棗貳枚同煎食前[illegible]仙圓

[illegible]圓

蒼术[illegible]　香附子[illegible]　威靈仙貳兩　草烏頭[illegible]

陳皮伍兩半　狗脊去毛壹兩　没藥壹兩別研

右末酒麪糊圓桐子大每服貳拾圓用[illegible]下治腎受

風冷脚膝酸疼及久病發動風冷入於腸胃以致兩脚[illegible]

成跛挫風而瘸又不止用此兩藥俱效

不老地仙丹　治腎臟風毒攻注脚膝腫痛

當歸　牛膝　茯苓各[illegible]　虎骨[illegible]

真川椒去目出汗　川萆薢[illegible]　蒺藜[illegible]　川芎各壹兩

白附子[illegible]　黃耆[illegible]　[illegible]

羌活　獨活　杜仲[illegible]



防風　赤小豆　地龍去土　茴香炒

木鱉子去殼　白附[illegible]　乳香[illegible]

右細末酒麪糊圓桐子大每服拾[illegible]圓[illegible]木瓜湯下

[illegible]圓　治風寒[illegible]

烏頭[illegible]　虎骨[illegible]　石斛[illegible]　黃松節[illegible]

巴戟去心　蓯蓉[illegible]　防風

獨活　續斷　五加皮　薏苡仁

當歸　木香　川芎各[illegible]　乳香[illegible]　生乾薑[illegible]

右末酒麪糊圓桐子大每伍拾圓[illegible]湯下

[illegible]圓　治脚氣走注兩足軟上腰腿疼痛不能轉側

宣木瓜[illegible]　川烏[illegible]　黃耆　蒺藜[illegible]

當歸　防風　萆薢　牛膝

天台烏藥[illegible]　赤小豆　茴香[illegible]

地龍去土　老[illegible]　川五靈脂[illegible]

右細末酒麪糊圓桐子大[illegible]數肆拾圓[illegible]下

四[illegible]圓　治脚氣緩弱喘咳及腎虛衰受風寒濕痺[illegible]

[illegible]加[illegible]下[illegible]

[illegible]脚氣[illegible]痛用[illegible]湯調下

[illegible]治[illegible]溫而利之[illegible]用以[illegible]

[illegible]煎湯下

[illegible]加[illegible]治脚氣[illegible]多[illegible]

[illegible]

脚痛緩弱[illegible]在風濕風[illegible]以[illegible]加[illegible]主之溫

[illegible]以[illegible]加[illegible]主之一匕[illegible]易事也

若夫腎虛爲病脚弱而痛[illegible]

最良以[illegible]

緩弱人多服[illegible]

[illegible]則無[illegible]

新刊仁齋直指方論卷之五

# 諸氣

## 諸氣方論

人以氣為主，一息不運則機緘窮，一毫不續則穹壤判。陰陽之所以升降者，氣也；血脈之所以流行者，亦氣也；榮衛之所以運轉者，氣也；五臟六腑之所以相養相生者，亦此氣也。盛則盈，衰則虛，順則平，逆則病。氣也者，獨非人身之根本乎？人有七情，病生七氣。七氣者，寒、熱、怒、恚、喜、憂、愁，或以為喜、怒、憂、思、悲、恐、驚，皆通也。然則均調是氣，將何先焉？曰：氣結則生痰，痰盛則氣愈結，故調氣必先豁痰，如七氣湯以半夏主治，而官桂佐之，蓋良法也。況夫冷則生氣，調氣雖用豁痰，亦不可無溫中之劑，其間用桂，又所以溫其中也。不然，七氣相干，痰涎凝結，如絮如膜，甚如梅核，窒礙於咽喉之間，咯不出，嚥不下，或中滿艱食，或上氣喘急，曰氣隔，曰氣滯，曰氣秘，曰氣中，以至五積六聚，疝癖癥瘕，心腹塊痛，發即欲絕，殆無往而不至矣。人亦有生冷[illegible]風冷入胃，或血海虛冷，則生氣[illegible]

[illegible]大[illegible]痰[illegible]不食，水氣腫脹，面目俱浮[illegible]

[illegible]上氣[illegible]喘[illegible]

[illegible]七氣[illegible]

五[illegible]嘔吐，思食不能下[illegible]不和，中[illegible]

以[illegible]從[illegible]

[illegible]腹[illegible]

[illegible]或少[illegible]

[illegible]加[illegible]



○氣秘者，氣不升降，谷道難，大便不通[illegible]

而或[illegible]

多因[illegible]不[illegible]成[illegible]，狀如中風，卧倒[illegible]

與[illegible]此為氣中，不得誤用[illegible]

[illegible]用[illegible]

[illegible]即以[illegible]以和其中，使氣[illegible]

[illegible]又有[illegible]五積[illegible]五臟之[illegible]

六腑[illegible]水[illegible]血[illegible]

[illegible]

[illegible]用[illegible]又[illegible]

[illegible]和用之。○人有血氣心知之性，而無哀樂喜怒之常[illegible]

[illegible]人[illegible]七[illegible]事[illegible]行，一身[illegible]

[illegible]不入食，入食則吐[illegible]或一塊[illegible]

而痛，或一塊如[illegible]心下，而疼或腹中[illegible]攻刺

[illegible]時發，閉於四肢之力，腳不能行，小便[illegible]

日就[illegible]全以虛[illegible]然而[illegible]不入，[illegible]

是[illegible]所[illegible]得[illegible]病者，此也，用[illegible]

[illegible]

以[illegible]之，服之[illegible]安平[illegible]以[illegible]

無由[illegible]一[illegible]加[illegible]以下[illegible]

[illegible]可也。若夫七情所發[illegible]

[illegible]多有[illegible]

[illegible]

### 諸氣證治

七氣湯 治七氣所傷，痰涎結聚，心腹刺痛，不能飲食。

半夏五兩 人參 辣桂去粗皮，各一兩 甘草炙，半兩

右剉散，每服三錢，水大盞，薑五片，棗[illegible]，煎七分，食前服。

和劑分心氣飲 方見脾胃門

沉香降氣湯 治陰陽交滯心腹脹滿留飲停痰積冷諸證

沉香一兩 縮砂仁二兩四 甘草炙二兩半 香附炒斤

右末每服壹錢鹽壹點沸湯點

大沉香圓 治一切冷氣攻心腹刺痛胸膈噎塞婦人血氣刺痛並宜服之 方見心氣門

三因七氣湯 治證如前有熱者可用此

半夏五兩 伏苓四兩 厚朴三兩製 紫蘇葉二兩

右㕮咀散每服肆錢水盞半薑柒片棗貳枚煎除分不時服

局方七氣湯 方見痰氣門

指迷七氣湯 方見積氣門 治證同前加官桂木香煎服

和劑分心氣飲 調榮衛利三焦行痞滯消腫脹

橘紅 青皮 紫蘇葉 厚朴製

香附炒淨 甘草炙各四兩 木通二兩 大腹皮

丁皮 檳榔 辣桂 木香

草果仁 蓬朮煨 香附子 麥門冬

人參 白朮 木瓜 赤伏苓

石菖蒲 白芷 半夏製 枳殼製各一兩

右㕮咀散每服叁錢薑肆片棗貳枚煎服 餘見水腫門

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼

青皮 陳皮 桔梗 蓬莪朮

辣桂 藿香 益智仁各一兩 香附一兩半

甘草炙三分 加半夏製三分

右㕮咀散每服叁錢水壹盞薑肆片棗壹枚煎除分不時服

小木香湯 治冷證腫脹泄瀉

良薑 乾薑炮 茴香炒 縮砂仁

辣桂 橘紅 厚朴製 甘草炙

蒼朮炒 丁皮 桔梗各等分



右末每服貳錢半水盞半薑三片食前服

三和湯 和暢三焦治痞脹浮腫

大腹皮炒 紫蘇莖葉 沉香 宣木瓜切焙

羌活各壹兩 白朮 川芎 木香

甘草炒 陳橘皮去白 檳榔各三分半

右細末每服貳錢煎服加流氣飲可以和氣利水

五皮散 治皮膚水氣

大腹皮炒 桑白皮炒 伏苓皮 生薑皮

陳橘皮各等分

右件末每服叁錢煎服

分氣紫蘇飲 治腹脅疼痛氣促喘急

五味子去梗 桔梗生 伏苓 大腹皮

陳橘皮 草果仁 桑白皮炙 甘草炙各三斤

右件㕮咀為粗末秤貳拾斤淨入揀嫩枝葉乾紫蘇拾伍斤捣碎同一處拌勻每服肆錢水壹大盞薑叁片入鹽少許同煎至柒分去滓空心食前服常服和胃進食

蘇子降氣湯 治心腹脹滿喘促氣急

蘇子炒 半夏 甘草炙 前胡去苗

陳皮去白 厚朴 桂 川當歸

右為㕮咀每服貳錢水壹大盞生薑叁片煎至柒分去滓溫服不拘時常服消痰飲散滯氣進飲食

蘇合香圓 治疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等疾 方見脾胃門

□□□湯 治□□

五加皮 枳殼 柴胡

骨碎補 地骨皮 桔梗

桑白皮 陳皮 前胡 甘草炒

半夏（[illegible]） 草果（[illegible]）
右為麄散和勻以攪拌就飯甑上蒸一伏時傾出攤令冷收之每服貳錢紫蘇伍葉薑叁片水壹盞同煎柒分食後溫口服痰嗽加半夏麴煎心胸虛加人參茯苓煎上膈熱加北黃芩煎下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸煎

五膈寬中散 治七氣留滯飲食不下致脹氣脹通用
白豆蔻仁 丁香 木香 縮砂仁
甘草（炙） 青皮 陳皮（[illegible]） 川厚朴（薑汁炙[illegible]）
香附（各肆兩）
右麄末每服壹錢薑叁片鹽壹點煎服

三棱丸 治丈夫脾積氣滯胃膈滿悶酒積不食婦人脾血積氣諸般血癥氣塊（方見[illegible]門）

[illegible] 治腹脇脹滿痞悶噎塞噫氣吞酸一切氣痞腹中刺痛
蓬莪茂（煨） 益智仁 甘草（炙） 京三棱（[illegible]）
青皮（去白） 陳皮（[illegible]） 石蓮肉（壹兩） 厚朴（[illegible]）
右為細末每服貳錢水壹盞薑叁片棗壹枚鹽少許煎柒分通口服不計時或鹽湯點或鹽酒調皆可服

[illegible] 治氣滯不勻[illegible]食不消
白豆蔻（[illegible]） 丁香 檀香（[illegible]） 木香（[illegible]）
藿香葉 甘草（[illegible]） 縮砂仁（[illegible]）
右為細末每服壹錢入鹽壹字沸湯點服不計時或用薑棗略煎服

[illegible]圓
木香 胡椒（[illegible]） 巴豆（[illegible]） 乾蝎（[illegible]）
右件湯釋蒸餅圓如麻子大朱砂為衣每服伍粒心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下肚痛癥者白礬蛤粉各叁分黃丹壹分同研為散煎桑根白皮糯



米飲調叁錢下小腸氣川楝皮糯米飲下胃氣腸下滴炒茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末壹錢下氣嗽木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下諸氣惟膀胱氣脇下痛最難治獨此藥輒能去之有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不瘥乃流入背膂久之又注右脇攣痛甚苦乃合服之一投而瘥後嘗再發又一投瘥

[illegible]圓 利大腑去積氣
舶上茴香（[illegible]） 附子（[illegible]） 枳殼（[illegible]） 川楝子（去核）
檳榔 山藥（[illegible]） 硇砂（半兩） 京三棱
蓬莪朮（[illegible]） 豬胰（[illegible]）
右為末入胰內同醋麪糊為圓如梧桐子大每服拾圓至拾伍圓生薑湯下婦人淡醋湯下不拘時候更量虛實加減常服順氣寬中消積化痰飲

[illegible] 去水逆腫
澤瀉（[illegible]） 豬苓（去皮） 赤茯苓（[illegible]） 白朮（[illegible]）
桂（[illegible]）
右為細末每服貳錢熱湯調下不拘時又治痰熱在裏身發黃加濃煎茵陳蒿湯下食前服之霍亂吐瀉及中暑引飲亦可用水調服小兒加白朮末少許如發虛熱加[illegible]人參末少許

[illegible]山人降氣湯 治氣不升降痰實喘滿
紫蘇子（[illegible]） 前胡（[illegible]） 厚朴（[illegible]） 半夏麴（[illegible]）
甘草（炙） 橘皮（去白） 五加皮（[illegible]） 當歸（[illegible]）
桂心（不見火） 黃芪（[illegible]） 人參（[illegible]） 附子（[illegible]）
桔梗（炒） 羌活 乾薑（[illegible]）
右麄末每服叁錢水壹盞半紫蘇叁葉薑叁片棗子壹枚同煎柒分去滓食後服

[illegible]圓 治氣滯不散兼治腰痛

破故紙（炒） 胡桃（去皮） 蒜 杜仲（炒）

右為細末蒜膏為圓每服叁拾圓空心温酒下婦人淡醋湯下常服壯筋骨活血脉烏髭鬚益顔色

[illegible]圓 治積冷傷胃腹脇脹痛

麻仁圓 順三焦潤五臟治大便秘塞不通年高人尤宜服之

白檳榔 羌活 木香 肉桂

兎絲子 山茱萸 車前子

枳殼 防風 山藥 麻仁（別研）

大黄 郁李仁

右為細末入別研藥勻煉蜜和圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓温水吞下臨卧服

撞氣阿魏圓 治五種噎疾九般心痛痃癖氣塊冷氣攻刺

茴香 陳橘皮 青橘皮 川芎

丁香皮（炒） 蓬莪朮 甘草 縮砂仁

肉桂 白芷 生薑

胡椒 阿魏

右為末用阿魏糊和圓如雞頭大每藥圓壹斤用朱砂貳錢為衣丈夫氣痛炒薑鹽湯下壹粒至貳粒婦人血氣醋湯下常服壹粒爛嚼茶酒任下

三稜煎圓 治中脘氣痞心腹堅脹胸中痞塞喘滿短氣大便不調或泄或秘

京三稜 青橘皮

杏仁 蘿蔔子 乾漆 神麴（炒）

麥蘗 硇砂

右為末以三稜膏攪和圓如梧桐子大每服拾伍圓至貳拾圓晶米飲下食後服

[illegible]圓 養脾温胃去冷消痰大治心腹疼痛寬胸下氣一切冷物所傷

諸氣

良薑 乾薑

右件等分為細末麵糊為圓如梧桐子大每服拾伍至貳拾圓食後橘皮湯下孕婦不宜服

[illegible]散 治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附（炒） 半夏（製） 橘紅 甘草

右剉散每服叁錢薑伍片棗貳枚煎服

[illegible]散 治諸氣痞結滿悶

枳殼 桔梗 甘草

右剉散每服肆錢水盞半薑伍片煎至中盞温服

[illegible]散 治心中卒痛腹脇氣滯

辣桂 川白薑 蓬莪朮

右末每服壹錢温酒調下

[illegible]散 治五膈五噎痞滿嘔吐心腹刺痛脇肋脹拒

沉香 荊三稜 蓬莪朮 白豆蔻仁

蓽澄茄 縮砂仁 草果仁 益智仁

川白薑 丁香 人參 丁皮

木香 白茯苓 香附 藿香葉

半夏麴 青皮 陳皮 甘草

右麄末每服叁錢水盞半薑伍片棗貳枚煎至中盞食前服

[illegible]湯 治冷氣腹痛

良薑 辣桂 半夏 木香

當歸 厚朴 甘草

右麄散每服叁錢薑肆片水大盞煎從分食前服

[illegible]湯 治七氣所傷滯於胸膈鬱於咽喉脹痛於心下噫氣吞酸不能飲食

白豆蔻仁 縮砂 蓽澄茄 丁香

木香 甘草 青皮 陳皮

辣桂 厚朴 香附

右末每服貳錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎柒分不時服

**如神丸**治積聚塊痛五般痞癖等疾

沉香　木香　大丁香　蓽澄茄

史君子　辣桂　川白薑炒　桃仁炒

五靈脂炒　硇砂醋洗　雄黃　沒藥

大戟　牽牛炒取末　巴豆各去油各一分　荊三稜

蓬莪术　肉豆蔻煨各半兩

右末研細水煮麵糊圓麻子大每服貳圓加至叁圓上溫酒送下

**[illegible]**治積氣塊痛久年脾積癖瘕之疾

木香　丁香　淡豉　硇砂醋煮半日

朱砂研細各一分　巴豆去油一分半

右末陳米飯為圓桐子大輕者壹圓重者貳圓臨睡先嚼煨薑如指許嚥下次以冷熟水吞藥不得嚼或上項丙圓子請酌量用

**[illegible]**治停宿積聚脹滿諸般痛疝膀胱氣脇下痛皆治此藥主之

茴香一兩　木香　胡椒各一兩　全蝎去毒微炒

巴豆去皮膜油

右為末湯泡蒸餅搜圓麻子大朱砂衣每服叁圓常服熟水下心腹痛研煨薑泡湯下血痛炒薑醋泡湯下腎氣臍痛茴香酒下大便秘蜜湯下

**阿魏丸**治酒積氣攻刺及或受風寒暑濕初證通用片酒食所傷中脘妨痛噫吐吞酸悉療之

陳橘皮先淨新汲水煎服亦效

**[illegible]**治飲食傷冷心下結押狀如伏梁又攻左脇

車螯殼　蛤蜊殼各煅　乾薑生

官桂　甘草各一分

右為末每服貳錢臨臥時濃煎湯調服車螯蛤蜊殼治塊

**分心氣飲**治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯通利大小便

紫蘇莖葉二兩半　夏麯　枳殼炒各一　青皮去白

陳橘紅　大腹皮　桑白皮炒　木通去節

赤伏苓　南木香　檳榔　蓬莪术煨

麥門冬去心　桔梗　辣桂　香附

藿香各一兩　甘草炙一兩二分

右剉散每服叁錢水大盞薑叁片棗貳枚燈心拾莖煎柒分不時服野人痃癖經年壓塵腹脹食不知飽以此藥吞**白丸**

**[illegible]**見脾胃門初則小便數次後則大便尺通其病頓愈

新刊仁齋直指方卷之五

新刊仁齋直指方論卷之六

# 心氣 附脾胃

心疼方論

紫之奪朱相去一間耳而虛實寒熱似實難辨焉夫心為五官之主百骸之所以聽命者也心之正經果為風冷邪氣所干果為氣血痰水所犯則其痛掣背脹脅胸煩咽乾兩目赤黃手足俱青至節朝發而暮殂矣然心之包絡與胃口相應往往脾痛連心或陽虛陰厥亦令心下急痛或他臟之邪亦有客乘於心者是則心之別脈受焉如所謂九種心痛一蟲二疰三風四悸五食六飲七冷八熱九去來者皆是也其心果痛不知能飲食乎然則治療之法將何如曰熱者涼之寒者溫之感受風邪者散之順氣調血逐水豁痰此其要略耳然而內翰有方曰[illegible]凡心脾疼痛隨試輒效也如[illegible][illegible]等藥亦可的對藥也[illegible]

心疼證治

**失笑散** 治心脾氣血諸痛 方見血類

**和劑七氣湯** 治七氣相干心下疼痛 方見氣類

**沉香降氣湯** 治陰陽不和心腹刺痛 方見氣類 加此[illegible]為佐

**大沉香圓** 治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香 乾薑炮 薑黃炒 辣桂 檀香各二兩 白豆蔻仁一兩 白芷 甘草炙 甘松洗焙 天台烏藥各半斤 香附淨炒

右末煉蜜圓如大彈子每服一圓食前生薑湯嚼下或薑棗[illegible]煎服

**蘇合香圓** 治卒心痛 方見[illegible] 用生薑橘皮湯調下

**桂枝四七湯** 治風冷寒邪搏心腹作痛

桂枝 白芍藥 半夏各一兩 白茯苓



厚朴製 枳殼製 甘草炙各半兩 人參 紫蘇各一分

右剉每服三錢薑七片棗二枚食前煎服

**[illegible]** 治心下痛

桂枝 延胡索炒 五靈脂 當歸等分

右為末每服二錢水一盞酒少許同煎食前服

**[illegible]** 治心腹卒痛

川五靈脂去砂石略炒

右為末每二錢溫酒調下加[illegible]尤妙

**[illegible]** 治熱氣乘心作痛

石菖蒲一兩 北前胡 赤茯苓各三分

右為末蜜同生地黃汁和丸[illegible]研為膏每服彈子大紫蘇煎湯食後調下

**[illegible]** 治冷氣乘心作痛

好[illegible]炒三分 川五靈脂二分 [illegible] 同研細 母丁香一十個為末 好[illegible] 乳香一錢 [illegible]

右研極細和勻醋圓麻子大每服二十圓食前石菖蒲生薑煎湯下或用**蘇合香圓** 方見[illegible] 或用**[illegible]** 方見[illegible] 須審其脉證虛冷乃可用脾家冷氣亦可揀用

**[illegible]** 治心腹刺痛

良薑 辣桂等分

右為末每服二錢米湯乘熱調下

**[illegible]** 治中脘氣滯心下引痛

辣桂各兩 生薑一兩 枳殼[illegible]二分

右雜末每服三錢新水煎服

**[illegible]圓** 治九種心痛

五靈脂 木香 當歸 蓬莪术各半兩

生乾薑二分

右為末煉蜜圓梧子大每服二十圓食前橘皮煎湯下

[illegible]方

草果 延胡索 靈脂 沒藥

右末酒調下貳錢腹痛手拈知

# 脾胃

## 脾疼方論

氣血痰水皆能作痛而食積傷脾風冷入脾與夫脾間虫動其為痛也居多氣血痰水食積風冷諸證之痛每停聚而不散惟虫痛則乍作乍止來去無定又有嘔吐清沫之為可驗焉俗謂脾家疼痛出於胃脘大率用醫脾之劑而不知受病各有自來苟不能推究其原則和養等劑徒挾邪氣非徒無益而又害之也夫風冷入脾尤念慮之所不到至有經歲月而不可治療者有一田夫醉飽之餘露卧取快一夜天明自此脾疼攻刺百藥罔功淹滯數載後遇至人授以和劑抽刀散溫酒調下數服頓愈則知風露之根入胃良薑菖蒲為能散其邪巴豆得[illegible]為能伐其根觀此可以通一畢萬矣然而痛不復作養脾之劑獨不可繼是調理之乎辨痢如[illegible]不必先去其積滯而後可以加[illegible]劑[illegible]也諸皆是以為前

## 脾疼證治

[illegible] 治脾疼妙甚

良薑 [illegible]

右只用良薑為末每服壹錢重溫米飲調空心服

和劑抽刀散 治脾胃積冷中滿疼痛

川白薑 [illegible] 良薑 [illegible] 石菖蒲伍兩半 糯米[illegible]一分

右為末每服貳錢空心溫酒調下

[illegible] 治脾疼氣膈

木香 丁香 檀香 大香附



天台烏藥 蒼朮 辣桂 片薑黃

生白薑 白豆蔻仁 縮砂仁 甘草炙各等分

右剉每服貳錢半紫蘇葉煎服

[illegible] 治脾積氣痛

香附子炒去毛 蓬朮 良薑 甘草炙各一兩

桂花一兩

右末每貳錢鹽少點沸湯熱調食前服

[illegible]方

香附 良薑等分

右為末每服貳錢空心陳米湯熱調服

[illegible] 治氣血攻刺脾疼 方見心疼類

[illegible] 治痰水攻脾作痛 方見氣門 [illegible]煎亦得 方見脹滿門

[illegible] 方見水飲門 [illegible] 方見[illegible]門 等分用沉香降氣[illegible]下 方見諸氣門 治食積脾痛

[illegible] 治風冷入脾逆氣上攻作痛

辣桂去粗皮

右細剉每貳錢食前煎服或為末紫蘇煎湯乘熱調下 腹痛通用

[illegible] 治風冷入脾作痛 方見心疼類 [illegible] 治心腹痛 方見氣類

[illegible] 治虫動脾痛乍去乍來嘔吐清沫

雞心大檳榔 貫衆各二分 石菖蒲

木香各一分 甘草炙一分

右剉每服貳錢水煎空心吞[illegible]拾圓或食後服[illegible]靈砂金液

有[illegible]能殺虫也

金液丹 壯陽道進胃氣除冷[illegible]

好硫黃 [illegible]

右藥壹兩用蒸餅壹兩湯浸握去水為圓桐子大每服伍拾圓空心米飲下

一物湯 治脾痛

雞心大檳榔　良薑等分

右細剉每服叁錢陳米百粒煎服

□□甘草湯 治脾中冷痛嘔吐不食

川白薑 炮　甘草 炙 減半

右剉散每服貳錢大棗壹枚同煎食前溫服

□□方 治脾痛脹滿

大草果二箇去殼

右剉用酒煎痛時服酒能飲壹盞以兩盞煎壹盞能飲兩盞以叁盞煎兩盞欲其中節也

□□□□方

良薑　陳皮 各半兩　丁香　石菖蒲

甘草 炙 一分

右剉散每服叁錢水大盞煎捌分入□□□□貳錢再煎少頃濾清汁服

□□湯 方見嘔吐門 和胃證治 加□□□□ 溫脾止痛

□□□□散 治脾胃虛寒腹中脹痛

人參　沉香 各一分　丁香　檀香

木香　白豆蔻　縮砂仁　半夏麴

辣桂　烏藥 各半兩　藿香葉 三分　甘草 炙 一分半

右細剉每服叁錢薑伍片棗貳枚煎服

□□□ 開胃和中止嘔進食

人參　白朮　木香　檳榔

丁香　半夏麴　肉豆蔻 麵裹煨　橘紅

藿香　白伏苓　青皮　甘草 炙 等分



右剉散每服叁錢薑肆片煎服

人參開胃湯 助胃進食

人參　橘紅　丁香　木香

藿香　神麴 炒　麥蘗 炒　白朮

伏苓　縮砂仁　蓮子肉　厚朴 製

半夏麴　甘草 炙 各等分

右剉散每服叁錢薑肆片煎服

□□□ 治嘔吐不食

人參　白朮　白伏苓　橘紅

縮砂仁 各一分　木香　丁香　肉豆蔻 麵裹煨

草果仁 各半分　白豆蔻仁 各半

右末煉蜜圓彈子大每服壹圓薑叁片煎湯下

□方七香圓 消食快膈和胃止痛

木香　丁香　檀香　甘松 淨

丁皮　橘紅　縮砂仁　白豆蔻仁

三稜 煨　蓬朮 各煨　大香附 炒去毛

右為末研米糊圓如綠豆大每服叁肆拾圓薑湯下

丁香半夏圓 治脾胃宿冷嘔吐痰水噫酸吞酸

人參　丁香　木香　肉豆蔻

陳橘紅 各一分　藿香葉 半兩　半夏

右細末薑汁煮麵糊圓如小豆大每服貳拾圓薑湯下

千金五套圓 治胃虛膈滿宿滯不消停飲

亦治風冷痰癖之氣

南星　半夏

良薑　乾薑 炮　白朮　伏苓 各一兩

丁香　木香　青皮　橘紅 各半兩

右末用神麴壹兩大麥蘗貳兩同末為糊圓梧桐子大每伍柒拾圓米湯下

六君子湯

新刊仁齋直指方論卷之七

# 痰涎 附 水飲 嘔吐

## 痰涎方論

惟氣與血能生諸病痰亦如之夫痰者津液之異名人之所恃以潤養肢體者也血氣和平關絡條暢則痰散而無氣脈閉塞脘竅凝滯則痰聚而有痰之所以發動者豈無自而然哉風搏寒凝暑煩濕滯以至詭譎熱飲食生冷煎煿腥鹹動風發氣等輩皆能致痰也其為喘為嗽為嘔為泄為眩暈為嘈煩為風癇為狂迷為忪悸或吞酸或短氣或痞隔或腫脹或寒熱或疼痛痰實主之人知痛生於氣血孰知痰涎流注亦能缺痛而為痛手如頸項臂膊胸背腰脅以手攣不可轉以一[illegible]

[illegible]

從權取吐或者津液不守所以痰多甚者則[illegible]療痰之法理氣為上和胃次之若風若寒若濕若熱如前數者亦當推尋所受之因[illegible]涎者脾之液也[illegible]自散故治痰多用半夏蓋半夏能利痰故也

痰涎證治

**二陳湯** 治痰滯停飲

半夏湯洗 茯苓 陳皮各壹兩 細辛

青皮 桔梗 枳殼 甘草

人參 旋覆花

右剉散每服三錢薑五片煎服

**前胡半夏湯** 治痰盛

北前胡 半夏制 茯苓各叁分 陳皮

木香 紫蘇 枳殼 甘草各貳分

右剉散每服叁錢薑伍片烏梅少許煎服

**人參湯** 治痰亦治熱

人參 桔梗 半夏麯 五味子

細辛 枳殼制 赤茯苓 甘草

右剉散每服叁錢薑伍片煎服痰嗽加[illegible]添甘草

**星香湯** 治痰去風

圓白南星 老生薑

右各切片以水二盞煎取其半分兩溫服

**二生湯** 治風痰

南星 半夏

右用生薑壹斤搗取自然汁浸藥[illegible]焙乾為末每[illegible]二錢以生薑甘草少許煎湯調下或用[illegible]糊小圓薑湯下[illegible]入嗽加白芷少許[illegible]

**大半夏湯** 治痰飲

半夏制 茯苓 生薑

右剉散每服叁錢水貳盞小盞溫服如熱痰加甘草少許胃不和去甘草加陳皮

**小半夏圓** 消下痰涎

圓白半夏 老生薑

右為末生薑汁為糊圓梧子大每叁拾圓薑湯下

**破痰圓** 治痰盛

南星 半夏

白附子 川烏

全蠍 直僵蠶 細辛

右為末[illegible]糊圓梧子大每[illegible]叁拾圓薑湯下

**[illegible]圓** 治痰嗽

[illegible]以蒼木[illegible]

[illegible]麻[illegible]各等分

右等為細末，[illegible]丸如梧桐子大，日乾，每服五十圓，空心溫湯下

[illegible]化痰丸

辰砂 白礬 半夏 南星

右為末，薑汁調麵糊圓如梧桐子大，別用朱砂為衣，每服拾圓，薑湯下，小兒風痰壹貳圓

[illegible]一圓 溫脾胃，消痰

良薑 乾薑 青皮 陳皮

大半夏 南星 半兩

右為末，薑汁麵糊圓如梧桐子大，每服叁拾圓，薑湯下

[illegible]丸 治腎虛氣不歸元，痰涎上壅，亦治寒痰，每服貳拾圓，用[illegible]送下

二陳湯 [illegible] 治痰飲 一錢 留心留伊胃痛狀

加減

二陳湯 加[illegible] 少許 治酒[illegible]

[illegible]熱主痰咳 脹腫痛

[illegible]方 [illegible]通用

白礬 [illegible] 號丹

右以鉛王[illegible]大孔先入[illegible]，以白[illegible]蓋，須用炭[illegible]斤，煆至火盡，[illegible]出，火毒研細，煮[illegible]麵糊圓如梧子大，每服拾伍圓，沸湯[illegible]下，諸[illegible]不通，[illegible]出，以叁拾圓研末入[illegible]少許，用白飲[illegible]，取[illegible]，頃見吐痰立愈，凡[illegible]

[illegible]喘者與[illegible]圓

# 水飲

水飲方論



水之與飲，同出而異名也。人惟脾土有虧，故平日所飲水漿不能傳化，或停於心下，或聚於脇間，或注於經絡，或溢於膀胱，往往因此而致病矣。觀謂面[illegible]能生諸病而水飲之不能為患乎？惟水與飲，漉漉有聲，為喘為咳，為嘔為泄，為眩暈，為怔忪，為寒熱，為堅痛，為浮腫，為多唾，為短氣，為體重，為胸膈痞滿，為骨痛，冷痺則曰氣分，經脈不行，四肢紅腫則曰血分，此等類皆水氣之所由作也。治之者可不究其所受之源乎？然則[illegible]之法，將何先？曰：能以表裏虛實訂之，斯得矣。表有水者，其身熱[illegible]喘，怔忪，乾嘔，[illegible]汗之；而裏有水者，其身浮腫，咳嗽，痞滿，引脇痛，[illegible]下之；而實者，脈實，心腹痛而當以[illegible]。虛者，脈虛，心腹滿而硬，當以[illegible]許以行之。[illegible]以導之，常水氣心下怔忪，[illegible]用可也。然而[illegible]或[illegible]於心下，傳[illegible]於膈間，結[illegible]為能生寒熱，所以[illegible]多用[illegible]。蓋水在上焦則吐之，不在於上焦則[illegible]不能[illegible]而下其水也。若夫水腫證候，亦此種類，詳見于後，請參考而互證焉。

水飲證治

[illegible]湯 治水利飲通用

川芎 半夏 伏苓 青皮

陳皮 枳殼 白木 甘草

右剉散，每服[illegible]伍厚片，煎服[illegible]加去節[illegible]，嗽加炒[illegible]，嘔加[illegible]能逐水也；喘加[illegible]；脹滿加[illegible]，[illegible]膈加[illegible]，怔忪加白伏苓；寒熱腹痛下，其[illegible]重者，其[illegible]以類推

[illegible]

[illegible] 治諸水氣

半夏 湯洗壹兩　　茯苓 叁兩

右剉散每服叁錢水貳盞半煎壹盞去滓用生薑貳錢半研取汁入藥煎沸溫服

**五苓散** 流行水飲 方見傷暑門 每貳錢沸湯調下小便更不利加防己佐之

**桂术湯** 治氣分前證

辣桂 叁兩　白术　麻黄 去節　細辛 去苗

甘草 炙 　枳殼 製　乾薑 各壹兩半

右剉散每服叁錢煎服

**桂苓湯** 治血分前證

辣桂　赤茯苓　當歸　川芎

赤芍藥　蓬莪术　京三稜　檳榔

蒼术 炒　桑白皮 炒　大腹皮　瞿麥穗

青皮　陳皮　甘草 炒

大黄 各壹分

右剉散每服叁錢薑伍片煎服

**平肺湯** 肺與腎俱以至陰積水腎虛喘咳水乘之

葶藶 隔紙炒　桑白皮 炒　枳殼 製

紫蘇莖葉　半夏 製　麻黄 去節　甘草 炙

右剉散每叁錢薑伍片煎服治腎水用青木香圓

**小青龍湯** 治表不解有水氣發熱乾嘔咳喘或渴或微利

麻黄 去節　細辛　芍藥

甘草 炙　辣桂　五味子　乾薑 炮

右剉每服叁錢水壹盞半煎壹盞溫服

**十棗湯** 治表解裏有水身涼汗出乾嘔短氣咳微利心下痞滿引脇硬痛

芫花 炒　大戟　甘遂 各等分

右件爲細末合和入乳缽研以肥棗拾枚煎湯用水



壹盞半煎棗取汁調服強者服壹錢重弱者服半錢重平旦溫服利用棗湯下通利即以糜粥自養未利明日再服

半錢 證見叠用

**腎氣圓** 治腎氣不足膀胱虛冷

川烏 炮　辣桂 各壹兩　茯苓　白术

石斛　白茯苓 去皮　巴戟

桃仁 去皮尖　萆薢　山藥　破故紙 各半兩

右末煉蜜圓如桐子每伍拾圓鹽湯空心服

**青木香圓** 行滯通水

青木香 壹兩　蓽澄茄　補骨脂　檳榔

牽牛 炒取頭末

右爲末滴水圓菉豆大每貳拾圓熟水下

**三和散** 治水氣

**三和湯** 和暢三焦治痞脹浮腫

**順氣圓**

茯苓　乾薑　白术　枳實

右末煉蜜圓桐子大每伍拾圓米飲下

**倍术圓**

白术　辣桂　乾薑

右爲末煉蜜圓桐子大每服貳拾圓米飲下此二藥可以溫中消水

# 嘔吐

嘔吐方論

嘔吐出於胃氣之不和人所共知也然有胃寒有胃熱有痰水有宿食有膿血有氣攻又有所謂風邪入胃凡是數者可不究其所自來哉寒而嘔吐則喜熱惡寒四肢淒清法當以刺溫之熱而嘔吐則喜冷惡熱煩躁口乾法當以溫凉解之痰水

者宜和中桔梗湯先治標後治本又消痰去水調治飲食看有腹脹滿
能消吞酸與之消食去積脾胃虛弱氣食鬱悶心胃痛血之類
鬱所謂嘔家有癰膿不須治嘔膿盡自愈七情內鬱嘔隔不
平此氣攻之證經所謂諸嘔吐則嘔吐者其風邪入胃
人參不宜單用參朮助之挾寒邪於此以陽利下貫或取陽
食嘔嘔水不下嘔藥不納此則胃虛之甚者也宜之不足其
何以挾寒治某錄然且陽明之經胃之絡膈以陽明之氣下行
則氣反逆而上行諸不可泄瀉也然嘔吐者每大便秘結上
下相通氣不流行者惠所以嘔逆而利瀉之他如汗後水藥不
入口者為嘔而脈弱小便複利身微熱而手足厥者虛寒之極
此難治者也醫鑑

嘔吐諸治

新法和中湯 治寒證嘔吐 方見寒門

二陳湯 治寒證嘔吐

良薑 吐方見 木香 丁香各五分

甘草炙

右剉作一服水煎半食前服

吳茱萸湯 治冷涎嘔吐 陰證乾嘔通用

吳茱萸 生薑各二錢

人參 大棗

右剉細每服四錢水煎半食前服

小半夏湯 加生薑 治熱證嘔吐 方見 人參 須依分兩用

或加 亦得

大半夏湯 治痰證嘔吐

半夏 人參

右每服四錢薑十片蜜少許煎服

茯苓半夏湯 治水氣嘔吐 方見 金匱云嘔家用半夏

以去其水水去則嘔止



治中湯 治食證嘔吐

人參 白朮 乾薑炮 甘草

青皮 橘紅各一錢

右剉每服五錢薑棗煎服積聚大便秘者加大黃二錢半治

二陳湯 方見 加砂仁丁香 治宿食嘔吐

保命湯 治瘀血嘔吐

生地黃 川芎各一錢 半夏 甘草

南星 芍藥 白芷 茯苓

枳殼 前胡 知母 人參各五分

右剉每服五錢半薑五片烏梅一箇煎服

加減七氣湯 治氣鬱嘔吐

半夏 人參 官桂 厚朴

茯苓 甘草

右剉散每五錢半薑五片棗一枚煎服加木香亦得

藿香正氣散 治寒邪入胃嘔吐

半夏麴 川厚朴 藿香葉 橘紅

甘草

右剉散每五錢薑三片棗一枚食前服又香附

通用

木香豆蔻散 治翻胃嘔吐

人參 木香 肉豆蔻

白豆蔻仁 甘草

右爲末每服二錢薑湯調服

參橘湯 治翻胃

人參 橘紅 石蓮肉 決明 乳香

右末每服二錢薑湯調服

丁香透膈湯 治翻胃嘔吐

丁香 右連 硫黃 生薑

黄秫米半合洗

右水煮半黃秫粥去藥取粥食之

附子散 治翻胃

大附子 [illegible]

右並末每壹錢半粟米壹合北棗貳箇煎食前服

藿香半夏湯 大治停寒留飲痰涎翻胃嘔吐 方見痰飲門 濟生方 二

下藥

嘔吐家多大便秘結虛冷者用半硫丸或來復丹溫而利之又蘇

今有方 五月飯門 用肆分 威靈仙 方見服飲門 用陸分夾研竹

細闡薑汁泡沸湯下此亦溫利若大便熱結用蜜導 [illegible] 於竹指

挺納後部導之或用 [illegible] 汁入 [illegible] 少許以生蘿蔔

灌於後部或燒 [illegible] 內寒穀道或用 [illegible]

伍拾粒搗細作餅 [illegible] 以 [illegible] 煎湯 [illegible]

嘔吐之

[illegible] 治翻胃嘔吐

真橘皮 [illegible]

右每貳錢薑棗略煎服

[illegible] 治翻胃

右連內為末入 [illegible] 末米湯乘熱調服或方 [illegible] 附於

口通用

[illegible] 治久治翻胃

真附子 [illegible]

右為末每壹錢入溫半湯調下







# 咳嗽 附 喘 聲音

咳嗽方論

江流滔滔日夜無聲狂瀾激石不平則鳴所以咳嗽者痰塞胸脘氣逆不下衝擊而動肺耳然亦何以致此哉曰感風傷冷挾熱受濕瘀血停水與夫肺實肺虛皆能壅痰而發嗽也夫肺為嬌臟外主一身之皮毛內為五臟之華蓋形寒飲冷風寒傷外冷熱所以內外交侵動則掀氣 [illegible] 易生熱惟其易為冷熱所以內外交侵 [illegible] 不平而鳴乎 [illegible] [illegible] 則心下 [illegible] 欬 [illegible] 大法 [illegible] [illegible] 人 [illegible] 行之 [illegible] [illegible] 以 [illegible] 之人 [illegible] 以 [illegible] 宜飲食不進則用溫中助胃加 [illegible] 使痰熱 [illegible] 血上氣而白 [illegible] 得之尤速此則人參 [illegible] 所不可無一 [illegible] [illegible] 嗽入 [illegible]

[illegible] 邪之劑然則咳嗽 [illegible] 治於此可以開 [illegible] 有說焉肺出氣也腎納氣也肺為氣之主腎為氣之藏凡咳嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上者此腎虛不能收氣歸元也當以 [illegible] 毋徒事於肺以諸氣諸逆喘嗽之類須用 [illegible] 為佐 [illegible] 不惟寬中又能行其氣氣下痰下他證自平

咳嗽證治

[illegible] 治肺感風寒痰壅咳嗽

麻黄 [illegible] 紫蘇子 [illegible] 杏仁 [illegible] 橘紅 [illegible]

桑白皮炒 赤伏苓 甘草炙各半两

右細剉每服貳錢半薑棗煎食後服隨意加減

加減麻黃湯治肺感寒邪咳嗽

麻黃去節 辣桂 甘草各半两 杏仁去皮 [illegible]

陳皮 半夏各[illegible]

溫肺湯治肺虛感冷咳嗽嘔吐痰沫

右細剉拌和杏仁每服叁錢薑肆片煎服

乾薑 辣桂 甘草炙 半夏

陳皮 北五味子 杏仁去皮各等分 細辛

阿膠炒各半两

右麄散每貳錢半薑棗煎服

三拗湯治感寒不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃不去節 杏仁不去皮尖 甘草不炙各半两

右剉散每服貳錢半薑伍片煎服

金沸草散治上壅熱嗽

荊芥穗 旋覆花去梗 麻黃去節 北前胡各壹两半

半夏 赤芍藥 甘草炙各半两

右細剉每貳錢半加炒[illegible]半錢薑肆片煎服如咽喉[illegible]

加[illegible]食後又治傷風鼻塞清涕聲重若咳嗽不止兼[illegible]

人參款花膏

款冬花 紫菀茸 人參

北五味子 桑白皮炒各等分

右為末煉蜜圓小彈大含化壹圓或淡薑湯嚼下若身熱口

乾兼服天麻防風圓

天麻防風圓

人參 天麻 防風各壹两 全蝎

直僵蚕 朱砂研 雄黃研 甘草各壹分



牛黃各壹分 [illegible]

右細末煉蜜圓梧子大每貳圓紫蘇薄荷湯嚼下

前胡散治肺氣上熱咳嗽

前胡 荊芥 桑白皮炒 甘草炙

枳殼各半分 知母 貝母去心 薄荷

赤伏苓 北梗 紫蘇 阿膠炒

杏仁去皮 天門冬各去心半两

右剉散每服貳錢薑三片[illegible]食後煎服如更內實[illegible]

黃連阿膠圓治肺熱或咯血

黃連 赤伏苓 阿膠炒

右黃連伏苓同末水調阿膠和搗手圓梧子大每服[illegible]圓食

後米飲下[illegible]抑心火貝肺得其清

[illegible]治[illegible]傷[illegible]咳嗽[illegible]加[illegible]

大阿膠圓治肺虛客熱咳嗽咯血嘔血

阿膠炒 地黃 白茯苓 北五味子

山藥各壹两 貝母去心 百部 柏子仁

伏神 丹參 杜仲 麥門冬去心各半两

遠志去心 人參 防風各壹分

右細末煉蜜圓彈子大每壹圓少水略煎食後臨臥服

[illegible]加[illegible]煎湯嚼下[illegible]不效[illegible]乃宿血

東肺[illegible]入[illegible]煎汁與之

[illegible]治上焦有熱[illegible]血腥[illegible]氣不得透

薄荷 北梗 川芎 防風

桑白皮炒 黃芩 北前胡 柴胡

紫蘇 赤伏苓 枳殼各 甘草炙各分半

右剉細每[illegible]煎服或[illegible]亦可

小青龍湯治表[illegible]水氣[illegible]乾嘔[illegible]治[illegible]有冰

氣身涼咳嗽滿脇痛[illegible]證方見水腫門
真武湯治少陰腎證水飲與寒合而作嗽腹痛下利
白伏苓　白朮　白芍藥略炒　熟附子半兩
右剉散每貳錢半加乾姜細辛五味子各半錢姜五片食
前服凡年高氣弱久嗽通用仍間服養正丹
補肺湯治肺虛氣乏久嗽
阿膠炒　真蘇子　北梗　半夏製
甘草各半兩　款冬花　紫菀　細辛
杏仁去皮炒　陳皮　桑白皮炒　青皮
縮砂仁　五味子　石菖蒲　草果各一分
右剉散每三錢姜四片紫蘇三葉煎服
溫中圓補肺止寒嗽
人參　乾姜　白朮　甘草炙等分
右末煉蜜圓彈子大每壹圓加炒阿膠五味子煎服
加味理中湯治肺胃俱寒咳嗽
人參　白朮　乾姜不炒　甘草炙
半夏製　伏苓　橘紅　細辛
北五味子等分
右細剉每服貳錢半姜棗煎食前服曾經解利者通用
溫肺湯方見寒類人參敗毒散方見風類二藥兼服治肺胃俱寒
作嗽或煎人參湯嚼下大[illegible]圓亦可
人參潤肺湯治咳嗽痰壅通用
人參　北梗　半夏製　五味子
細辛　枳殼製　赤伏苓　杏仁去皮尖各等分
甘草炙半分
右細剉每服叁錢姜伍片烏梅半箇食後煎服
參蘇飲治肺壅上氣痰嗽
人參　紫菀　赤伏苓　杏仁去皮尖



真蘇子　陳皮　桑白皮炙　款冬花
半夏麴　北梗　甘草炙等分
右為麤末每叁錢姜肆片烏梅半箇食後煎服寒者加桂
[illegible]治諸嗽通用
桑白皮炒　紫蘇　細辛　北五味子
橘皮　半夏製　伏苓　杏仁去皮
縮砂仁　枳殼製　北梗　甘草炒等分
右剉散每叁錢姜肆片烏梅半箇食後煎服
人參潤肺散治咳嗽喘急痰壅鼻塞
麻黃去節　杏仁去皮　貝母去心炒各壹兩　人參
阿膠炒　甘草炙半兩　橘紅　北梗各壹分
右麤末每貳錢半紫蘇叁葉煎服不能發散小兒通用
[illegible]方見[illegible]類大七氣湯[illegible]和每叁錢姜棗柒片壹貳
不問新久[illegible]加[illegible]粒
[illegible]治痰多咳嗽
半夏製兩半　伏苓壹兩半　陳皮　五味子各壹兩
人參　細辛　甘草炙各半兩
四七湯治風氣動痰發嗽
右剉散每肆錢姜柒片煎服
生南星壹兩　枳殼製　細辛各半兩
木香　甘草各壹分
右吹咀每服叁錢姜柒片慢火熟煎服
人參芎歸湯治虛勞少血津液內耗心火自炎燥熱乘肺咳嗽
咯血及血不榮肌肉動輒毛寒咳嗽
當歸　川芎　白芍藥炒各貳　人參
半夏製　橘皮　赤伏苓　阿膠炒
細辛　北五味子　甘草炙各等分
右剉每服叁錢姜肆片棗貳箇煎服

人參清肺散 方見[illegible] 治肺痿勞嗽
人參蛤蚧散 方見[illegible]門 治勞氣喘急
[illegible]治肺痿勞嗽久嗽

人參　款冬花　鍾乳石　鵝管石 各[illegible]
明礬 各[illegible]　辣桂　甘草 各[illegible]

右細末臨卧以少許噙下兩次

安腎丸 方見[illegible]門 治腎經虛寒咳嗽痰唾而色黯黑小腹動
[illegible]丸 方見[illegible]門 [illegible]同前 治心系氣作痛

[illegible]湯 治肺有癰腑腥氣上衝咽而咳嗽

生南星 [illegible]　知母　貝母 去心 炒　生地黃
阿膠 炒　川芎　桑白皮 炒　甘草 各炙
防風　射干　北梗　天門冬 去心
薄荷　杏仁 去皮尖　半夏 [illegible]　紫蘇葉
白芷　白及 各半兩

右剉散每服三錢薑三片[illegible]食後煎服

[illegible]治傳疰勞嗽肺管有虫令人喉癢

雄黃　安息香 各[illegible]　[illegible]
桃仁 去皮尖 [illegible]

右為末每用一錢[illegible]入[illegible]研汁夾和臨卧含化仍燒
[illegible]以管子吸煙入喉

蘇合香圓

安息香 [illegible]　蘇合香油 [illegible]
白朮　丁香　青木香　白檀香
沉香　蓽撥　香附 [illegible]　訶子 煨取肉
烏犀 [illegible]　朱砂 [illegible]　薰陸香　龍腦 [illegible]
麝香 [illegible]

右為細末入研藥拌和用安息香膏并煉白蜜和劑每[illegible]大



開肺湯化下前系加[illegible]後諸痛咽喉類並用此

附方 蘇合香圓用[illegible]煎湯調下
附此即咳逆胃寒所致也[illegible]人參[illegible]佐之
溫胃能解散胃中風邪

安腎丸 方見[illegible]門 凡咳嗽暴重動氣從臍下逆奔而上者蓋
腎虛氣不歸元[illegible]之

# 喘嗽

喘嗽方論

肺主氣也一呼一吸上升下降榮衛自然往來流通安有所謂
喘惟夫邪氣伏藏凝涎[illegible]呼不得呼吸不得吸於是上氣促
急填塞肺脘激亂爭鳴如鼎沸之沸而喘之形狀具矣有肺虛挾
寒而喘者有肺實挾熱而喘者有水氣乘肺而喘者有驚憂氣
鬱肺脹而喘者又有胃絡不和喘出於陽明之氣逆真元耗損
喘生於腎氣之上奔如是等類皆[illegible]而主治之[illegible]
以[illegible]之未除冷痰如冰之[illegible]補[illegible]之類
也肺實肺熱必有壅盛[illegible]上炎之狀[illegible]清利[illegible]
之[illegible]之類是也水氣者[illegible]
使[illegible]
之宜中下氣[illegible]陽明之氣下行令[illegible]
上行古人以通利為戒如[illegible]加[illegible]石
[illegible]之[illegible]當[illegible]氣不得歸元用[illegible]以
鎮墜助陽接其[illegible]而愈者然亦不可以[illegible]
[illegible]則人參[illegible]
或令諸品并不主喘也如前治法大要究其受病之原[illegible]
其發端表汗裏下腑氣當論[illegible]收功此則但療本病其喘自
安圖哉之士可以與隅而反矣雖然喘有利下而愈者亦有已

爲而短者喘有數年不痊而得甚者亦有忽因[illegible]嗽大喘而不
救者[illegible]汗出[illegible]喘者爲肺絶身汗如油喘者爲命絶[illegible]白[illegible]
喘滿[illegible]不治諸有暴病正氣欲絶之時邪氣盛行多壅逆而爲
喘然則喘之危急又安可以尋常目之

喘嗽證治

九寶湯 治經年喘嗽通用常服有效
麻黄去節 橘紅 脳荷各壹兩 辣桂
紫蘇 桑白皮炒 杏仁去皮尖 大腹子連皮
甘草各半兩
右細剉每服叁錢薑伍片烏梅壹箇水煎食後臨卧服或入
童子小便半盞同煎尤妙

定喘湯 治上氣喘嗽
紫苑茸 北五味子 橘紅 杏仁去皮尖
甘草炙 真蘇子炒 桑白皮炒 半夏製
枳殼[illegible]各等分
右細剉每服叁錢薑伍片紫蘇伍葉食後煎服

[illegible]湯 治喘嗽
枳殼製 半夏製 北梗 青皮
陳皮 真蘇子 檳榔 伏苓
葶藶隔紙炒各半兩 木香 白豆蔻仁 縮砂仁
紫蘇葉各貳兩半 甘草炙各叁分
右剉散每服叁錢薑伍片煎服

[illegible]散 治上氣喘嗽浮腫
紫蘇葉貳兩 五味子 大腹皮 烏梅肉
杏仁去皮尖 陳皮 北梗 麻黄去節
桑白皮炒 阿膠各壹兩 紫苑 甘草炙各[illegible]兩
右㕮咀每服叁錢薑伍片煎服

五味子湯 治寒喘



北五味子 杏仁去皮炒 橘紅各壹兩 麻黄去節[illegible]
甘草炙 生乾薑 辣桂各半兩
右麁末每服貳錢半紫蘇叁葉煎服肺虚加[illegible]同煎喘甚加[illegible]

人參胡桃湯 治肺虚發喘氣乏
人參寸許 胡桃肉[illegible]
右切碎每錢伍片棗貳枚食後臨卧煎服盖人參定喘帶皮
胡桃斂肺更堅志方

三拗湯 方見咳嗽門寒證喘者加[illegible]熱證喘者加[illegible]

[illegible]湯 前單入[illegible]少許

[illegible]湯 清肺定喘
甘草 葶藶[illegible] 桑白皮炒 天門冬去心 馬兜鈴
半夏製 紫苑 杏仁去皮尖 貝母炒
百合 人參各半兩 百部 甘草炙[illegible]
右剉散每服貳錢半薑肆片大棗壹枚煎服

[illegible]湯 方見水飲門本方去[illegible]加[illegible]去皮叁兩治水氣
喘嗽遂小腹滿更加[illegible]

[illegible] 治水氣乘肺動痰作喘身體微腫
葶藶隔紙炒 杏仁去皮尖炒 防己 郁李仁炒
真蘇子 陳皮 赤伏苓各半兩
右末煉蜜圓梧子大每服叁拾圓食後生薑紫蘇湯下

[illegible]湯 治水氣作喘
陳皮 北梗 紫蘇 人參
五味子 檳榔 桑白皮炒 半夏製
甘草炙等分
右剉散每服叁錢薑伍片煎服

[illegible]湯 方見水飲門

[illegible] 治[illegible]痰氣逼上喘

半夏[illegible] 茯苓[illegible] 厚朴[illegible] 紫蘇葉[illegible]

右㕮咀每服叁錢半薑柒片棗貳枚煎服

[illegible] 方見氣門

[illegible]丸 方見嗽類

[illegible] 方見水飲門 八味圓 [illegible] 方見痼冷門 治腎虛上喘凡腎虛而喘須以人參為佐

五味子圓 治久喘

木香半兩 馬兜鈴去殼 葶藶[illegible] 各壹分 川五靈脂貳兩半

右為細末煉蜜圓桐子大每貳拾圓杏仁三箇搥碎薑叁片煎湯下

[illegible] 至誠修合治喘

雄黃研 白礬[illegible] 木香 生薑[illegible]

馬兜鈴去殼 雞內金 淡豆豉[illegible] 信砒[illegible]

右剉味各取實分數並細末研末蒸餅糊圓如胡椒大每服伍圓茶清微冷臨卧送下 加至七圓而止次日飲食勿用熱[illegible]

[illegible] 方見[illegible]門 治[illegible]毒

[illegible] 方見[illegible]門 治喘嗽

[illegible]方

靈砂[illegible] 人參 木香[illegible]

大香附[illegible] 大紅川椒[illegible]

右細末糕糊圓麻子大每服貳拾圓空心食前橘皮湯下川椒引氣歸元

# 聲音

## 聲音方論

心為聲音之主肺為聲音之門腎為聲音之根風寒暑濕氣血痰熱邪氣有干於心肺者病在上脘隨證解之邪氣散則天籟鳴矣惟夫腎虛為病不能納諸氣以歸元故氣奔而上咳嗽痰



壅或喘或脹髓虛多唾足冷骨痿胸腹百骸俱為之牽制其嗽愈重其氣愈乏其聲愈乾矣君子當於受病之處圖之可也按錢氏方小兒吐瀉利其小便過多以致脚虛不食錢用[illegible]以[illegible]作數日以後忽爾不語錢知其脾氣已復腎氣尚虛投以[illegible]圓益腎抑鬱數劑於是能言余推信聲音之根出於腎也不誣矣。諸病不語或聲乾說難以癒後餘見活人總括小兒雜症見小兒類

## 聲音證治

[illegible] 治風邪風毒纏喉不語

南星[illegible] 生薑[illegible] 橘皮[illegible]

右剉每服叁錢紫蘇伍葉煎服

[illegible] 失音通用

荊芥 蘇葉 木通 橘紅

當歸 桂 石菖蒲[illegible]

右等分剉煎肆錢服

[illegible] 兼服治傷風鼻塞涕流喉啞聲啞熱證通用 方見[illegible]門

[illegible] 治風寒邪氣留滯失音

辣桂半兩 石菖蒲[illegible]

右剉每服貳錢半新水煎細呷

[illegible] 治風痓口噤不語項強背直身腰反張 方見痓門

[illegible] 治伏暑發熱汗渴昏入心胞不語 方見血[illegible] 加[illegible]煎

[illegible] 方見寒類 加[illegible]治濕證聲啞 加[illegible]治寒證

[illegible] 方見氣門 加[illegible]治氣鬲聲沉

[illegible] 治血證心忪語短昏冒迷忘

生地黃[illegible] 犀角 牡丹皮 芍藥各半兩

右剉每服肆錢入[illegible]去皮尖柒粒煎服如[illegible]

[illegible]

【[illegible]】治打撲驚忤血入心竅不語（方見血類）

【二[illegible]散】（方見[illegible]）加[illegible]煎[illegible] 治痰迷心竅[illegible]

【[illegible]】治失音亦治喉痺

槐花新瓦上炒香熟 三更後床上仰卧[illegible]之[illegible]

【[illegible]】治大驚入心痰血聚積不能言亦治痰風

【[illegible]】治狐惑虫食其臓上唇瘡其聲啞

桃仁（去皮尖） 槐子 艾葉（各壹兩） 大棗（拾伍枚）

右用水叁盞煎至壹盞半分叁次服

【人參[illegible]】治腎虛聲不出

人參 川芎 當歸 熟地黄（洗）

白芍藥 白伏苓 兎絲子（酒浸） 北五味子

杜仲（去皮薑汁炒去絲） 牛膝（酒浸） 巴戟（去心） 橘紅

半夏麴（各壹兩） 白朮 補骨脂（炒）

葫蘆巴（炒） 益智仁 甘草（炙各半兩） 石菖蒲（壹錢半）

右剉細每服叁錢薑伍片棗貳枚食前煎服[illegible]法拾粒

[illegible]五更頭腎氣開不得咳唾言語默然再進上藥

功效勝常

【[illegible]】治咳嗽暴重聲音不出

杏仁（去皮尖） 冬蜜 砂糖 薑汁（各壹兩）

桑白皮 木通 貝母（去心各壹兩半） 北五味子

紫菀茸 石菖蒲（半兩）

右後陸味剉以水伍升煎半去滓入[illegible]和微火煎

取壹升半每服叁合兩日夜服之

【木[illegible]】治諸風失音

木通 石菖蒲 防風 羌活

桑螵蛸 全蝎 直殭蚕 甘草（各壹分）

圓白南星（[illegible]半兩）

右剉每服貳錢半【[illegible]】伍片棗[illegible]伍片熟煎服 【[illegible]】

二



# 虛勞 附 虛汗 [illegible]

虛勞方論

蒙莊有言精太用則竭神太勞則憊。借是可以論勞矣。夫人所以根本此性命者氣與血也。若男若女氣血均有。獨不能保而有之。終日役役神倦力疲。飢飽越度喜怒失節。形寒飲冷縱欲恣情。遂使五臓氣血俱虛。此五勞之所從始也。六極七傷類焉。故心家虛則便濁汗多。肝家虛則筋攣目眩。腎家虛則腰痛泄精。肺家虛則咳嗽。脾胃虛則嘔吐不食日就羸黃。或乃胃熱消穀飲食雖多亦不生肌肉而轉加瘦悴矣。前其間大抵心下引脇俱痛。蓋滯血不消新血無以養之也。治法大要。潮熱者不可過用寒凉。秘結者不可驟與疏泄。喘嗽者不可妄施發散。咯血者不可輕易[illegible]以為熱也。以滋養榮血為上。調平臟氣[illegible]分之熱[illegible]又於[illegible]血[illegible]之中而增益也。其或有閒積以至四肢羸弱不舉。此則骨[illegible]之。有[illegible]比[illegible]羅[illegible][illegible]因養血之上藥也。尤當以益胃消痰兼佐之。蓋人以穀氣為本。所謂精氣血氣由穀氣而生。古人以五味五穀五藥養其病者。不無所據於其間也。[illegible]陰陽偏勝則傷胃。是可屏桂附熟而制量輕重之不當乎。抑余聞諸虛不足皆成勞瘵。此可療而可愈之疾也。其間傳疰[illegible]。[illegible]在者[illegible]之年而作也。經[illegible]人有逢年月之[illegible]感異物之精[illegible]不定沉默而不能的知所苦積歲漸至委頓[illegible]傳疰殃及傍人。須用通神明去惡疰等劑療之。或者刻[illegible]伐邪[illegible]丹[illegible]引[illegible]清和[illegible]為尸疰設也。前集咳嗽中亦略陳之。

又論

勞瘵之疾[illegible]其脉[illegible]之物以養之不能[illegible]也古方

用[illegible]

類正此意且或者夏秋[illegible]以致血氣乾

竭心腎不交故火炎於上[illegible]

建於下爲脚弱[illegible]

腠入脈多弦或浮大或數[illegible]

可治而正比弦者難治血氣以耗[illegible]調[illegible]

脈非復觀此九難[illegible]加數則難治矣[illegible]可以

廻生或且臍[illegible]取肯脊骨對正灸亦有驗又[illegible]亦不可多

十補湯 虛勞[illegible]通用[illegible]加北五味子[illegible]加[illegible]

加[illegible]有汗加[illegible]加[illegible]皆依元[illegible]分兩稍不[illegible]

勿用

[illegible]湯 五勞六極七傷通用

白芍藥 當歸 川芎 黃耆

熟地黃 辣桂 甘草

右[illegible]末每服叁錢[illegible]煎食前服或入[illegible]同煎

地骨皮散 治虛勞潮熱骨蒸壯熱

地骨皮 秦艽 柴胡 枳殼

知母 當歸 鱉甲[illegible] 川芎

甘草

右[illegible]末每服叁錢[illegible]枇杷葉各[illegible]寸[illegible]叁片烏梅壹個同煎空

心臨卧各一服潮熱甚加[illegible]大黃微利之

枳殼湯 治虛勞大便秘結

枳殼 甘草 杏仁

阿膠 生地黃

右細剉每服叁錢水[illegible]伍片棗叁[illegible]烏梅壹個同煎空心服

加味人參紫菀散 治虛勞咳嗽

人參 北五味子 紫菀茸 陳皮



貝母 紫蘇葉 桑白皮 白伏苓

杏仁 甘草 川芎 半夏麴

阿膠

右[illegible]末每服叁錢水[illegible]片棗貳枚烏梅壹個食後煎服

大阿膠圓 [illegible]見[illegible]門[illegible]虛勞咳血咯血[illegible]

[illegible]湯 [illegible]咳嗽門用人參[illegible]可煎湯嚥下肺熱加[illegible]

[illegible]

人參[illegible] 治虛勞少血肺熱嗽血方見咳嗽門

生地黃[illegible] 治虛勞熱咯血 生地黃搗汁入生薑汁少許服之以熱退爲度或利則止

大[illegible]散 治虛勞咳嗽諸嗽通用神效

北五味子 伏苓 桑白皮 紫蘇

細辛 橘皮 枳殼 杏仁

阿膠 甘草 罌粟殼

半夏

右剉散每服叁錢水[illegible]伍片棗貳枚烏梅半個食後煎服勞嗽多加[illegible]

遠志圓 治虛勞驚悸神氣不寧

遠志 伏神 黃耆 熟地黃

人參 石菖蒲 當歸

右末煉蜜圓梧子大每服[illegible]拾圓米飲下

茯神湯 治心忪驚悸常懷憂慮如人將捕小便或少或多或滴

半夏 辣桂 人參 白伏苓

甘草 當歸 龍骨 北梗

遠志 枳殼 黃耆 伏神

右末每服叁錢水[illegible]伍片棗貳枚粳米百粒食前煎服

[illegible]十四味建中圓 治虛勞少血心煩多驚精神恍惚[illegible]

[illegible]心[illegible]小便[illegible]

【[illegible]丸】治勞損虛冷精血不足[illegible]
【[illegible]丸】治[illegible]虛勞傷補養心腎益血氣
鹿茸[illegible]　熟地黃[illegible]　當歸[illegible]　枸杞子
酸棗仁[illegible]　遠志[illegible]　川芎[illegible]　沉香
牛膝[illegible]　山藥[illegible]　茯苓[illegible]各半兩
右末煉蜜圓梧子大每服伍拾圓空心鹽湯下
【[illegible]丸】補虛勞益心腎生精血
山藥[illegible]　牛膝[illegible]　白茯苓　山茱萸
鹿茸[illegible]沉香各[illegible]　續斷　菟絲子[illegible]
杜仲[illegible]　巴戟去心　蓯蓉[illegible]
北五味子[illegible]　遠志[illegible]　熟地黃各壹兩
右末煉蜜圓梧子大每服參拾圓鹽湯下
【[illegible]湯】補虛勞養血氣
黃芪[illegible]　當歸[illegible]　熟地黃[illegible]　茯神各半兩
白芍藥[illegible]　人參　白朮　酸棗仁[illegible]
半夏[illegible]　陳皮　北五味子　肉桂
天台烏藥　甘草[illegible]　麥門冬[illegible]
木香　沉香各壹錢
右剉每服參錢重伍片棗貳枚食前煎服
【[illegible]大補湯】補虛損益氣血
人參　北五味子　當歸　白朮
白茯苓　熟地黃　白芍藥　黃芪[illegible]
甘草[illegible]　阿膠[illegible]　續斷[illegible]　半夏[illegible]
山藥[illegible]　石斛　酸棗仁[illegible]　柏子仁[illegible]
遠志[illegible]　川白[illegible]　肉桂[illegible]　鹿茸[illegible]
右細剉每服參錢半[illegible]片棗貳枚食前煎服
【[illegible]六[illegible]湯】治虛勞自汗
黃芪[illegible]　甘草[illegible]　加白朮　白芍藥各[illegible]



右為末每服貳錢[illegible]服
【[illegible]散】治虛汗盜汗
人參　當歸各壹分
右為末分兩服以豬心壹箇[illegible]新水煮熟取汁調次煎藥空
心臨臥服
【[illegible]】[illegible]治虛勞[illegible]
【參苓白朮散】治虛勞脾胃弱飲食不進
人參　白茯苓　白朮　甘草[illegible]
山藥[illegible]　白扁豆[illegible]　縮砂
桔梗[illegible]　蓮子肉　薏苡仁各壹兩
右末每貳錢棗湯調服[illegible]【人參[illegible]】
方見[illegible]【[illegible]】[illegible]可擇用
【[illegible]圓】治勞瘵傳尸骨蒸尪弱
大川椒[illegible]　生犀角　當歸　續斷各壹兩
桃仁[illegible]　鱉甲[illegible]　蛤蚧[illegible]
木香　白薇[illegible]　豬牙皂角[illegible]
安息香　蘇合香　雄黃[illegible]　麝香[illegible]
右末煉蜜圓梧子大每貳拾圓米飲下或用正川椒泡湯下
【[illegible]】治傳尸勞瘵殺勞蟲
正川椒[illegible]
右搗末老酒浸[illegible]為糊圓梧子大每服參拾圓食前鹽
湯下[illegible]常服[illegible]壹斤[illegible]自[illegible]昔人服之口以取下勞蟲
如小蛇狀即瘥此藥亦治[illegible]煎湯下治腰[illegible]
治背[illegible]湯下神效
【[illegible]】治勞瘵
生[illegible]心服此亦用枕頭之意[illegible]
[illegible]

〔黃芪六神湯〕治諸虛勞倦

肉桂　熟地黃　半夏麯　甘草各炙一分
石斛酒炒　當歸　川芎　黃芪炙
白术各壹兩　白芍藥壹兩　北五味子　木香各一錢半

右剉細每服叁錢薑伍片棗貳枚食前煎服有熱加〔柴胡〕

# 虛汗

## 虛汗方論

汗者表虛而津液為之發泄也夫人以衛氣固其表衛氣所以溫肌肉充皮膚肥腠理司開闔衛氣一虛則肌肉不溫皮膚不充腠理不肥而開闔失其司耳或昏或醒浸浸而出者曰自汗睡困則出醒而後收者曰盜汗若風若暑若濕邪氣與衛氣相干以至喜怒驚恐嗜欲勞傷皆能致之表虛者與之[illegible]之劑邪氣相搏者與之微微解散之劑驚恐勞傷者養心補腎之劑獨不可調理之乎然而人之一身負陰抱陽平則寧偏則病陰虛陽必湊故發熱汗出如水熱而涼陽虛陰必乘故發厥汗出如水溢而流要之汗者血之異名陽主氣氣為衛陰主血血為營氣血二者俱不可一日缺矣抑余聞之汗出髮潤一不治也汗出如油二不治也汗凝如珠三不治也君子見幾辨之不可不早

## 虛汗證治

〔黃芪建中湯〕治表虛自汗

官桂叁分　芍藥壹兩半　甘草炙半兩

右剉散每服肆錢薑伍片棗貳枚食前煎服本方加[illegible]兩名〔黃芪建中湯〕治虛勞自汗[illegible]兩名[illegible]治婦人血虛自汗甚自汗漏不止者加[illegible]半兩名[illegible]每服肆錢薑三片棗一枚空心煎服

〔[illegible]六一湯〕加〔白术〕[illegible]治[illegible]虛自汗[illegible]



〔[illegible]散〕治虛汗盜汗[illegible]

〔參[illegible]湯〕治[illegible]虛汗盜汗

黃芪[illegible]　防風　白茯苓　白术
麻黃根[illegible]　甘草炙[illegible]

右剉細每服叁錢入小麥百粒同煎臨臥服加〔牡蠣〕亦得

〔牡蠣散〕治諸虛體常自汗驚惕不寧

左顧牡蠣[illegible]　麻黃根　黃芪[illegible]
加白术[illegible]　甘草[illegible]

右剉每服叁錢〔小麥〕百餘粒同煎服

〔龍膽散〕治盜汗有熱

龍膽草　防風[illegible]

右為末每服貳錢溫米飲調下臨臥服

〔[illegible]散〕治盜汗

川芎[illegible]　人參[illegible]　防風[illegible]

右為末每服貳錢臨臥米飲調下

〔[illegible]止汗法〕

川芎　白芷　白术　藁本[illegible]

右為末每[illegible]兩入米粉[illegible]和撲身[illegible]亦得

# 勞瘵

## 勞瘵方論

瘵之為病[illegible]食之嘗[illegible]血枯精竭不救者多人能平時愛護元氣保養精血瘵不可得而傳惟夫縱欲多淫若不自覺精血內耗邪氣外乘是不特男子有伤婦人亦不免矣然而氣虛腹餒最不可入勞瘵者之門[illegible]不[illegible]服藥[illegible]中皆能乘虛而染[illegible]婦人入其房睹其人病者由之受氣隨入染患日久莫不化而為虫治瘵之法大抵以保養精血為上去虫次之[illegible]

間蓋尸疰皆鬼氣也伏而未起故令[illegible]
氣飛越不復附人於是乎瘵外出則[illegible]
類也其沙[illegible]首之要乎要之發用以前皆以[illegible]先立乎
根本之地[illegible]

勞瘵證治

[illegible]治瘵疾先用此以[illegible]取虫
守宮 頂門生[illegible]
真川芎[illegible] 當歸[illegible] 木香 桃仁[illegible]
安息香 雄黃[illegible] 全蝎[illegible]
江上大鰻魚頭[illegible]
右為末分作肆服每服井水壹大碗於靜室中煎柒分入紅蓖[illegible]
[illegible]末壹錢燒[illegible]入藥月初五更空心向北日天[illegible]
曰瘵神瘵神害我生人吾奉帝敕服藥保身急急如律令
念呪使連面北服藥畢面南吸生氣入口腹中燒[illegible]
床下午時又如前服藥

北斗符

敕

念此斗呪 朱砂書符

[illegible]治瘵疾殺瘵虫取出惡物
天靈蓋[illegible]
虎長牙[illegible] 鱉甲[illegible] 安息香 檳榔[illegible]
桃仁[illegible] 生犀角 木香
甘遂 降真香 乾漆[illegible]
阿魏[illegible] 穿山甲[illegible] 雷丸[illegible]
全蝎[illegible]
右件為末每服半兩先用[illegible]
[illegible]
片右[illegible]



藥末煎取柒分入[illegible]壹等月初旬五更空心溫服即以被覆
汗恐汗中有細虫軟帛拭之即焚其帛少時必瀉一物淨桶
盛急鉗取虫付烈火焚之並收入磁器中[illegible]盡之
死者及孔埋深山絕人行處

[illegible]治勞瘵[illegible]殺下瘵虫
紫河車[illegible]
大紅川椒[illegible]
虎頭骨[illegible] 黃狗頭骨[illegible]
鹿茸[illegible] 生鱉甲[illegible]
桃仁[illegible] 鼈膠[illegible] 木香 明阿膠[illegible]
雄黃 安息香 生髮[illegible]
右細末以紫河車狗肉杵和為圓桐子大每服拾粒月首五
更空心米湯下午時又服如無胎末以雄猪肚代用修事同

[illegible]治勞瘵殺瘵虫下惡物
雄黃 雌黃 青黛[illegible]
朱砂[illegible] 大蝦蟆[illegible] 男子天靈蓋[illegible] 代赭石[illegible]
安息香 阿魏[illegible] 川巴豆肉[illegible]
右細末軟粳飯頭揉和杵圓桐子大每貳拾粒桃仁拾肆個
去皮研煎湯月初五更空心下

[illegible]取下傳尸勞虫
桃枝 李枝 梅枝 桑枝
石榴枝[illegible] 青蒿[illegible] 苦練根[illegible]
生薑[illegible] 葱白[illegible]
右以童尿壹升半煎取其半去滓入[illegible]
壹錢別研至[illegible]末各半
錢[illegible]末壹錢半[illegible]分作貳服月[illegible]五更空心進
壹服五更五點又進壹服[illegible]前取下瘵虫淨桶[illegible]鉗取
入油鐺內煑仍傾油中入磁器及孔埋山僻處

青蒿散 殺瘵虫恐虫皆化為水
生藍青葉 研取自然汁
右以[illegible]末各半錢[illegible]少許研
和，月頭五更空心服[illegible]虫[illegible]通用此方

烏肝方 殺瘵虫
黑貓生取肝焙乾
右為末，月首五更空心醇酒調服，或用酒浸而食之

[illegible] 治勞瘵久嗽[illegible]
蛤蚧 [illegible] 生鱉甲 去裙醋炙
白茯苓 川芎 當歸 北五味子
牛膝 酒浸 綿黃耆 柴胡 知母
貝母 去心 蓮心 明阿膠 [illegible] 巴戟 [illegible]
桃仁 [illegible] 肉豆蔻 [illegible] 木香 秦艽
破故紙 [illegible] 生[illegible]
羌活
右細末，煉蜜圓彈子大，每服一圓，[illegible]湯空心嚼下

[illegible] 治勞瘵咳嗽咯血發熱潮熱盜汗
柴胡 明阿膠 炒 [illegible] 白茯苓
紫苑茸 當歸 川芎 半夏
貝母 去心 枳殼 桔梗 秦艽
甘草 人參 北五味子 羌活
防風 杏仁 款冬花 桑白皮
生鱉甲 [illegible]
右麄末，每服三錢半，[illegible]煎，食後少頃服

全[illegible] 治勞瘵虛熱咳嗽
知母 貝母 去心 杏仁 [illegible] 柴胡
川芎 [illegible] 當歸 明阿膠 [illegible]
右麄截入厚磁器中，用中[illegible]頭上去[illegible]
以[illegible]同共血[illegible]用醇酒伍升同[illegible]



同煮[illegible]取[illegible]食之[illegible]鱉甲[illegible]
乾為末，以浸[illegible]酒汁調[illegible]為糊，圓梧桐子大，每服[illegible]拾圓，不時
[illegible]

神授圓 [illegible]論治勞瘵虫有動，但隨時用飯飲圓服
之[illegible]
業有數虫如蜈蚣，如小蛇，如蝦蟆，如馬尾，如亂絲，如[illegible]如
[illegible]如壁[illegible]上紫下白，形銳足細而有口，或如白蟻孔[illegible]
中皆出[illegible]根毒若傳至三人則如人形如鬼狀
前方[illegible]甲生犀散，已服後[illegible]日又再服之

新編仁齋直指方論卷之九

增修仁齋直指方論卷之十

# 漏濁 附 [illegible]

漏濁方論

精之主宰在心，精之藏制在腎。凡人酒色無度，思慮過情，心腎氣虛，不能管攝，往往小便頻數，漏濁之所由生也。因小便而出者曰尿精，因見聞而出者曰漏精。心不足而挾熱者為赤濁，心不足而腎冷者為白濁。陰不升，陽不降，上下乖睽，是以有清濁不分之證。藥法另條列于下，要必龍骨之精而後發用之，當[illegible]。外此又有脾精不禁，小便漏濁，手足力乏，腰背酸疼，當用蒼术等劑以斂脾精，謂何精生於穀也。

漏濁證治

[illegible]圓 治小便中泄精不止

白龍骨 [illegible] 新蓮子 [illegible]

右末，酒調糯米為糊，圓桐子大，每服三十圓，空心鹽湯下

[illegible]八一散 治心熱赤濁

石蓮肉 [illegible] 甘草 [illegible]

右末，每服二錢，食後燈心煎湯調下

清心蓮子飲 治心中客熱煩躁，赤濁肥脂

石蓮肉 白伏苓 益智仁 遠志 [illegible] 麥門冬 人參 石菖蒲 車前子 白术 澤瀉 甘草 [illegible]

右剉散，每服三錢，添燈心煎服，有熱加薄荷

[illegible]散 方見[illegible] 治小便赤濁，又[illegible]

[illegible] 方見[illegible] 可夾[illegible] 每服[illegible]錢，用燈心[illegible]

心[illegible]門冬 煎湯調下，男女濁用

[illegible] 用[illegible]圓 白半夏 [illegible]



右為末，用新[illegible]清圓桐子大，[illegible]，以[illegible]木[illegible]，[illegible]同炒，[illegible]為度[illegible]，[illegible]磁器[illegible]收，每[illegible]圓食前

白伏苓[illegible]

[illegible] 治心氣不足[illegible]白濁 方見[illegible]

[illegible] 治心[illegible]便濁 方見[illegible]

[illegible] 治白濁通用

真龍骨 [illegible]炒 厚牡蠣 [illegible]

石[illegible] 白伏苓 三 益智仁 石菖蒲 [illegible]

縮砂仁 [illegible] 川楝子 [illegible] 桑螵蛸 [illegible] 兔絲子 [illegible]

右末，以山藥[illegible]炒，為糊圓桐子大，每伍拾圓，日間前[illegible]

[illegible] 臨卧[illegible]湯下 [illegible]

[illegible] 治心氣不足[illegible]白濁

遠志 [illegible] 麥門冬 [illegible] 生地黃 [illegible] 天門冬 [illegible]

龍[illegible] 五味子 車前子 [illegible]

白伏苓 伏神 [illegible]

右末，煉蜜圓桐子大，每伍拾圓，食前[illegible]湯下

[illegible] 治白濁通用 方見[illegible] 赤濁[illegible]煎湯下[illegible]

[illegible] 治男子下女[illegible]，[illegible]豆花，入[illegible]三十六[illegible]

[illegible] 治腎虛[illegible]小便[illegible]而數，白而濁如水[illegible]之狀，又[illegible]

[illegible]用[illegible]

[illegible] 治精氣不禁[illegible]

右[illegible]用[illegible]入[illegible]煮[illegible]

子大[illegible]

[illegible] 治[illegible]白濁

真龍骨 [illegible] 牡蠣 [illegible]

右以[illegible]，[illegible]去豆焙乾[illegible]

淨搥碎揀去內入水煮[illegible]焙乾[illegible]爲末[illegible]圓
子大每服叁拾圓食前用茯苓伍枚連殼搥碎煎北五味子[illegible]湯下
柏子仁[illegible]煎湯下
水芝圓用北五味子煎湯下治諸虛白濁方見[illegible]門
茯苓散治心腎不和小便白濁或如米泔或爲[illegible]
桑螵蛸[illegible] 遠志[illegible] 石菖蒲
人參 白茯神 當歸 龍骨[illegible]
鱉甲[illegible] 甘草[illegible]
右爲末每服貳錢人參茯苓煎湯調下夜臥服
王瓜四子湯方見[illegible]貳味夾和
每服貳錢用燈心棗湯同前服治小便白濁
清心蓮子飲治諸虛不足虛熱渴來心神驚悸睡臥不寧小便
油濁
龍齒[illegible] 人參 當歸[illegible] 熟地黃[illegible]
牡蠣[illegible] 酸棗仁[illegible] 白茯苓 白茯神[illegible]
遠志[illegible] 枳殼[illegible] 麥門冬[illegible]
半夏麴 白朮 甘草[illegible] 肉桂[illegible]
綿黃耆[illegible]
右㕮咀每服叁錢水壹盞半薑伍片棗壹枚煎小盞[illegible]不時服
臨臥服
秘精方治遺精白濁
雪白鹽入[illegible] 山藥[illegible]
白茯苓
右爲末入鹽壹兩研和用棗湯浸棗取肉研夾煉蜜丹研爲
圓如梧桐子大每服叁拾圓空心棗湯下[illegible]甘以濟腎兩
得也
山藥圓
乾山藥[illegible] 北五味子 茯苓[illegible] 菟絲子[illegible]

牛膝[illegible] 熟地黃[illegible] 山茱萸
茯神去木 巴戟去心 破故紙[illegible] 杜仲[illegible]
右末煉蜜圓梧桐子大常服叁拾圓鹽湯下
茯菟圓方見[illegible]白圓子[illegible] 茯苓圓[illegible]
又方每服叁拾圓食前用[illegible]送下方見[illegible]治虛[illegible]
陳湯服亦可
[illegible]心腎俱虛漏精白濁方見[illegible]
[illegible]圓治心虛腎冷漏精白濁
鹿茸[illegible] 肉蓯蓉 當歸
巴戟去心 菟絲子[illegible] 杜仲[illegible]
川楝[illegible] 益智仁 禹餘糧[illegible]
茴香 故紙 山茱萸 赤石脂
龍骨 滴乳香
右細末酒糊米糊圓梧桐子大每服叁拾圓食前[illegible]
[illegible]圓治[illegible]陽氣衰微白濁遺精
破故紙[illegible] 當歸 茯苓 牛膝
熟地黃[illegible] 鹿茸[illegible] 巴戟去心 黃蜀葵子[illegible]
茯神[illegible] 石斛 桂心 乾薑[illegible]
右末酒糊米爲圓梧桐子大每服叁拾圓空心鹽湯下[illegible]
又方 治清濁
[illegible]治腎經虛損濁不止方見[illegible]用[illegible]加白茯苓
白濁方治陰陽不調清濁相干小便渾濁方見[illegible]用茯苓
煎湯下
分清飲治思慮過度清濁相干小便白濁
益智仁[illegible] 萆薢[illegible] 石菖蒲[illegible]
天台烏藥 白茯苓[illegible] 甘草[illegible] 川萆薢
右爲末每服貳錢鹽壹許同煎食前服[illegible]

前用

□□丸 治元陽虛憊，夢精不禁，白濁淋瀝，腰痛力疲

蒼朮（[illegible]） 柏子仁（[illegible]） 川練子（[illegible]）

川烏（[illegible]） 破故紙（[illegible]） 白伏苓 龍骨（[illegible]）

右末，酒煮糊圓梧子大，朱砂為衣，每服伍拾圓，空心溫酒或鹽湯下，[illegible]

# 夢泄

夢泄方論

經云：腎藏精，神不守舍，故心有所感，夢而後泄也。其候有三：年少氣盛，鰥曠矜持，強制情欲，不自覺知，此泄如瓶之滿而溢者也，人或有之，是為無病，勿藥可也。心家氣虛，不能主宰，或心受熱，邪氣不收，此泄如瓶之側而出者也，人多有之，其病猶輕，合用和平之劑。臟腑積弱，真元久虛，心不攝念，腎不攝精，此泄如瓶之罅而漏者也，人少有之，其病最重，須當大作補湯。或謂夢泄尤甚於房勞，此世俗習聞其說也。[illegible]之有重輕乎？外此又有一等神氣消散，鬼邪乘其虛，風氣干其正，往往與妖魅交通，是又危篤之不可療者也，法當[illegible]補助[illegible]是言

夢泄證治

茯苓圓 治心虛夢泄

白伏苓

右為末，每服貳錢，米飲調下，間用溫酒水調下，空心食前臨臥日參服。

蓮子六一湯 方見赤白濁門 治心[illegible]熱夢遺，並用燈心壹握煎湯下

□□圓 治□□腎氣虛，夢泄

鹿角霜 鹿茸（[illegible]） 白伏苓（[illegible]） 人參

白伏神 桑螵蛸（[illegible]） 川芎（[illegible]） 當歸

破故紙（[illegible]） 龍骨（[illegible]） 韭子（[illegible]）



柏子仁（[illegible]） 甘草（[illegible]）

右末，每服參錢，[illegible]伍片，棗參枚，粳米百粒，食前煎服

□□□□（方見□□門） 大補[illegible]，[illegible]送下，[illegible]間用溫酒米飲湯下

□□□ 封圖下，[illegible]夢泄不止 [illegible]空心人參[illegible]煎湯下

增修仁齋直指方論卷之十

增修仁齋直指方論卷之十一

# 眩運

## 眩運方論

眩言其黑，運言其轉，冒言其昏，眩運之與冒眩，其義一也。其狀目閉眼暗，身轉耳聾，如立舟船之上，起則欲倒，蓋虛極乘寒得之，亦不可一途而取軌也。風則有汗，寒則掣痛，暑則熱悶，濕則重滯，此四氣乘虛而眩運也。喜怒憂思悲恐驚，郁而生涎，結而為飲，隨氣上厥，此七情致虛而眩運也。淫欲過度，腎家不能納氣歸元，使諸氣逆奔而上，此眩運之出於氣虛也。吐衄崩漏，肝家不能收攝榮氣，使諸血失道妄行，此眩運之生於血虛也。又明矣以致新產之後，血海虛損，或瘀滯不行，皆能眩運，是可不推尋致病之因乎。治法隨機應變，其間以升降鎮墜行汗為最，不可妄施汗下。然而眩運欲解，自汗則有之，若諸[illegible]汗則[illegible]。目眩與夫少壯眩運，[illegible]利止而頭眩，時時自冒者，此病極而脫也。識者將有參[illegible]之憂。[illegible]

## 眩運證治

茯苓桂枝白朮甘草湯　治氣上衝胸，戰搖眩運

茯苓 一兩半　桂枝 一兩　白朮 一兩　甘草 炙，半兩

右剉散，每服三錢，新水煎服。風證加川芎，[illegible]，熱證加[illegible]，諸加川芎[illegible]

（芎朮散）寒證加[illegible]

三五七散 方見風門　治寒風眩運，仍吞來復丹 方見暑門　養正丹 [illegible]

正元散 方見[illegible]

芎朮除眩湯　治感風感寒，頭重眩運

附子 生　白朮　川芎 各半兩

官桂　甘草 炙，各二錢半

右剉，每服三錢，薑七片，同煎，食前服

[illegible]四[illegible]湯 方見[illegible]門　附子理中湯 方見[illegible]

[illegible]治[illegible]眩運

肉桂　茯苓 各半分

右細末，煉蜜丸，每兩作[illegible]丸，每服一丸，[illegible]湯下

[illegible]丸 通用 方見[illegible]門

十四友丸 方見[illegible]門　[illegible]丸 方見水氣門　二藥夾和用[illegible]

七氣湯 送下 方見氣門　治七情所干，眩運欲倒，仍間用[illegible]

湯下

[illegible]湯 方見[illegible]門　治痰飲眩運

[illegible]丸 方見痰涎門　治痰飲結聚，眩運欲嘔

[illegible]散　治氣虛眩運

木香　白朮　半夏麴　橘皮

白茯苓　縮砂 各半兩　丁香　甘草 炙，各二錢半

右剉散，每服[illegible]錢，薑五片，同煎，吞[illegible]丸 方見[illegible]門 本方加[illegible]、川芎各[illegible]，治血虛眩運

芎歸湯 方一[illegible]　治一切血運，每服[illegible]，間用[illegible]

[illegible]丸 方見[illegible]　加[illegible]　治婦人血運，眩暈不省人事

[illegible]元 方見[illegible]門　加[illegible]　治[illegible]眩，冒心下悸眩

大用[illegible]七氣湯 佐之

[illegible]散 方見[illegible]門　升降陰陽，用之[illegible]

[illegible]丸 方見[illegible]　[illegible]湯下，升降鎮墜，功用兩全

[illegible]丸 方見[illegible]門　[illegible]眩運用之

[illegible]丸 用[illegible]湯[illegible]，用[illegible]　治心虛不飲，怔忪頭運

[illegible]丸 方見[illegible]門　加[illegible]　治[illegible]眩運，及酒食所傷

[illegible]丸 治風證眩運，及血證眩運

[illegible]食所傷眩運，吞[illegible]丸

新白芷　[illegible]大[illegible]　[illegible]

右為末，煉蜜丸，彈子大，每服一丸，[illegible]氣湯嚼下

[illegible]治風痰上厥，眩運，[illegible]

白附子 炮　南星 炮　半夏 湯洗七次　旋覆花
甘菊　天麻　川芎　橘紅
僵蚕 炒　乾薑 各一兩　全蝎 半兩 炒
右末用生薑半斤取汁打糊圓小圓每伍拾圓食後荊芥湯下

人參前胡湯 治風痰頭暈目眩
前胡　橘紅　半夏曲　木香
枳殼　紫蘇葉　赤茯苓　南星 炮
甘草 炙 各半兩　人參 各三錢
右麤末每參錢薑肆片慢火熟煎服

[illegible]圓子 [illegible] 用參拾圓 [illegible] 宜前
[illegible] 末 [illegible] 研和以 [illegible] 薑汁 少許調下 治諸
風眩運 [illegible] 語短吐

# 驚悸

驚悸方論

人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所肇端也曰驚曰悸其可無辨乎驚者恐怖之謂悸者怔忪之謂心虛而鬱痰則耳聞大聲目擊異物遇險臨危觸事喪志心為之忤使人有惕惕之狀是則為驚心虛而停水則胸中滲漉虛氣流動水既上乘心火惡之心不自安使人有怏怏之狀是則為悸驚者與之豁痰定驚之劑悸者與之逐水消飲之劑所謂扶虛不過調養心血和平心氣而已若一切以剛燥用工或者心火自炎又有熱生風之證

驚悸證治

養心湯 治心虛血少驚惕不寧
黃芪 炙　白茯苓　伏神　半夏麯
當歸　川芎 各半兩　遠志 [illegible]　辣桂
柏子仁　酸棗仁 [illegible]　北五味子



人參 各一分　甘草 [illegible]
右麤末每服參錢薑伍片棗貳枚煎食前服加[illegible]
治停水怔悸

寧志圓 治心虛血少多驚
人參　白茯苓　伏神　柏子仁
琥珀　當歸　酸棗仁 [illegible]
遠志 [illegible]　乳香　朱砂 [illegible]
石菖蒲 各半兩
右末煉蜜圓桐子大每參拾圓食後棗湯下

朱雀圓 治心氣不足怔忪自汗
人參 半兩　當歸 [illegible]　乳香 [illegible]
右末山藥煮糊圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下

十四友圓 治心血俱虛精神恍惚
柏子仁 [illegible]　遠志 [illegible]　酸棗仁 [illegible]
紫石英 [illegible]　熟乾地黃　川當歸　白茯苓
白伏神　人參　黃芪　阿膠 炒
辣桂　龍齒 [illegible]　朱砂 [illegible]
右細末煉蜜圓桐子大每參肆拾圓食後棗湯下

朱雀圓 治心病怔忪不止
白伏神 [illegible]　沉香 [illegible]
右細末煉蜜圓小豆大每參拾圓人參湯下

[illegible]圓 治大驚入心敗血頑痰填塞心竅瘖不能言
密陀僧 [illegible]
右每服挑壹大錢已無熱者用熱酒調下有熱者薄荷湯泡[illegible]
[illegible]下亦治痰厥顛疾有奇效[illegible]

溫膽湯 治心膽虛怯觸事易驚涎與氣搏
半夏 [illegible]　枳殼 [illegible]　白伏苓 [illegible]
橘紅 [illegible]　甘草 [illegible]

驚悸

右剉，每服叁錢，水一盞半，生薑七片，棗貳枚，刮青竹皮一塊如錢大，煎服。或加辰砂，尤妙。

加味四七湯 治心氣鬱滯，豁痰散驚

半夏製，貳兩　白伏苓　厚朴製，各壹兩半　伏神
紫蘇葉，各壹兩　遠志湯浸，去心　甘草炙，各半兩

右剉，每服肆錢，薑柒片，石菖蒲半寸，棗貳枚，煎服。

伏苓甘草湯 治心下停水忪悸

伏苓　桂枝，各貳兩　甘草炙，壹兩　生薑叁兩

右剉，每服肆錢，水煎服。

蒼朮湯 治停飲怔忪

白薑生　白朮　伏苓　半夏製，各半兩
辣桂　甘草炙，各壹分

右剉，每服叁錢，薑煎服。

小半夏加伏苓湯 治卒嘔吐，心下痞，水氣心下怔忪。方見嘔吐門

炙甘草湯 治心下動悸，其脈結代，動而時止曰代

甘草炙，壹兩　人參半兩　生乾地黃壹兩　桂枝去皮，半兩
麻仁　麥門冬去心，各半兩　生薑叁分　大棗捌枚

右麄末，每挑叁大錢，水壹盞半，酒半盞，煎至捌分，入阿膠壹片，候溶消，溫和服，日進叁劑，不拘時。

寧志膏 治因驚失心

人參　酸棗仁，各去殼，壹兩
辰砂半兩　滴乳香壹分，水研

右末，煉蜜和杵，圓如彈子，每壹圓，以薄荷湯化下。

新刊仁齋直指方論卷之十一

瘧疾

新刊仁齋直指方論卷之十二

# 痎瘧

痎瘧方論

風寒暑濕邪自外來，飲食居處邪由內作，此瘧疾感受之[illegible]也。[illegible]其病候何如？始而呵欠，繼而足冷，面色青黑，拘急戰慄鼓頷，腰脊俱痛，寒去未幾，內外皆熱，頭痛而渴，但欲飲冷，嘔惡煩滿而不嗜食者，其候也。或內[illegible]從背起，冷如[illegible]，大瘧之熱，其[illegible]陰陽二氣更相勝負而作，邪併於陰則寒，邪併於陽則熱，陰盛則寒多，陽盛則熱多，其寒也湯火不能溫，其熱也冰水不能寒。衛氣與邪氣相值，故邪正交爭而病以作；衛氣與邪氣相離，故汗出而解而病以休。衛氣晝行陽，夜行陰，得陽而外出，得陰而內搏，故發於日間，發於暮夜[illegible]邪氣內搏於五臟，橫連募原，其道遠，其行遲，不能與衛氣俱行，故有間日一發，有一日一發者。[illegible]行疾[illegible]內外失守，其邪不分，陰陽勝負[illegible]則休作無時[illegible]有數種[illegible]為瘧風[illegible]

[illegible]

頃瘧嘔逆脈弦[illegible]宜用[illegible]加[illegible]木香[illegible]多者木
[illegible]最良[illegible]大人受[illegible]陽虛陽不能制陰所以寒
多不熱氣虛而[illegible]
從之處留 食瘧 一名胃瘧[illegible]飲食無節[illegible]有傷致然也凡食
咳生冷鹹物[illegible]中脘[illegible]皆為食[illegible]其狀[illegible]而不能
食食則中滿[illegible]腹痛宜[illegible]作劑
或四獸湯二陳湯自有奇功[illegible]
然也自[illegible]以[illegible]不常人多[illegible]其狀[illegible]
焦病欲來時令人迷悶甚則發狂[illegible]不能言[illegible]
敗[illegible]於心[illegible]於脾[illegible]仙指為脾胃[illegible]所致又有[illegible]
傷暑之[illegible]加大黃[illegible]
[illegible]
[illegible]存則有所謂[illegible]
小勞復來謂之[illegible]當調養氣血川芎[illegible]
[illegible]
不可與○[illegible]下[illegible]衛[illegible]邪氣伏藏腸間結為
瘧[illegible]謂之[illegible]以扶其衰候
其内氣[illegible]下之取愈大抵瘧之初
得一[illegible]間[illegible]不可[illegible]當候其
[illegible]而[illegible]所謂[illegible]待衰而已[illegible]發及將
解不可投藥[illegible]其氣[illegible]當於未發以前兩時之先或過發
[illegible]心[illegible]之脈大約尺寸俱弦或浮[illegible]
緩瘧或虛濇或左手[illegible]而右手[illegible]尺中[illegible]濡不可定
名以為弦也[illegible]多熱者[illegible]寒者[illegible]
弦[illegible]數其[illegible]在表者可汗弦實[illegible]其邪在裏者可
下若夫調胃氣利痰水[illegible]陰陽行二[illegible]治法之綱領也[illegible]
欲水[illegible]入[illegible]吐人參[illegible]抑[illegible]有[illegible]
其[illegible]用[illegible]之[illegible]
後發[illegible]其[illegible]



血如泥汎下極臭[illegible]是[illegible]知諸瘧皆有根在治法之外又
[illegible]輕重而利導之實者[illegible]巴豆大黃[illegible]用黃丹輩不然
[illegible]每[illegible]作[illegible]能破其癖
而下其水也

麻黃白朮湯 治風瘧[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 麻黃 去節 | 官桂 | 青皮 | 陳皮 |
| 川芎 | 白芷 | 半夏麯 | 紫蘇 |
| 伏苓 | 白朮 | 北梗 | 甘草 各等分 |
| 加細辛 | 檳榔 | | |

右剉散每服三錢薑三片棗一枚[illegible]空心煎服

五積散 治寒瘧初作以此解散

| | | | |
|---|---|---|---|
| 蒼朮 | 北梗 | 麻黃 去節 | 枳殼 |
| 陳皮 | 乾薑 | 厚朴 | 川芎 |
| 當歸 | 白芍藥 | 白芷 | 甘草 |
| 半夏 | 官桂 | 伏苓 | |

右剉散每服三錢水一盞半薑三片蔥白三寸煎至[illegible]空心服

養胃湯 加桂 治寒瘧發[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 厚朴 | 蒼朮 | 半夏 | 人參 |
| 伏苓 | 草果 | 藿香 | 橘紅 |
| 甘草 | | | |

右剉散每服三錢水一盞半薑五片烏梅一箇煎服[illegible]溫服

[illegible]

[illegible]中湯[illegible]

[illegible]諸瘧通用加[illegible]治寒瘧

| | | | |
|---|---|---|---|
| 草果 | 白芷 | 良薑 | 青皮 |
| 川芎 | 紫蘇 | 甘草 各等分 | |

右剉散每服三錢煎服

小[illegible]湯治[illegible]則加[illegible]

[illegible]治[illegible]瘧[illegible]

香附 壹兩　厚朴　陳皮 各貳兩

右剉散每服[illegible]錢[illegible]薑[illegible]水煎臨熱入[illegible]汁[illegible]溫服

五[illegible]

[illegible]治傷暑瘧疾

柴胡　常山　知母　草果仁

甘草 炙　良薑　烏梅肉 各[illegible]兩

右㕮咀每服四錢水壹盞生薑伍片棗壹枚煎半稍冷服

[illegible]治[illegible]瘧[illegible]

川常山　雞心檳榔　青皮 去白

甘草 炙 各[illegible]兩　草果仁 [illegible]

右細剉每服[illegible]錢[illegible]又用水大[illegible]煎[illegible]半稍冷[illegible]

空心服

[illegible]治[illegible]發[illegible]小便不利[illegible]

[illegible]治[illegible]但寒或寒多微熱[illegible]

柴胡 八兩　[illegible]桂 [illegible]分　栝蔞根 [illegible]　乾薑 [illegible]

甘草 炙　牡蠣 [illegible]　黄芩 [illegible]　加半夏[illegible]

右剉散每服[illegible]錢[illegible]煎服

二陳湯 治食瘧諸瘧

陳皮　半夏 [illegible]　伏苓 [illegible]　甘草 炙 [illegible]

右㕮咀每服四錢[illegible]伍片烏梅[illegible]同煎服多者加[illegible]

多者加[illegible]之類隨意增用

四獸湯 治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏 [illegible]　人參　伏苓　白朮

橘紅　草果　生薑　烏梅

以上各等分　甘草 減半



右㕮咀以鹽少許淹食頃[illegible]紙厚裹[illegible]火[illegible]熟每服[illegible]

水[illegible]煎[illegible]溫服

紅圓子 治食瘧食積氣[illegible]腹脹

京三稜 [illegible]　蓬莪朮 [illegible]　青皮

陳皮 各伍兩　胡椒　乾薑 [illegible]

右為末米醋[illegible]米粉糊圓[illegible]大[illegible]每伍拾圓[illegible]

[illegible]治[illegible]但寒及脾寒[illegible]或寒重熱輕

[illegible]

大川烏頭 [illegible]

右細剉分[illegible]服每服[illegible]片棗[illegible]白[illegible]寸水大[illegible]煎

半[illegible]候稍冷服

又方用[illegible]壹枚[illegible]一同[illegible]能[illegible]脾[illegible]風[illegible]

[illegible]

[illegible]

常山[illegible]　雞心檳榔　陳皮 [illegible]

青木香　人參　熟附子　厚朴 [illegible]

官桂 [illegible]　京三稜　羌活　獨活

乾薑 [illegible]　甘草 [illegible]　川芎　川大黄 [illegible]

[illegible]

右為末[illegible]收[illegible]末[illegible]研和

[illegible]子大每服[illegible]拾圓[illegible]下以通利為度

[illegible]治[illegible]大熱[illegible]

生[illegible]

右入生薑汁薄荷汁[illegible]各少許[illegible]水調下如[illegible]加[illegible]

[illegible]少許

[illegible]治[illegible]

圓[illegible]　生烏梅肉　母丁香　川巴豆 [illegible]

右為末[illegible]糊圓[illegible]子大[illegible]下以厚[illegible]有油又再[illegible]

每服伍圓，用冷水下。此方冉人於海岸得之，曰不授之

**[illegible]散** 治勞瘧寒熱

當歸　川芎　芍藥

陳皮　伏苓　半夏[illegible]　青皮

右剉散，每服貳錢，薑伍片，棗貳箇，小烏梅壹箇，水煎服。熱多加[illegible]

[illegible]瘧久多力[illegible]

**[illegible]** 治勞瘧久不瘥

[illegible]　桃仁[illegible]

陳皮[illegible]　鱉甲[illegible]　烏梅[illegible]

右日乾為末，煉蜜圓如梧子大，每服肆拾圓，空心溫酒下，不飲者熟水入些鹽下

**[illegible]** 治瘧疾無問寒熱無已

真阿魏[illegible]　雄黃[illegible]　朱砂[illegible]

右用湯泡阿魏，研散，雄朱為末和之，稀糊圓如梧子大，每服壹圓

**[illegible]人參[illegible]** 煎湯假冷，空心服，瘧[illegible]前湯冷服臨發[illegible]壹圓

傳[illegible]口[illegible]

**[illegible]** 治瘧，毋停水結癖，腹脅堅痛

芫花[illegible]　朱砂[illegible]等分

右為末，煉蜜圓小豆大，每拾圓，棗湯下，去積須用芫花

**太[illegible]** 破水之劑，下後即[illegible]

**[illegible]** 治諸瘧久瘧

草果仁　青皮　陳皮　人參

伏苓　半夏[illegible]　厚朴[illegible]　蒼朮[illegible]

雞心檳榔　白朮　甘草各半兩　良薑[illegible]分

右剉散，每服貳錢，薑伍片，棗貳枚，烏梅壹箇，同煎，空心服

**[illegible]** 治脾寒發瘧及寒多熱少

草果　肉豆蔻[illegible]　川厚朴[illegible]

生薑[illegible]　甘草[illegible]



右剉散，分貳服，每服壹盞水，貳片薑，烏梅煎，未發前空心服

**[illegible]** 治瘧消痰

常山[illegible]　七朱[illegible]

右為末，以[illegible]糊圓如梧子大，每拾圓[illegible]

**[illegible]** 治諸瘧[illegible]下

常山[illegible]　檳榔　草果　青皮

陳皮　川厚朴[illegible]　甘草[illegible]分

右剉細，每服二錢，薑伍片，烏梅貳箇，水壹盞，煎[illegible]宜溫服[illegible]來日[illegible]服之[illegible]

**[illegible]** [illegible]志修合

土朱[illegible]　綠豆粉[illegible]　信砒[illegible]

右用綠豆粉糊為和，研圓如麻子，每服貳圓，新汲水研[illegible]空心服，是日飲食鹹和而已

**[illegible]** 治一切瘧，寒熱不一，嘔惡頭疼，煩渴喘息，腹堅脅痛

雞心檳榔[illegible]　川[illegible]

右為末，水[illegible]糊圓如梧子大，每服貳拾圓，於未發前半日，以溫[illegible]下，脾胃不得吐，熱湯飲，次日又用冷[illegible]下貳拾圓，仍不得吃熱飲食，又次日飲食無拘

**[illegible]** 貳貼加[illegible]貳錢，分作兩服，每服[illegible]貳錢[illegible]水壹盞[illegible]分[illegible]

[illegible]

**[illegible]** 治久瘧不已，寒少熱多

常山[illegible]　柴胡　雞心檳榔

青皮[illegible]　草果仁

右剉分作服，每服大錢，烏梅貳箇，好酒[illegible]壹盞[illegible]以紗蓋之，次早[illegible]服[illegible]朴貳錢，[illegible]服，是日飲食皆勿用熱

# 霍亂吐瀉 附 泄瀉

吐瀉方論

乾上坤下其卦爲否陽降陰而不降陰升陽而不升此否之所以否而不通也人具此陰陽撩亂結搏於中必然吐瀉或瀉而不吐或吐而不瀉大抵心腹[illegible]其根天地不交之否果乎否乎霍亂之證心腹卒痛嘔吐下利[illegible]頭痛眩暈先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱作甚則轉筋攣頓特反[illegible]蓋足陽明屬胃以養宗筋[illegible]上津液驟亡宗筋失其所養[illegible]則[illegible]亦然何以致此哉曰胃傷暑毒[illegible]卧[illegible]當風取涼風冷邪氣入於腸胃加以嗜好肥腥飲食生冷暑熱不節[illegible]而發焉於是邪正相干中脘節閉氣不得通吐利[illegible]作所謂[illegible]邪未來勝上者此也治法藿香正氣散[illegible]加[illegible]為上不惟可以溫散風邪抑亦可以調理吐瀉其有傷暑所致未可[illegible]冷之劑自合先治中脘加[illegible]則以[illegible]溫服散暑解煩[illegible]若指爲脾胃虛冷[illegible]用人參白朮理中圓之屬以[illegible]胃[illegible]腸不思風冷未散輒以[illegible]擁[illegible]寒邪邪氣得之[illegible]作[illegible]延或下痢或久[illegible]或脹滿或中滿不食[illegible]百出矣抑猶有說焉霍亂[illegible]所苟務評仁則書有是言矣蓋[illegible]所傷之物因吐利而出[illegible]泄盡則止猶可冀免若上不得吐下不得利所傷之物擁閉正氣關隔陰陽撩擾喘脹其能生乎則知揮霍撩亂如人[illegible]然必有以接之可也古方用[illegible]止或吐利之意但多則大[illegible]又苦薑湯下[illegible]自有不治者不治

又治[illegible]

治[illegible]吐[illegible]先於助胃[illegible]助胃[illegible]中[illegible]風冷[illegible]



胃莫先於調和脾胃[illegible]而[illegible]者風冷在表或在裏[illegible]之證用[illegible]腸斷下終不作效[illegible]風冷暑氣之所致必[illegible]其[illegible]解散於其外則[illegible]可以[illegible]解散風冷不換金正氣散爲上其間[illegible]用最良若欲其消[illegible]則[illegible]暑亦然[illegible]作痢或爲[illegible]或爲[illegible]或爲[illegible]不止者[illegible]之後[illegible]當及此此說[illegible]宜斂用中之

吐瀉證治

藿香正氣散 治霍亂吐瀉通用腹痛者加桂小便不利者加茯苓 方見[illegible]

[illegible] 方見[illegible]此藥[illegible]

[illegible] 治霍亂[illegible]神效

良薑 藿香 陳皮 甘草

右剉細每[illegible]錢水煎服

又方

藿香葉 良薑 木瓜

右同煎治霍亂水瀉

[illegible]

半夏 川厚朴 蒼朮 陳皮 茯苓 甘草 藿香葉

右剉散每服[illegible]薑棗煎[illegible]治霍亂[illegible]而不吐者加[illegible]吐而不瀉者去蒼朮加桂丁香吐瀉俱作[illegible]者[illegible]加桂

[illegible] 治霍亂吐瀉

胡椒 生綠豆

右末煎木瓜湯溫調下

治[illegible]治飲食[illegible]不節以致霍亂[illegible]本方[illegible]

[illegible]能[illegible]風冷

香薷散 治傷暑霍亂 方見暑門

木瓜湯 治吐瀉不已轉筋擾亂

酸木瓜 一兩 茴香 二錢半 甘草 炙二錢 吳茱萸 湯泡半兩

右剉散每服肆錢[illegible]生薑[illegible]煎服

四順附子湯 治吐瀉過多手足逆冷六脉沉細氣少不語急服

生附子 白薑 炮 人參 甘草 炙各一分

右剉每服肆錢水[illegible]小便不利加

茯苓 仍用炒鹽或用[illegible] 方見中暑門

鹽湯救 治乾霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉痰壅腹脹

鹽 一合 生薑 半兩切

右同炒令色變以童子小便一盞煎[illegible]分[illegible]溫服

鹽湯探吐法 治乾霍亂心腹絞痛欲吐不吐欲下不下

先以鹽湯一盞頓服後以[illegible]吐出令[illegible]不吐再服[illegible]以針[illegible]

倍加[illegible]與[illegible]加[illegible]倍加[illegible]

[illegible]用[illegible]調下 方[illegible]用[illegible]下治乾

霍亂不吐不瀉氣塞乎中心腹絞痛此證最惡

熨臍方 治霍亂吐瀉心腹作痛

炒鹽[illegible]紙包紗護頓其臍前并腹肚上載以熨斗火熨氣

透則漸甦又以炒鹽熨其背則十分無事

霍亂吐瀉[illegible]以[illegible]上下及兩脚心即止

# 泄瀉

泄瀉方論

胃為水穀之海其精英則流布以養[illegible]其糟粕則傳送以歸

大腸腸胃虛弱或挾風挾寒[illegible]調

泄瀉諸證皆能致之[illegible]自[illegible]節

[illegible]浮



肢體重著若冷則腸鳴肚冷而手足[illegible]過

冷熱不調[illegible]積於內不能[illegible]以冷[illegible]氣[illegible]

所致也故冷[illegible]而下[illegible]以

然[illegible]冷積不得[illegible]或[illegible]泄[illegible]

後重是[illegible]也外此則飲食一[illegible]不能消[illegible]腹脹

服所下腹臭[illegible]然後為之[illegible]不

[illegible]其原[illegible]脾胃[illegible]以消水

穀水穀既分安有所謂[illegible]以[illegible]而不知[illegible]泄

[illegible]何如[illegible]時冷[illegible]

是也[illegible]則為表

裏[illegible]先當[illegible]然後[illegible]與[illegible]活

人書[illegible]肝者脾之賊[illegible]不能勝土古

人[illegible]也經曰肝[illegible]者所以守司

於下[illegible]則不泄也[illegible]泄瀉而[illegible]

有[illegible]者[illegible]所[illegible]以主[illegible]何

意哉[illegible]

泄瀉證治

理中湯 治腸胃虛弱[illegible]泄瀉[illegible]

人參 白朮 乾薑 炮 甘草 炙各等分

加 茯苓 川厚朴[illegible]

右剉細每服[illegible]錢[illegible]食前服

[illegible]治腸[illegible]泄瀉[illegible]不進飲食

藿香葉 縮砂 [illegible] 乾薑 炮

肉桂 茴香 炒 草果 [illegible] 麥芽 炒

益智仁 橘紅 [illegible] 神麴 炒

桔梗 各[illegible]兩 甘草 [illegible]

右末每服[illegible]錢[illegible]

[illegible]治脾[illegible]泄瀉[illegible]

大肉豆蔻[illegible]
右末每服壹錢米飲調下
[illegible]風邪泄瀉加[illegible]寒邪泄瀉加[illegible]通用
加木香[illegible]
[illegible]治傷暑泄瀉更增人參
[illegible]治傷濕泄瀉
橘紅　厚朴　蒼术　甘草
右㕮咀每服貳錢[illegible]煎服
又方以[illegible]川陳米煎[illegible]
[illegible]圓治暑瀉熱瀉[illegible]用[illegible]送下
又洞泄方[illegible]米飲下
[illegible]治協熱泄瀉亦治血痢
檗皮　黃芩　黃連
右剉每服貳錢水大盞煎七分入[illegible]煎[illegible]服
[illegible]治冷證泄瀉[illegible]
[illegible]圓治虛冷腸鳴滑泄
良薑　乾薑　肉桂　華撥
右末麪糊圓梧子大每伍拾圓米飲下
[illegible]圓治冷熱不調泄瀉
吳茱萸　黃連　白芍藥
右末米糊圓梧子大每服拾圓空心米飲下
[illegible]治冷熱不調泄瀉裏急後重
罌粟殼　木香　白芍藥
訶子肉　人參　白朮
甘草　肉桂　當歸
右㕮末每服貳錢[illegible]食前服先用[illegible]下[illegible]
[illegible]然後服[illegible]
[illegible]治飧食生冷久爲冷積



良薑　附桂
天台烏藥　益智仁
右末每貳錢入少鹽沸湯點[illegible]
[illegible]治傷食泄瀉[illegible]
京三棱　蓬莪术　益智仁
甘草　青皮　白茯苓
右末每貳錢少鹽煎[illegible]圓治傷食泄瀉[illegible]即
[illegible]治泄瀉滑[illegible]下痢[illegible]
服[illegible]止之
罌粟殼　陳米　乾薑
甘草　肉豆蔻　木香
右末每貳錢[illegible]食前服
[illegible]治泄瀉不止
川厚朴　肉豆蔻　訶子
砂仁　橘紅　蒼术　茯苓
木香　甘草
右㕮末每[illegible]食前服手足冷加[illegible]
[illegible]圓治腎泄腰痛無定取以痢非痢骨痛面[illegible]
腰腳時冷用[illegible]送下
[illegible]治腎泄[illegible]
禹餘糧　赤石脂　紫石英　代赭石
[illegible]　乳香　没藥
五靈脂　朱砂
右並爲細末糯米粉糊圓小雞頭大陰乾每服[illegible]
[illegible]入棗煎湯[illegible]下[illegible]送下小兒腎泄[illegible]
而[illegible]人[illegible]
服[illegible]

斷下丸 治脾腎俱虛泄瀉

肉豆蔻煨 破故紙炒 白朮 白茯苓各一兩

木香 甘草炙各三分

右剉散每服二錢食前薑棗煎溫服

二神圓 治脾腎俱虛泄瀉不食

破故紙炒四兩 肉豆蔻生貳兩

右末用肥棗肆拾枚取肉研膏入和杵圓梧桐子大每服肆拾圓

清米湯下若飯食後常一泄服此頓愈

[illegible]圓 治肝經受熱木來剋土脾受傷而泄利

當歸 厚朴製 官桂各參兩 良薑伍兩

右剉散每服三錢食前服

[illegible]修仁齋直指方論卷之十三



[illegible]修仁齋直指方論卷之十四

# 瀉痢 附 脫肛

瀉痢方論

痢瀉名目不同所感受之源一也風邪得之寒邪得之

強弱得之而寒熱[illegible]得之[illegible]寒白汗

挾虛受濕得之[illegible]自爲積重[illegible]或得之則澀腸鳴[illegible]

熱則發熱煩躁以小便不調者乃泄瀉飲食倒飽者往下酸臭

[illegible]以肚熱氣痛推之以和氣以狀如蟹漚之究其定物

之所以[illegible]之劑大要以散風邪行滯氣開胃脘爲先不可

[illegible]以通泄積[illegible]不可遽投[illegible]

[illegible]以開通腸胃[illegible]而食[illegible]之食[illegible]不爲

[illegible]後[illegible]所以日夕淹延而未已也痢之赤白

[illegible]血漬大腸亦也若[illegible]所下赤而

[illegible]則[illegible]也[illegible]邪[illegible]之則所下

白而黑焉冷熱相搏赤白相半重者狀若腸滑而血雜之

有白[illegible]中間[illegible]是也[illegible]故清血流時或[illegible]

[illegible]則下[illegible]或有[illegible]是也[illegible]以手足[illegible]

[illegible]入腸胃之間[illegible]已而[illegible]之[illegible]其[illegible]

[illegible]於[illegible]者也其有大[illegible]酒[illegible]以

[illegible]之於外者也[illegible]精血[illegible]於内者

成積[illegible]加[illegible]以[illegible]精血[illegible]

必明[illegible]外[illegible]則[illegible]用[illegible]

[illegible]不成痢[illegible]下[illegible]

[illegible]以下痢[illegible]有[illegible]如用藥不效即是腸胃

有風邪熱者[illegible]者[illegible]加[illegible]

瀉痢證治

[illegible]治風邪寒邪壯熱下痢方見[illegible]陳米飲調[illegible]

之方見水[illegible]門

不換金正氣散 治風邪寒邪冷瀉下痢 方見[illegible]門
[illegible]湯 方見[illegible]門 加[illegible] 治風寒冷證下痢加[illegible]
[illegible] 方見[illegible]門 加[illegible] 治傷濕下痢 仍以[illegible] 治濕冷下痢
[illegible] 治濕冷下痢腸血腹痛婦人下血
乾艾葉 [illegible] 川白薑 [illegible]
右為末醋煮麪糊圓梧桐子大每服[illegible]圓食前溫米飲下
大[illegible]圓 治冷瀉瀉痢通用
木香 厚朴 蒼朮 乾薑
肉豆蔻 半夏麴 陳皮 阿膠
罌粟殼 [illegible] 縮砂 甘草 [illegible]兩半
右剉每服[illegible]錢薑棗煎食前服
[illegible]湯 方見[illegible]門 治傷暑下痢[illegible]
佐之
[illegible]
[illegible]散
右剉每服[illegible]錢薑[illegible]片同煎[illegible]
[illegible] 白芍藥 甘草 [illegible]
[illegible]圓 方見[illegible]門 治傷暑下痢[illegible]
[illegible]圓 方見[illegible]門 治[illegible]熱下痢亦
治暑[illegible]
香連圓 治冷熱不調下痢
黃連 [illegible] 木香 [illegible]分
右取香連為末醋糊圓梧桐子大每服[illegible]圓米飲下[illegible]
通用
大[illegible]湯 治冷熱不調下痢 方見[illegible]門 依前法用之
[illegible]圓 治食積下痢腹痛 方見[illegible]門 依前法用之
[illegible]圓 方見[illegible]門 治諸積下痢用
[illegible]散 下
[illegible]大[illegible]湯 方見[illegible]門 治[illegible]



神[illegible]散 治[illegible]痢[illegible]
蓽撥末 [illegible] 牛乳 [illegible]
右同煎減半空腹服
茱萸圓 治赤白下痢
吳茱萸 [illegible] 黃連 [illegible]
右各[illegible]末醋糊圓梧桐子大赤痢甘草湯服白痢乾薑湯服[illegible]
赤白痢服[illegible]或多或少以意增減每服[illegible]圓米飲下以愈
為度
胃風湯 治風冷客入腸胃泄下鮮血及腸胃濕毒下如豆汁或
下瘀血
人參 白茯苓 川芎
辣桂 白朮 白芍藥 當歸 等分
右剉每服[illegible]錢粟米百餘粒同煎食前熱服腹痛加[illegible]
固腸[illegible] 治冷證久痢不止 方見[illegible]門
[illegible]圓 方見[illegible]門 治[illegible]損久痢
四服[illegible]冷以[illegible]擇用
[illegible]方
石蓮肉 [illegible]
右為末每服[illegible]錢陳米飲調下便覺思食仍以日照東方壁
土炒真橘皮為末薑棗略煎佐之
[illegible] 止赤白痢
茯苓 白朮 各[illegible] 甘草 半兩
入罌粟殼[illegible] 加木香 [illegible]
右為粗末分作兩服每服[illegible]伍片大棗[illegible]食
前煎服 方見[illegible]門 通用
[illegible] 治臟腑久虛止瀉止痢
陽起石 [illegible] 白石脂 [illegible]
右[illegible]酒[illegible]

右研極細如粉和匀[illegible]空心米飲下嘔者人參湯下
亦治腸風下血又[illegible]通用
[illegible]治瀉痢[illegible]不效以此固其下焦　禹餘粮[illegible]以水飛過
赤石脂[illegible]
右等分為末和匀每服[illegible]空心煎湯服
瀉痢須要究服藥及腸風冷熱[illegible]而[illegible]雖已
疑通澁然其痛不減者非熱[illegible]積也宜行血鬱以陽明腸除
故兩用藥當以[illegible]為佐祭血一調其痛亦止

# ○脫肛

脫肛方論

四十八難曰病之虛實出者為虛入者為實肛門之脫非虛無
故然或[illegible]實則温熱則內氣充而有所蓄[illegible]則其實則內
氣餒而不能收[illegible]況大腸之頭[illegible]脂之痛肥亦現夫內[illegible]之
[illegible]
所實何如耳大凡脫肛須以温湯洗令和軟然後推[illegible]而入治
法以温鼓行之其有產婦用力過多及小兒叫號努氣久痢不
止與[illegible]亦有此證○凡腸頭作痛[illegible]是腹中有虫[illegible]
[illegible]而湯洗仍以[illegible]散飲其脫肛腸風所治者多濕
不可用舊紙若[illegible]藥物尤不可用[illegible]有一等深污其間
之見痛腫以此急以温湯濯之患在肛腸暑濕接須用一洗

脫肛證治

[illegible]治肛門脫出不收
螺皮[illegible]　煅石[illegible]
辣桂[illegible]　鱉頭[illegible]
右細末每服貳錢食前米飲調下仍以破[illegible]及上而安
按令入

[illegible]治[illegible]脫肛
鱉頭[illegible]

脫肛

右為末以傳腸頭用軟紙[illegible]按入仍以方寸匕食前米
飲調下

[illegible]治脫肛
磁石半兩[illegible]
右為末每服[illegible]空心米飲調下

[illegible]治脫肛
大香附　荊芥穗[illegible]　縮砂[illegible]
右末每服[illegible]食前新水煎數沸即服小兒通用

[illegible]治大腸虛冷脫肛不收及腸風[illegible]
人參[illegible]　茯苓[illegible]　訶子[illegible]　枳殼[illegible]
白附子　生南星　生半夏　生附子[illegible]
黃瓜蔞[illegible]　陳皮[illegible]
雞冠花[illegible]　胡桃仁[illegible]
右細末醋煮糊丸梧桐子大每服貳拾圓空心溫酒下或[illegible]
飲送下

[illegible]治大腸虛而挾熱脫肛紅腫
縮砂　黃連　木賊
右末每服[illegible]米飲調下

[illegible]治腸[illegible]所攻脫肛紅腫肛門熱
[illegible]以[illegible]湯洗次用[illegible]調傅

[illegible]治大腸本虛風毒客熱乘之脫肛紅腫
敗[illegible]
右入[illegible]末夾和傳之即接入

[illegible]治脫肛[illegible]
先蒲黃以猪脂和傳即接入

[illegible]治脫肛
桑根上綠桑螺子[illegible]
右末以[illegible]和冷[illegible]後緩[illegible]

脫肛

[illegible]治脫肛

蝸牛子燒存性豬脂和傅

[illegible]治脫肛不收

木賊燒存性爲末摻以帛按入

[illegible]治脫肛不收以五倍子半兩末井水壹碗入鍋煎內煖火

煎十數沸入[illegible]又荷葉煎湯溫洗仍以五倍子末傅之

石灰方 治大腸積冷久年脫肛

石灰炒熱以帛包裹肛坐其上冷又別換仍以[illegible]末傅

[illegible]小兒痢後風邪入大腸脫肛不收以此散風邪加[illegible]

前[illegible]見[illegible]

[illegible]方

黃皮桑樹取葉煎三升煎帶溫

右以布盛坐小兒肛門輕手按入次用門臼中細塵摻之

[illegible]直取前後髮際折中橫取兩耳尖折中在頂

之中心端正螺毛處是也兩手捧兩灸灸則肛腸自收

[illegible]虫蝕肛門咽乾[illegible]方見[illegible]

增修仁齋直指方論卷之十四

積熱

增修仁齋直指方論卷之十五

# 積熱

附 潮熱 [illegible] [illegible] 便毒

積熱方論

消熱前輩雖用峻補自能生熱謂之積者何以乾斯久斯其所由來尚矣夫人偏陰不可以無陽偏陽不可以無陰惟在今後得中而已矯枉過正熱者憂焉然則欲去之積熱將何如曰三黃圓第一藥[illegible]雖然凡熱皆出於心熱甚則能傷血熱出於心[illegible]所不可闕熱能傷血四順清涼飲又不可無此自本自根之論也若夫酒後之熱飯後之渴最易積熱又當防於未然

積熱證治

[illegible] 治積熱蘊隆三焦皆熱大小便閉

黃芩 大黃 [illegible]等分

右剉細每服二錢[illegible]食後服

三黃圓 治前[illegible]項[illegible]等爲末煉蜜圓桐子大每[illegible]

[illegible] 治壯熱頭昏風痰壅塞大小便秘澀

大黃 甘草 當歸 芍藥

麻黃 荊芥穗 白朮 [illegible]

右末每服貳錢半生薑[illegible]少許同煎食後服

四順清涼飲 治血熱[illegible]

大黃 [illegible] 當歸 甘草 [illegible]

右爲粗末每貳錢半[illegible]前服[illegible]治血熱[illegible]

[illegible] 治心熱煩躁口赤小便淋閉

大黃 [illegible] 瞿麥 木通 滑石

萹竹 車前子 山梔仁 甘草 各等分

右剉每服二錢入燈心煎食後服大忌心熱要得小便流[illegible]

而出

**甘露飲** 治諸熱發熱

生乾地黃 熟地黃 天門冬 麥門冬去心

黃芩 枇杷葉去毛 山茵陳 枳殼麩炒

石斛 甘草炙各等分

右末每服貳錢半食前煎服加犀角尤佳

**導赤散** 治諸熱利小便

生乾地黃 木通 荊芥 地骨皮

桑白皮 甘草炙 北梗各等分

右剉每三錢薑三片煎服

**甘豆湯** 治諸熱煩渴大小便澁

黑豆貳合 甘草貳錢

右七[illegible]薑七片井水煎汁服

**[illegible]湯** 治一切熱血熱眼熱[illegible]

黃連[illegible]

右以井水浸良久緩緩[illegible]內[illegible]湯[illegible]服

**牛黃凉膈圓** 治上焦壅熱口乾咽痛煩燥涎潮

馬牙硝 寒水石 硬石膏各[illegible] 甘草[illegible]

牛膽南星 紫石英 牛黃 腦子 麝香各[illegible]

右末煉蜜圓每兩作貳拾圓每服壹圓薄荷人參湯調下

**[illegible]圓** 取積下熱

雄黃 川鬱金 巴豆[illegible]

右末醋糊圓菉豆大每服伍圓加至七圓熱茶清下

**竹茹湯** 治胃熱嘔吐

實用此嘔吐以熱茶清調[illegible]

半夏[illegible] 甘草[illegible]

右剉散每服[illegible]竹茹[illegible]煎服或加[illegible]

**諸熱[illegible]圓[illegible]** [illegible]同用



# 痼冷

痼冷[illegible]論

右得其冷無物不[illegible]失其[illegible]無物不消人之飢飽飲食為[illegible]湯藥治之[illegible]其口腹不[illegible]以[illegible]而為之[illegible]痼也男子精冷女子帶下皆[illegible]冷氣之[illegible]以[illegible]泄[illegible]治之[illegible]其[illegible]湯精不[illegible]大[illegible]以[illegible]氣中[illegible]以[illegible]人所謂精不足者補之以味[illegible]加[illegible]回[illegible]腎水[illegible]心火[illegible]者[illegible]其[illegible]

**痼冷證治**

**[illegible]湯** 治[illegible]虛[illegible]

人參 白朮 白茯苓 甘草

桂 黃芪 當歸 川芎

右[illegible]每服[illegible]

熟地黃 白芍藥[illegible]

右剉散每[illegible]食前服加[illegible]

**[illegible]圓** 治[illegible]痼冷須加[illegible]

熟地黃 山藥 杜仲

北五味子 肉蓯蓉 牛膝

右末煉蜜圓梧桐子大每服伍拾圓食前鹽湯下

**八味圓** 治[illegible]

熟地黃 山藥 山茱萸

附子 澤瀉 牡丹皮 白茯苓 肉桂

右為末煉蜜圓梧桐子大每服叁拾圓食前鹽湯下

**[illegible]** 治[illegible]冷氣[illegible]

黑錫 沉香 木香 熟附子

[illegible]白芍藥 破故紙 [illegible]
陽起石 [illegible] 肉豆蔻 [illegible]
右用封鐵鈿如常法 [illegible] 炒干研上以火煅候冷研
極細餘藥并末同研 自朝至暮以黑爲度 酒麪糊圓桐子
大空心乾再三五十圓空心溫酒鹽湯下 婦人艾醋湯下 本方加鹿茸
〇[illegible]白术 [illegible] 黃芪 [illegible] 治腎元虛憊
升降水火 助陽接真 治吐逆 [illegible] 頭運眼花腰疼
[illegible]吐瀉
好硫黃 兩 黑錫 水銀 朱砂 各
右淨鐺熔以厚紙布扎柄先熔黑錫去滓淨 放水銀
用鐵匙攪 [illegible] 漸入其中 或 [illegible]
只急手攪 [illegible] 令 [illegible] 得 [illegible] 放
地下 [illegible] 令冷 即 [illegible] 以紗篩出 [illegible] 粉 其 [illegible] 碎者再炒
爲末 [illegible] 以 [illegible] 以熟 [illegible]
入 [illegible] 攪 [illegible] 黃 [illegible] 上 [illegible] 過 [illegible] 又過入上再 [illegible]
炒得 [illegible] 成 [illegible] 和了 [illegible] 放冷爐上 [illegible] 勿令
冷又須在 [illegible] 微微火上少頃入水銀以鐵匙頻 [illegible] 勿令
青煙上 煙上便是了 水銀又次入朱砂末 [illegible] 攪炒令十分調
和即傾放地下 [illegible] 研爲末糯米糊圓菉豆大每服
拾圓鹽湯空心下
靈砂丹 [illegible] 臟冷神效
好硫黃 [illegible] 兩 水銀 [illegible] 兩
右修煉家有此成者 [illegible] 研細糯米糊圓小麻子大每服伍柒
圓加至拾伍圓空心人參湯 [illegible] 或鹽湯下 [illegible] 氣偏墜木
腎腫疼炒茴香入酒 [illegible] 下〇 [illegible] 生薑 [illegible] 湯
[illegible] 湯下〇 [illegible] 汗小便多 [illegible] 煎湯下 [illegible] 不已
[illegible] 湯下〇脹滿腹痛 [illegible] 湯下〇 [illegible] 胃 [illegible] 湯
[illegible] 煎湯下〇白 [illegible] 白茯苓 [illegible] 下〇中 [illegible] 木

木香湯研磨〇走注風遊走疼痛 [illegible] 〇腹痛木瓜湯下
〇氣滯 [illegible] 湯下〇婦人血痛氣痛 [illegible] 酒
醋各半煎湯下〇小兒驚搐沉困胃疏神脫人參 [illegible] 煎湯
吞下
椒附丸 治腎氣上攻項背不能轉側亦治冷痺不仁
熟附子末 正川椒
右每服附子末貳大錢匕川椒貳拾壹粒用白麪填滿水盞
半 [illegible] 煎半去椒入鹽少許通口空心服
大凡腎氣須以川椒引而歸經則安矣 又一證腎虛血寒氣逆
而脹 [illegible] 足 [illegible] 中脘秘滿兩眼多眵此是逆血也 二陳湯加官
桂 [illegible] 若大便澀更加 [illegible] 二陳湯 方見 [illegible]
[illegible] 方見水 [illegible] 門

## 秘澁 附 轉脬 便多

小便不通方論

腎主水 膀胱爲之府 水潴於膀胱而泄於小腸 實相通也 然小腸獨應於心者何哉 蓋陰不可以無陽 水不可以無火 水火既濟 上下相交 此榮衛所以流行 而水竇開闔 所以不失其司耳 惟夫心腎不濟 陰陽不調 故內外關格 而水道澀 傳送失度 而水道澀 熱則不通 冷則不禁 其熱盛者 小便閉而絕無 其熱微者 小便難而僅有 腎與膀胱俱虛 客熱乘之 故不能制水 水挾熱而行澀焉 是以數起而溺有餘瀝 腎與膀胱俱冷 內氣不充 故胞中自滑 所出多而色白焉 是以遇夜而陰盛愈多 若夫下焦蓄血 其與虛勞內損 則便溺自遺而不知 下焦虛寒 不能溫制水液 則便溺欲出而不禁 是皆不與心 [illegible] 通 故 [illegible] 或熱而胃 [illegible] 隨之矣 然自今心氣旺盛 小便澀滯 以清利行之 如 [illegible] 之類是也 心氣虛怯 小便滑利 以溫和益之 如 [illegible] 人參之類是也 須論其間腎實 [illegible]

皆可以暴腸而反或者膝比謂疏詳於腎而略於心其可乎哉然小腸之與膀胱心腎所主固也然素問有云水之本在腎其末在肺則知天一之水自上而下相為貫通亦猶心腎之不可不升降也昧者從聞忽略小便使水氣上逆乘肺喘滿咳嗽亂争鳴其來不可御於此見肺主氣也小便澁滑又當調其氣焉毋徒曰[illegible]可以滲肺經之水

小便不通證治

[illegible]湯 治心腎有熱小便不通

生車前草搗取自然汁半盞入蜜一匙調服

[illegible]湯 治心腎有熱小便不通

赤伏苓　木通　車前子　桑白皮炒
荊芥　燈心　赤芍藥　甘草微炙
生蒲黃　滑石等分

右末每服貳錢葱頭壹片[illegible]伍葉煎湯調下

八正散 治心經邪熱小便赤澁不通方見[illegible]門

五苓散 方見水[illegible]門 加赤伏苓治小便不通每服貳錢用[illegible]名壹握煎湯調下

[illegible]湯 治心腎虛而客熱乘之小便澁而數數而遲

赤伏苓　生乾地黃　黃耆　桑螵蛸
地骨皮　人參　北五味子　兎絲子酒浸研
甘草炙各等分

右細剉每服叁錢新水煎臨熟入燈心貳拾莖溫服

[illegible]圓 治腎虛小便數而遲如欲滲之狀或虛勞內損遺泄或下焦虛寒小便欲出而不禁通用方見消渴門

[illegible]圓 治下焦虛冷小便多或遺泄或欲出而不禁

鹿茸酥炙　肉蓯蓉　當歸　雞內金
龍骨　牡蠣　赤石脂　禹餘粮
川白薑　益智仁　巴戟　乳香



右細末糯米糊圓桐子大每服柒拾圓空心鹽湯下

[illegible]湯 治下焦蓄血或水或小腹急痛內外有熱加生[illegible] 方見[illegible]門

大小便不通證治

[illegible]散 治小便大便不通[illegible]壹兩不得洗帶土[illegible]壹塊[illegible]拾壹粒[illegible]貳匙同研[illegible]熱撫臍中以帛扎定良久氣透自通不然再換[illegible]劑

轉胞證治

[illegible]方 治胞轉小便不能通先用

良薑　葱頭　紫蘇莖葉各壹握

右煎湯密室內熏洗小腹外腎肛門留湯再添蘸帛洗以手拊摩臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣次用

蜀葵子　赤伏苓　赤芍藥　白芍藥各半兩

右剉每服叁錢煎取清汁再煨[illegible]叁圓研[illegible]壹半錢[illegible]前溫服。又法炒鹽半斤[illegible]熨小腹

便多證治

[illegible]方 治腎虛多溺或小便不禁而濁

葫蘆巴炒　故紙炒　川楝肉[illegible]　山茱萸
大熟地黃　益智仁　鹿茸[illegible]　龍骨
代赭石　熟艾[illegible]　赤石脂各叁分　丁香
海螵蛸　滴乳香　禹餘粮
沉香

右細末水煮糯米糊圓桐子大每服伍拾圓食前[illegible]湯送下

大便祕澁方論

凡人五味之秀者養臟腑諸陽之濁者歸大腸大腸所以司出而不納也今停蓄蘊結獨不得其疏導何哉抑有由矣熱邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾此大腸之挾熱然也虛

人臟冷而血脈枯老人腸寒而氣道澀此大腸之挾冷然也腹脹痛悶胸痞欲嘔此證結聚以宿食留滯得之腸胃受風涸燥秘澀此證閉塞以風氣燔灼得之也大氣不下降而穀道難噫逆泛滿必有其證矣治法熱者[三黃湯]冷者[半硫圓]宿食者[脾積圓]風秘者[麻仁圓]氣不下降[桔梗枳殼湯]閉在精擇而審處其閒然挾冷挾熱固自有法究之矣然而大腸與肺爲表裏大腸者諸氣之道路關焉熱則清利冷則溫利積聚者挨其積風壅者疏其風是固然爾孰知流行肺氣又所以爲四者之樞紐乎不然叔和何以曰肺與大腸爲傳送

大便秘澀證治

[大黃飲子]治身熱煩燥大便不通

川大黃濕紙裹煨 杏仁去皮尖 梔子仁 川升麻

枳殼浸去穰麩炒各半兩 生地黃壹兩 人參

黃芩 甘草炙各貳錢半

右剉散每服叁錢[生薑]伍片[豉]貳拾壹粒[烏梅]壹枚煎服

[三黃湯][三黃圓]治熱證大便結 方見熱門

[甘露飲]治熱證風證大便不通 方見熱門

[金液丹]治大便挾冷結滯用[麻仁][杏仁]煎湯下 方見痼冷門

[半硫圓]治冷秘風秘老人秘結

透明硫黃研十分細 圓白半夏湯浸洗七次焙乾各等分

右末[生薑]汁煮白麪糊圓桐子大每服貳拾圓[薑]湯下或用[葱]白壹莖[生薑]叁片煎熱入[阿膠]貳片溶開食空送下

[膠蜜湯]治老人虛人大便秘澀

連根葱白叁片

右新水煎去葱入[阿膠]炒貳錢[蜜]貳匙溶開食前溫服

[[illegible]圓]大便秘澀通用

杏仁去皮尖 枳殼制 麻仁 陳皮各半兩

阿膠炒 防風各貳錢半

右末煉蜜圓桐子大每服伍拾圓老者[蘇子]煎湯下壯者[荊芥]泡湯下

[脾積圓]治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘結

蓬莪朮叁兩 京三稜貳兩 良薑半兩 以上用米醋壹升於甆瓶內煮乾乘熱切碎焙

青皮去白壹兩 南木香半兩 不蛀皂角叁大錠燒存性

百草霜村庄家者

右爲細末用[川巴豆]半兩只去殼研如泥漸入藥末研和得所麪糊圓麻子大每服伍圓加至拾圓[橘皮]煎湯下

[木香逐氣圓]治食積氣滯通利大便兼治脾氣小腸氣諸氣攻刺腹痛

橘紅 青皮去白 檳榔各半兩 南木香貳錢半

川巴豆肉壹錢半研如泥漸入藥

右件並末用[生薑]自然汁調[神麯末]煮糊圓麻子大每服拾圓[薑]湯下如氣攻腹痛[枳殼][木香]煎湯下

[三棱圓]治積滯泄痢心腹刺痛中滿積聚

南木香 丁香 青皮去白 橘紅

京三稜 肉豆蔻生 白豆蔻仁 五靈脂

蓬莪朮 縮砂仁各壹兩半

右細末用[巴豆]半兩研如泥漸入藥末研和以麪糊圓麻子大每服叁圓加至伍柒圓[生薑]湯下

[[illegible]]治大便積日不通

大好[illegible]壹兩入[illegible]

[[illegible]]煎湯下

[麻仁圓]治風秘及脾約證小便數大便秘 方見[illegible]用

右以棗肉[illegible]細以[illegible]送下

[[illegible]圓]治風氣壅滯大便秘結

[[illegible]圓]治風壅秘結

枳殼(半兩) 防風 羌活 獨活
檳榔 白芷 威靈仙 蔓荊子(炒各[illegible])
麻仁 杏仁 甘草(各[illegible])
右為末每服貳錢半[illegible]食前服

**橘杏枳殼湯** 治氣不下降大便不通 方見氣門 加[illegible]煎

**大七氣湯** 治氣不下降大腑澀滯
香附(炒) 天台烏藥 枳殼([illegible]) 縮砂仁([illegible])
蘇子(半兩) 青木香 甘草(炙各[illegible])
右末每服貳錢[illegible]煎湯調下或吞[illegible]丸少許

**[illegible]湯** 治氣不升降才便不通 方見[illegible]門 加[illegible]煎此藥流行肺氣

**[illegible]丸** 治氣秘不大便用[illegible]煎湯下或[illegible]送下
[illegible]丸 方見[illegible]門 [illegible]丸 方見[illegible]門 [illegible]各分[illegible]研和劑圓大凡腹痛而嘔欲利其大便諸藥皆吐惟[illegible]丸用[illegible]汁泡湯下最妙

**通秘方** [illegible]大皮以綿裹納後部即通

**又方** [illegible]丸 方見小便門 臨用入[illegible]少許尤速

**[illegible]方** [illegible]用[illegible]內後部自通

**[illegible]湯** 治婦人產前產後大便不通
當歸 川芎 防風 枳殼([illegible]) 甘草([illegible])
右細剉每服叁錢食前[illegible]煎服





# 五疸 (附) 諸淋

## 五疸論

濕與熱鬱蒸於脾面目肢體為之發黃此即疸也疸之名有五 曰黃汗 發熱不渴身腫而汗汗如黃檗汁者 曰黃疸 此胃中蓄熱汗出浴水得之已食如飢但欲安臥小便如黃檗汁者 曰酒疸 此酒[illegible]得之食則[illegible]心忪而不自安者 曰穀疸 此失飢大食胃氣衝熏所得之其或飲酒常多進食常少[illegible]熱入水之[illegible]當風以致心中懊憹足脛腫滿是之謂酒疸 大勞大熱而交接[illegible]未[illegible]冷室以致發熱惡寒小腹滿急[illegible]是之謂女勞疸 五者雖不同其為黃則一 自本自根未有非熱[illegible]能[illegible]熱也又皆無輕重之別乎濕氣勝則如熏黃而晦熱氣勝則如橘黃而明蓋脾主肌肉[illegible]色[illegible]濕[illegible]內[illegible]熱[illegible]不容[illegible]於外矣自其濕熱[illegible]而傷血此又為[illegible]何以明之疸發之黃小便不利血證之黃則小便自利且[illegible]熱於大小便中入[illegible]多有腹脹[illegible]之微[illegible]須[illegible]大要[illegible]陰陽[illegible]與陰陽[illegible]勢[illegible]者則寸口無脈[illegible]曰[illegible]以[illegible]不得可用五疸而[illegible]為其[illegible]腹[illegible]全[illegible]鼻[illegible]入[illegible]與大形如[illegible]直視[illegible]絕環口[illegible]黑由汗[illegible]黃為脾[illegible]此[illegible]所[illegible]而[illegible]者[illegible]黑疸之能[illegible]脈[illegible]大[illegible]與[illegible]為[illegible]一名女勞[illegible]黑疸脈[illegible]大[illegible]而[illegible]已食如飢[illegible]

五疸證治

[illegible] 治疸用茵小便出血或小便如血用之皆效[illegible]
[illegible]於新汲水[illegible]日常進兩服小便漸白而[illegible]
[illegible]黃汗自出[illegible]小便不利

白芍藥 [illegible] 桂枝 [illegible] 甘草 [illegible]
黃耆 [illegible] 黃芩 [illegible]
右剉散每服四錢水一盞半煎五分[illegible]煎服覆取微汗未
汗再服
[illegible] 治黃疸通用
茵陳 [illegible] 龍膽草 山梔仁
山茵陳 黃芩 等分
右爲末每服二錢新水煎服
一清飲 治疸證發熱諸熱通用
柴胡 [illegible] 赤伏苓 桑白皮
川芎 [illegible] 甘草 [illegible]
右剉每服三錢薑棗煎服
[illegible] 治濕熱發而發黃小便秘澀頭汗而渴 [illegible]
五苓散 治疸證通用 [illegible] 加 香 [illegible] [illegible] [illegible]
發苗或或 [illegible] 調下亦得
山茵陳湯 治黃疸大小便秘澀
梔子 [illegible] 茵陳 [illegible] 枳實 [illegible]
赤伏苓 葶藶 甘草 [illegible]
右剉每服三錢薑三片煎服
五苓散 [illegible] 加 山梔 柴胡 同煎 [illegible]
治熱疸小便秘澀
柴胡 [illegible] 治熱疸
柴胡 [illegible] 甘草 [illegible] 白鮮根 [illegible]
右件以水 [illegible] 時時服 [illegible]
生薑方 治疸
生薑燒灰存性爲末新汲水調方寸匕日三服
[illegible] 治發疸 [illegible] 通用 ○ 一清飲 加 [illegible]
少許 [illegible]



[illegible] 治飲酒行房 [illegible] 成黃疸
伏苓 伏神 [illegible] 山藥 [illegible]
黃耆 [illegible] 人參 甘草 [illegible] 遠志 [illegible]
木香 辰砂 [illegible] 麝香 [illegible] 桔梗 [illegible]
右細末每服二錢加 [illegible] 小 [illegible] 煎 [illegible] 調下日三服
[illegible] 治酒疸
[illegible] 四兩 [illegible] 以酒 [illegible] 日乾爲末粟米糊爲
圓桐子大每服三四十圓以 一清飲 加 [illegible] 入 [illegible]
送下
[illegible] 治酒疸 [illegible] 以上 [illegible] 茵陳蒿
伏苓 [illegible] 當歸 黃芩 茵陳 [illegible]
白木 枳實 [illegible] 甘草 [illegible] 杏仁 [illegible]
前胡 乾葛 [illegible] 半夏 [illegible]
右剉散每服三錢水一盞薑五片食前煎服凡酒疸熱疸大
便秘者可 [illegible]
[illegible] 治酒疸肚脹
草拾 荊芥穗 不灰川楝子 [illegible]
[illegible] 烏梅 甘草
右件等分於石臼中搗細用 [illegible] 以自己 [illegible] 小便 [illegible]
首尾 [illegible] 小便 [illegible] 兩 [illegible] 明 [illegible] 清汁
續用 [illegible] 服自 [illegible]
水從小便出而肚不脹 [illegible]
大黃方 治酒疸熱疸 大黃 [illegible] 服
[illegible] 圓 治色疸
[illegible] 石蓮肉 [illegible]
山藥 [illegible] 白伏苓 [illegible]
右爲末山藥糊圓桐子大每服五十圓用 [illegible] 多加伏苓 [illegible] 煎
湯下 [illegible]

四君子湯 加味治色疸

人參各兩 白茯苓各兩 白朮各兩 甘草炙各半兩

加黃耆各兩 白芍藥 白扁豆炒各兩

右剉細每服四錢薑五片棗二枚煎服

[illegible]方 生車前草[illegible]淋研細井水調下

又方 車前子炒末二錢米飲調下止[illegible]

# 諸淋

諸淋方論

諸淋所發皆腎虛而膀胱生熱也水火不交心腎氣鬱遂使陰陽乖舛清濁相干蓄在下焦故膀胱裏急膏血砂石從小便道出焉於是有欲出不出淋瀝不斷之狀甚者窒塞其間則令人悶絕矣大凡小腸有氣則小便脹小腸有血則小便澀小腸有熱則小便痛痛者為血淋不痛者為尿血敗精結者為沙精結散者為膏金石結者為石指本於病各從其類也執剝之法流行滯氣疏利小便清解邪熱其於調平心火又三者之用焉心清則小便自利心平則血不妄行最不可姑息用補氣得補而愈脹血得補而愈澀熱得補而愈盛水竇不行加之穀道閉遏未見其有能生者也雖然腎氣虛弱囊中受寒亦有挾冷而小便淋澀者其狀先寒戰而後溲便盖冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒戰而成淋正氣勝則寒戰解而得便溺也況又有胞系轉戾之不通者乎是不可以無辨胞轉證候臍下急痛小便不通凡強忍小便或尿急疾走或飽食忍尿飽食走馬忍尿入房使水氣上逆氣迫於胞故屈戾而不得舒張也胞落則殂

諸淋證治

消石散 治諸淋

消石白者為細末每服貳錢○血淋[illegible]煎湯調下○勞淋[illegible]

淋小便赤而淋瀝臍下急痛新水調下○氣淋[illegible]煎湯下○[illegible]

淋小腹脹滿尿後常有餘瀝[illegible]煎湯下 石淋[illegible]

尿不能出尿中有沙石令人悶絕此須將消石用紙隔炒

紙焦為度再研細[illegible]煎湯調下

[illegible]散 治諸淋五淋

[illegible]巴 海金沙 [illegible] 滑石各兩

右為細末每服貳錢生多用燈心木通麥門冬草新水煎入

蜜調下

五淋散 治諸淋

赤茯苓 赤芍藥 山梔仁

生甘草各等分 當歸 黃芩各等分

右為細末每服貳錢水一盞煎至八分空心服或以五苓

散和之用竹園麥門冬草燈頭燈心煎湯調下

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子 淡竹葉

赤茯苓 燈心 荊芥穗

右件分作兩劑每用新汲水煎候熟[illegible]

[illegible]散 治諸血下[illegible][illegible]新汲水煎湯調

下[illegible]血淋[illegible]加[illegible]切不得用[illegible]

止澀之劑

[illegible]治血淋熱淋

黃芩剉 新水煎[illegible]服

[illegible]治熱淋[illegible]

[illegible]治尿血

[illegible]為細末每服貳錢[illegible]煎湯調下

[illegible]

生乾地黃 木通 黃芩 生甘草

車前子不炒　山梔仁　川芎　赤芍藥各等分
右件為末每服貳錢入竹葉拾片燈心貳拾莖煎服
**車前草方** 治小腸有熱血淋急痛
生車前草洗淨臼內搗細每服准一盞許井水調濾清汁食前服若沙石淋則以煆寒水石為末和入新水調下
**瞿麥湯** 治血淋尿血通用
瞿麥　赤芍藥　[illegible]　車前子不炒
赤茯苓　石韋去毛　桑白皮炒　阿膠炒
黃芩　生乾地黃洗焙　甘草炙
白茅根洗曬乾各等分
右為細末每服貳錢入生薑[illegible]煎湯調下如無以[illegible]
止用柔花
**葵子散** 治血淋沙淋小便澀痛
[illegible]冬葵子壹斤地為末每服貳錢生甘草煎湯調下亦治
小腸氣虛熱痛當用木通燈心赤茯苓麥門冬煎湯調下
**[illegible]** 治尿血方用[illegible]內加[illegible]少許用燈心煎湯[illegible]新水
調下
**柴胡散** 治淋渴好酒過度房勞後小便下血
半夏　赤伏苓去皮　赤芍藥　川芎　半夏湯洗
前胡　柴胡　青皮　枳殼
地榆　桑白皮　白茅根　燈心
甘草[illegible]半
右剉細每服叁錢薑[illegible]片棗貳枚新水煎服
**[illegible]** 治小便出血加白茅根煎
治血淋諸淋小便痛不可忍
**[illegible]** 治心腎氣熱膀胱不利小便淋痛及諸熱淋澀
生乾地黃　木通　山梔仁　赤伏苓
赤芍藥　滑石　大黃



右為末煉蜜圓如梧子大每服貳拾圓食後煎[illegible]送下
水[illegible]得
**[illegible]圓** 治濁漏[illegible]清[illegible]成膏淋黃赤白帶如肥膏也
白伏苓　[illegible]　鹿角霜　秋石
右末研和糕糊圓梧子大每服伍拾圓人參煎湯下
**[illegible]** 治沙石淋痛
滑石　石膏半兩　石韋去毛　瞿麥穗
木通　冬葵子
右細末每服貳錢半用葱頭貳片燈心[illegible]搗新水煎
[illegible]前湯調下
**[illegible]** 治沙石淋痛
硼砂　琥珀　赤伏苓
陳橘皮　[illegible]　瞿麥子
右末每服貳錢半用葱白貳片去心燈心叁拾莖[illegible]
匙新水煎取汁調下
**木香湯** 治冷氣[illegible]小便淋澀作痛身熱冷清
木香　木通　檳榔　舶上茴香炒
當歸　赤芍藥　青皮去白　澤瀉
辣桂　橘紅　甘草炙
右剉散每服叁錢薑五片煎服
**沙石淋方**
黑豆[illegible]　粉草[illegible]
右以新水煎熟入滑石末壹錢調和空腹服

新編仁齋直指方論　卷之十六

增修仁齋直指方論卷之十七

# 消渴

附 脹滿 虛腫

## 消渴方論

水包天地前輩嘗有是說矣然則中天地而為人水亦可以包潤五臟乎曰天一生水腎實主之膀胱為津液之府所以宣行腎水上潤於肺故識者以肺為津液之臟自上而下三焦臟腑皆囿乎天一真水之中素問以水之本在腎末在肺者此也真水不竭安有所謂渴哉人惟淫欲恣情酒麵無節酷嗜炙煿糟藏鹹酸酢醢甘肥腥羶之屬復以丹砂五石濟其私於是炎火上熏臟腑生熱燥氣熾盛津液乾焦渴引水漿而不能自禁矣渴之為病有三曰消渴曰消中曰消腎分上中下三焦而應焉熱氣上騰心虛受之心火散漫不能收斂胸中煩躁舌赤唇紅此渴引飲常多小便數而少病屬上焦謂之消渴熱蓄於中脾虛受之伏陽蒸胃消穀善飢飲食倍常不生肌肉此渴亦不甚煩但欲飲冷小便數而甜病屬中焦謂之消中熱伏於下腎虛受之腿膝枯細骨節酸疼精走髓空引水自救此渴水飲不多隨即溺下小便多而濁病屬下焦謂之消腎自腎而析之又有五石過度之人真氣既盡石氣獨留而腎為之石陽道興強不交精泄謂之強中消渴輕也消中甚焉消腎又甚焉若強中則其斃可立待也雖然真水不充日從事於杯勺之水其間小便或油膩或赤黃或泔白或渴而且利或渴而不利或不渴而利但所食之物皆從小便出焉甚而水氣浸漬溢於肌膚則脹為腫滿猛火自炎留於分肉則發為癰疽此又病之深而證之變者也總前數者其何以為執劑乎吁此虛陽炎上之熱也叔和有言虛熱不可大攻熱去則寒起請援此以為治法○又曰消渴證候人皆知其心火上炎腎水下泄小便愈多津液愈涸飲食滋味皆從小便消焉是水火不交濟然亦孰知脾制腎水而心腎二者皆取氣於胃乎治法總要當服真料參苓白朮散可以養脾自生津液兼用好粳米煮粥以膂肉碎細入鹽醋油酒葱椒茴香調和少頃粥熟乃投入以此養脾則水有所司又用[illegible]及對入[illegible]中密扎於斗米上蒸爛添些蒸飯臼中杵粘圓如桐子每服百粒食後米飲下可以清心止渴

## 消渴證治

[illegible] 三消皆可通用亦治白濁

兔絲子(酒浸焙乾別研為末)　北五味子(略炒)　白伏苓(各一兩)　石蓮肉(去殼二兩)

右末用[illegible]陸兩末為糊和杵三百杵圓桐子大每五十圓食前米湯下神妙

[illegible] 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

人參　遠志(去心薑汁炒)　當歸　川芎　熟地黃　白伏苓　黃芪(蜜炙)　北五味子　甘草(炙各半兩)　天花粉(各一兩)

右剉細每服三錢食前煎服

[illegible] 通用

生地黃(洗切研細取汁)　人參(半兩)　白伏苓(一兩)

右將[illegible]洗切研細以新水實搗調服同蜜煎至半次入[illegible]末拌和瓶器盛收起旋服

[illegible] 治消渴證

黃芪　伏神　瓜蔞根　麥門冬(去心)　北五味子　甘草(炙)　生乾地黃(各一兩半)

右剉細每服五錢新水煎服

[illegible] 治諸渴疾

川黃連(去鬚一兩)　淨白扁豆　知母　伏神　麥門冬(去心)　大熟地黃(各兩)　瓜蔞根

粟米各三兩　人參一兩

右末臼中同搗爲散入淨猪肚內縫密置甑內蒸極爛便搗

再杵細若硬加少蜜圓梧桐子大蒸汁下伍拾丸或粥飲下

又方　一味黃連末入猪肚內縫密蒸熟粳米上蒸熟日漸杵丸

如前法

川黃連圓　治諸渴

川黃連五兩　白天花粉　麥門冬去心各一分半

右末以生地黃汁并牛乳汁夾和搗圓梧桐子大每服參拾丸粳

米飲下

玉壺圓　治煩渴口乾

麥門冬去心　人參　伏苓　黃耆

烏梅肉　甘草各一兩　瓜蔞根　乾葛各一兩半

右末煉蜜丸彈子大每壹丸溫湯嚼下

止渴飲

枇杷葉拭去毛炙　白乾葛　生麥門冬

大烏梅十个　大草果二个　淡竹葉　甘草各半兩

右剉每肆錢新水煎服

生天花圓　治消渴通用

黃連二兩童便浸三宿　白扁豆二兩去皮炒

辰砂　白伏苓　牡蠣粉　知母

苦參　天花粉　鐵粉各半兩　蘆薈一分

金銀箔各二十片

右末取瓜蔞根生汁和生蜜圓梧桐子大每服參拾丸麥門冬湯下

繰絲湯　治渴疾繰絲湯熱時飲之爲妙

又方　牛乳細呷○又方　田螺搗取汁時飲少許

黃蠟圓　治濁止渴

黃蠟　雪白伏苓各四兩

右伏苓爲末鎔蠟和圓彈子大每壹丸不飢飽細嚼下

　　　　　　

□□圓　治渴神效煮繰絲湯任意飲之頓效如非時以繰絲

綿煎湯服

□□□　治渴證小便滑數而有油濁　用時

白伏苓煎湯下

天花粉圓　治消渴飲水多身體瘦

天花粉　黃連去鬚各一兩　伏苓　當歸各半兩

右末煉蜜圓梧桐子大每參拾丸空心茅根煎湯下

瓜蔞圓　治消渴骨蒸

黃連淨剉用瓜蔞汁浸一宿曬乾凡七次

右末瓜蔞汁丸梧桐子大每參肆拾丸半飢飽熟水下或伍拾

丸米飲下

人參圓　治消渴引飲無度

人參　瓜蔞根等分

右末煉蜜丸梧桐子大每參拾丸麥門冬煎湯下

天花散　治消渴

天花粉　生乾地黃各一兩　乾葛

麥門冬去心　北五味子各半兩　甘草一分

右麁末每服參錢粳米佰粒同煎服

錢氏白朮散　治消中消穀善飢

人參　白朮　白伏苓　甘草炙

藿香葉一兩　白乾葛二兩　木香半兩　柴胡　枳殼

加北五味子

右麁末每參錢新水煎服

伏神圓　治消中煩熱消穀小便數

人參　伏神　生乾地黃　黃連

麥門冬去心　枳殼　牡蠣粉各一兩　石蓮肉

黃耆　知母各半兩　瓜蔞根二分

右末煉蜜同搗三百杵丸梧桐子大每伍拾丸清粥飲下

小菟絲子圓治消腎以茯苓湯或五味子湯煎湯下 方見[illegible]

枸杞子圓治消腎久渴困乏小便滑數

枸杞　菟絲子酒浸　黃耆炙

牡礪粉　牛膝　白伏苓　熟地黃洗　麥門冬去心各一兩

雞內金一兩炙　桑螵蛸　瓜蔞根各三分　山茱萸

牡丹皮各半兩

右末煉蜜和搗三百杵丸桐子大每伍拾丸食前粥飲下

八味圓治消腎補虛止渴 方見痼冷門 本方去附子以北五味子代之內鹿茸截塊再炙[illegible]再熬

鹿茸圓治消腎不渴肌肉瘦削小便渾數而濁如欲淋之狀

兔絲子酒浸　山茱萸去核　當歸　益智仁各十兩

川練肉　牛膝　葫蘆巴炒　厚杜仲姜剉炒

巴戟去心　蓯蓉酒浸焙各三分半　乳香一分

右末糯米糊丸桐子大每伍拾丸棗湯或鹽湯食前服

鹿茸丸治腎虛水涸煩渴勞倦

鹿角膠二兩　沉香半兩　澤瀉[illegible]　覆盆子

白伏苓　人參　宣木瓜　薏苡仁炒

黃耆炙　熟地黃酒洗再蒸　蓯蓉酒浸焙　兔絲子[illegible]

北五味子　石斛炒　當歸各一兩　磁石一分

右末煉蜜圓桐子大朱砂衣每伍拾圓空心棗湯下

[illegible]方治消渴有虫 出夷堅志 苦楝根取新白皮實搥切焙入麝少許水貳盞煎至壹盞空心飲之雖困頓不妨自後下虫三四條狀如蛔虫其色正紅而渴頓止乃知消渴有虫耗其津液

# 脹滿

## 脹滿方論

陰陽愆伏榮衛凝澁三焦不能宣行脾胃不能傳布此脹滿之所由生也曰穀脹曰水脹曰氣脹曰血脹或冷或熱又不可以一槩別失飢傷飽痞悶停酸旦則陰消陽長穀氣易行故能飲食暮則陰長陽消穀氣難化故不能食是爲穀脹脾土受濕不能制水水漬於腸胃而溢於體膚漉漉有聲怔忪喘息是爲水脹七情鬱結氣道壅隔上不得降下不得升身體大而四肢瘦削是爲氣脹煩燥漱水迷忘驚狂痛悶嘔惡虛汗厥逆小便多大便黑婦人尤多見之是爲血脹陽挾爲邪則身熱有挾脹滿而咽乾陰挾寒爲邪則吐不下食脹滿而自利隨證劑量毋固執汗抑猶有虛實之辨焉又若腹中常脹外堅內痛按之不陷法當疏之疏利虛者時脹時減虛氣留滯按之則濡法當以溫藥和之此又出於隨證劑量之外其若久病羸乏卒然脹滿喘息不得與夫臍心突起或下利頻頻百藥遍嘗未見一愈者耳

脹滿證治

[illegible]治七氣爲陽飲食不消穀脹氣脹通用

人參　伏苓　厚朴製　橘紅

蓬朮　枳殼製　半夏麴　甘草炙

生白姜　辣桂　檳榔　木香[illegible]分

右剉末每服參錢薑三片棗貳枚煎服

大異香散治穀脹氣脹

京三稜　蓬朮　青皮　陳皮

半夏麴　藿香　北梗　益智仁

枳殼製　香附炒各半兩　甘草炙二分

右剉散每服參錢姜五片棗貳枚煎服

五膈寬中散治七氣留滯飲食不下氣兩膨脹 方見諸氣門

[illegible]圓治狂痛肚痛穀脹氣脹通用

蓽澄茄　白豆蔻仁　縮砂仁　青皮

蘿蔔子　木香各三分　肉豆蔻　茴香炒

辣桂　丁香各一分半　陳皮二分

右末飛麪煮稀糊圓如梧桐子大每服叁拾圓煎[illegible]湯下

〔木香順氣湯〕治氣滯脹滿宿食不消 方見諸氣門

〔大七氣湯〕方見積聚門 〔小半夏茯苓湯〕方見水飲門 二藥加檳榔

〔紅圓子〕〔撞氣阿魏圓〕各 並主水氣脹滿

〔[illegible]〕調榮衛利三焦行氣滯消腫 方見諸氣門 見水腫門

〔[illegible]〕治氣脹 方見[illegible]門

〔沉香化氣湯〕治陰陽交滯心腹脹滿飲食[illegible]積冷者[illegible]

〔人參芎歸湯〕治血脹

當歸 半夏 製各[illegible]分 川芎 壹兩 蓬朮

木香 縮砂仁 烏藥 甘草 各半兩

人參 辣桂 五靈脂 炒各壹分

右㕮咀散每服叁錢薑伍片棗貳枚紫蘇四葉煎食前服

〔[illegible]〕治冷則氣聚脹滿不下食

熟附子 當歸 厚朴 製 人參

橘紅 半夏 麪炒 生白薑 甘草 炙各壹兩

川椒 去合口者炒 分

右剉散每服叁錢薑叁片棗貳枚食前煎服

〔[illegible]〕治寒冷腫脹泄瀉 方見諸氣門

〔[illegible]〕治挾證脹滿

厚朴 制 枳殼 炒 北梗 各半兩 甘草 炙 大黃 蒸各一分

右剉每服叁錢薑伍片棗貳枚烏梅壹枚煎服

〔[illegible]圓〕

丁香 木香 各[illegible] 乾薑 壹兩 京三棱 [illegible]

大杏仁 [illegible] 巴豆 [illegible] 肥巴豆 [illegible]

黃蠟 [illegible] 麻油 [illegible]

右將〔[illegible]〕[illegible]研細末[illegible]二味研極細得所煉油蠟和成

劑油單裹斷圓如菉豆大每五七圓加至拾伍圓熟水下[illegible]

〔[illegible]圓〕方見[illegible]門 通利脹滿[illegible]可治[illegible]可



治瀉者[illegible]家服之有積則行無積則止若以此亦可治瀉痢

人已上數劑前利須多服之方却在此

## ○虛腫

虛腫方論

賢洛陽以病腫不治必為痼疾雖有扁鵲亦莫能為則知腫之危惡非他病比也夫人所以得全其性命者水與穀而已水則腎主之土穀則脾主之惟腎虛不能行水惟脾虛不能制水胃與脾合氣胃為水穀之海又因虛而不能傳化焉故腎水泛溢反得以浸漬脾土於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌肉而發腫矣其狀目胞上下微起肢體重着咳喘怔忪股間清冷小便澁黃皮薄而光手按成窟舉手即滿是也治法大要身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可下其間通利小便順氣和脾俱不可緩耳然而證雖可下又當權其重輕不可過用〔[illegible]〕猛烈之劑一發不收吾恐峻決者易固閉者難水氣復來而無以治之也雖然水之為腫特一耳曰風曰氣曰血合而有四焉風腫者皮麄麻木不仁走注疼痛氣腫者皮厚四肢瘦削腹脅脹膨其或煩躁漱水迷忘驚狂嘔逆煩悶皮間有紅縷赤痕者此血腫也婦人經脉壅閉敗血停瀦尤多見之然婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫者此但順氣安脾飲食無阻既產而腫自消若產後發虛則虛退而腫自消矣大凡虛腫先起於腹而後散於四肢者可治先起於四肢而後歸於腹者不治至若蠱脹而肚上有筋腹滿而大便滑泄久瘧而轉作虛浮與夫唇黑傷肝缺盆平傷心臍突傷脾足平傷腎背平傷肺皆為不治之診當明辨之○男從腳下腫而上女從身上腫而下或肉硬或手掌平並不治

虛腫證治

〔[illegible]〕治[illegible]有水〔[illegible]〕[illegible]治[illegible]不詳 方見[illegible]門

〔?〕多用〔?木香圓〕少用〔?〕藥末和合，以〔?〕湯下。治水腫〔?〕
效〔?〕
〔?白圓〕治十種水病積聚脹滿〔?〕痛久〔?〕諸風
吳茱萸〔?〕 柴胡 枳殼
石菖蒲 乾薑 肉桂 黃連
茯苓 人參 川椒 厚朴
皂角〔?〕 紫菀茸 巴豆〔?〕 川烏〔?〕
右細末，和巴豆研勻，蜜圓梧子大，每服三圓，食後薑湯下，加至五
〔?〕圓。〔?〕治水腫，以〔?白圓〕用〔五苓散〕加〔?〕入〔?〕汁略煎
送下〔?〕
〔?湯〕
沉香 丁香 木香 青木香
藿香 川芎 赤茯苓 檳榔
枳殼 甘草 乳香 麝香
右麁末，每服貳錢，生薑叁片，紫蘇叁葉，〔?〕煎服。凡虛腫先用
消香〔?〕透其關絡，然後〔?〕證治之
〔?〕治水病浮腫
葶藶子 赤茯苓 牽牛末 桑白皮
甘草 半夏 川芎 檳榔
辣桂 青皮 陳皮 青木香
白色商陸〔?〕
右剉，每服叁錢，薑肆片，不飢不飽煎服
〔?〕〔?〕加〔?〕〔?〕〔?〕〔青木香?〕〔?〕治水氣
脹腹腫脛面〔?〕〔?〕〔?〕乃水腫要藥，〔?〕可〔?〕用或〔五皮散〕
送下，或〔?〕〔?〕無熱者〔?〕〔?〕下
〔?〕治水腫
牽牛〔?〕 葶藶〔?〕 〔?〕
澤瀉 木香 川椒〔?〕



右〔?〕先以〔?〕白二〔?〕水〔?〕入〔?〕酒〔?〕調〔?〕
三錢，空心服
〔行水圓〕治水腫氣脹
〔?〕巴 〔?〕 縮砂仁 蓽澄茄
川椒〔?〕 烏梅肉〔?〕
木香 牽牛〔?〕 巴豆肉〔?〕
右末，糊圓梧子大，每伍圓，食後薑湯下
〔?〕治〔?〕滿腹脹大〔?〕〔?〕乾嘔
人參 川厚朴 草果仁 良薑
訶子 川白朮 藿香 丁皮
蒼朮 貝橘紅 甘草 木香
肉豆蔻 縮砂仁 茯苓
右剉散，每服叁錢，水煎，食前服，仍以〔木香〕〔?〕〔?〕煎湯〔?〕〔?〕
〔?〕
〔?〕治肺〔?〕〔?〕水頭面浮腫
桑白皮 青皮 陳皮 檳榔
枳殼 赤茯苓 青木香 當歸
川芎 石葦 羌活 牽牛
半夏 葶藶 甘草
右剉，每服叁錢，薑肆片，煎服
〔?〕治風邪皮粗麻木不仁，或時與痛
麻黃 牽牛 甘草 杏仁
防風 半夏 芍藥 辣桂
白芷 防己 當歸 川芎
羌活 獨活 檳榔
右剉，每服叁錢，薑肆片，紫蘇三葉，煎服
〔?〕治〔?〕〔?〕竹〔?〕腹滿〔?〕〔?〕不〔?〕
紫〔?〕 縮砂 〔?〕 枳殼

青皮　陳皮　三稜　蓬朮
檳榔　辣桂　白豆蔻仁　蓽澄茄
木香各壹两　半夏麴　蘿蔔子生　甘草炙各壹分半
右剉每服叁錢薑棗煎服

分氣紫蘇飲治氣為痰飲所隔心下堅脹名曰氣分
枳殼麸炒　白朮　紫蘇莖葉　辣桂
陳皮　檳榔　北梗　木香
五靈脂炒各壹分　半夏麴　伏苓　甘草炙各壹分半
右剉每服叁錢薑肆片煎服

調經散治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮肉赤紋名曰血分
華陰細辛　莪朮　辣桂　赤芍藥
延胡索　當歸　川芎　白芷
檳榔　大腹皮　桑白皮炒　瞿麥穗
赤伏令　陳皮　葶藶炒香　大黄濕紙煨各壹分
甘草炙分半
右剉每服叁錢薑棗煎食前服

又方治血分如前
延胡索　當歸　川芎　牛膝
川續斷　赤芍藥　辣桂　白芷
五靈脂炒　羌活各壹分　赤伏令　牽牛炒取末
半夏麴　甘草炙各壹分半
右剉散每服叁錢薑肆片食前煎服

十棗圓治通身腫外腎腫[illegible]煮爛手足令吾研細入[illegible]
末[illegible]酒調下
[illegible]以大[illegible]淨以童尿浸令日夜取出別換童尿又浸
壹日夜再取出又換童尿浸壹日夜次以生布錢[illegible]揩去皮
於日[illegible]焙細用米醋煮飛白麵糊圓桐子大每服伍拾圓煎和
劑流氣飲下方見脹滿門



又方　牡蛎煅　甘遂煨各[illegible]　橘皮[illegible]　良薑各[illegible]
右[illegible]貳錢[illegible]細剉煎湯候冷調[illegible]末得所然後
[illegible]通[illegible]日空心服
青皮　木香　黄連　橘紅各壹分
胡椒壹錢半
右為末入巴豆肉不用去油壹錢研細同胡椒大每叁肆圓
溫湯下大便利腫自消未利再服停積稍通用
又方二十四味大流氣飲煎熟加枳殼壹錢用[illegible]叁様
截件[illegible]壹撮生薑肆片木通貳枝新水壹大碗同煎取清汁
調[illegible]圓[illegible]圓[illegible]方見脹滿門
治外腎腫大水物水泡通明方二十四味流氣飲加白芷木通
[illegible]青木香[illegible]四百粒煎

增補[illegible]直指方[illegible]卷之十七

# 身體 附 臂痛 肩背 木臂

## 身疼方論

凡人百骸四體肌肉皮膚關節脈絡總而謂之身風濕寒熱血刺痰攻皆能作痛至於骨之酸疼或寒或熱入裏徹骨則倍蓰于常大不侔焉蓋骨者髓之藏髓者飲食五味之實秀也髓虛則骨虛勢所必至疾痛在於身風之證以走注知之濕之證以重著驗之血有筋脈鑽刺之證痰有眩暈嘔吐之證驅風除濕行血豁痰對證一投猶算可以旦暮若夫病入於骨此勞極損傷之不可救藥者也其能生乎然則身痛之與骨痛其輕重相千里之差於此不可以無辨雖然男子之病多為項臂痛患熱在上焦不能清利故醞釀日久生痰其痰然氣遺入於項臂之間不踵則痛耳然而曰痰曰飲又有理一分殊之別伏於包絡隨氣上浮客肺壅嗽而發動者痰也聚於脾元隨氣上溢口角流出而不禁者涎也惟飲生於胃腑為嘔為吐此則胃家之病學者不可不知

## 身疼證治

人參敗毒散 治身疼通用 方見風類 更增川芎半兩亦散風邪

[illegible] 治風濕身痛 方見風類

[illegible] 方見[illegible]類 五苓散 見水飲類 並主之

見身痛

[illegible]中湯 方見[illegible] 加川芎[illegible] 治血刺身痛

大[illegible]湯 方見[illegible] 加官桂[illegible] 治痰證身痛

[illegible] 治臂痛不能舉手或左右轉移或兩臂如人抽搜

半夏 二兩 伏苓 一兩 枳殼 半兩

風化朴硝 二錢半

右末薑汁煑糊圓梧子大每服三十圓食後薑湯下



[illegible] 治痰注臂痛

片子薑黃 天仙藤 羌活

白朮 白芷梢 各叁錢 半夏 製 半兩

右剉每服叁錢薑五片煎服間下 [illegible] 方見風類

白圓子 治諸風痰涎通用

圓白半夏 南星 叁兩

白附子 生 川烏頭 生去皮 半兩

右細末以生絹袋井水擺以手揉出滓再研入袋擺盡磁盆中曝露至曉傾棄清水換新水攪擺又早又換新水攪曬春伍日夏叁日秋柒日冬拾日去水曬乾研開糯米粉煎粥清圓菉豆大每叁拾圓薑湯下治酒家痰壅項臂白圓子貳錢研末[illegible]煎湯調下吐痰立愈自後二陳湯加[illegible]服 方見[illegible]類

[illegible] 治風濕痛手足不舉筋節疼痛先與通關用

全蝎 [illegible]

右老酒[illegible]調作壹服如覺[illegible]則止未[illegible]次日再作壹劑然[illegible]末盡除自[illegible]以[illegible]洗淨切碎酒煎日貳服神效

[illegible]圓 治酒[illegible]停飲臂痛 見水飲門

[illegible] 治勞倦身痛

沉香 人參 牛膝 伏苓

秦艽 木香 黃耆 巴戟 去心

當歸 半夏 柴胡 荊芥 各半兩

熟附子 辣桂 去皮 鱉甲 [illegible]

羌活 熟地黃 [illegible] 全蝎 [illegible]

大肉豆蔻 [illegible]

右末每貳錢[illegible]白貳寸[illegible]薑叁片棗貳枚食前煎服溫酒調下尤妙

[illegible]加製[illegible]治[illegible]見身體門

[illegible]治風濕血刺[illegible]腰痛[illegible]拘攣

延胡索炒 辣桂去粗皮 當歸[illegible]

右末每服貳錢溫酒調下 [illegible] 活血除風理氣

[illegible]治腎虛腰痛

杜仲[illegible] 破故紙[illegible]用[illegible]

沈香[illegible]

右細末用[illegible]拾箇去皮[illegible]

搗和丸桐子大每百粒空心鹽湯下

# 腰

## 腰痛方論

腰者腎之外候，一身所恃以轉移開闔者也。蓋諸經皆貫於腎而絡於腰脊，腎氣一虛，凡衝風受濕、傷冷蓄熱、血瀝氣滯、水積墮傷，與夫失志作勞，種種腰疼，疊見而層出矣。[illegible]傷風者[illegible]

[illegible]

## 腰痛證治

[illegible]治腎虛腰痛[illegible]

[illegible]杜仲[illegible]

右為末用[illegible]



上[illegible]食前[illegible]見[illegible]門

[illegible]治腎虛腰痛[illegible]食前[illegible]見[illegible]門

[illegible]治風冷[illegible]腰腳[illegible]腰腳攣

[illegible]風活血腳氣[illegible]用

獨活[illegible]桑寄生[illegible]杜仲[illegible]

細辛 牛膝[illegible] 伏苓

白芍藥 辣桂 川芎 防風

人參 當歸 熟地黃[illegible] 甘草[illegible]

右細剉每服[illegible]空心前服下[illegible]

[illegible]治風攻腰痛[illegible]見諸風門[illegible]去皮大炒

[illegible]治受濕腰痛

附子[illegible] 蒼朮[illegible] 杜仲[illegible] 生乾薑

白朮 伏苓 牛膝[illegible] 厚朴[illegible] 甘草[illegible]

右剉每服[illegible]薑[illegible]片[illegible]食前[illegible]

[illegible]治[illegible]腰痛[illegible]見[illegible]加[illegible]食前服

[illegible]治[illegible]熱入腎腰痛大小便不通[illegible]見[illegible]門加[illegible]

[illegible]間服[illegible]見[illegible]

[illegible]治血瀝腰痛[illegible]見[illegible]用[illegible]

[illegible]治氣滯腰痛[illegible]見[illegible]加[illegible]

[illegible]治腰間積水[illegible]見[illegible]門[illegible]

[illegible]

[illegible]治打撲腰痛

虎脛骨[illegible] 骨碎補[illegible] 赤芍藥

當歸 沒藥 自然銅[illegible]

防風 白附子[illegible] 辣桂[illegible] 白芷

蒼耳子[illegible] 牛膝

天麻　檳榔　五加皮　羌活各等分

右末每服壹錢温酒調下加[illegible]妙　腳氣通用

茴香散治打墜凝瘀腰疼通用

破故紙炒　茴香炒　辣桂等分

右為末每服貳錢熱酒調食前進[illegible]治腰痛不行[illegible]

安腎丸治失志傷腎氣虛腰痛方見虛損加[illegible]少

加鹿茸亦得

[illegible]丸治房勞傷腎腰痛[illegible]十補湯[illegible]亦治房勞

力腰痛[illegible]

[illegible]散治積勞傷肝發為腰痛

半夏麴三分　辣桂　宣木瓜　當歸

川芎　牛膝　川細辛各半兩　石菖蒲

酸棗仁炒去皮各半兩　甘草炙各壹分

右剉細每服叁錢薑伍片棗貳枚煎服

沉香降氣湯和[illegible]每服貳錢[illegible]薑棗煎治[illegible]傷肝發為

腰痛方見諸氣門

橘核圓治腰痛經久不差

橘核　茴香　葫蘆巴　菴䕡子

破故紙各炒　附子炮去皮各等分

右末酒煮糯米糊圓桐子大每服叁肆拾圓食前鹽湯下

神保圓治腰痛不能轉側[illegible]大塊煉調[illegible]酒去

神麴通口吞青娥圓兩服頓愈

[illegible]

八角茴香炒末食前鹽酒調下

## 腎氣

腎氣方論

腎主納氣人之氣海繫焉腎虛而為風寒所乘[illegible]所謂為



嘗怒憂恐所傷而水結不散又與氣搏使以群邪聚於其中曰

疝曰奔豚曰小腸氣曰膀胱氣皆是物也其候不特外腎小腹

作痛或攻刺於腰脇或游走於背膂或冷氣搶心心下痛或

手足厥冷繞臍結聚[illegible]之左右如覆杯上下如臂以腹

中累累如桃李或臍間攪大如盤有此熱逆寒發有兩拘寒

熱者有不得大小便者有暴急而下泄者有自汗出者有不欲

食者其於陰間則卵有小大伸縮而上下不常囊有腫脹急痛

而發歇無定挾冷觸怒則塊物遇上衝或攻腰脇挾和心平

則塊物自循系歸入囊中凡此皆謂之腎氣治法綱領風則

散之寒則温之暑則解其熱濕則滲其水七情所致調其心氣

水與氣搏行其小便其間以主治腎氣之劑參之[illegible]定則也然

總治之法大要以流行疏利為先世曰腎虛得疾不敢疏泄蓋

腎為邪氣所干若非逐去病何由愈使或始自腎虛必以剛劑

閉住使大小腑秘而不通邪氣入腹衝心危殆必矣雖然腎氣

發作固以腎虛得之然虛中有冷虛中有熱又有冷熱不調先

當溫當冷者腸滑多外腎清冷小便滑而多[illegible]即發見也熱

者內挾暑氣或積酒毒或服燥藥於前外腎與小腸俱熱肛門

閉塞後亦熱小便數而澀遇熱則甚是也今熱不調者小腹外

腎乍冷乍熱大便小便或秘或利用藥溫涼當隨證而權宜之

但所謂流行疏導常常連帶於其中矣其君大小便流利之後

或更有[illegible]或微氣[illegible]於臍[illegible]間此則[illegible]

不還元當加削[illegible]人參[illegible]圓[illegible]等又不

可純性溢逆氣最難中脘得[illegible]而[illegible]於嘔吐最為

嘗收何則天一生水腎實主之宗筋聚於陰器惟腎[illegible]則以資

之今腑臟不和腎水上乘及為酸汁或為涎飲在脾則[illegible]成

嘔吐腎家熱劑[illegible]皆知腎經惡燥如[illegible]之類誠

不敢輕用耳及其嘔吐大作[illegible]宜用之[illegible]不能有[illegible]則

[illegible]劑又加[illegible]用之[illegible]

勢至此脚上未[illegible]腎水已[illegible]之[illegible]水所固脚土又[illegible]之往往
往陰陽不升降榮衛不流行大小二便阻隔而腎[illegible]
皆自其口出也如此者大抵不救諸病須當識[illegible]
腎氣證治

[illegible]圓 治風寒氣痛及諸血滯作痛
牡丹皮 桃仁 官桂 各[illegible] 川烏頭 [illegible]
右末煉蜜圓梧子大每服伍拾圓溫酒下 [illegible]
[illegible] 治奔豚氣痛 [illegible]

[illegible]湯 治腎虛無陽小腸氣痛頭額小腹外腎時冷兼治[illegible]
附子生 沉香 辣桂 華澄茄
甘草炙 各[illegible] 香附[illegible]
右剉每服三錢薑[illegible]片空心煎服

[illegible] 治興陽勝冷疝氣兼治[illegible]
吳茱萸 [illegible] 川白薑 辣桂 各[illegible]
良薑 華澄茄 茴香炒 縮砂仁
益智仁 木香 伏苓 甘草 各[illegible]
右剉每服三錢水煎[illegible]食前服

[illegible]圓 治腎冷寒疝
良薑[illegible] 巴豆肉[illegible] 桂心[illegible]
右並末[illegible]圓梧子大每服[illegible]拾圓溫酒食前服

[illegible] 治腎冷疝氣偏墜[illegible]
舶上茴香 胡椒 縮砂仁 辣桂 各[illegible]
右麄末以生猪腰子去膜批薄不洗用[illegible]入藥於其脇中以麻纏定又濕紙數重裹煨令熟[illegible]入嚼食溫酒送下

川楝子[illegible] 治小腸氣外腎腫痛
正川楝 [illegible] 官桂 各[illegible] 川芎
當歸 青皮 陳皮 枳殼
檳榔 赤伏苓 青木香 南木香

華澄茄 白豆蔻仁 甘草炙 各[illegible]分
右麄末每服[illegible]錢[illegible]食前服

[illegible]散 治腎氣虛中有熱小腹外腎腫[illegible]大小便不通
梔子仁 [illegible] 枳殼 [illegible] 北柴胡
青木香 赤伏苓 車前子 甘草 各[illegible]分

[illegible]湯 治腎氣虛中有熱大小便不通
右剉每服[illegible]水煎服壯熱加[illegible]大便秘加大黃
黑豆 [illegible]合 甘草 [illegible]
右作[illegible]劑新水煎取清汁服

[illegible]散 治腎氣熱[illegible]小便秘澁黃色
海浮石
右細末每貳錢煎[illegible]湯調下

[illegible] 治膀胱氣痛
巴豆 [illegible] 川楝子 [illegible]
右件用麩貳合同炒令黃赤去麩與巴豆只將川楝子為末每[illegible]貳錢溫酒調空心服

五苓[illegible] [illegible]
[illegible] 治腎氣冷熱不調
柴胡 人參 桔梗 白茯苓
生薑 [illegible] 黃芩 甘草 各[illegible]
右剉散每服[illegible]錢水大盞煎[illegible]分溫服

[illegible]圓 治腎氣大便不通[illegible] 以[illegible]送下

二[illegible]湯 治奔豚疝氣攻刺走痛
辣桂 [illegible] 牽牛 [illegible]
右麄末每服貳錢[illegible]食前服

[illegible] 治[illegible]氣每[illegible]圓以[illegible]

下ㄅ並見水竹門又方香木香同貳○枚○○○○去頭足翅
為末同於文武火上慢慢炒令圓子微香以碟盖頓○上頗在
令點少頃去○酒末取圓子每服伍拾圓空心溫酒下

金鈴散治膀胱小腸氣外腎腫痛
大川楝子 ○○○○○○○○○○○○○○○○
右以巴豆○○同炒○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
各半盞煎取○○服○○汁食前調下

梔子散治小腸氣痛不可忍○○○○○○○○○○○○○
紙包置慢火中煨令香熟去皮○服食○○○○○
煎湯送下

茴香散治膀胱小腸氣痛○○○○○○○而全者不拘多少炒○○
末每服○錢○○時用○○○○入○○○○○○服溫酒調下人
行拾里又進後服神效

失笑散治小腸氣痛及諸血痛
川五靈脂 蒲黄○○ 加延胡索各等分
右末每服貳錢酒半盞水半盞煎○○○食前服血痛臨熱入
米醋少許

○○○治小腸氣吊腹中成塊刺痛兼治風疹
益智仁 白芷 白姜○○ 茴香○○
甘草 天台烏藥 ○○○○○○ 青皮○○
檳榔 麻黄 川芎 枳殼○○
右末每服貳錢鹽少許水煎食前服

金鈴散治小腸氣痛○○
延胡索 ○○○○ 全蝎○○○○○
右細末每服壹錢食前溫酒調下○○○○痛不○○○○○調下

○○散治小腸氣攻○○
巴豆○○○○○
右末每服貳錢○○○○用熱酒淡鹽湯○酒調下

○○○○治胸脅刺痛七氣通用
當歸 川芎 枳殼 官桂
青皮 川白薑 茴香 川楝肉
陳皮 紫蘇 三稜 蓬朮○○○○○
白芍藥 茯苓 木香各壹兩 人參
沉香 甘草各半兩
右麁末每服貳錢水壹盞煎○○○○○大便秘加大黄

○○圓治奔豚氣作痛
當歸 延胡索 舶上茴香 胡盧巴○○○○○○
桃仁 ○○○○○ 川五靈脂 白芍藥
川楝肉 ○○○ 木香○○○○ 全蝎○○○
右末米醋打糊圓如梧子大每服伍拾圓少鹽入酒送下有
熱小便○○○○赤茯苓煎湯下

○○○○○○○每服貳錢入○○○○
少○○○○○○○○○○○調下

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○大或庄
○○○水
吳茱萸○○○○ 山茱萸○○ 馬藺花○○○○
川楝子○○○○ 黑牽牛○○ 舶上茴香○○○
延胡索 ○○官桂 青皮○○
桃仁○○ 白蒺藜○○ 木香各半兩 海藻○○○○
右細末○○○○糊圓如梧子大每服○拾圓食前溫酒鹽湯任下

○○○圓治腎經積冷○○○○膀胱氣痛或陰腫偏墜或小腹有物如
卵上下疼痛
胡盧巴○ 川楝子○○○○○○ 川烏○○○○
大巴戟○○○○ 茴香○○○
吳茱萸○○○○○○○○ 牽牛○○○○○
右為末酒煮麵糊圓如梧子大每貳拾圓空心溫酒送下

旧年台〇
化灰囊出[illegible]



[茴香]圓 治小腸膀胱氣痛

延胡索 [illegible] 川楝肉 [illegible] 舶上茴香 [illegible]

牽牛 [illegible] 當歸 良薑 青皮 [illegible]

木香 天台烏藥 [illegible] 全蝎 [illegible]

右末生薑自然汁浸蒸餅為糊圓如梧桐子大每服三五十圓燈心灰

存性調酒送下

腎氣散 治腎氣作痛

黑牽牛 [illegible] 白牽牛 [illegible]

右為末每服三錢以豬腰子一個薄切開縫入川椒伍拾粒

茴香伯粒以青木香末摻入腰子中線紮濕紙數重煨香

熟出火氣嚼後空腹嚼咽好酒送下少頃就枕天明取下惡

物即愈

[茯苓桂枝甘草大棗湯] 治臍下悸動欲作奔豚

茯苓 [illegible] 甘草 一兩 桂枝 [illegible]

[illegible]

右剉細每服肆錢[illegible]煎[illegible]服

[三增茴香圓] 治腎氣外腎腫脹大或生瘡出黃水[illegible]痛[illegible]

在家

京三稜 蓬莪朮 木猪苓 白附子

蘿蔔子 赤芍藥 黑牽牛 川楝肉

山茵蔯 青木香 陳橘皮 五靈脂

[illegible] 茴香 [illegible] 南木香 [illegible] 丁香 [illegible]

澤瀉 [illegible] 海藻 [illegible]

海浮石 [illegible] 川山甲 [illegible]

青皮 [illegible]

香附 [illegible]

右件銼碎[illegible]為末酒糊為圓如梧桐子大每服三拾

圓溫酒送下此藥能[illegible]用之

[川楝子圓] 治膀胱小腸氣[illegible]



[金鈴子圓] 治腎氣攻刺及腳氣能用者用皆得效

胡蘆巴 [illegible] 牛膝 [illegible] 舶上茴香 [illegible]

肉蓯蓉 [illegible] 川續斷 [illegible] 杜仲 [illegible]

天麻 [illegible] 當歸 [illegible]

右為末以[大棗]去核[illegible]入[illegible]

蓋定竹針神麻[illegible]細[illegible]圓如梧桐子大每服三五拾

圓溫酒鹽湯任下

[illegible]散 治[illegible]加炒[illegible]

豬腰子剝開小孔納以川楝[illegible]煨[illegible]

# 木腎

木腎方論

心火下降則腎水不患其不溫真陽下行則腎氣不患其不和溫溫其和安有所謂木強者哉惟夫嗜欲內戕腎家虛憊故陰陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作疼頑痺結硬勢所必至矣然則之法不可純用燥熱當溫散溫利以逐其邪邪氣內[illegible]如寒[illegible]者不疾而速不行而至者矣外此又有一種升高墜下外腎跌傷[illegible]攻亦有木強腫痛之證治法大要則同於中更為之斟酌

木腎證治

[川楝圓] 治外腎脹大麻木痛硬及奔豚疝氣偏墜[illegible]

川楝子 [illegible]

[illegible]

南木香 [illegible] 茴香 [illegible] 青木香 [illegible] 辣桂

右件為末酒調糊圓如梧桐子大每服三拾圓食前溫酒下

積日計功打扑[illegible]

[illegible]研為末調酒下

[illegible]圓 治膀胱小腸氣痛外腎脹大通治木腎方見[illegible]門

[illegible]圓 治腎[illegible]氣脅痛

吳茱萸[illegible]

大香附[illegible]加 青木香各半兩

右為末米糊圓桐子大每服五十粒食前鹽湯下或乳香葱

白煎湯下

增修仁齋直指方論卷之十八



增修仁齋直指方論卷之十九

# 腎臟風癢 附 頭風

腎癢方論

腎[illegible]則為頑虛則為癢瘙之出於腎虛也明矣腎為足少陰之經其間濕癢謂之腎臟風此[illegible]知此說[illegible]歟陰之形系焉[illegible]腎主[illegible]耳人之精血不充則為嗜慾所耗外為風冷所乘風毒與氣皆從虛入[illegible]其有不濕癢者乎腳下其有不瘡瘍者乎治之法先當疏散風邪流行血毒然後以[illegible]活血與[illegible]風藥相參而平治之若欲透用[illegible]烈之劑[illegible]邪病無由愈間有患者至滿[illegible]所傷腎虛而收效如[illegible]為圓子又不可缺其或不[illegible]一切從事於[illegible]次之弊也然[illegible]肝腎愈遠或者未知[illegible]

腎癢證治

[illegible]散 治肝腎風[illegible]

大雞心檳榔[illegible] 陳皮半兩

牽牛[illegible] 甘草[illegible]

右末每服[illegible]錢[illegible]湯調下

[illegible]圓 去肝腎風氣方見[illegible]

[illegible]圓 導肝經風水方見水[illegible]門 婦人腎虛[illegible]邪[illegible]多用[illegible]少用[illegible]木香圓空心鹽湯下兼[illegible]方見[illegible]

[illegible]散 治肝腎風毒上攻脚下瘡瘍

當歸 川芎 白芷 [illegible] 細辛

白茯苓 桃仁 白芍藥 半夏

[illegible] 五靈脂 甘草 蒼术

杜仲[illegible] 天麻 [illegible]

橘紅 檳榔 [illegible] 枳殼

右細剉每服叁錢水壹盞生薑伍片棗貳枚煎七分去滓溫服
熱入[illegible]末少許食前服[illegible]以佐心氣使心腎相交或有
熱證大須加[illegible]煎

[illegible]治[illegible]風乚攻頭目眩[illegible]
痰[illegible]烏頭[illegible]
白附子 蒼朮[illegible]
右爲末米糊圓如梧桐子大每服一拾圓乚則茶清下別[illegible]
[illegible]治肝腎風毒[illegible]外腎濕癢方見腎臟門

[illegible]方
大腹皮[illegible]
右夾[illegible]煎湯[illegible]以津唾[illegible]
也白及末傅[illegible]先[illegible]或用[illegible]仍服
[illegible]用米飲調下
臍頭三五孔小扁皆出血微脹妙方
由髮燒存性灰候乾則津唾調仍以米湯調髮灰食前服

[illegible]治外腎濕癢流膿如瘡
龍骨 五倍子[illegible]
乳香 黃丹[illegible]
右細末先以[illegible]大腹皮[illegible]煎湯[illegible]洗後傅

[illegible]方
爐甘石[illegible] 黃連 五倍子[illegible]分
右細末擦先以[illegible]大腹皮煎湯溫洗
又爐甘石方見[illegible]

[illegible]方
油髮灰 青黛[illegible]分
右爲末入少麝或[illegible]或津唾調傅
又青黛方見[illegible]



大聖[illegible]治腎臟風發瘡疥方
貼心[illegible]
明礬 黃[illegible] 全蝎[illegible]
右同末入瓷器收每用[illegible]
兩掌上以鼻嗅之以兩掌擦外腎[illegible]以兩掌擦兩乳令睡至
醒又日又如此用藥嗅之
又方[illegible]大蒜[illegible]生薑[illegible]研擦手如上
[illegible]

# 頭風

頭風方論
足太陽者頭之經也六經惟太陽受病最多蓋頭居其上
當風寒之衝一有間隙則若頭若腦若耳若鼻風邪乘虛皆得
而入之矣况[illegible]飲食[illegible]之不謹乎頭風爲病不必
須有偏正頭痛之證但自頸項以上耳目口鼻眉稜之間或有
一[illegible]不[illegible]皆其漸也有頭皮頑痺有頭皮頑厚不
自覺知有口舌不仁莫知味或耳聾或頭汗或目痛或眉稜
上下掣痛或鼻中聞香極臭或只呵欠而作昏眩之
狀凡此皆頭風證也治法大要有[illegible]之人或
[illegible]又有素患頭風之人或
因[illegible]頭風發作則不必拘
況前證當以頭風和平之藥[illegible]或[illegible]老弱先患頭風復
感其邪自汗不止[illegible]又不可也若夫太陽項強
一證[illegible]惡風則爲表虛合
用[illegible]頭風[illegible]之力者也入木補
煎入[illegible]其所在斷可失矣
多成風[illegible]

頭風證治

消風散 治頭目昏眩鼻塞聲重

人參 羌活 川芎 白茯苓

白僵蠶炒 藿香葉 荊芥穗 防風

甘草炙 蟬殼[illegible] 厚朴[illegible] 陳皮各半兩

右末每服貳錢[illegible]荊芥湯調下

追風散 治偏正頭疼[illegible]上攻頭風狀若虫行

川烏[illegible] 軟石膏[illegible] 白僵蠶[illegible] 川芎

防風 荊芥 甘草[illegible] 南星炮

白附子炮 羌活 天麻 全蝎

地龍去土 白芷各半兩 草烏[illegible] 沒藥

乳香 雄黃各[illegible]分

右為末每服半錢入好茶少許沸湯調食後臨睡服

川芎茶調散 治諸風上攻偏正頭疼

川芎 荊芥穗[illegible] 香附去毛 薄荷[illegible]兩

白芷 羌活 細辛 甘草[illegible]

防風[illegible]分

右末每服貳錢食後茶清調下

[illegible]散 治頭風[illegible]痛

川烏[illegible] 雄黃 [illegible] 川芎 細辛[illegible]

右末每服半錢食後臨臥茶清調下

芎芷散 治頭風風壅

川芎 白芷 荊芥穗 軟石膏[illegible]

右末每服壹錢食後沸湯調下

香芷散 治頭面諸風

新白芷[illegible]以[illegible]汁浸日乾

右末沸湯調食後服或以些子搐入鼻左用右右用左[illegible]

又方

新白芷[illegible]



右為末煉蜜圓彈子大每服壹圓食後荊芥湯嚼下[illegible]

[illegible] 加荊芥 治頭風[illegible]

[illegible] 治偏正頭疼[illegible]耳鳴目暗

川烏[illegible] 南星 [illegible] 川芎

甘草[illegible] 天麻 防風 半夏[illegible]

右末為[illegible]大[illegible]日乾每服五[illegible]

細嚼[illegible]湯下

[illegible]散 治[illegible]頭疼[illegible]不可服

附子[illegible] 烏頭生 南星 乾薑

川芎 細辛各[illegible] 甘草[illegible]分

右剉散每服[illegible]錢薑五片[illegible]煎[illegible]服

葛根湯 治太陽病項強[illegible]為表實

葛根[illegible] 麻黃[illegible] 官桂 芍藥 甘草[illegible]

右剉散每服[illegible]錢薑五片大棗壹枚煎服

桂枝葛根湯 治太陽病項強汗出惡風為表虛

桂枝 芍藥 甘草[illegible] 葛根[illegible]

右剉散每服[illegible]錢薑五片大棗壹枚煎服

[illegible]方

川芎 天麻各半兩 細辛[illegible] 石膏

荊芥穗 白芷梢 甘草[illegible] 全蝎[illegible]

右末白湯或茶清調食後臨臥服[illegible]加

[illegible]湯下[illegible]

新增[illegible]直指方論卷之[illegible]

增修仁齋直指方論卷之二十

# 眼目

## 眼目方論

眼者五臟六腑之精華如日月麗天昭明而不可掩者也其首尾赤眥屬心其滿眼白睛屬肺其烏睛圓大屬肝其上下肉胞屬脾而中間黑瞳一點如漆者腎實主之是雖五臟各有證應然論其所主則瞳子之關係重焉何以言之目者肝之外候也肝取木腎取水水能生木子肝母腎焉有子母而能相離者哉故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣乏則昏蒙暈眩烏輪赤暈刺痛浮漿此肝熱也燥澀清淚枯黃遶睛此肝虛也瞳人開大淡白偏斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎熱也一虛一實以此驗之然人知肝腎之氣相依而行孰知心者神之舍又所以為肝腎之副焉所謂一而二二而一者也何則心主血肝藏血血能生熱凡熱衝發於眼皆當清心涼肝又不可固執水生木之說特眼者黑瞳屬水所以內方瞳及本非天一之水又果熱為之主宰乎析而論之則拘急牽踡瞳青胞白癢而清淚不赤不疼是之謂風眼烏輪突起胞硬紅腫眵淚濕漿裏熱刺痛是之謂熱眼眼渾而淚胞腫而軟上壅朦朧酸澀微赤是之謂氣眼其或風與熱并則癢而浮赤風與氣搏則癢澀昏沉血熱交聚故生淫膚粟肉紅縷偷針之類氣血不至故有眇視胞垂雀眼盲障之形淡紫而隱紅者為虛熱鮮紅而妒赤者為實熱兩眥呈露生胬肉者此心熱血旺白睛紅膜如傘紙者此氣滯血凝熱證瞳人內湧白睛帶赤色澤而赤也冷證瞳人青綠白睛枯槁氣沉而濁也眼熱經久復為風冷所乘則赤爛眼中不赤但為痰飲所注則作痛肝氣不順而挾熱所以羞明熱氣蓄聚而傷飽所以胞合昏澀此又本之於五臟六腑而言其然者一腎與脾經異同何耶曰目之中亦有視者熱有淚上胞下胞或目眥間如疥點者其熱在脾脾主味也五味之所發泄中則精華發見於其外肺主氣也水火升降榮衛流轉非氣孰能使之前所謂五臟各有證應者於此又可推矣雖然眼之為患多生於熱其間用藥大抵以清心涼肝調血順氣為先有如腎家惡燥設遇虛證亦不過以當歸地黃輩潤養之輕用溫藥不可也況夫肺能發燥肝亦好潤古方率用杏仁柿乾飴糖沙糖為佐果非潤益之意乎至於退翳一節尤關利害凡翳起於肺家受熱輕則朦朧重則生翳珍珠翳狀如碎米者易散梅花翳狀如梅花葉者難消雖翳自熱生然治法先退翳而後退熱者謂熱極生翳若先去赤熱則血為之冰而翳不能去其有赤眼與之凉藥過多又且滌之以水不反掌而水凝冰結一團水耳水性清澄尤不可輕點洗輒以冷水挹洗最為失勤嗜欲悲泣爐灸熬夜役眼力治沭過傷經絡強視當曉夜不避煙火飲啖熱物凡此皆生於酒色者也其實熱先可平哉有能節生活神爽諸目力放懷自適心遊目休調和飲食以養之其間藥餌以平之明察秋毫亦可坐致古曰眼不醫不瞎不醫訪以為戒 風眼 熱眼 氣眼

## 眼目證治

**人參羌活散** 治風眼熱眼昏澀腫痛

羌活 獨活 柴胡 人參
川芎 枳殼(制) 茯苓 前胡
桔梗 天麻 地骨皮 甘草(炙)各等分

右末每服二錢入薄荷三葉煎湯下

**[illegible]散** 方見風類 加菊花夾和前同

**[illegible]** 方見風門 治眼風癢 [illegible]

治眼壅熱赤腫方

山梔 車前子

右㕮咀下本門㕮咀散以水通用食後臨卧服

【蟬花散】治諸風攻眼消[illegible]
沙苑蒺藜 [illegible] 防風 羌活
甘菊 甘草 石決明 [illegible]
草決明 蟬蛻 蛇皮 [illegible] 川芎各半兩
右末每壹錢半用[illegible]入荊芥湯下食後臨卧服

【驅風散】治風毒攻眼昏澀腫痛
防風 白蒺藜
蒼术 [illegible] 甘草
荊芥穗 [illegible]
右末每服壹錢入蜜少許沸湯點下[illegible]和丸

【羌活散】治風氣攻眼昏澀淚花
羌活 川芎 天麻 旋覆花
甘菊 槀本 防風 蟬蛻
細辛 杏仁 [illegible] 甘草
右為末每貳錢新水略煎服

【菊花散】治肝受風毒眼目[illegible]服
蟬蛻 木賊 白蒺藜
羌活 甘菊 荊芥穗 甘草
右末每貳錢食後茶清下

【白蒺藜散】治大眼[illegible]經風毒攻眼昏澀淚[illegible]
白蒺藜 防風 甘草 生地黃
白附子 [illegible] 甘菊
右末每貳錢[illegible]湯少鹽點下

【明目飲】治風毒氣眼澀痛[illegible]
蔓荊子 防風 羌活 川芎
天麻 茯苓 蟬蛻 蒼术
藁本 細辛 荊芥 [illegible] 甘草
甘菊 [illegible]



右末每服貳錢[illegible]食後[illegible]湯[illegible]下

【[illegible]散】治風眼昏澀[illegible]
川芎 蒼术 [illegible] 木賊
蟬蛻 蛇皮 [illegible] 羌活 防風
蔓荊子 桔梗 地骨皮 荊芥穗
旋覆花 白蒺藜 石膏 細辛
杏仁 甘草 全蝎
右細末每服壹錢半食後臨卧服或[illegible]煎湯下

【[illegible]散】治風眼[illegible]昏[illegible]或頭風牽引眼小[illegible]
石決明 [illegible] 當歸
防風 羌活 蟬蛻
蛇皮 [illegible] 荊芥 甘草
茯苓 [illegible] 芍藥 細辛
蒼术 [illegible]
右細末每貳錢食後米泔茶清送下

【[illegible]散】治風眼熱腫[illegible]
蟬蛻 甘菊 川芎 防風
羌活 山梔仁 白蒺藜 草決明
荊芥穗 蔓荊子 穀精草 密蒙花
木賊 蒼术 甘草
右末每貳錢食後米泔茶清送下

【[illegible]】治風熱攻眼赤澀
荊芥穗 [illegible] 牛蒡子 蔓荊子
甘菊 細辛 甘草 防風
白蒺藜 玄參 川芎 大黃
黄芩 木賊 草決明 蒼术
右末每服貳錢食後臨卧[illegible]湯調下或蜜丸[illegible]下

【[illegible]】治[illegible]眼[illegible]
白及 [illegible]蘆 黄芩 麻黄

川升麻　芍藥　白蒺藜　枳殼麩炒

大黃　甘草等分

右麄末每服三錢新水煎服以通利為度

[illegible]治熱眼腫痛

車前子　龍膽草　穀精草　仙靈脾

威靈仙　藁本各半兩　荊芥穗　桑皮

甘草[illegible]

右細剉每服貳錢食後煎服

[illegible]湯治諸熱眼赤腫羞明目[illegible]淚[illegible]

黃連[illegible]

右以磁碗盛重湯炖食後服滓再炖

[illegible]治肝熱赤眼腫痛

梔子仁　荊芥　大黃　甘草等分

右剉每服貳錢水煎食後服

[illegible]

[illegible]治肝盛風熱攻眼赤腫[illegible]羞明

當歸　川芎　防風　羌活

山梔仁　薄荷葉　大黃煨　甘草炙等分

右末每服貳錢食後用竹葉湯調下

洗眼[illegible]方

當歸[illegible]　木賊　黃檗

右末斧水酒各浸出汁

[illegible]丸治肝熱風[illegible]眼赤痛

大黃[illegible]　山梔仁[illegible]　杏仁[illegible]

右末煉蜜丸桐子大每服叁拾丸臨卧溫湯下

[illegible]治肝熱[illegible]淚赤[illegible]

龍膽草　梔子仁[illegible]　防風　川芎

玄參　荊芥　山茵陳　甘菊[illegible]

決明　甘草各等分



右末每服貳錢半食後茶清調下

[illegible]加川芎[illegible]眼淚[illegible]加[illegible]

[illegible]

[illegible]治肝熱生[illegible]可治[illegible]

楮實子[illegible]

右以蜜湯調下食後服亦可小兒[illegible]眼

[illegible]清心益肝明目[illegible]

人參　茯神去木　[illegible]　琥珀

蔓荊子[illegible]　川芎　生地黃　熟地黃[illegible]

菟絲子　蟬殼[illegible]　車前子　細辛

白蒺藜[illegible]　遠志[illegible]　全蝎[illegible]

右細末煉蜜丸桐子大每伍拾丸空心[illegible]下臨卧[illegible]

湯下

[illegible]湯治熱眼赤痛[illegible]

車前子　麥門冬去心　生地黃[illegible]

右剉每服叁錢新水入蜜同煎食後服加[illegible]方好

[illegible]明目活血消去瘀肉

人參　防風[illegible]　川芎

生地黃　乾白蒺藜[illegible]　當歸　全蝎[illegible]

右爲末煉蜜丸桐子大每伍拾丸食後薄茶下加[illegible]

半兩尤佳

[illegible]方

[illegible]　[illegible]　防風　羌活

木賊[illegible]　川芎　細辛

秦皮　[illegible]　荊芥　蒼术

甘菊　甘草[illegible]

右末每服貳錢薄荷湯調下

[illegible]

蛇退[illegible] 蟬退[illegible] 黃連[illegible]
綠豆[illegible] 甘草[illegible]
右剉細每服貳錢食後臨卧新水煎服
杏仁方 治肝腎風毒攻眼人常青淚[illegible]時洗垢開光[illegible]
真杏仁[illegible]
右五更初就床端坐勿言勿唾自虛[illegible]神嚼杏仁一粒勿嚥
逐一細嚼至五粒後津液滿口分為三嚥直入肝經惟在久
而成功
[illegible] 治患眼腫痛澀[illegible]昏暗
羯羊膽[illegible]
右以[illegible]和入蜜[illegible]末少許頻研成膏食後臨卧點少
許令至[illegible]亦可點目
[illegible] 治眼睛疼痛[illegible]
夏枯草 大香附子[illegible] 木賊[illegible]
蚕退紙[illegible]細辛 [illegible] 川芎
當歸[illegible] 赤芍藥 蟬殼[illegible] 甘草[illegible]
薄荷[illegible]
右末每貳錢茶清米泔任下[illegible]以[illegible]代用
[illegible]大明方 治一切眼疾昏暗[illegible]
木賊[illegible] 甘草生 川芎
穀精草 蒺藜[illegible] 蟬殼[illegible] 荊芥
羌活 防風 旋覆花 密蒙花等分
右末每貳錢[illegible]風湯調下
[illegible] 治內外障
蒼术[illegible] 木賊[illegible]
右搗為末每服貳錢溫米泔調下或入[illegible]入飯食中[illegible]服
[illegible] 治眼中翳膜
蒼术[illegible] 木賊[illegible]



蟬殼去土 白[illegible] 穀精草
防風 羌活 川芎 杏仁[illegible] 甘草[illegible]
右末每[illegible]食後[illegible]湯調下
[illegible] 治內外障失明或結青光內障或赤脉[illegible]
血竭 熊膽[illegible] 人參 蛇退[illegible]
木賊[illegible] 蒼术[illegible] 威靈仙 鸚爪黃連[illegible]
地骨皮[illegible] 蔓荊子 蒺藜子 車前子
川芎 當歸 羌活 蟬退[illegible]
石決明[illegible] 蚕退紙[illegible]
右細末用[illegible]羊肝[illegible]帶血性和藥
同搗以[illegible]用肝汁煮糊丸梧子大每服[illegible]丸溫米泔
下或石[illegible]煎湯下食後常服
羊肝圓 解毒消血明目
黃連[illegible] 杏仁[illegible] 白羊子肝[illegible]
右件同內搗細杵丸梧子大每服[illegible]粒食後臨卧溫米泔
下日三服
[illegible] 治內外障[illegible]睛疼痛
石決明[illegible] 石[illegible] 川芎 木賊[illegible]
杏仁[illegible] 甘草[illegible]
右細末每貳錢[illegible]服食後臨卧
[illegible] 治眼生翳障神效
白蒺藜[illegible] 蒼术[illegible] 蟬殼[illegible]
蛇退[illegible] 菊花 蛇皮
好川芎 杏仁[illegible] 防風 羌活
白芷[illegible] 細辛 獨活[illegible] 白附子生
明礬石[illegible] 荊芥穗 真蛤粉[illegible]
右細末每服壹錢半沸湯[illegible]清調以舌溼於藥中良久
泪自出又別[illegible]食後臨卧服仍用[illegible]

[illegible]散
白澄石膏　烏賊骨　真珠粉各等分　小琥珀少許
右細末，每服一錢，第一米飲調，食後臨卧常服。
退翳散　治眼中翳膜遮睛[illegible]眼漏
真蛤粉一兩　穀精草一兩　[illegible]
右為細末，每服二錢，生豬肝一兩，大竹刀劈開，摻藥在內，麻線縛定，米泔煮爛，熟食後臨卧細嚼，以汁下。
五退散　治內障眼
蟬退　蛇退　[illegible]
烏雞卵殼　男子髮各等分
右燒存性，研細末，每服一錢，和羊肝湯熱水不時常服。
還睛圓　治眼目昏暗
蟬殼　蒼朮[illegible]　熟地黃　川芎
白蒺藜[illegible]　羌活　[illegible]
防風　木賊[illegible]　甘菊
荊芥　蔓荊子　杏仁　菟絲子
石決明[illegible]　陳皮[illegible]
右細末，煉蜜圓彈子大，每服一圓，食後細嚼，茶清下。
[illegible]圓　治腎氣虛弱，肝受邪熱，眼生黑花
生地黃　熟地黃　石斛　枳殼
羌活　防風　牛膝　甘菊
杏仁[illegible]
右末，煉蜜圓梧子大，每服五十粒，空心食前，鹽湯下，或[illegible]湯下。
駐景圓　治肝腎俱虛，眼目昏暗
車前子　菟絲子　熟地黃[illegible]
右末，煉蜜圓梧子大，每服五十粒，食前溫酒下，或[illegible]鹽湯下。本方加枸杞子[illegible]



[illegible]圓　[illegible]明眼[illegible]
右[illegible]火和[illegible]食前[illegible]湯下[illegible]
瞳人開大[illegible]五更[illegible]
氣即合[illegible]
[illegible]圓　治肝腎氣虛，目暗黑花
菟絲子[illegible]　枸杞子[illegible]　川芎[illegible]　川巴戟[illegible]
右細末，煉蜜圓梧子大，每服五十粒，食前鹽湯下。余太守方
加[illegible]
磁石圓　[illegible]升降水火，明眼目，益心智
磁石[illegible]
神麴[illegible]　加沉香[illegible]
右細末，別用生神麴末，水調煮糊，圓梧子大，每服三十粒，空心鹽湯下。磁石法水入腎，朱砂法火入心，加沉香則升降水火。
[illegible]　治[illegible]風[illegible]眼[illegible]
當歸　赤芍藥　黃連[illegible]
右末，每用[illegible]，沸湯泡，乘熱先薰後洗，冷則再煖，用日兩三次。又方：沸湯入白鹽少許，閉目沃洗，亦散血。
水淋法　治眼睛脹突出，新汲水沃眼中，頻數換水，眼睛自入。乃以[illegible]煎湯通口服之。
[illegible]　治[illegible]眼赤腫痛
[illegible]　乾[illegible]　真杏仁[illegible]
右同搗，新汲水浸[illegible]日夜[illegible]，以帛蘸滴入眼中，覺內見苦味即[illegible]，或新水浸[illegible]湯[illegible]
以[illegible]入[illegible]用
[illegible]　治風毒攻眼[illegible]
黃連[illegible]　蔓荊子[illegible]　五倍子[illegible]
右剉細，分[illegible]水[illegible]，以[illegible]洗

或將[illegible]治[illegible]眼[illegible]點眼
呼白鹽 多治中生一兩少許
右以大燈草[illegible]手[illegible]汁[illegible]點兒[illegible]不[illegible]痛[illegible]
微驗效
當歸[illegible]治眼風[illegible]淚爛眩有蟲
牛黃[illegible]以銀鉤入[illegible]出蟲眼頭尾 效
秘[illegible]治[illegible]眼
南硼砂 [illegible] 腦子 少許
右以燈草[illegible]點其上[illegible]
洗[illegible]治爛眩風[illegible]紅[illegible]
日夜研細末[illegible]末用[illegible]浸取清汁點眼[illegible]仍取[illegible]
取[illegible]入男兒乳汁研爲[illegible]置眼[illegible]頭引蟲自出
[illegible]治風眼流淚不止
綠鹽 甘石 [illegible] 烏賊骨 [illegible]
右細末入腦少許點目[illegible]腦和之
朱砂 [illegible] 南硼砂 [illegible]
真珠 [illegible]
右細末用[illegible]研和[illegible]內[illegible]入角[illegible]用時[illegible]
汁[illegible]眼[illegible]效
[illegible]方 治遠眼赤腫閉合
上朱 [illegible]
右末新水入[illegible]眼[illegible]及太陽[illegible]
[illegible]服一[illegible]
[illegible]目不能視[illegible]
青果竹刀[illegible]開[illegible]
[illegible]細[illegible]以汁送下[illegible]
[illegible]入[illegible]汁[illegible]



治[illegible]方 脾胃積熱兼宿食不消則[illegible]
前[illegible]末少許利之
[illegible]方 治小兒[illegible]入眼生[illegible]尾而垂之[illegible]
破以少取生血點[illegible]九住[illegible]已[illegible]即[illegible]以燈心
[illegible]仍用[illegible]末每[illegible]二錢[illegible]調服
[illegible]
細辛 川芎 腦荷 莫荊子 各等分
右爲末每年[illegible]入鼻又頭風門[illegible]
小兒[illegible]眼[illegible]在後

新刊仁齋直指方論卷之二十

新編仁齋直指方論卷之二十一

# 耳

耳論

耳為足少陰之經，腎家之寄竅於耳也。腎通乎耳，所主者精，精氣調和，腎氣充足，則耳聞而聰。若勞傷氣血，風邪襲虛，使精脫腎憊，則耳轉而聾。又有氣厥而聾者，有挾風而聾者，有勞損而聾者。蓋十二經脈上絡於耳，其陰陽諸經適有交并，則臟氣逆而為厥，厥氣搏入於耳，是為厥聾，必有時乎眩暈之證。耳者宗脈之所附，脈虛而風邪乘之，風入於耳之脈，使經氣否而不宣，是為風聾，必有時乎頭痛之證。勞役傷於血氣，淫欲耗其精元，瘦瘁力疲，昏昏瞶瞶，是為勞聾，有能將適得所，血氣和平，則其聾暫輕。其或日就勞傷，風邪停滯，則為久聾之證矣。外此又有耳觸風邪，與氣相擊，其聲嘈嘈，眼或見光，謂之虛鳴。熱氣乘虛，隨脈入耳，聚熱不散，膿汁出焉，謂之膿耳。人耳間有津液，輕則不能為害，若風熱搏之，津液結䩕成核塞耳，亦令暴聾，謂之耵耳。前是數者，腎脈可推，風則浮而盛，熱則洪而實，虛則澀而濡。風為之疏散，熱為之清利，虛為之調養，邪氣屏退，然後以通耳調氣安腎之劑主之，於此得耳中三昧。

耳病證治

[illegible]加石菖蒲 每服三錢，以生薑四片，白[illegible]煎，食後服。[illegible]方見[illegible]

[illegible]方見[illegible] 重者[illegible] [illegible]方見[illegible]九治耳聾[illegible]

桂星散 治風虛耳聾

辣桂　川芎　當歸　細辛

淨石菖蒲　木通　白蒺藜炒去刺　木香

麻黃去節　甘草炙各半兩　天南星煨　白芷梢各四錢



右件剉散，每服三錢，水盞半，葱白二片，生薑五片，紫蘇五葉，煎，食後服。晚少食時，加此[illegible]服排風湯亦可用方見[illegible]

[illegible] 通利腎臟風氣

雞心檳榔　橘皮　桃仁　白芷

枳殼　牽牛[illegible]

右為末，每服二錢，葱湯調下，食前服。

[illegible] 治勞聾

大熟地黃　當歸　川芎　辣桂

菟絲子　大川椒　故紙

白蒺藜　杜仲　白芷

石菖蒲　磁石

右為細末，煉蜜為圓，如梧桐子大，每服五十圓，以葱白温酒空心吞下，晚飯前又服。

[illegible] 治[illegible]耳聾

磁石　巴豆　大川椒　沉香

石菖蒲

右為細末，每服二錢，用豬腎一枚，細切，和以葱白少許，[illegible]濕紙十重裹，煨令香熟，空心嚼，以酒送下。

[illegible] 治風入耳虛鳴

白芷　石菖蒲　蒼朮　陳皮

細辛　厚朴　半夏　辣桂

木通　紫蘇莖葉　甘草　川芎

右剉散，每服三錢，薑五片，葱白二片，水煎，食後臨臥服。

[illegible]方

草烏頭　石菖蒲

右等分為末，用綿裹塞耳，一日三度。

耳鳴[illegible]方

川椒　石菖蒲　松脂　巴豆肉

右為細末鎔蠟圓如棗核大塞入耳

[illegible]方 治內熱耳出膿汁

川升麻 木通 赤芍藥 桑白皮[illegible]

麥門冬去心 生地黃 前胡 甘菊

赤茯苓 蔓荊子 甘草炙各等分

右件剉散每服叁錢薑棗煎食後臨卧服

[illegible]方

消石 爛石膏 天花粉 防風[illegible]

腦子少許

右件為末摻耳立止

[illegible]方

真龍骨 白礬枯 赤小豆 黃丹[illegible]

烏賊骨各壹分 臙脂半分

右為細末摻耳

又方

爛石膏[illegible] 明礬枯 黃丹[illegible]

真蚌粉 真龍骨各等 麝少許

右為細末用綿纏竹簽拭耳換綿蘸藥入耳

[illegible]方

生猪脂 生地龍 釜下墨等分

右件細研以葱汁和捏如棗核薄綿包入耳令潤即挑出

[illegible]方

明硫黃 雄黃各研 遠志去心 皂角肉等分

右為細末葱白搗粘入麝少許綿包入耳

又方

草麻子肉 巴豆去皮油 杏仁去皮 滴乳香

松脂各等分研 青鹽半分

右件細研鎔蠟圓如棗核大入耳



又方 以生鼠取膽汁滴入耳又以生[illegible]取腦髓綿包入耳生[illegible]

腦通用

[illegible]方

菖蒲壹寸 巴豆壹粒去皮 麝少許

右為末合研作梁圓綿包入耳日壹圓

[illegible]方

草麻子一兩去皮 遠志去心 乳香

磁石[illegible] 皂角[illegible] 生地龍[illegible] 全蝎[illegible]

右為細末入蠟搓圓柱入耳

[illegible]方

竹鹽炒熱重帛包熨

又方

杏仁炒焦研細綿包塞

[illegible]方 桃葉挼細塞其耳自出○或以[illegible]研汁滴入耳又以川[illegible]

為末洗酢浸壹宿滴耳

[illegible]方 猪脂壹指許炙令香置耳孔邊其蟲自出

[illegible]方 以生[illegible]取汁灌放耳中少時自出或以[illegible]搗汁灌入耳即自出

[illegible]方 用大蒜壹瓣從壹頭開孔以巴豆肉壹粒慢火煨搓熱入蒜孔中以新綿包塞耳逐日換

又方 用猛磁石半錢紙研生研細入[illegible]耳孔別用鐵砂末入不[illegible]耳孔自然通[illegible]然後傾出

[illegible]

全蝎（去毒）　土狗（一枚）　中地龍（一條）　雄黃

明礬（各半錢）　麝香（少許）

右研細，葱白引藥入耳，閉氣面壁坐一時，三日一次

[illegible]方

明白礬　黃鐵丹　龍骨　燕脂

麝香（少許）

右件研為細末，用綿杖子攪乾，換綿杖蘸藥入耳，入[illegible]

各少許，捻入耳

又方

[illegible]　燕脂　乳香　麝香

右研為細末，以鵝翎子挑入耳

[illegible]方　論腎者宗脈之所聚，耳為之竅，血氣不足，宗脈乃虛，風邪乘虛隨脉入耳，氣與之搏，故為耳鳴。先用生料五苓散加[illegible]，[illegible]木香丸，[illegible]散邪[illegible]

[illegible]和養

[illegible]

川芎　當歸　羌活　細辛　辣桂

石菖蒲　白芷

右剉細，每服三錢，入紫蘇、生薑煎服。如虛冷甚者，加生[illegible]

## 鼻

鼻論

肺為氣之主，通竅於鼻，鼻者清氣出入之道路也。陰陽升降，血和平，則一呼一吸，榮衛行焉。或七情內鬱，六氣外傷，則清濁不分，[illegible]起矣。夫血之與氣，相隨而行，[illegible]生熱，熱則津[illegible]，[illegible]乾冷，則[illegible]流注，若風冷隨氣，[illegible]則[illegible]不



能自收，謂之流涕。肺[illegible]所傷，[illegible]鼻氣不宣，香臭不聞。於是[illegible]作鼻[illegible]，[illegible]血脈[illegible]，歲月淹延，轉加壅結，於是鼻生息肉，或風邪入鼻，搏於正氣，邪正相搏，鼻道不通，則為鼻[illegible]。或氣血壅滯上焦，生熱邪熱之氣留伏不散，則為鼻瘡。[illegible]是數證，七情六氣皆[illegible]受之源，[illegible]有序，痊愈可期，孰方無遺乏，未有所遇也。外此更有[illegible]一證，[illegible]汁臭，下部生瘡，詳於後論，[illegible]論見之

鼻衂證治

[illegible]　治上熱衂血

木通　黃芩　阿膠（炒）　川芎　北梗

蒲黃　甘草（炙）

右剉，每服三錢，水煎熟，入生薑汁少許，溫服

[illegible]　治鼻衂

生地黃　生麥門冬　生薑　白[illegible]

[illegible]

右擣細，以井水[illegible]大盞，煎七分，分兩服

[illegible]　治[illegible]衂血

大黃　川芎　黃連　黃芩

右[illegible]每服二錢，井水調服，食後

[illegible]　治肺熱胃中有熱，衂血，兼治血[illegible]吐血口臭

[illegible]　蒲黃　麥門冬　阿膠

甘草　人參　黃芪　木通

柴胡　生地黃

右擣研取細，用冬[illegible]麥[illegible]即入[illegible]末，[illegible]得所，次將[illegible]和圓如梧子大，每服三十圓，食後服

[illegible]　治[illegible]

[illegible]方

川芎全末，茶清調下，亦治吐血。又茅花煎湯調服。又
方[illegible]方見[illegible]治[illegible]致鼻血不止，以[illegible]解之
仍頻[illegible]，存性為末入鼻。又方[illegible]花等末入鼻。
又方[illegible]花，生研，末入鼻。又方片[illegible]入中白，燒去穢為
末入鼻，[illegible]鼻或加[illegible]。又方[illegible]汁滴入
鼻。又方大蒜，麝香，取[illegible]研，以[illegible]中，有[illegible]即去之

川椒散 治鼻流清涕
大紅開口川椒 細辛 川白芷
辣桂 川芎 漂白朮
右件為末，每服二錢，溫酒調下。
[illegible] 治風邪入腦，宿冷不消，鼻內結硬物，窒塞腦氣，不宣，遂
流濁涕。
[illegible]白芷 切成片，用[illegible]，每服二錢，用[illegible]
柴蘭[illegible]同煎，食後服。[illegible]服後，其硬物自出，腦氣流
轉，鼻涕自收。仍以[illegible]末，作餅，用[illegible]灸，熨貼顖門。
[illegible]治鼻[illegible] [illegible]末入鼻
蒼耳 [illegible] 辛夷 肉桂
防己 木通 細辛 白芷
石菖蒲 木香 川椒 甘草
右剉，每服三錢，水煎[illegible]服。
[illegible]治[illegible]
瓜蒂 藜蘆 皂角
右為末，吹些入鼻。
[illegible]
雄黃 瓜蒂 綠礬 麝香
右為細末，搐些入鼻，亦治息肉。
又方



瓜蒂 明礬 華陰細辛 [illegible]
右為末，以雄犬膽汁和丸，綿裹塞鼻。
[illegible]方
瓜蒂 華陰細辛 等分
右末，綿包少許塞鼻。
又[illegible]
甘遂 明礬 朱砂 雄黃
雌黃 藜蘆 瓜蒂 等分
右為末，香油調傳，前各藥通用。
[illegible] 方見[illegible]，皆治鼻痛。
又方
杏仁 細辛 白芷 全蝎
右為末，麻油調傳。
[illegible] 方見[illegible]，[illegible]可用[illegible]方見[illegible]，共治鼻瘡。
又方
用杏仁研，乳汁[illegible]，或以[illegible]傳，或[illegible]
[illegible]為末，以[illegible]研傳，或[illegible]杏仁研傳。
[illegible]方
蓖麻子 [illegible] 硇砂 [illegible]
白丁香 [illegible] 鉛丹 [illegible]
右件同入[illegible]中，以慢火熬，[illegible]取下，續入研細[illegible]
錢，[illegible]以小竹枝挑些，
點[illegible]便流去，[illegible]但七日[illegible]取出，膿血自成痂
落矣。
[illegible]方
白[illegible]末，[illegible]日洗面，如[illegible]，[illegible]時方以湯洗去，食後
常服[illegible]見[illegible]半月管案。
[illegible]

白礬常擦妙

[illegible]方 以藥吹入鼻，牙關開，次入點法醋井水調下

# 唇舌

唇舌論

心之所司者舌，脾之所司者唇口，是雖各有司存，然心之氣未嘗不通於脾，脾之氣未嘗不通於心也。夫舌者心之官，主嘗五味之[illegible]，以榮養一身，資脾胃之[illegible]，以分布水穀，故心之本脈系於舌根，脾之絡脈系於舌傍。或風寒暑濕之所中，傷則舌端卷而不能言；或喜怒憂恐之所發，則舌腫痛而不得息。心熱則破裂生瘡，脾閉則白胎如雪，舌之為病，合心脾而主治之，故曰心之氣未嘗不通於脾者此也。口者，一身吐納之都門，百物榮養之要道，節宣少差，百病必生焉。故熱則苦，寒則鹹，宿食則酸，煩燥則澀，虛則淡，疸則甘，寒熱偏勝則其味必偏應於口，或酸或甘或苦，[illegible]舌味之[illegible]而[illegible]若六[illegible]池津液出於舌端，亦實主之也，津液流布[illegible]而向，故曰脾之氣未嘗不通於心者此也。或問口臭一證可得聞乎？曰：臟腑異氣[illegible]，同是氣蘊積胃腸之間，挾熱而衝發於口，人將掩鼻而過之，信夫齊不難於愈，方[illegible]難於[illegible]，受病源流，猶不及先[illegible]以古方，實試一中不幾與人于此擇之，不可不早。

唇舌證治

**升麻散** 治心脾有熱，口舌破裂生瘡

川升麻 玄參 川芎 生地黃(各[illegible])

麥門冬(去心) [illegible] 大黃 黃連

[illegible] 甘草(各[illegible])

右件剉碎，每服三錢，[illegible]煎[illegible]食後服

**[illegible]散** 治口舌生瘡，咽[illegible]痛



寒水石(煅過) 朱砂(各[illegible]) 腦子(半字)

右為細末，日三五次摻

**[illegible]** 治[illegible]口舌生瘡[illegible]

玄參 北梗(各[illegible]) 伏苓(半[illegible]) 人參(半兩)

馬牙硝 青黛(各[illegible]) 甘草(各[illegible]) 麝香(半字)

金[illegible]

右為細末，煉蜜圓如皂子大，以腦荷湯化下[illegible]，如口臭，以生地黃汁調下

**[illegible]** 治口舌生瘡

生地黃 藍青葉(各[illegible])

右入蜜同細研，每服半兩，井水煎，食後服

**[illegible]** 治口舌瘡

[illegible]草 黃柏(去[illegible]) 杏仁 青黛(各[illegible])

輕粉(少許)

右件細研，圓皂子大，以綿裹含，有涎吐之

**[illegible]** 治心熱[illegible] 治血熱[illegible]

**[illegible]** 治[illegible]口瘡[illegible]

**[illegible]** 柳花散[illegible]

**[illegible]** 治心熱口瘡[illegible] 可擇用

**[illegible]** 治口臭口乾口舌瘡

寒水石 [illegible] 鵬砂 [illegible] 腦

馬牙硝 甘草 [illegible] 麝[illegible]

右為細末，[illegible]圓如[illegible]子大含化

**[illegible]** 治胃中客熱，口臭煩渴[illegible]

**[illegible]方**

[illegible]

硼砂 [illegible]

[illegible]方 蚶皮 [illegible] 全蝎

右為末少許搽傳

[illegible]方 大山豆根剉細含咽或末搽傳

口瘡方 正黃連 厚黃栢 雞心檳榔

右等分為細末傳之即可

[illegible]方 黃栢 青黛 銅綠

右件為末傳之

[illegible]方 黃連 升麻

右貳件為末以薄綿包含嚥津或[illegible]末傳

[illegible] 白礬 檳榔 [illegible] 和少輕粉研傳

唇舌焦燥口破生瘡者盖心脾受熱所致也以水浸[illegible]湯

[illegible]而飲之或用[illegible]以米飲下此為要[illegible]大

渴而不可[illegible]少與[illegible]湯執劑之法無以[illegible]

[illegible]而已[illegible]則水火相濟[illegible]

## 咽喉

### 咽喉論

咽者胃之系喉者肺氣之所通咽以嚥物喉以候氣理一而分

殊也自其風邪客於喉間氣鬱而熱則壅遏而為咽痛自其熱

氣生於肺胃風毒蘊隆則腫結而為喉痺[illegible]咽者所關不利

肺壅痰涎[illegible]不能宣通[illegible]生[illegible]於咽[illegible]



又如[illegible]之候也[illegible]若[illegible]發[illegible]於米而誤食之滞於咽門

不能出化[illegible]熱[illegible]血[illegible]氣[illegible]腫[illegible]如喉痺之生[illegible]

也胃[illegible]火上[illegible]白頭[illegible]根[illegible]有咽瘡之證臟腑停

寒則[illegible]物窒礙於其間[illegible]有喉閉之證至若懸癰生於

上腭[illegible]咽喉所以[illegible]腫者[illegible]也咽喉[illegible]

關要所係[illegible]人熱則[illegible]之將何如熱則通之

寒則溫之不熱不寒依經調之寒熱和平病不生矣

咽喉論治

[illegible] 治[illegible]咽喉腫結閉塞

鴨嘴膽礬 [illegible] 全蝎 [illegible]

右為末以雞羽蘸藥入喉中須臾破[illegible]出次用[illegible]研

細井水調下[illegible]出毒涎即愈未吐再服

[illegible] 治積熱咽喉閉塞腫痛

山豆根 [illegible] 大黃 川升麻 朴硝 [illegible]

右為末煉蜜圓如皂子大每服一粒以薄綿包少[illegible]嚥汁

[illegible] 治[illegible]攻咽喉腫痛

寒水石 石膏 [illegible] 青黛 [illegible]

右為細末拌和青黛[illegible]研[illegible]每服[illegible]食後

以井花水化下

[illegible] 治咽喉熱腫口舌生瘡

盆硝 [illegible] 青黛 [illegible] 真蒲黃 [illegible]

右以生荷汁[illegible]和[illegible]入[illegible]慢火熬乾研細每服[illegible]錢[illegible]

吹入口內

[illegible] 治咽喉熱痛腫[illegible]

寒水石 [illegible] 硼砂 牙硝 朱砂 [illegible]

腦子 [illegible]

右為細末每服[illegible]入口[illegible]津

[illegible] 治咽喉熱[illegible]

貫衆　縮砂仁　荊芥穗　白伏苓
玄參　黃連　山豆根　滑石
甘草　寒水石　鵬砂
右爲細末每服壹錢乾摻舌上漸以新水嚥下
[illegible]治咽喉發舌熱腫[illegible]
[illegible]治咽喉腫痛
桔梗　甘草　加荊芥穗
右件等分爲麤末每服貳錢用井水煎臨卧服
[illegible]治喉風
白僵蠶　明白礬
右件爲末以白梅肉和圓如皂子大每服用薄綿包入喉少
頃涎水出而愈
[illegible]治喉閉
[illegible]
右爲細末以管子吹開口吹藥入喉少頃令頭低涎出而愈
[illegible]治喉中熱毒腫痛散血消毒
白礬　朴消
右爲末以小管吹入喉
[illegible]方
木鱉子仁　川大黃　牙硝　射干
山豆根　川升麻　白藥
右件等分爲末煉蜜圓如皂子大以薄綿包含嚥液
又方
鵬砂　牙硝
右件等分細研每服半錢以薄綿裹含嚥
[illegible]方
清[illegible]
[illegible]治[illegible]喉閉[illegible]

咽喉

[illegible]治冷證咽喉閉
桂　甘草　半夏
右件等分剉碎每服壹錢水壹大盞煎半候冷少呷
[illegible]方
膽礬細研以管子挑少許吹入喉中即破[illegible]
以[illegible]以大黃[illegible]代之亦得
又方
明白礬末壹大錢匕用巴豆[illegible]入礬中以火熬乾取
巴豆爲末極細每服壹字以小管扎吹入喉涎出自愈
[illegible]方
蛇皮　白梅肉
右件研和爲圓含化嚥汁
[illegible]治纏喉風及急喉閉[illegible]每服半圓研細以
熟水研白梅肉調下或熱涎不住則[illegible]用此
[illegible]治風熱喉痺
焰硝　鵬砂　白僵蠶
右爲末每半錢以竹管吹入喉
又方
川升麻
右剉井水濃煎服少頃吐出毒氣
又方
山豆根　射干　升麻
右井水研服
[illegible]治[illegible]
蚕退紙燒存性爲末煉蜜圓如皂子大含化
又方
又方
綠礬研細米醋調[illegible]一[illegible]臨卧含化

皂角肉半錢剉細以米醋壹大盞煎至柒分溫清服

吹喉散 白礬 直僵蠶 南星 [illegible]
全蝎

右為末以小竹筒吹壹字入鼻中吐痰喉通

又方 治喉閉欲絕

雄黄 明礬生 [illegible] 蝎梢

猪牙皂

右為細末每服壹字吹入鼻吐痰效

玄參升麻湯方

玄參 升麻 射干 大黄

甘草

右為末每叁錢以井水煎時時含嚥

又方

明礬燒灰存性和[illegible]研細點傳患處

[illegible]方

腦麝為末以湯點服

[illegible]圓方

白明礬 牙硝 膽脂

右研細剉烏梅肉圓彈子大含化嚥

又方 治喉熱閉喉以[illegible]汁和[illegible]吐之

又[illegible]方

牙硝 膽脂 鹽梅肉

[illegible]方 以[illegible]常含之嚥汁

右件同研以雞翎送入

齒

齒論



齒者骨之所終髓之所養腎實主之經云腎衰則齒豁精固則齒堅誠哉是言也又曰手陽明之支脈入齒手陽明者大腸經也於齒大何傾不思上髓傳送氣道行[illegible]則齒浮虛則宣露挾風則上攻頭面疳[illegible]則變成齲蝕不拘為[illegible]實相關也大齒之為痛者五一曰[illegible]二曰[illegible]三曰[illegible]四曰[illegible]五曰[illegible]風熱[illegible]客於齦間乘於血氣故令齦腫熱甚加之腫[illegible]是此風熱之為齒痛一也血氣不足胃氣乃虛風冷乘入停於齒根不堅不生日漸動搖此風冷之為齒痛二也熱則生痰毒氣上攻灌注經絡最能致痛外[illegible]壅盛咳嗽交衝此毒痰之為齒痛三也頭面有風熱攻齦熱搏於血故令血出疼痛不消[illegible]則比惡血之為齒痛四也凡人飲食甘肥不能潔齒腐臭之氣淹漬日久齒根有孔虫在其間蝕一齒盡又度其餘至如研[illegible]其種類以虫殺而後痛止此非五曰虫蝕之證乎前[illegible]數者痛有自來治各有道豈可[illegible]于後雖然百物養生莫先口齒不[illegible]不洗[illegible]之患是不惟[illegible]生宿[illegible]而曷毒消毒常伏於口齒之間莫先時時洗漱之為愈也臨睡洗畢至于晨興[illegible]一口[illegible]出[illegible]目光明[illegible]行之[illegible]為[illegible]

[illegible]方 治風熱齒痛

荊芥 薄荷 升麻 細辛

[illegible]

右件等分為末每服貳錢以水煎嚥漱以含[illegible]用擦牙

[illegible]方 治齒熱痛齦腫有汁先使[illegible]又以[illegible]

[illegible] 其上 又法[illegible]漱[illegible]毒

[illegible] 治風[illegible]齒痛

當歸 川芎 細辛 白芷

蔓荊 藁本 蜂房

右剉每貳錢井水煎服仍含漱

[illegible]散 [illegible] 八[illegible]散 治[illegible]冷[illegible]齒痛

[illegible]治冷證齒痛
香附　紅川椒炒　故紙[illegible]各貳錢　華撥[illegible]
右為末和勻用貳錢擦傳
[illegible]治風冷齒痛
白芷　細辛　良薑　華撥
川椒　香附　蜂房各
右件等分為末擦牙搐鼻
[illegible]治風齒動搖
長肥皂角[illegible]　白鹽[illegible]
右二件同燒赤研細白擦
[illegible]加細辛[illegible]用[illegible]傳煎治[illegible]齒痛仍
以[illegible]等分井水煎候溫以舌浸其中從自流出
[illegible]治毒血齒痛[illegible]加[illegible]煎
[illegible]治牙宣出血或痛
[illegible]
槐花　荊芥穗
右等分為末擦牙仍煎[illegible]服
[illegible]治齒出血
鬱金　白芷　細辛
右件等分為末擦牙仍以[illegible]濃煎入鹽少許含漱
[illegible]
[illegible]治惡血齒痛
川五靈脂以米醋煎汁含漱
[illegible]治虫蝕齒痛
猪牙皂角[illegible]　川椒[illegible]　生明礬
鶴虱[illegible]
右為末蒸餅搜圓如麻子大納於孔中有效吐之
[illegible]治齒虫痛
川椒　白芷　蜂房[illegible]



右件剉碎等分每服貳錢以井水煎[illegible]熱含冷吐
[illegible]方
川巴豆肉[illegible]　明乳香[illegible]
右同研[illegible]圓麻子大每服壹圓塞孔
又[illegible]方
紅川椒末[illegible]　大巴豆肉[illegible]
右件研細蒸餅圓如麻子大以薄[illegible]塞孔
又方
明[illegible]　明乳香[illegible]
右為細末搽圓塞孔
又方
[illegible]以薄綿包塞牙吐之○又方[illegible]
入[illegible]塞○又方[illegible]燒存性搽少許鹽湯漱口○
又方[illegible]入[illegible]研傳痛處
又方
[illegible]　蜂房[illegible]　樟腦[illegible]
右為末[illegible]少須和[illegible]小圓塞痛孔
[illegible]用方
華撥　生地黃　當歸[illegible]　荊芥穗
白芷　桑白皮[illegible]　蜂房[illegible]　赤芍藥
[illegible]　細辛　藁本　赤甘草[illegible]
右為粗末每服叁錢井水煎頻漱齒
[illegible]治齒痛通用
當歸　荊芥穗　川升麻　川鬱金
細辛　白芷　華撥[illegible]
右為末每服半錢擦痛處[illegible]鹽湯漱
[illegible]川[illegible]治齒[illegible]痛通用
紅川椒目[illegible]　赤小豆　縮砂仁[illegible]

明礬 半生半煅 為末少許，揩擦不妨，咽痛甚加川椒，麻(?)

**又方** 蜂房 炙焦 全蝎 各等分 為末傳，亦治風疼

**又通用方** 絲瓜 乾燒存性 為末擦傳

**又方**

蜂房 炒　明礬 煅　黃丹 各等分

右為末，飯為小丸，塞齒

**齒齦宣露** 治牙斷爛口臭

白礬 煅　青黛　胡黃連　蘆薈 各等分

蝦蟇 一枚燒存性　麝香 少許

右為末，每服半錢，傳患處

**又牙疳方** 以熟豬肉薄切，塗酥傳之，或用大黃末凉傳，以紙裹又用荷葉外包，煨令焦存性為末，入少許研傳。又**走馬疳**燒入麝研傳治牙疳。**黃柏末**可為散傳。

**牙宣方**

末研　雄黃　磁石　石膽

礬石 各等分

右件等分入磁合，鹽泥塗固，燒兩日夜，埋地出火毒兩日，細研，雞羽蘸傳瘡，惡肉朽骨損牙俱出而愈。此周官五毒攻瘍之方，諸惡肉朽骨瘡毒通用

**牙疳散方**

蚕蛻 燒存性　白僵蚕 炒去絲　為末，擦傳，良久鹽湯漱口

**又方** 鷄屎白為細末，良久鹽湯漱口

**又牙齒風腫方**

明白礬 煅　乳香 半錢　小錢

右件同研細，頻擦良久，鹽湯灌漱

**治風牙方** 以井水漱口，頻換。少食凡物，或白湯沖涼湯，漱冷含味或用蒜頭傳齒痛通用





新編仁齋直指方論卷之二十二

# ○癰疽 附 乳癰 疔瘡 瘰癧 漏瘡 瘭

## 癰疽論

癰疽五發，曰癰、曰疽、曰瘭、曰痼、曰痼發背者是也。人之一身，血氣周流而無間，稍有壅聚，莫不隨所至而發見焉。又豈特五者而已哉。俗以癌、痼、瘭附於癰疽之列，以是為五，豈知瘭與痼不過癰疽之一物。古書所載，從有所謂瘭疽，則瘭亦同出而異名也。若癌者，癌則未之聞，合是以為五發，其可乎。癰者，壅也；疽者，沮也。血氣壅沮，寒熱不散，陰滯於陽則發癰，陽滯於陰則發疽，而所發無定處也。蓋衣服厚煖則表易招寒，滋味過多則裏易生熱。感受日久，熱勝於寒，寒化為熱，六腑積熱，騰出於外肌肉之間，其發暴甚，腫而光軟，皮薄以澤，侵展廣大者為癰，其患浮淺，不傷筋骨，此可治也。五臟積熱，攻焮乎肌骨之內，其發停蓄，狀如牛領之皮，厚以堅，淡白焦枯者為疽，其患沉深，傷筋蝕骨，此不可治也。凡發熱惡寒，頭痛惡心，筋節拘攣，氣悶悶，或病渴經年，是皆欲發癰疽之證。發於喉舌頭面腦項肩背胸腹四肢大節，女子妬乳，軟皆為險，其他為緩。腫高而軟者發於血脈，腫下而堅者發於筋骨，肉皮色不變者發於骨髓。近骨者多冷，近虛者多熱。近骨久不愈則化血成蟲，近虛久不愈則傳氣成漏。成蟲則多癢少痛，或先癢後痛；成漏則多痛少癢，或不痛不癢。若形狀腫大，按而後痛者，其膿深；小按即痛者，其膿淺。按之軟而即復者，有膿；按之強而不復者，無膿。膿淺者欲在厚處，膿深者欲在薄處。一種起堅硬腫核者為實，膿下軟漫腫稀者為虛，有實熱者易療，虛寒而邪熱多者難療。瘡疽已決，去其膿而煩疼尚不全退，其脈洪粗者又難為力。要之，癰疽脈來帶澀，但得和緩為平。若洪粗則愈毒不收斂，有潛也。然則治療之法將何如？曰：血得溫則流行，氣得溫則和暢，癢痛得藥用和平，初緊則散壅，臨

消已潰則排膿斂毒膿盡則去腐內塞惡肉盡則生肌傅痂此定則也瘡家臟腑宜熱恐其血血敗則腐肉肉腐則成膿膿當膿血城聚之時所賴朝夕洗滌以外虧其毒[illegible]積則膿即發諸瘡對而破之[illegible]則敗肉即[illegible]而去之稍或稽延不及掌而侵蝕筋骨其必腐敗[illegible]氣[illegible]好肉得生耳而收癰疽險惡古人以虎口[illegible]喻之一芽初萌[illegible]作主張殆有甚於拯溺救焚之不可緩也奈何人多玩忽遷延成形[illegible]以此往往不救伊誰之咎大抵癰疽自內發外最不可服冷藥亦[illegible]可[illegible]冷藥但以溫和調合使毒氣自內發出可也若服冷藥則必至傷動臟腑若[illegible]毒則[illegible]毒氣內行內氣有虧毒從外入衝心煩燥嘔吐[illegible]喘以至泄瀉此[illegible]內壞殺人無疑或不隨順痊理更以[illegible]已剩行之[illegible]口太速毒氣[illegible]出未盡必於其旁復發大疽至血排膿斂毒去腐生新收口人所共知也孰知諸痛癢瘡皆屬於心心主血脈心通諸竅加[茯苓][茯神][遠志][石菖蒲]等藥又當佐助於其間抑使病人不得憂愁[illegible]怒勞精神有觸於心尤關利害五臟六腑所包者一膜耳人有患癰疽幾殆兩月新肉已平夜[illegible]中[illegible]若[illegible]疾[illegible]觸入心新肉開裂[illegible]者謂其肉膜已破而後肉開神仙莫救畢并心平於此又能精加飲食使胃氣有所充和補救[illegible]使內氣得所養有諸中形諸外理勢必然切戒癰疽成形以後不得通利大便上[illegible]毒蓄用[illegible]等類以[illegible]佐之若[大黃]則不敢輕用也如其有熱即以[illegible][白][illegible]以[illegible]利其熱於小便之中或以[illegible]入[illegible]如豆湯主亦能疏導若夫瘡口[illegible]熱而[illegible]疼[illegible]用[illegible][illegible]煎湯入[illegible]為之[illegible]洗或瘡口[illegible]平[illegible]一[illegible]時[illegible]水不乾者其中必有蟲蛀朽骨當以[illegible]消[illegible]而毒除之婦人患此適值月候不行尤當[illegible]為調血所謂大寒大熱大渴大吐大瀉狂言[illegible]事[illegible]皆[illegible]不收[illegible]血[illegible]



流不止小便如淋結硬過月方發硬如石稍不破多日不腫[illegible]肉不知痛癢[illegible]熱[illegible]意取涼沉重毒弱氣之肩項運掉不一[illegible]病腹如脂[illegible]血常流腫如赤白下痢[illegible]小[illegible]而白睛青黑膿血入眼而[illegible]且[illegible]色[illegible]而肢體腫浮氣短[illegible]而[illegible]燥時[illegible]而[illegible]渴其[illegible]食不下而服藥即嘔與夫吃逆咳喘大便泄瀉皆惡證也癰猶有內外之別為疽初發粟一粒[illegible]身體[illegible]熱[illegible]亦熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅[illegible]此為外發雖[illegible]大用藥有[illegible]一失自發[illegible]以來不問小大身體[illegible]亦不熱數日之間[illegible]開不腫不高不[illegible]不痛[illegible]而[illegible]肉色紫黑此為內發[illegible]如之何[illegible]其未發以前[illegible]已[illegible]爛矣此又善惡之辨[illegible]雖然癰疽治法已條列於前矣究其病源有風有氣有食有藥毒有勞損而所受不同[illegible]風則多癢氣則多痛食則發寒熱藥毒則堅硬勞損則[illegible]弱此外證之為可驗也風氣食三種易療藥毒勞損二者難愈大[illegible]風毒當[illegible]風氣毒當調氣食毒當消積勞損當補[illegible]藥毒[illegible]則[illegible]利之[illegible]解之[illegible]則[illegible]可以為依登山到頂酌水問源故推明本始以為[illegible]一[illegible]之助

癰疽灸治

[灸法]癰疽初發小點一二日間急以大蒜頭橫切如錢貼其中心頓小艾炷灸之五壯而止若形狀稍大以黃[illegible]紙[illegible]濕令貼認先乾處為筋腳於先乾處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯而止[又法]取指從四圍尋按遇痛處是根就此重按深入自覺輕快即此灸之更於別處尋灸若或大腫即搗蒜為餅焙乾蘸法醋灸熱更換頻[illegible]或以艾[illegible]於蒜餅上灸之更換熱餅須灸如覺患處[illegible]散即以[illegible]盡切令[illegible]也依小[illegible]癰疽長大如[illegible]之形且看頭向上下先灸其前兩腳次灸其尾或紅線走緊而長從[illegible]處灸之頂留頭并後兩腳勿灸若盡[illegible]之

不惟火氣壅聚彼毒無所泄散又依入裏也或辨認不明以
白芷 各三分　黄柏　桑白皮 各[illegible]　車根 [illegible]　搗爛
右取新水煎湯入酸醋半盞淋洗小瘡其筋自現可以辨認
頭尾
[illegible]消法 治癰疽發背已發未結已結未潰急以[illegible]新水
浴令稀稠得所攤在紗紙上貼之良久以戰布二條於[illegible]醋中
煮熱互換熨出毒在膠紙上又熨常要熱氣相接若乾起後乃
藥氣透須忍痛頻熨候直至消散或破而膿出將盡即以[illegible]
煎湯洗去膠紙用[illegible]或[illegible]摻瘡或便用[illegible]
[illegible]隨意服[illegible]一料或兩服[illegible]破後以[illegible]
[illegible]方 盡洗去毒氣
[illegible]散 癰疽腫毒通用能散能潰
南星 壹兩 [illegible]大白者　草烏頭
白芷 各半兩　木鱉子仁 壹個 [illegible]
右細末分兩次法醋入蜜調傅紙貼之
[illegible]散 治癰疽腫毒未結則散已結則潰去風排膿
大南星 壹兩　貝母 各分　白芷　赤小豆
直僵蠶 各半兩　雄黃 別研
右細末初用醋調傅後用蜜水調傅
[illegible]方 治諸癰疽已破未破通用
瓜蔞 壹箇去皮銼細　紫車螃蟹 [illegible]
皂角刺　甘草 各[illegible]　乳香　輕粉 [illegible]
右細末先用老酒貳碗煎瓜蔞[illegible]去滓取壹大碗五更煖瓜蔞
酒調上項藥末空心服大便自下惡物如魚涎狀
[illegible]
瓜蔞 去皮　老粉草 壹錢半
右剉酒水等分同煎少頃入[illegible]川椒肆拾玖粒臨熟又
入[illegible]末少許溫服



[illegible]方
黑牽牛 去皮
右取行又豬腎中綿札濕紙包熱火灰內煨香熟候冷溫酒
嚼下
[illegible]方
斑猫 去頭足翅 只　好大[illegible] [illegible]入豬腎中[illegible]
右空心嚼豬腎溫酒下
又方 治癰疽腫毒
老翁鬚 [illegible]
右花與葉[illegible]搗擂酒調服無花只用葉酒和葉煖可傅瘡
[illegible]散 治癰疽托毒排膿治五毒附骨在臟腑裏托出毒氣止
痛內消
蜂房 壹兩　蛇退　穿山甲　油髮 [illegible]各壹分
右為末每服貳錢入乳香末半錢煖酒調下
[illegible]散 托毒排膿
川芎 半兩　甘草 壹錢　乳香 壹分　皂角刺 [illegible]
右末每服貳錢溫酒調下
[illegible]散 托裏排膿生肌
川芎　當歸　白芍藥　木香
白芷　茯苓 各等分　人參　辣桂
丁香　甘草 各壹分
右末每貳錢食前米湯調下
癰疽毒入臟腑嘔吐眠食少
甘草 半兩　丁香 壹分
右剉每服貳錢水一碗入薑少許溫服
癰疽腫毒傅藥[illegible]收腫解毒排膿
滑欄根皮 末　[illegible]貝母 各[illegible]
右二味同搗酒調[illegible]或以水調小石[illegible]把每[illegible]

血或膿用[illegible]亦效

[illegible]收膿散毒排膿

落地茄花去心　黃蜀葵花去心　赤芍等分

右爲末井水稀調雞羽掃敷愈乾則再傅或收毒子散或破潰出膿神效如瘡口開用末摻亦效毒不出於證

[illegible]癰疽通用

消蘭皮　大南星　赤小豆

白芷　薑黃各等分　白及半分

右細末酒調傅或蜜水醋同調傅

[illegible]癰腫通用

木鱉子去殼　大南星　半夏生

赤小豆　白芷　草烏頭去皮尖各等分

右細末硬則法醋調傅熱腫則蜜水調傅

[illegible]癰腫初發急用

川烏　蜈蚣炙土等分

右細末法醋調傅未結則散已結則潰

[illegible]消膿排膿

夜明砂壹兩　辣桂半兩　乳香壹分

右細末入乾砂糖半兩研和用井水調傅

[illegible]治癰疽腫節疼痛入門先用此止痛

綠豆粉　乳香各半兩

右末酒調傅傘紙貼乾則再傅次後卻換消腫排膿藥

[illegible]治癰疽已結未作欲潰

大南星　草烏頭　辣桂等分

右末用酒或醋調傅留白口貼末欠再用

[illegible]傅四圍收毒

南星　赤小豆　白及等分

右末井水調傅四圍留瘡口貼上

癰疽

[illegible]癰腫毒通用

大南星　圓白半夏生　赤小豆

五倍子　白芷　貝母各貳錢半

右細末蜜醋調傅

[illegible]

黃明牛皮膠以長流水半盞化開入乳香五大錢

右收斂收入瓷合以雞羽掃於瘡上留口如未破傅腫自消

[illegible]治癰疽毒腫止痛收斂筋脈

乳香　明沒藥各壹分　豐湯

[illegible]　黃蠟　草麻子仁壹兩

右熱研極細以片以撚紙拆薄攤藥留眼貼之日二換或

用[illegible]入四圍研細傅貼

[illegible]治癰疽發背腫毒

透明硫黃　蕎麥麵各貳兩

右用井花水調和作餅焙乾收下要用時再末之入[illegible]少許井水調厚傅瘡上如乾以雞羽蘸新水潤之如此至瘡愈方敢痛則不痛不痛則痛神驗

[illegible]治癰疽腫毒

黃蜀葵花

右用鹽摻收入瓷器密封經年不壞患處傅之自平自潰

[illegible]炒碎入宜毒藥中尤驗

[illegible]癰疽腫結通用

不蛀皂角

右以法醋煎爛研膏傅之自消

[illegible]治發背癰腫硬厚如牛皮服之方精

大南星　草烏頭　半夏　狼毒等分

右細末醋蜜調傅留頭出毒氣

[illegible]毒疽排膿斂毒

大南星[三分] 白及[三分] 赤小豆
半夏生 貝母[各半兩] 木鱉子仁[去殼]
乳香 沒藥[各一錢] 雄黃[少許]
右細末井水入蜜調傅少許
[拔毒散]治癰疽腫毒等患
爐甘石[[illegible]分細] 大南星 半夏[生各半兩]
五倍子 赤小豆 片薑黃 直僵蚕
貝母 白及[各一兩] 乳香[少許]
右細末未破者醋調傅已潰者清蜜調傅半乾濕只摻若
紅腫多汁[生地黃]研汁調傅仍煎[[illegible]]湯淋
[麝香散]癰疽已結而頭不破用此
直雀糞[[illegible]] 斑猫[去頭足翅] 麝[少許]
右細末法醋調少許點在有頭處立破急用[illegible]湯洗去
[透膿膏]治癰疽軟而無頭不破或已破而無頭腫結無膿
斑猫[去頭足翅炒]
右為末蒜搗和膏似小豆許點在膏藥中[illegible]瘡口處貼之少頃膿出即去藥或用[illegible]少許用[illegible]調作點傅瘡
頭軟處亦破須四圍塗藥護之
[[illegible]散]治癰疽瘡口小而硬貼膏藥膿不出是為風毒所勝用
赤足蜈蚣[[illegible]] 全蝎[[illegible]]
木香[[illegible]]
右細末每用一字摻於膏藥上[illegible]瘡口貼如瘡口閉不硬勿用若是風邪所搏即煎[illegible]次入[白芷]末半兩少頃溫清淋洗明日又洗如服[illegible]
[護風散]收瘡斂毒
大南星[[illegible]] 明白礬[[illegible]] 白蘞
白及 雄黃
右細末每半兩[illegible]調傅[illegible]肉上自[illegible]



促斂之又驗瘡用新水調筆蘸傅瘡頭力勝則腫消皮皺易
療若腫處沒急通閒難療
[[illegible]散][illegible]傅癰疽瘡內使膿血化為水出收瘡斂毒
大南星[[illegible]] 白蘞 草麻子仁[各[illegible]]
白芷[[illegible]] 薑黃 五倍子[[illegible]] 貝母[半[illegible]]
白及[各[illegible]] 沒藥 乳香[[illegible]] 爐甘石[[illegible]]
右細末夾和井水入[蜜]調傅瘡色暗晦[illegible]汁調傅從暈邊抹
收入裏留中間如錢大貼膏藥若瘡開大全用紗攤藥以舊
茶籠內白竹葉剪兩片如瘡勢先貼藥上然後貼瘡久年
邊仰上竹葉亦得竹葉出水黏藥以行之凡傅藥須是細末
則不痛
[內消[illegible]]癰疽惡瘡[illegible]覺便服
穿山甲[[illegible]]
右為末入[illegible]每服貳錢半溫酒調下或[illegible]煎酒調下
尤妙[illegible]服
[大全內消散]內消毒疽惡瘡[illegible]覺便服
穿山甲[[illegible]] 當歸[半兩] 甘草[[illegible]]
右末每服叁錢溫酒調下
[[illegible]散]內消毒疽取下惡毒當初便服
紫背大車螯[[illegible]]
右細末每服叁錢入[生甘草末]壹錢[illegible]用[illegible]枚
[illegible]叁拾塗分兩次煎酒[illegible]調下五更晶服天明又服日
于大便下黑若惡物或不用[illegible]入[illegible]貳匙
[[illegible]散]治癰疽等患宣毒排膿宜初便服
紫黑色皂角刺 連皮瓜蔞[[illegible]] 北五[illegible]
右剉細每服肆錢酒[illegible]大盞煎[illegible]入乳香少許溫服皂刺
亦能宣毒
[[illegible]]治癰疽[illegible]宣通[illegible]初便服神妙

瓜蔞[illegible] 甘草[illegible] 沒藥[illegible]

右用紅酒叁大盞煎取其半分兩服溫服之在上食後服患在下食前服重者[illegible]以[illegible]又方加[illegible]白芷[illegible]

[illegible]重要宜[illegible]加[illegible]

內托黃芪散 治癰疽初發便服或毒氣入裏衝心煩悶吐嘔欬噦以至泄瀉急用此藥服托裏逼出毒氣自內發起于外此藥又能消已發未發皆可服神效

真菉豆粉[illegible]兩　明乳香[illegible]

右末每服貳錢熟新水調下或生甘草煎湯調食後少時細呷常要藥味在胸膈間則毒氣不能攻心或瘡[illegible]用[illegible]

[illegible]散 每服貳錢煎湯調下仍以加味不換金正氣散為佐

小兒豆瘡陷入[illegible]能托之[illegible]攻心嘔悶通治

[illegible]治癰疽發背[illegible]內服[illegible]解諸毒自然內消神效

通明白礬[illegible]

右細末[illegible]壹兩貳錢溶化就盞上入[illegible]拌和丸梧桐子大每服拾伍圓熟水下或冷酒下常服之[illegible]用[illegible]加[illegible]內[illegible]外塞

明膠飲 治癰疽等患使毒氣不攻於內不轉變證

透明牛皮膠[illegible]

右溫酒壹大盞入膠重湯燉令溶化通口服

排膿內補[illegible] 治癰疽發背活血排膿消毒　紅內消[illegible]

何首烏[illegible]　當歸　川芎　生地黃

川續斷[illegible]　伏苓　芍藥　白芷

半夏麴　藿香葉[illegible]　紫草茸　甘草[illegible]

右麄末每服叁錢新水貳分酒壹分[illegible]煎服有熱者加[illegible]

[illegible]只用水煎

[illegible]內[illegible]大渴[illegible]用此[illegible]



內塞[illegible]以加味不換金正氣散佐之有熱[illegible]切用

以[illegible]內補[illegible]加[illegible]服

[illegible]治癰疽須用香氣[illegible]

木香　丁香　藿香葉[illegible]　沉香

乳香　連翹　木通　[illegible]

桑寄生　甘草[illegible]

右細剉每服叁錢井水壹盞煎[illegible]分入[illegible]少許患在上食後服患在下食前服五香[illegible]令人頭痛[illegible]入裏熱氣[illegible]拘攣此藥[illegible]之如有熱[illegible]加[illegible]

加味不換金正氣散 治癰疽[illegible]或內挾風邪或內氣虛飲食[illegible]用最能[illegible]出風毒[illegible]與[illegible]排膿內補[illegible]並行

蒼朮[illegible]　橘紅　半夏麴　藿香葉

厚朴[illegible]　甘草[illegible]　白伏苓　川芎[illegible]

木香[illegible]

右為末每服叁錢薑伍片棗貳枚煎服[illegible]不[illegible]多[illegible]

[illegible] 治[illegible]氣[illegible]食[illegible]通用[illegible]胃氣[illegible]服之

木香　藿香葉　白豆蔻仁　半夏麴

厚朴　橘皮　伏苓　蒼朮[illegible]

甘草[illegible]　益智仁　縮砂仁　丁香[illegible]

右麄末每貳錢[illegible]煎服

[illegible]治[illegible]內虛止痛

黃芪　白伏苓　甘草[illegible]　乳香[illegible]

右末每服貳錢酒小盞慢火[illegible]如[illegible]再添酒調服[illegible]

[illegible]治[illegible]咽[illegible]亂[illegible]不[illegible]

辣桂[illegible]　當歸[illegible]　木香　白芷[illegible]

右細剉每服叁錢[illegible]煎[illegible]

不[illegible]溫服以[illegible]內補[illegible]為佐以[illegible]

〔…〕能發起可發食之如更不發起用
〔…〕加〔…〕煎服又更不發却用
穿山甲 …… 生人牙 ……各等分
右為末分作兩服用〔…〕煎酒食前調下速
急用〔…〕和〔…〕或用〔…〕服並細末酒調
傳之
〔…〕治癰腫結硬聚毒作痛
木香 …… 用生……
右為末每服一錢半米飲調下或〔…〕煎湯調下澄數服
硬自消有服〔…〕出於氣血〔…〕便急用〔…〕
〔…〕治癰疽發毒
當歸　白芷　甘草生
赤小豆　紫草茸各半　貝母各一兩
右末每服二錢半水煎日三服
〔…〕止痛通利小便從小便出毒氣
瞿麥穗　赤小豆　當歸　川芎
白芷　黃耆　赤伏苓　辣桂
甘草各……
右〔…〕每〔…〕半酒調下
〔…〕治……發背魚……毒……毒挑生毒……
毒蟲……出……
文蛤 ……　山茨菰 ……
紅芽大戟 ……　全蝎 ……　大山瓦根
續隨子 ……　麝香 ……　朱砂　雄黃 各……
右件先以前件味入末〔…〕研後〔…〕味〔…〕和搗
米粥〔…〕作〔…〕各〔…〕日〔…〕服
壹圓〔…〕水〔…〕毒〔…〕救病神妙
〔…〕五毒攻腸中……



〔…〕治癰疽〔…〕外發熱用此
黃芪　何首烏　遠志　木通 ……　赤伏苓
川芎　北梗　苦參　赤小豆
赤芍藥　草藥子　威靈仙各等　生甘草半兩
右末每服二錢〔…〕煎湯調下
〔…〕治〔…〕有熱者
遠志　赤伏苓　赤芍藥　生地黃
麥門冬去心　知母　甘草各生等分
右剉每服〔…〕煎服小便秘加燈心木通
癰疽大便秘〔…方〕
紫草　瓜蔞
右剉新水煎服或用黑豆〔…〕入生〔…〕煎湯亦得
〔…方〕
參苓白朮散
〔右……〕
右以〔…〕煎湯調下
〔加味八味丸〕……瀉心火生腎水治……疾癰疽未發前〔…〕後渴
痛用
好熟地黃 ……　山藥 ……　山茱萸 ……
辣桂 ……　澤瀉 ……　牡丹皮 ……
白伏苓 ……　真北五味子 ……
右為末煉蜜和圓梧桐子大每服〔…〕空心鹽湯下
〔…方〕
辣桂 ……　木香　芍藥　北五靈脂 各……
右剉散每服〔…〕煎服
〔…方〕
粉乳托裏散
右用〔木香白伏苓〕煎湯調下〔加味不換金正氣散〕〔…〕嘔噁
通用

〔[illegible]散方〕
明乳香 [illegible]
右每服壹錢，熱水調下。此藥於肝，乳香專肝而温之，寒熱亦止。
〔[illegible]圓〕治癰疽因腎虛勞損所發，前服[illegible]圓，更初腎
氣開時，端坐勿言，勿動，勿咳，勿唾，侍側有人，進藥，鹽湯下，日間
以〔[illegible]服內補[illegible]〕加〔[illegible]〕佐之，最爲功驗。
〔內托[illegible]圓〕癰疽因針砭誤割傷其經絡，白膿赤汁逗留不止
用此。
黃耆 貳兩　當歸 [illegible]　木香
沉香　乳香 [illegible]　肉桂
右末，菉豆粉壹兩，生薑汁煮糊圓梧子大，每服[illegible]圓，溫熱
水下。
〔[illegible]〕治癰疽發背，隨毒淺深用之
軟石膏 [illegible]　大白南星　赤小豆
草烏 [illegible]　乳香 [illegible]
右細末，蜜水調，敷從外抹收入，留頭向上，泄毒氣，勿傳，如已破，
切忌藥入瘡口，恐痛。此毒淋漓不致潰爛，其效。
〔洗瘡方〕
薺草　苦參　貝母　射干
木通　蜂房　大腹皮　桑白皮
漢椒　連根葱白 多用　白芷
右煎湯，密室中淋洗。
〔又方〕
白芷 壹兩　新桑白皮 [illegible]　貝母 半兩
漢椒 [illegible]　紫蘇 [illegible]
右剉，每分兩次，入連根葱煎，以[illegible]湯洗，潰爛者，〔[illegible]湯〕
洗，或〔水[illegible]湯〕洗亦好。
[illegible]癰疽瘡口，令深深血少，[illegible]名[illegible]，又不合，遂日用

癰疽

北艾 [illegible]
右煎湯，密室中洗，仍以白膠香燒煙熏之，瘡口深者，多服[illegible]
〔[illegible]不[illegible]〕
又方 瘡口已成，大窟以
桑白皮 [illegible]　當歸 半分
右爲末，乾摻外用，〔北艾[illegible]〕煎水研細塞口。
〔[illegible]散〕治瘡口有熱攻，傲作痛，亦爛，血汁
桑白皮 [illegible]　苦參　槐花　天花粉 [illegible]
右杵細末，乾摻，仍煎〔[illegible]白皮〕湯，溫洗，瘡深者加〔[illegible]〕
〔又[illegible]方〕
白芷　桑白皮
右煎湯洗，以桑白皮末摻之。
又瘡口大，每用以
大桑葉 [illegible]
右末之，須摻初經霜黃桑葉尤好，摻傳，煎湯皆可用。
〔又方〕
〔[illegible]〕或〔[illegible]〕取汁，飲並抹
〔[illegible]散〕治[illegible]惡肉深赤，先用洗瘡方，然後傳此
明白礬 [illegible]　綠礬 [illegible]　雄黃
乳香　好胭脂　遠志 [illegible]
右細末，蜜水研，傳惡肉上，麻油調亦得。
又〔[illegible]方〕臘月收猪膽[illegible]性
猪膽 [illegible]　雄黃 [illegible]　雞心檳榔 [illegible]
右細末，凡若摻，乾者麻油輕粉調抹，能惡肉[illegible]好
〔[illegible]〕[illegible]潰後孔中，以[illegible]，捏小圓塞其中，以[illegible]
內〔[illegible]〕次〔天花[illegible]〕[illegible]消毒
〔[illegible]〕
[illegible]　花蕊石　雞內金 [illegible]　白及 [illegible]

白歛（各錢半）　黃丹（[illegible]）　滴乳香（各半錢）

右滑石花蕊石炭燒通紅[illegible]地上伏時為細末次入餘

藥末研和乾摻神效

【[illegible]散方】

白歛　白及（各壹兩）　雞內金（[illegible]兩）　降真香（半兩）

右細末井水調傅須膿盡乃可用潰者亦能歛

【[illegible]生肌方】

降真香（[illegible]）　桑白皮（[illegible]）　半夏（生各半兩）

乳香　當歸　五倍子（各貳錢）

右細末乾摻

【又方】

天南星　半夏生　五倍子　雞內金（各半兩）

南木香　當歸　降香[illegible]　降真香節

白歛　白及（各貳錢半）

右細末先[illegible]洗後摻與傷撲通用

【生肌散】

老狗頭生腦骨（[illegible]）　桑白皮（[illegible]）　[illegible]

右細末麻油調傅瘡口則移合[illegible]之

【太乙膏】治癰疽發背惡毒

好號丹（[illegible]）　男生髮（[illegible]）　木鱉仁（[illegible]）　肥白巴豆肉（[illegible]）

右用麻油肆兩慢火先煎巴豆木鱉[illegible]更投柳枝攪[illegible]

耗五分頃令滴絹濾去渣入淨銚入丹投柳枝攪播候變滴

入水成珠隨意入乳香末再煎沸傾入磁器候凝覆收之[illegible]日

雖用凡修合宜密室中勿令貓犬婦人見之

【[illegible]膏】治癰疽發背惡毒

龍泉好光丹（[illegible]）　真麻油（[illegible]）

右慢火同熬更投柳枝攪滴入水成珠方入白歛末少許

拾餘傾入[illegible]以水浸兩日出火毒[illegible]



【[illegible]膏】治癰疽發背惡毒瘡癤

黑參　白芷　當歸尾　杏仁（不去皮）

木鱉仁　男生髮（[illegible]）　[illegible]（各貳錢）　[illegible]

肥白巴豆（[illegible]）

右剉細麻油伍兩同藥入磁銚浸[illegible]慢火煎更換柳枝攪

候藥色焦黑頻令爐生絹濾再入銚煉入[illegible]貳兩柳枝

攪[illegible]候黑滴入水成珠入乳香末貳錢拌和傾入磁器候凝

覆尼地坐日點用

【[illegible]膏】治癰疽發背瘡癤等

川五靈脂　白芷　貝母（各半兩）　當歸（貳錢半）

右剉細柳枝截貳拾肆寸[illegible]油陸兩同上藥入磁銚熬候焦

火煎柳枝攪藥色稍焦入肥白巴豆貳拾壹粒[illegible]許伍

[illegible]攪煎令黑頻令爐生絹濾再煉入[illegible]半兩[illegible]

入[illegible]貳兩半更換柳枝急攪候黑滴入水如珠入銚

【[illegible]】米冬貳錢拌和傾入磁器候凝覆[illegible]地三日點用

好柳枝[illegible]

【[illegible]法】治癰疽發背瘡癤使服使毒氣不內攻可保

真麻油（[illegible]）

右和酒[illegible]貳盞分作[illegible]次[illegible]溫日夜服盡解散毒

【[illegible]忌】

避風邪　少睡臥　勿[illegible]　勿嗔怒　徐行動　省言語

戒閑勞　絕思慮　防饑飽　[illegible]事　[illegible]

[illegible]香　一使[illegible]　擇飲食　[illegible]

[illegible]常加[illegible]　宜用[illegible]其毒不忌

[illegible]食反[illegible]其[illegible]上[illegible]

[illegible]凡發[illegible]如[illegible]頭[illegible]

但以[illegible]或有疑似[illegible]

[illegible]男女皆取左手中指用草[illegible]全指為[illegible]

草拾貳片陸片安頓在外合之離作形陸片安頓於離對之內
中心貳頓貳片四方分頓肆片內外各相連合灸安則兩尾四
足定矣以筆點其尾足挨滸灸之先灸其尾待壯火未滅便
灸後脅脚待壯火未滅又灸後脅脚待壯迎灸如是灸至前兩
脚而止須留頭莫灸以出毒氣法也[illegible]其如筋中間大頭作
丈壯也夫合陰陽氣俱可用灸之省力療理
論熱自發大都惟發熱則消之若不發熱皆痛也其有陰證
於五六日發者知又沉晦無熱大凡癰疽惟赭有熱則發熱則
氣血行今則氣血滯熱則能生既今則擁不合遇有熱者切不
可[illegible]用寒藥以致京少流之是爲和劑
論[illegible]發背俗以腫痕所於表裏外皆重也量生於口之
旁如紅筋之狀[illegible]以至[illegible]向可
指手若肆量伍量[illegible]

**保安萬靈丹方** 治[illegible]癰疽[illegible]通用神妙

粉草[illegible]

右劑覆末用酵[illegible]煎[illegible]空心[illegible]溫服[illegible]活血解毒

**諸豆方**

赤小豆　綠豆　黑豆　川[illegible]

右爲細末未發起當以和井水調傅已發起羨水調傅

**前癰疽大服秘方**

甘草[illegible]

右㕮碎井水煎入酒調服能逐毒惡物

**[illegible]** 生油髮[illegible]　白及[illegible]錢細末搽傅

**去水膏** 治癰疽破穴後誤入皂角水及諸雨水以致疼痛

甘草[illegible]　砂糖　糯米粉[illegible]分

右爲[illegible]搗[illegible]貼毒水自出[illegible]汗及[illegible]一切毒水皆
治之



**太乙[illegible]** 木香　[illegible]　[illegible]丹[illegible]　輕粉[illegible]

右細末搽

**[illegible]** 治一切瘡口不合

先細末摻之

**洗方**

蜂房　白芷　苦參　川椒

右銼[illegible]煎加荊芥

**瘡口不合大方**

深山黃牛糞[illegible]　一蜂房

白芷　大腹皮[illegible]

右以[illegible]爲細末摻瘡口服[illegible]排膿內托散[illegible]醇酒
食肥[illegible]自然生肌深山黃牛糞[illegible]由牛只[illegible]

**[illegible]方** 或在上或在下[illegible]不散用[illegible]
[illegible]從小便出[illegible]一醉[illegible]之類[illegible]從大便出也先以
**[illegible]** 爲末酒調傅仍服[illegible]穿山甲[illegible]溫酒
調下在上者加[illegible]湯[illegible]

**[illegible]** 男以左[illegible]女以右[illegible]

**[illegible]方** 此瘡[illegible]頭[illegible]牙[illegible]治法
[illegible]頭[illegible]項[illegible]灸[illegible]
止其瘡開口入孔[illegible]爲細末[illegible]其中特異[illegible]
[illegible]加[illegible]少許調[illegible]
[illegible]
[illegible]上焦病[illegible]太溫加[illegible]
[illegible]以出火毒最能收
斂使瘡口肥[illegible]

乳癰

乳癰方論

男子以腎為重婦人以乳為重上下不同而性命之根一也[illegible]
草以後風邪襲之寒濕衝為之凝結與夫嬰幼未能吮乳或乳多
兒飽所吮斂而不泄或飲以[illegible]時捻出不盡皆令乳汁停蓄其
間與血氣搏始而腫痛繼而結硬至於手不能近則乳癰之患
成矣乳癰一名妬乳婦人四十以下血氣周流患此可療年事
既高血氣耗竭患此難治[illegible]寒發熱煩渴大渴是其證也甚則
嘔吐無已咽膈窒礙何耶蓋胃為足陽明之經[illegible]通乎乳毒氣
入胃嘔吐何疑或者不能温散妄以寒凉[illegible]之劑行之即使
癰毒自外入裏嘔吐尤甚其咽膈妨礙者毒氣上衝所致也[illegible]
[illegible]最為明[illegible]要[illegible]能[illegible]出毒氣或[illegible]
加以[illegible]止嘔止渴兩得其宜或更付[illegible]一[illegible]能事
畢矣雖然渴而過飲水入腸胃必至下利[illegible]失劑又而不[illegible]
必成漏瘡又不可不防其漸

[illegible]散 治乳癰[illegible]背乳癰通用
瓜蔞[illegible] 皂角刺[illegible] [illegible] 乳香 甘草[illegible]
右[illegible]末[illegible]醋酒[illegible]升煎取一升時時飲之痛不可忍立止

[illegible]一[illegible]湯 加川芎當歸[illegible]半分

乳[illegible]方
皂角刺[illegible] [illegible]研細每服[illegible]酒調下

[illegible]甘[illegible]湯 治乳癰諸般腫毒上衝咽喉窒礙不利
北梗[illegible] 甘草 生薑各半兩
右剉細每服[illegible]錢水煎服

乳[illegible]方
甘草[illegible]
[illegible]分[illegible]以[illegible]水煎[illegible]令人吮乳

[illegible]乳[illegible]



大南星 半夏[illegible] 皂角刺[illegible]
白芷 草烏 [illegible]
右細末多用[illegible]白研取汁入蜜調[illegible]若破[illegible]用膏藥貼

乳[illegible]方 乳癰初發
貝母[illegible]末
右每服[illegible]錢温酒調下即以兩手[illegible]於桌上垂乳[illegible]又自通

又方
石膏煅紅[illegible]地出毒細末[illegible]温酒調下

## 癌

癰疽諸方是法通用

發癌方論

癌者上高下深岩穴之狀顆顆累垂裂如瞽眼其中帶青由是
簇頭各露一舌毒根深藏穿孔透裏男則多發於腹女則多發
於乳或項或肩或臂外證令人昏迷治法急用[illegible]等藥外
[illegible]
得以多出其毒水內服[illegible]方中[illegible]是也內則
於小便利之蓋[illegible]心與小腸為表裏所當宣
毒於小便但諸發[illegible]毒又[illegible]之所能宣必如是
前方中[illegible]以[illegible]在之而後可
以宣其毒矣自此又於心腎用工人之一身水不能濟火則渴
而後發癌心腎相交水以既濟於人何病之有心主血也清心
行血固所當然亦使腎得其養則水有所司真元凝合疲瘠自
平更服[illegible]又可以灌溉[illegible]切戒忌風邪入之將理一節[illegible]
補皆歸可以益腎可以養中當加之意

## 瘤

發瘤方論

瘤[illegible]於手足或[illegible]或[illegible]
面[illegible]

甚者宜次則可療其患深則害人或雨毒已[illegible]數月之後復發於他處人發但作肉色微帶淡紅終不能收治法以前項例推之大要以養內氣以防消泄兼用[illegible]藥[illegible]貼可服

## 瘭

發瘭方論

瘭疽之發有數種先作點而後發肉小者如粟如豆劇者如梅如李可畏青白色黑不常或貫或蔓或以藥或肚腑發無定處大熱多見於手指之間根深入肌走臂遊腫毒血流注貫串筋脉爛肉見骨出血極多令人串痛狂言痛入於心則死突出於外腎者亦死此瘡最毒引風合[illegible]毒行血尤當於心腎加意為蓋心為萬病之門腎敗血[illegible]皆毒氣攻心之致也心家為毒所攻若於小便利之又恐外腎[illegible]易至傷風[illegible]宜毒於大便如[illegible]之入[illegible]生灰[illegible]是雖大便引導毒氣歸清心行血去風邪之劑如之何而發之心清血行風邪解散豈不[illegible]矣經云在指則截在肉則割蓋瘭毒氣隨風走肌膚脉入臟作忽害人不達而不可留也此疾根源初因感受惡風入於肺理或傷寒瘡疹之後[illegible]毒所生凡經絡諸發開豈寸則[illegible]寸不風非必風入於其中[illegible]虛處自引風也惟風邪[illegible]則肉爛透骨惡血横[illegible]治最能去風可以通傳其諸瘭理推[illegible]須[illegible]度行之

發瘭證治

[illegible]方

生髮[illegible] 皂莢刺[illegible] 白及[illegible]

右細末乾摻或井水調[illegible]能行諸藥

又方

生髮[illegible] 皂莢刺[illegible] 小[illegible] 黃柏[illegible]

右細末雄黃[illegible]調傅

又方

雞內金 [illegible] 大南星 半夏生 細末摻

又方

皂莢刺[illegible] 白及少許 細末摻諸瘡通用

又方

燕巢和白雀糞研膏傅

又方

[illegible]末之米湯調服兼[illegible]亦効

[illegible]酒入[illegible]送下

又方

荆芥穗 白芷 漢椒去目 [illegible]黃連根

右用井水煎入鹽[illegible]自手背上[illegible]下日[illegible]

[illegible]所至[illegible]之

又洗方

山[illegible]連翹 [illegible] 盆下土[illegible]

右研[illegible]分兩[illegible]井水煮[illegible]溫洗日[illegible]

又方

生井蛙[illegible]

右細末摻或[illegible]水調傅又通用方在前

[illegible]方見瘭[illegible]

[illegible]自手[illegible]至心下[illegible]不救各有小紅筋[illegible]

此即[illegible]

[illegible]一名[illegible]

## 丁瘡

[illegible]

丁瘡方論

丁瘡全書毒氣突出兩寸瘡最異常二三日間害人甚速是尤在癰疽之上也內經以丁發於石龍赤丁發於舌根黃丁發於口唇黑丁發於耳前青丁發於目下蓋取五色之應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處在手足頭面骨節間者最急其餘尚庶幾焉丁曰五丁類分數種如釘如豆如瓶如湯金如朱又如石榴子或發疹搔破而青黃汁出或衣物觸著而疼痛忽生或白而腫實或赤而浮虛其狀不一大抵瘡頭黑硬如釘四畔帶赤如火盤根突起隨變焦黑未幾腫大而光轉為滿溲孔透肌如大針穿之狀外證惡寒頭痛拘急戰寒四肢痛強或寒熱交作頰舌間亦有黑點如珠若毒入腹心則煩悶嘔逆恍惚癡眠其死可立待也此疫鈹白風毒而來其諸禍犯不可不信如合丁之忌[illegible]火光炙[illegible]水丁之忌[illegible]麻丁之忌[illegible]水[illegible]眼[illegible]食[illegible]刀仁[illegible]丁之忌[illegible]又不特[illegible]二丁戒謹房事而已一有所犯難以[illegible]也見[illegible]有[illegible]其或背脊拘強疼痛徹骨此[illegible]犯之候也治法以調平心氣為上蓋丁瘡毒氣結於心如[illegible]之類佐以[illegible]可救[illegible]治心經之劑也心氣一平毒自消散外仿傳若用鋒鍼刺內單如[illegible]以[illegible]調和而傳之[illegible]其內而後刺[illegible]以[illegible]知以[illegible]破半生為細末以平[illegible]瘡口或[illegible]肉[illegible]傳之作疼則以[illegible]多用[illegible]以[illegible]辨之矣又有一種瘡[illegible]如[illegible]黃水滲出四畔[illegible]是曰魚臍丁瘡其毒尤甚通前治法即離朋方中[illegible]以清心去血湯使服之以井花水磨傳之是為神仙妙藥

丁瘡證治

[illegible]方

生[illegible] [illegible] 雄黃 [illegible] 皂莢刺 [illegible]



赤小豆[illegible]

右並[illegible]末[illegible]絲綿作一團外用[illegible]十[illegible]線定[illegible]入[illegible]分作兩服空心[illegible]下

又方

生薑 蛇皮 [illegible] 土蜂窠 皂莢刺[illegible]

右以[illegible]大分作四片分聚七件[illegible]之炭火燒[illegible]性並為細末每服一錢空心酒調下

又方

蛇皮 土蜂窠[illegible] 每服一錢酒調下

又方

蛇皮洗[illegible]為末[illegible]清調傳

又方

磁石[illegible] [illegible]研[illegible]調傳

又方

[illegible]

右[illegible]下仍以[illegible]以醋[illegible]傳[illegible]不拘[illegible]色[illegible]用之

丁瘡方

金頭蜈蚣 [illegible] 膽礬 銅綠

烏賊骨 [illegible]

右細末以紙[illegible]麻油[illegible]藥引入瘡中如瘡頭硬即灸破或針刺破然後入藥

瘰癧

瘰癧方論

瘰癧生於頸腋之間凡人少小以來動[illegible]或憂思驚恐[illegible]不伸多致結核于項日積月累[illegible]氣聚焉於是隱然[illegible]起伏無已甚則牽連至于腋下白腫下而[illegible]矣發熱增寒[illegible]盜汗或[illegible]不痛其外證治法無他大抵以[illegible]不有根[illegible]

[illegible]度如法能使其根從小便中出或如粉片或如塊血或如
爛肉皆其驗耳但毒根之行小便亦必澁痛當以[illegible]
導之然是毒必從小便出者何哉諸[illegible]於心甚或一
二流行於大便尤快便也人有此患不惟[illegible]
風寒具於飲食百味一切戒之然則投方已之[illegible]當何如而責
效焉曰飯蔬食而已

瘰癧論治

[illegible]治瘰癧神效已破未破皆可服

連翹　赤芍藥　川芎　當歸
甘草[illegible]　滑石[illegible]　黃芩各[illegible]　白牽牛[illegible]
土蜂房[illegible]　川烏尖[illegible]　地膽[illegible]

右為細末每服抄壹大錢匕濃煎木通湯調下臨卧服毒根
從小便中出澁痛不妨毒根如粉片塊血爛肉是也如未效
後再服[illegible]以薄荷丹解其風熱且地膽性帶毒[illegible]以烏尖或
衝上麻悶不能強制[illegible]白[illegible]茶清下以解之如小便澁
燈心煎湯調[illegible]服[illegible]用[illegible]宜
導毒本方去[illegible]不用

薄荷丹 解瘰癧風熱之毒自小便宣毒後常須服

杜薄荷　皂角[illegible]　何首烏[illegible]
蔓荊子　京三稜[illegible]　荊芥各[illegible]

右為末好豉貳兩半以米醋煎沸酒豉[illegible]令軟研如糊和圓
桐子大每服[illegible]圓食後熟水下日進服[illegible]常服之

[illegible]治瘰癧多年不瘥

斑猫[illegible]　薄荷葉[illegible]

右細末烏雞子清和圓桐子大空心茶清下貳圓午時後服
叁圓臨卧服肆圓次日空心服伍圓臨下[illegible]小便取下惡物
為效如小便秘[illegible]茶少許

[illegible]治瘰癧

斑猫[illegible]　荊芥穗[illegible]
直僵蚕[illegible]　黑牽牛[illegible]

右細末每服[illegible]錢五更好[illegible]調下日中當取下惡物如不下
次日五更再進壹服或更不[illegible]第三日五更先[illegible]糯米粥壹
盞次服此藥其毒次下如小便痛澁以[illegible]解之或[illegible]
[illegible]湯利之

[illegible]治瘰癧

斑猫[illegible]　[illegible]
甘草各[illegible]錢
鵝[illegible]

右細末作兩服飯飲後好茶濃點壹盞調下

木[illegible]治[illegible]

木鼈仁[illegible]

右[illegible]以雞子清調和磁盞盛之飯內蒸熟每日食後嚼[illegible]服
之半月自然消散

[illegible]治瘰癧攻心嘔吐發出毒方[illegible]
[illegible]神效方[illegible]

山豆根方 治咽喉上膈熱毒[illegible]常含汁嚥下仍以

山豆根　紫蘇葉細剉煎湯臨卧服

[illegible]方 瘰癧咽痛紅腫多汁[illegible]

小[illegible]　紫蘇[illegible]　[illegible]細剉煎湯食後服

[illegible]方

白芷煎湯泡荊芥

右候温軟[illegible]洗拭乾好[illegible]膏[illegible]汁惡肉出盡更用

半夏[illegible]　南星各[illegible]　血竭[illegible]　輕粉[illegible]

右細末以津唾調傅

[illegible]方[illegible]

血竭[illegible]　麝[illegible]

右夾研津唾調傅

# 癭瘤

癭瘤方論

氣血凝滯結為癭瘤癭則喜怒所生多著於肩項皮寬不急捶捶而垂是也瘤則隨氣留住初作梅李之狀皮嫩而光漸如杯卵是也其肉色不變者謂之肉癭其筋脉呈露者謂之筋癭其赤脉交絡者謂之血癭隨憂愁而消長者謂之氣癭堅硬而不可移者謂之石癭癭之名有五者此也一曰骨瘤二曰脂瘤三曰肉瘤四曰膿瘤五曰血瘤六曰石瘤瘤之種有六者此也癭瘤二者雖無痛癢最不可決破決破則膿血崩潰滲漏無已必至殺人其間肉瘤攻療尤所不許若夫脂瘤氣癭之類當順用藥尚庶幾焉

癭瘤證治

**海藻散** 治癭瘤通用

海藻洗 海蛤 松羅各半兩 當歸

川芎 官桂 白芷 細辛

藿香 白斂 明礬 昆布各一兩

右細末煉蜜圓彈子大每服一圓含咽下

**破結散** 治癭瘤通用 常服自然銅縮小消瘤方見瘡門

**系瘤方** 專治瘤

**小瘤方** 先用甘草煎膏筆蘸妝瘤傍四圍乾而後妝凡三次後以

大戟 芫花 甘遂

右等分為細末米醋調別筆妝傳其中不得近著甘草處次日縮小又以甘草膏妝小暈三次中間仍用大戟芫花甘遂如前自然焦縮

**南星膏** 治皮膚頭面上瘡瘤大者如拳小者如栗或軟或硬



# 漏瘡

漏瘡方論

漏者諸瘻之潰漏也狼瘻鼠瘻螻蛄瘻蜂瘻蚍蜉瘻蠐螬瘻浮蛆瘻轉脉瘻古所謂九瘻是爾析而言之三十六種其名目又不同焉大抵外傷四氣內窘七情與夫飲食乖常染觸蠢動含靈之毒未有不變為瘻瘡穿孔一深膿汁不盡得冷而風邪併之於是涓涓而成漏矣漏生於項腋亦有發於陰僻肛門之間或治失時因生寒熱不特瘻穴為漏凡瘡瘍諸瘡所在亂為有膿敗肉朽骨者皆其漏也一切漏瘡之萌孽也治法溫散風冷為要收水次之生肌又次之外用猬皮散以傅之一以佐之此足以盡散風冷矣然有近年漏者有久年漏者近則或帶淡紅或帶微腫或留小核久則上而槁白內而黑爛淫虫惡臭生焉近者不過前藥敷貼而已久者須其元陽亦當以附子加減而用之如其不當用而誤用又恐熱氣乘虛轉攻殺生經絡而亂髓海尤其甚夫收水一節則有可存水凝聚也堅虛不能傳導而後水無於腑水滿則滲流於漏瘡行臂之水無如三椒一以淬生取末入於豬腎煨火煨熟而溫酒下之則腎臍入腎餘瘡內得其便然水既泄不復淋濫矣以補不佐以猬皮之溫治細末佐以猬皮溫治細下仍以漏瘡通用排膿補肉外相雜肌以矣然而漸陷之方也又當以氣以充之此則自本自根之論也雖然漏已息矣瘡已平矣舉動可不知乎曰若焉山漏者漏滯之細流也然為之兆者江河之決也而故作是論告其如之何

漏瘡證治

[illegible]治漏瘡[illegible]風冷
藿香葉　厚朴　半夏　橘皮
蒼朮炒　細辛　川芎　白芷各壹分
辣桂　川白薑生　甘草炙各半分
右剉散[illegible]煎服
[illegible]通行漏瘡中惡水自大腸出
黑牽牛碾細末皮取末壹分入[illegible]中以線扎青竹箬包
[illegible]慢火煨熟空心溫酒嚼下
[illegible]七漏治血益腎氣續筋脈
桔梗[illegible]　當歸　川芎　黃耆[illegible]
川續斷[illegible]　胡蘆巴炒　紫金皮　牛膝[illegible]黃[illegible]
牡蠣粉[illegible]　木香　辣桂各壹錢　甘草[illegible]
右爲末每貳錢空心溫酒調下或加[illegible]佐之
保安[illegible]方治漏瘡內外[illegible]
[illegible]治漏瘡[illegible]
穿山甲[illegible]片去肉用　青蛤粉[illegible]
右入[illegible]末壹[illegible]夾和[illegible]拾伍貼或[illegible]子
大每服叁拾圓溫酒下仍以[illegible]調益酒服[illegible]圓[illegible]
方見虛勞門兼服之
代[illegible]圓治漏瘡膿血不止　方見婦人
[illegible]乳香圓
白淨滴乳香壹分　牡蠣粉半分
右細末雪糕糊圓麻子大每服叁拾圓酒[illegible]川芎[illegible]煎
湯空心下
[illegible]治積年冷漏黃水不止
雄黃　硫黃[illegible]　黃蠟[illegible]兩
右用麻油貳兩煎[illegible]去滓次入[illegible]
[illegible]火上[illegible]用[illegible]先以[illegible]

漏瘡

[illegible]洗貳[illegible]常貼
[illegible]治漏瘡通用
露蜂房[illegible]　牡蠣粉　[illegible]　硫黃[illegible]分
右同炒令[illegible]細末入[illegible]少許拌和傅[illegible]
能引出毒透[illegible]
[illegible]治痔漏痛不可忍
血竭　牡蠣粉　[illegible]陵灰各[illegible]分
右細末入[illegible]少許自以津唾調傅[illegible]
傅之
生[illegible]治漏瘡通用
露蜂房[illegible]　大香[illegible]
滴乳香[illegible]
右細末用[illegible]和為[illegible]上貼[illegible]
[illegible]治久年漏瘡[illegible]
多孔露蜂房[illegible]分　穿山甲[illegible]　龍[illegible]分
右末入[illegible]用臘月[illegible]則摻
[illegible]治漏瘡血水不止
蛇[illegible]　五倍子　龍骨各[illegible]分　川續斷[illegible]
右細末入[illegible]少許津唾調傅
人牙[illegible]治漏瘡惡瘡[illegible]肌[illegible]乾則[illegible]
人牙　油[illegible]　雄雞[illegible]內金各[illegible]分
右為末入[illegible]少許[illegible]麻油調傅
[illegible]治漏瘡久不合[illegible]乾則用
蒸[illegible]　露蜂房　生[illegible]新桑白皮半分
右細末入[illegible]少許津唾調[illegible]乾則摻
[illegible]治漏瘡[illegible]用
鍛[illegible]　狗頭連[illegible]兩
[illegible]壹兩　[illegible]

右細末用猪脂調傳

**[illegible]方** 艾葉　五倍子　白膠　苦楝根等分

右剉碎如燒香法置長桶内坐熏瘡處妙

**洗漏瘡方** 漏瘡孔中多有惡穢常須避風洗淨

露蜂房　白芷煎湯洗　或大腹皮　苦參煎湯洗

右洗畢拭水出拭乾先用東向石榴皮曬為末乾摻以殺淫
出少頃傳藥

**[illegible]方** 百日兒糞陰乾五月五日取塗瘡

**[illegible]** 忌戒怒氣不然枝則大漏則水多

**漏瘡方**

真龍骨　蜂房炙　黄丹　五倍子

降真香節　枯礬　烏賊骨各[illegible]

右為細末傳之

**又漏方** 九孔蜂房炙黄為末[illegible]研傳候收汁以

[illegible]細末入瘡孔内[illegible]

新刊仁齋直指方論卷之二十二



新編仁齋直指方論卷之二十三

# 腸癰

## 腸癰方論

癰疽發於外人可得見者猶為危急之疾而況隱伏腸間痛無定處人不可得而見者乎蓋癰疽五發在外則為發背發腦發鬢發眉發頤發顋在内則為腸癰心癰肝癰脾癰肺癰腎癰等患治之得法尚無幾焉一着少差禍甚大矣何則腸癰為病身皮甲錯腹皮緊急如腫之狀而按之濡[illegible]與關熱腹無積聚者此積陰冷之所致也當以溫藥調之發熱無汗洒淅惡寒小腹腫強而按之痛小便如淋者此内結熱之所致也當以涼劑利之其脉遲緊膿未成者可下其脉洪數膿已成者不可下其若腹肚脹大轉側聞有水聲或繞臍生瘡膿從臍出或大便膿血凡此皆為惡證其間寒熱交急煩渴驚悸嘔惡咳嗽或[illegible]自汗自利如痢常發癰之狀亦須有此婦人尤多得之但恐世俗不識其證耳抑余聞焉内經有曰息賁病有人得之二三年遍身微腫其後大腸與臍俱出膿血遂至不救此亦腸癰類也又可不審思而明辨之乎

## 腸癰證治

**[illegible]** 治腸癰冷證腹濡而痛時時利膿

人參　牡丹皮　白茯苓　天麻

黄芪　木香　當歸　川芎

辣桂　桃仁[illegible]　白芷　薏苡仁

甘草炙各[illegible]

右末每服三錢井水煎食前服

**[illegible]** 治腸癰熱證小腹痛而強或熱或寒小便似淋膿未成者服此

木通　薏苡仁　[illegible]　甘草[illegible]

川升麻　北梗　桃仁（湯去皮尖炒）

牡丹皮（各二兩）　生乾地黃　瓜蔞子　敗醬

赤芍藥（各一兩）　大黃　朴硝（各一分）

右剉為散，每服四錢，井水盞半，煎至七分，去滓，通口服。

四聖散　治腸癰癰疽便毒神效

生黃瓜蔞（一箇去皮）　粉草末（四錢）　沒藥末（一錢）

乳香末（一錢）

右件用好紅酒二大椀，慢火煎至一椀，分作兩服，兩日服盡。

大便順導惡物，妙。若乾瓜蔞則用兩枚。

神效栝蔞散　治腸癰，冷熱證通用。（方見癰疽門）加[illegible]煎服

內托十宣散　治腸癰冷證，及癰疽等疾。

人參　當歸　川芎　白芷

厚朴（薑製）　防風　北梗（炒）　白茯苓（去皮）

辣桂　黃芪（蜜炙）　甘草（炙）

右為末，每服三錢，溫酒調下。如不飲酒，以木香煎湯下。

熱證，黃瓜蔞煎湯下。

神仙追毒丸　治內外一切癰腫諸毒，冷熱證通用。藥料四十件（方見癰疽門）每服一錢，圓如梧桐子大。冷證以酒送下，熱

證甘草煎湯送下。○又腸癰[illegible]腸間隱痛而咯膿血、氣上衝

濃煎[illegible]湯送下，服畢皆效。

[illegible]　治諸痔瘻痔等（方見痔門）

[illegible]　治腸癰

乾棗（連核燒存性）　川[illegible]

右為末，每服一錢，米飲調下。

## 腸風

腸風論

蓋因不慮邪氣熱從而入大腸[illegible]



酒積熱以致榮血失道滲入大腸，此腸風藏毒之所由來也。

挾熱下血，清而色鮮，腹中有痛；挾冷下血，濁而色黯，腹內略疼。

清則為腸風，濁則為藏毒。有先便而後血者，其來也遠；有先血

而後便者，其來也近。世俗[illegible]前後之說，非也。治法大要，先當

解散腸胃風邪，熱者[illegible]，冷者[illegible]。既

其然後隨其冷熱而對治之。或曰血得熱則行，止血多用涼藥，

然亦有[illegible]之類，[illegible]

如[illegible]

然[illegible]不得歸元，則用[illegible]又須

血之上品，熱者加[illegible]，冷者加[illegible]，[illegible]則自根自本

之論也。蜂炭精氣血氣生於穀氣，[illegible]入胃，下而大抵以胃藥

收功。[illegible]以[illegible]和之胃

氣。一面血自[illegible]，抑[illegible]有蟲黑腸風之狀，[illegible]時得介[illegible]

肛之間[illegible]腸風之血，自腸中來；[illegible]之血，肛門邊傍別一小竅

如血線是也。近大肛門既脫，[illegible]血浸淫於其間，則[illegible]化為蟲[illegible]

蝕腸口，滴血淋漓，自此又不能[illegible]而收[illegible]矣。善調理者，尤當以

[illegible]之化蟲。○血屬於心，雖曰[illegible]

[illegible]之前，第止血亦不用甘草，但增[illegible]入[illegible]用

腸風諸治

[illegible]　治腸風熱證下血

地榆　黃連　黃芩　茜根

伏神　各[illegible]　梔子仁

右為末，每服三錢，[illegible]煎服[illegible]

[illegible]　（方見[illegible]）

[illegible]治下血，腸癰[illegible]即見血[illegible]

[illegible]　內[illegible]治[illegible]腸風[illegible]

[illegible]加[illegible]

小烏沉湯
香附子[illegible] 天台烏藥[illegible] 甘草[illegible]
右為末每服[illegible]
[illegible]四件夾和[illegible]
烏荊圓 治腸風下血諸風搐搦
川烏頭[illegible] 荊芥穗[illegible]
右為細末醋糊圓如桐子大每服貳拾圓[illegible]下[illegible]治腸
風及便血[illegible]
木香金[illegible]加川芎[illegible]
四君子湯加[illegible]治腸風五痔下血[illegible]之力
神授圓 治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不急
名曰野雞先用[illegible]去黃去皮取白者為末以[illegible]煎湯
調下服之三日後用[illegible]貳兩剉碎以猪臟貳尺去肥以[illegible]
連[illegible]猪臟紮兩頭[illegible]研細添[illegible]糊圓如桐子大每服
參伍拾圓米飲下
[illegible] 治腸風臟毒久不止
樗根皮[illegible]燒存性研為末每服貳錢用陳米飲食前
調下
[illegible] 名[illegible]治腸風臟毒[illegible]
方[illegible] 治腸風臟毒[illegible]
[illegible] 治腸風痔瘻[illegible]
棕櫚 頭髮[illegible] 荊芥皮
槐角[illegible] 牛角腮[illegible] 生地黃 蝟皮
苦楝根[illegible] 乳香[illegible] 麝香[illegible] 猪蹄甲[illegible]
桔梗子[illegible]
右為末酒糊圓如桐子大每服伍拾圓食前米飲下
[illegible] 治腸風下血腹痛
敗荷 頭髮 木[illegible] 木賊[illegible]



槐角[illegible] 枳殼[illegible] 烏梅肉[illegible]
右為末每服貳錢陳米飲[illegible]調下
木香[illegible] 治腸風下血
木賊[illegible] 木賊頭[illegible] 枳殼[illegible] 槐角[illegible]
茯苓 荊芥[illegible]
右為末每貳錢[illegible]調下
[illegible] 治腸風瀉血脫肛
槐角[illegible] 防風 地榆 當歸
枳殼[illegible] 木賊 伏神[illegible]
右末酒糊圓如桐子大每服参拾圓米飲下
[illegible] 加生[illegible] 治腸風[illegible]熱不調下血
[illegible] 治腸風臟毒痔疾及諸下血
當歸 川芎 伏苓 地榆
槐花[illegible] 敗棕 文蛤[illegible] 百草霜
右件等分為末每服貳錢食前陳米飲調下
[illegible] 治腸風血痔及下痢膿血
大活[illegible]不去鱗肚下穿[illegible]孔去其腸[illegible]入[illegible]
[illegible]如金橘大以敗棕皮重包又用厚紙裹先煨令香熟去
紙於[illegible]內燒帶生存性為末每服[illegible]米飲調下
[illegible] 治腸[illegible]大腸不收
又作腸風下血[illegible]用[illegible]空心[illegible]下
[illegible] 治傷酒臟毒及暑濕[illegible]
黃連[illegible]兩用酒壹大升煮乾研細水[illegible]為圓如桐子大
每服肆伍拾圓陳米飲湯下
[illegible] 治腸風米飲調下[illegible]
[illegible]
右為末陳米糊圓桐子大每服[illegible]陳米飲下食前服

芎藭 敗荷葉 敗棕(燒存性) 香附(炒去毛)

右為末食前米飲調下貳錢

[illegible]方

香附(炒去毛) 枳殼(麩炒) 當歸 川芎(各等分)

槐花(炒) 甘草(炙)

右為粗末每服叁錢新水壹盞半煎至壹盞食前服

# 諸痔

## 諸痔論

痔瘡本虛外傷風濕內蘊熱毒醉飽交接多欲自戕以致氣血下墜結聚肛門宿滯不散而衝突為痔也肛邊發露肉珠狀如鼠乳時時滴漬膿血曰牡痔肛邊生瘡腫痛突出一枚數日膿潰即散曰牝痔腸口顆顆發瘟且痛且癢出血淋瀝曰脈痔腸內結核有血寒熱往來登溷脫肛曰腸痔若血痔則每遇大便清血隨下而不止若酒痔則每遇飲酒發動瘡腫而血流若氣痔則憂恐鬱怒適臨乎前立見腫痛大便艱難強力則肛出而不收矣此諸痔之外證然也治法總要大抵以解熱調血順氣先之蓋熱則血傷血傷則經滯經滯則氣不運行氣與血俱滯乘虛而墜入大腸此其所以為痔也諸痔出血肛門淵別有小竅下如血線不與便物共道者又不然必至於乾瘡口不合漏無已時此則變而為漏矣治法之外抑猶有說焉腸風臟毒之與痔瘻同出而異名也[illegible]然腸頭濕爛可畏此果何物致然哉蟲是也其間[illegible]又當為之化蟲不然古書何以謂之蟲痔○氣血下墜衝突為痔既不能坐又不能行立則愈[illegible]其腫[illegible]惟高枕仰臥心平氣定其腫自收

## 諸痔證治



[illegible]丸 治諸痔[illegible]熱者[illegible]於心心主血熱者痔發[illegible]也此劑主之

黃連(淨) 伏神(去木) 赤茯苓(各等分)

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸食前米飲下 出痔證

是兒同米飲[illegible]

[illegible]散 治諸痔[illegible]用[illegible]送下 方見[illegible]

[illegible]門 或[illegible]煎湯下 解[illegible]先用此○[illegible]治諸痔

[illegible]腫痛大便不通加[illegible]煎 方見[illegible]

[illegible]散 治諸痔熱[illegible]大便秘結

當歸 赤芍藥 甘草(炙) 大黃(蒸 各等分)

右為粗末每服貳錢新水煎服

五痔散 治諸痔不問冷熱內外

鱉甲 刺蝟皮 豬甲 蜂房

蛇蛻

右為末入麝少許每服貳錢半食前米飲調下

[illegible]圓子 諸痔通用

槐子 豬牙皂角

大皂莢刺 [illegible]

麝

右為末[illegible]糊圓梧子大每服叁拾圓[illegible]

[illegible]散 治痔漏

穿山甲 刺蝟皮 黃牛角 豬牙皂角

槐子 皂莢刺 枳殼

阿膠 牛角 蝟皮 山甲

右為末每服壹錢半[illegible]調酒食前服 大腸[illegible]

[illegible]泡湯調下 漏血不止[illegible]湯調下

[illegible]丸 治諸痔及腸風下血脫肛

槐角 防風 地榆 當歸

枳殼 麩炒　黃芩 [illegible]
右為末酒糊為圓如梧桐子大每服叁拾圓米飲下
[illegible]圓 治諸痔出血裏急疼痛
槐花 炒　艾葉 炒　枳殼　地榆
當歸　川芎　黃耆　白芍藥
白礬 [illegible]　貫衆 各半兩　蝟皮 [illegible]　頭髮 [illegible]
猪後蹄垂甲 [illegible]　盛尺皂角 [illegible]
右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服伍拾圓食前米飲下
[illegible]圓 治諸痔通用
木明阿膠 炒　黃連　貫衆 [illegible]
盛尺皂角 [illegible]　蝟皮 [illegible]　蜂房 [illegible]
蛇皮 [illegible]　皂角刺 [illegible]　穿山甲 [illegible]
猪後蹄垂甲 [illegible]　當歸　川芎
槐花 [illegible]
右為末米糊為圓如梧桐子大每服柒拾圓[illegible]
下[illegible]
[illegible]治[illegible]痔[illegible]
[illegible]為末[illegible]圓如梧桐子大每服柒拾圓溫[illegible]下
[illegible]圓 治諸痔
猪後蹄垂甲 [illegible]
[illegible]圓 治酒痔
[illegible]末[illegible]不飲調[illegible]空心服
青蛙 [illegible]
右為末[illegible]為圓如梧桐子大每服拾伍圓空心先嚼[illegible]
胡荽[illegible]切細煎湯[illegible]
黑豆壹伯粒[illegible]
[illegible]湯 治[illegible]痔[illegible]
穿山甲 [illegible]

右為末每服壹錢[illegible]
調下[illegible]
[illegible]圓 治[illegible]痔[illegible]
地榆　黃耆　枳殼　[illegible]
川芎　黃芩　赤芍藥　槐花
羌活 各半　白歛　蜂房 [illegible]　甘草 [illegible]
右剉每服叁錢新水煎服
[illegible]圓 治[illegible]痔痛而復癢
皂莢刺 [illegible]　防風　槐花 [illegible]
蛇床　白礬 [illegible]　白蒺藜 [illegible]　枳殼 [illegible]
羌活 [illegible]　蜂房 [illegible]　五倍子 [illegible]
右為末醋糊[illegible]為圓如小豆大每服伍拾圓以苦楝
根煎湯下仍用童子熱尿入白礬末淋洗肛門
[illegible]圓 治[illegible]腸[illegible]生[illegible]寒熱往來
滿天皂角 [illegible]　刺蝟皮 [illegible]　白礬 [illegible]
猪後蹄垂甲 [illegible]　桃仁 [illegible]　川芎
[illegible]　[illegible]　白芷 [illegible]
右為末煉蜜圓如梧桐子大每伍拾圓[illegible]白[illegible]煎湯下仍以[illegible]
草根煎湯熏洗
[illegible]圓 治[illegible]痔下血不止
川芎　當歸　黃耆　神麴 [illegible]
地榆　槐花 [illegible]　阿膠 [illegible]　荊芥穗
木賊　頭髮 [illegible]
右為末煉蜜圓如梧桐子大每服伍拾圓食前米飲下
[illegible]湯 治酒痔
白殭蠶　枳殼 [illegible]　半夏 [illegible]　伏苓
[illegible]　杏仁 [illegible]　黃芩　甘草 [illegible]
右剉散每服三錢黑豆百粒[illegible]伍片白梅壹箇煎服

寿

[illegible]治氣痔
橘皮　枳殼　川芎　槐花
檳榔　木香　桃仁　紫蘇
香附　甘草
右剉每[illegible]煎服
[illegible]丸治痔[illegible]腹血不止
代赭石　[illegible]磁石[illegible]　白礬
杜[illegible]皮　龍骨　蝟皮　皂莢
猪後蹄[illegible]甲　赤石脂　川椒
木賊　蜂房
右件等分細末神麯糊圓小豆大每服伍拾圓食前艾芥生
薑煎湯下漏血取以[illegible]艾揉和血竭[illegible]日二換
[illegible]治氣滯[illegible]痔
荊芥穗　枳殼　槐花　香附
紫蘇莖葉　甘草
右為末每服貳錢米湯調下
[illegible]
[illegible]治臟口熱[illegible]
[illegible]等分末之井水調傅○又[illegible]等末傅之
[illegible]
時血竭末[illegible]傅○通用[illegible]燒灰傅○又水浸熊
膽汁以筆傅○又[illegible]為末用[illegible]傅[illegible]以
消[illegible]○又雞子[illegible]取白切[illegible]明[illegible]各[illegible]
錢同末傅有孔用[illegible]入
[illegible]
[illegible]水煎入白[illegible]熏洗○又[illegible]取仁研
[illegible]水煎熏兩三次○又[illegible]煎湯[illegible]洗
[illegible]花似小芙蓉○又[illegible]香汁[illegible]

寿

槐[illegible]以[illegible]三次凡痔發於肛內者須用熏洗若腸口腫熱[illegible]
木新汲水[illegible]之
[illegible]凡痔[illegible]用消[illegible]血惡血結[illegible]下焦不
行蹟通於是下[illegible]而為痔[illegible]痔之人下部[illegible]血熱多致大小
便不通小[illegible]一通又[illegible]有[illegible]水之證此下焦
留[illegible]其下焦[illegible]以[illegible]發見之合用[illegible]
主治須得大小便通快是與即以[illegible]白[illegible]也易[illegible]流仍以[illegible]
研大[illegible]用[illegible]尾[illegible]去[illegible]定[illegible]妙各[illegible]
分為細末入[illegible]少許研和清調以[illegible]傅上[illegible]痛來以[illegible]
次六第一時許[illegible]又增[illegible]若痛又以[illegible]之又第一
既[illegible]中又增[illegible]如前法一日三次用[illegible]又以
漸加多於第一日矣後日三次用煎[illegible]又以漸加多於
第二日矣痛則洗之以[illegible]三日以[illegible]更不用藥只是[illegible]
湯與[illegible]相間淋洗[illegible]三四次十餘日自然成痂如柿乾之狀
[illegible]以[illegible]代之
[illegible]通利大小便取下黑物
川芎　白芷　生乾地黃　赤芍藥
五靈脂　枳殼　阿膠　蓬莪朮
伏苓　伏神　木通　生甘草
當大黃[illegible]　桃仁[illegible]
右剉散每[illegible]并水[illegible]服以利為度
血作痛通用
[illegible]
槐實　黃[illegible]　朴消　綠礬
明白礬
右件各別[illegible]以銀[illegible]入[illegible]
[illegible]
紅[illegible]

入[illegible]末各壹錢同研極細每抄壹匙煎[illegible]湯調下
外用雞羽掃藥末蓋之日既次連肯次白然乾燥而脫落
須用蔥白煎湯入[illegible]洗軟帛拭乾然後傅藥[illegible]
[illegible]採枝各取汁以建盞[illegible]用[illegible]
須先用[illegible]取白皮煎湯溫洗然後傅藥

**[illegible]** 五倍子日乾如燒香法置長桶內坐熏患處自然收縮

**治瘡[illegible]** [illegible]新水煎食前服。**又方**白[illegible]末用米飲調食前服。
**又方**[illegible]焙乾為末入[illegible]以津唾調傅貼上或[illegible]
[illegible]掺小疳。**又方**[illegible]焙黃剉碎每用壹兩井水叁大椀
煎東熱熏洗拭乾[illegible]燒紅搥碎地出毒細末傅

# 便毒

## 便毒論

腎為作強之官所藏者志也男女大慾不能以直遂其志故敗精得血留聚中途而結為便毒矣夫人腳腿與小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或勞泄而不泄既不得偶合陰陽又不能忘情息念精與血交滯其不為腫結也幾希便毒處所上不在腹下不在腿介乎兩者之中是也當此[illegible]知覺有便毒諸狀必以為熱瘡所攻每每濟以寒藥是逐[illegible]邪[illegible]之熱[illegible]不得散日復一日敗精宿血愈聚而愈結而不思一身宗筋上絡於舌本下聚於陰器宗筋得寒則急急則[illegible]至陽痿而不復伸於斯時也百藥[illegible]亦難責效況便與事於寒涼者乎治法散[illegible]利[illegible]泄其[illegible]沉其[illegible]脈是為捷徑
老人氣滯亦或有之

## 便毒證治

[illegible]治便毒[illegible]熱[illegible]外[illegible]寒鬱精血交滯腫結疼痛



辣桂　川大黃生　白芍藥　澤瀉
牽牛[illegible]　桃仁[illegible]　甘草半分
右為粗末每服叁錢薑伍片食前煎服日兩服先小便快熱從小便出後大便利皆是濁毒

**[illegible]** 治便毒腫結
連翹　獨活　川升麻　射干
木通　桑寄生　赤伏苓　甘草[illegible]
大黃[illegible]　木香　乳香　沉香[illegible]
右剉細每服叁錢[illegible]煎服

**[illegible]** 便毒初發用此方
穿山甲[illegible]　天花粉[illegible]　白芷
紬上茴香[illegible]　白牽牛末[illegible]　延胡索[illegible]　南木香
當歸　甘草[illegible]　青木香[illegible]
右為細末每服貳錢溫酒調食前服不飲酒南木香煎湯下

**[illegible]** 治便毒腫結
穿山甲[illegible]　木鱉子[illegible]
右為末每服貳錢食前老酒調下次以法醋煮[illegible]研為傅之妙

**[illegible]** 疏利小便以泄敗精方見[illegible]門用葱貳莖煎湯調下 又[illegible]通
**[illegible]** 治便毒熱泄大便秘結方見[illegible]門 **[illegible]** 治便毒大便不通加[illegible]食前服
**[illegible]** 治便毒已消常服之[illegible]
[illegible]潰處以**[illegible]** 為末傅之 **[illegible]** 治腫核痔漏諸毒方見[illegible]門 **四[illegible]散** 治便毒癰疽腸癰神效方見[illegible]門

**[illegible]** 治便毒腫痛
雄黃　乳香各[illegible]　黃柏[illegible]
右為細末分作兩服以新水調下[illegible]

便毒

謾簡便方 治癰斑便毒等

皂角刺燒灰，大人以上者猪脂法研，米醋研成膏，傅之，屢效

附方 便毒初發

水調用水豉研細傅，若便毒已大而軟，則用[illegible]於熱湯
中熨軟，乘熱研細傅之，或要換藥，以熱湯洗去

附方 治便毒

焦弓兼乾者，焙焦為末，法醋生薑自然汁等分調傅

又方

紫荊皮研，醋調傅

新編仁齋直指方論卷之二十三

癮疹

新編仁齋直指方論卷之二十四

# 癮疹風 附 疥瘡 癩風 癘風 諸瘡 疥癬

癮疹風論

風氣挾熱，起於腠理，皮膚不仁，或發為瘙痒，謂之癮疹。此風熱之浮淺者也。其間有暑濕之氣行乎腠理，熱在表，天時炎暄，而汗出乘之，則為赤疹；風熱在表，天時寒涼，而冷氣折之，則為白疹。赤疹者遇清涼而後消，白者遇溫暖而後滅，然則用藥加減，可無權衡於此哉？其有冷後逢風，與夫汗出解脫而得之者，隱隱然似赤似白，發於肌肉之間，而四體為之重者，此風熱之挾濕，分證又可推矣。如其不知寒冒之所由生，概以癩風之按[illegible]熱等輩[illegible]之，按為治[illegible]而變為[illegible]

天麻散 治風熱癮疹

天麻 川芎 川升麻 羊角[illegible]
防風 細辛 羌活 荊芥穗
蟬殼去足 甘草 各[illegible]

右細剉，每服三錢，薑三片，井水煎服。挾熱者加[illegible]，挾寒者加[illegible]，若加[illegible]

加味羌活散 治癮疹通用

羌活 前胡 各半兩 人參 桔梗
川芎 茯苓 天麻 枳殼 等分
甘草炙 蟬殼去足 薄荷 少許 各二錢半

右末，每服貳錢，生薑三片，煎服

[illegible]治癮疹瘙癢[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]散 桔梗 細辛 人參 伏苓
白朮 瓜蔞根 甘草炙各等分
右末入薄荷[illegible]可與和人參羌活散治瘡疹
亦治瘡疹

[illegible]治瘡疹
白僵蠶 直者[illegible]
右末好茶清入[illegible]調下

傳藥
明礬 朴消 為末井水調雞翎掃傳
又方 赤小豆 荊芥穗 為末雞子清調傳
又方 [illegible] 為末[illegible]門
洗方 [illegible]新水煎[illegible]溫洗
[illegible]治風熱[illegible]瘡[illegible]
胡麻子 苦參 荊芥穗 何首烏各[illegible]兩
威靈仙 防風 石菖蒲 牛蒡子炒
蒺藜 蔓荊子 [illegible] 甘草炙各[illegible]兩
右末每服貳錢食後[illegible]湯[illegible]調服或[illegible]可得
忌[illegible]並不得[illegible]

## 丹毒

丹毒方論
丹之為候由熱毒之氣[illegible]於血而風乘之所以赤腫[illegible]遊走[illegible]然丹有五丹不特色赤或青或黃或白或黑[illegible]血[illegible]風毒有[illegible]有[illegible]以[illegible]其色[illegible]又不同[illegible]皆屬於心心為血之主血熱之[illegible]以丹命名[illegible]心[illegible]火色尚赤[illegible]大[illegible]血熱所致[illegible]以[illegible]於[illegible]

[illegible]出[illegible]則[illegible]自四肢而入腹入腎則[illegible]
初生[illegible]於四肢[illegible]
丹毒證治
[illegible]散 治[illegible]丹[illegible]
白芷 柴胡 知母 杏仁去皮
川芎 赤芍藥 生地黃 川升麻
乾葛 生甘草 [illegible]石膏 梔子仁各半分
蔓荊 [illegible]
右剉細每服一錢半新水煎[illegible]加[illegible]
[illegible]散 治[illegible]
漢防己 川升麻 黃芩 犀角
黃耆 川芎 [illegible] 朴消
右剉每服一錢半新水入[illegible]
[illegible]散 治丹熱[illegible]毒
青黛 [illegible] 朴消 荊芥穗各半分
右為末每服半錢[illegible]水調[illegible]
[illegible]湯[illegible]竹葉煎
[illegible]加[illegible]
[illegible]亦治丹毒[illegible]
傳方
[illegible] 中[illegible]研細傳
又方 [illegible]末水調傳
又方 [illegible]末雞子清調傳
又方 [illegible]汁傳
又方 [illegible]傳
又方 [illegible]取汁傳
又方 [illegible]水[illegible]傳
[illegible]井水[illegible]溫[illegible]
[illegible]中[illegible]分[illegible]

[illegible]

蒲黃　荊芥　貫衆
上末　赤小豆　滑石各等分
右為末接之服法同前

## ○癩風

癩風方論

癩風即經所載癘風也。癘之名非一，證狀多端，不出五種。風生五種虫，是謂黃風生黃虫，青風生青虫，赤風生赤虫，白風生白虫，黑風生黑虫。四虫猶可措手，惟黑虫未必有瘥，此其惡疾也。發於毒，作熱作寒，身體頑麻，手足指脫，眼爛眉落，鼻崩唇翻，顏色枯槁，痛癢不常，不能屈伸。病雖多端，莫甚乎此。致此雖出於風，必有所致。大率多因嗜欲無度，勞動氣血，熱發汗出，不避冷濕，外風遂致氣血衰滯，揭于衛氣，挾邪則肌肉不仁，榮氣泣濁則脈絡膜熱，故遍身瘡痍，腐人形。千金所謂自作不仁極猥之業，雖有悔言而無悔心，故應如是。亦有傳染觸犯而得者，此則不謹之所招也。其虫在於臟腑，去來無徵，內入骨節，食人肝則眉睫墮落，食人肺則鼻柱崩，食人脾則語音變散，食人腎則耳鳴如雷，食其心則諸痛疼痛，心不受觸則死矣。人有感疾，切須戒[illegible]，及一切口味，[illegible]。宜通達勿用補。出風從頭起而下者順，從足起而上者逆。順則易治，逆則難。又當識此，詳於盲[illegible]方論。

癩風方論

[illegible]治大風[illegible]
川鬱金半兩　[illegible]　大黃[illegible]
白牽牛半生半[illegible]　[illegible]

右細末每服叁錢，半月首五更面東好酒調下，重者泄出蟲頭，小蟲輕者泄如爛魚腸，稠粘臭脹，無虫則服[illegible]。絕口味，但喫白粥白飯，并[illegible]食牛馬雞鴨葷物下藥。候至勿令病人知，恐虫隱也。

[illegible]治大風
北大黃[illegible]　大皂角刺[illegible]　川鬱金一[illegible]

右細末每服貳錢，用[illegible]大[illegible]溫調，臨睡服，隔兩日再服。直候泄下，無虫方止。此疾業緣果報，常須至誠念佛懺悔，以全其身。

[illegible]治大風
皂莢刺[illegible]　北大黃[illegible]　輕粉[illegible]

右末酒調，空心服。取下惡物，服[illegible]數日，黏出[illegible]血甚臭。

[illegible]治大風諸癩
肥長皂角[illegible]

右以[illegible]多用酒，慢火煎，得稠粘，[illegible]，搜和[illegible]為丸梧子大，每五十圓，不飢飽，酒送下。

[illegible]殺癩風虫
明礬黃[illegible]

右入酒調，空心飲清汁，明日泄[illegible]研入酒，如前或添[illegible]好。

[illegible]治大風諸癩惡虫內蝕形體壞爛
天靈蓋[illegible]　蝦蟆[illegible]　生人中白
桃仁[illegible]　[illegible]　硫黃　雄黃[illegible]
穿山甲[illegible]　皂莢刺[illegible]　輕粉[illegible]

右末煉蜜[illegible]丸梧子大，每[illegible]圓，月首五更米飲送下，[illegible]日服，取出蟲則愈，[illegible]殺虫通用。

[illegible]治風癩殺五虫
胡麻子[illegible]　烏蛇肉[illegible]　[illegible]

檳榔　　獨活　　桃仁[illegible]　白蒺藜[illegible]
皂莢刺[illegible]　貫衆[illegible]　蟬蛻　雷圓
雄黃　　硫黃[illegible]　朱砂[illegible]　蜈蚣[illegible]
右細末以長皂角拾條水叁升挼取濃汁去滓煎成膏和藥
末圓如梧桐子每服叁拾圓空心溫酒下

[illegible]天圓 治大風
雄黃　　朱砂　　滑石　　阿魏　　雌黃
雷圓[illegible]　　[illegible]　硫黃　　生犀角[illegible]
元青虫　斑猫虫[illegible]　黑豆　皂莢刺[illegible]
右細末每服叁錢天明溫酒調下明日再服

[illegible]圓 取風癩取虫
水銀　　硫黃　　雄黃[illegible]
雷圓　　阿魏　　貫衆末[illegible]
右研極細每服壹錢天明溫酒調下明日又服

[illegible]圓 治大風殺五虫
乾蝦蟆[illegible]　肥長皂角[illegible]
右爲末以竹筒引入羊腸內緊兩頭用麩貳升鍋內置麩
上蒸熟去麩入[illegible]子末同搗圓如梧桐子每服貳拾壹粒空心溫
酒下

[illegible]圓 治大風
蔓荊子　　蒼耳子[illegible]　枸杞子　　牛蒡子[illegible]
黑牽牛[illegible]　胡麻　　白芷　　何首烏
威靈仙　　荊芥穗　　獨活　　蒺藜[illegible]
草[illegible]細辛[illegible]　直僵蠶[illegible]　道人頭[illegible]
皂莢刺[illegible]　苦參　　大草烏[illegible]
右細末[illegible]和圓梧桐子大每服拾伍圓食前茶酒下
[illegible]治大風[illegible]
[illegible]常服以解內毒[illegible]



[illegible]治大風[illegible]服[illegible]
癩風服[illegible]

# 癘風

[illegible]方
雞子[illegible]用醋[illegible]
右以針刺小穿[illegible]汁入[illegible]末少許[illegible]和丸以石
札搗破[illegible]用[illegible]

[illegible]方 治[illegible]
硫黃　　明白礬[illegible]
右爲末[illegible]擦[illegible]三次

[illegible]方
雄黃　　硫黃　　黃丹
密陀僧　大南星
右等分爲末先用[illegible]汁擦患處次用[illegible]
[illegible]日再擦[illegible]則無事矣

# 諸瘡

諸瘡方論

諸瘡雖不能害人然浸淫無已亦有多年不獲痊者此皆心腎
不和飲食不知節[illegible]以致風毒與血氣搏[illegible]滯於肌肉之
間而發出其名目雜治有異焉凡人體虛感受風熱之
氣發為瘡瘍[illegible]自熱多汗是爲[illegible]或生於手足關相
對如新[illegible]
爲[illegible]或初生如飯粒漸大而有根頭破血流膿出又如花
開[illegible]狀是爲[illegible]或初生甚小[illegible]後痛汁出[illegible]
肉[illegible]若從口發出流散四肢者輕若從四肢發生然後
入口者重[illegible]

筋絡月中則猶穀川未則穀䅈以久[illegible]而上[illegible]不
見耳下[illegible]或毒氣發於手足而[illegible]甲指甲疼痛
出血瘡中自出是為[illegible]或指頭先腫焮熱[illegible]後於爪
甲邊結膿甚者爪甲俱脫[illegible]或久[illegible]生是[illegible]則中
毒面浮而腫延眼臉亦痒熱狀之隨起[illegible]遍身如豆如
[illegible]作痛是為[illegible]或[illegible]腫理易開氣熱毒氣[illegible]於皮膚
經者狀如[illegible]者熱汗[illegible]成[illegible]致心神[illegible]
遍身發熱多小膿[illegible]如火曰[illegible]或身[illegible]以致
血並不行[illegible]頑滯不知痛痒經久難瘥曰[illegible]或[illegible]發生腫
[illegible]其狀如[illegible]或[illegible]曰[illegible]或頭生白
圜[illegible]剝如[illegible]有白皮久則成[illegible]中有孔有膿細
虫入裏不痛微痒少長不瘥曰[illegible]或風熱毒氣流注兩脚生
瘡[illegible]痛[illegible]惟生於[illegible]骨者為重曰[illegible]以其骨上
肉少[illegible]有多年無已[illegible]開[illegible]皮[illegible]骨臭穢可畏
者[illegible]取虫然後傳藥或深大難上生肌初發如粟揉之則痛
田是也[illegible]作曰孔後[illegible]日漸大痛曰[illegible]以婦人尤
有宿精在內或月水未斷與之交接[illegible]不能傳瀉而作婦人
亦有生於玉門者曰[illegible]或[illegible]痛瘥發如[illegible]而多汁
延[illegible]兩耳內外流[illegible]如浸淫瘡之狀曰[illegible]田[illegible]為[illegible]
[illegible]已上[illegible]種名目不同治各有方條列于後
[illegible]諸瘡[illegible]治
桑螵蛸　地龍　貝母　厚黃柏各半兩
[illegible]通[illegible]治諸惡瘡
桑螵蛸　地龍　貝母　厚黃柏各半兩
[illegible]丹少　乳香各[illegible]　粳米粉貳錢　雄黃
輕粉各[illegible]　麝香[illegible]
右細末以[illegible]井水和[illegible]
[illegible]方
[illegible]



[illegible]治[illegible]瘡久不瘥
杏仁[illegible]去皮　乳香[illegible]　硫黃
[illegible]粉[illegible]　[illegible]　麻油[illegible]
右研極細先熬油沸入[illegible]溫[illegible]入諸[illegible]攪成膏冷地出
火毒磁器收用
又方
[illegible]取抱子[illegible]末[illegible]先以白芷大腹皮[illegible]湯[illegible]洗拭後搽
[illegible]治[illegible]花瘡
[illegible]脂　貝母　胡粉各[illegible]
[illegible]少　没藥[illegible]
右[illegible]研細先以[illegible]水洗拭後傳藥
[illegible]治浸淫瘡
苦楝根[illegible]
右為末猪[illegible]傳[illegible]則[illegible]先用苦參大腹皮[illegible]煎湯洗
[illegible]治月蝕瘡
胡粉[illegible]　白礬[illegible]　黃丹[illegible]
輕粉[illegible]　胭脂[illegible]　麝少許　黃連[illegible]
右末先以溫漿水入鹽洗拭後搽藥如瘡乾麻油調傳
[illegible]治[illegible]瘡
[illegible]　麝[illegible]
右研如[illegible]以[illegible]所患指於[illegible]中線扎定[illegible]度
[illegible]治代指手指[illegible]頭腫
[illegible]
右研細末醋調傳所入指[illegible]自[illegible]
又方
中[illegible]和[illegible]如泥傳
[illegible]
[illegible]取黃[illegible]大小[illegible]傳之

又方[illegible]用麻油調塗　又方[illegible]打開金
又方磨鐵槽中取泥塗磨刀石下泥亦得
滑石散治痱瘡
綠豆粉[illegible]　滑石[illegible]兩
右木杵和以綿撲子撲之[illegible]以[illegible]撲之
紫草散治熱瘡
紫草茸　黃連　黃柏
漏蘆各半兩　赤小豆　綠豆粉各一合
右搗細入[illegible]每服[illegible]日三服常服[illegible]清心
又方治熱瘡淫瘡
南星　半夏　黃柏　黃連各等分
五倍子[illegible]　綠礬[illegible]
右細末搽瘡加[illegible]
又方熱瘡止痛收汁先用[illegible]煎湯泡[illegible]洗後用
[illegible]
蛇床　苦參　黃連等分
右為細末入些[illegible]疳瘡加[illegible]去及綠豆
雞心散治冷瘡
雞心檳榔　木香　硫黃
雄黃各半兩　吳茱萸[illegible]　[illegible]
右搗末麻油調傅有膿則乾摻
赤豆散治無名瘡
赤小豆　吳茱萸　赤色石脂　厚黃柏
黃連　貝母　硫黃　糯米[illegible]
號丹[illegible]
右末麻油輕粉調抹[illegible]湯洗先洗後抹
[illegible]治頭白禿及惡瘡
猪牙皂角[illegible]　檳榔[illegible]　雄黃[illegible]
右末先以麻油[illegible]頭大小作膏[illegible]頭上引



出不可輕撥不得動頭時[illegible]撥出不得令人急手搯起次
用[illegible]煎湯淋洗拭淨涼則[illegible]調抹
治頭[illegible]瘡[illegible]末摻
[illegible]小[illegible]肪[illegible]用
小[illegible]
右同糯米飯量合研細塗所以帛扎患處上下次以青紗罩
瘡却將蝦飯傅青紗上別用青紗罩蝦飯之上[illegible]
初解[illegible]蝦飯揭起樹它開處[illegible]小亦[illegible]
煎湯候溫淋洗[illegible]用[illegible]竹葉隨瘡大小剪貼[illegible]
[illegible]日[illegible]汁水出盡方以好膏藥貼[illegible]
[illegible]湯淋洗仍換[illegible]待生肉滿則不用膏藥其瘡口只
如鯽魚許乃可以[illegible]收平瘡[illegible]切忌
動風發氣等物
又方先用[illegible]入[illegible]許煎湯洗拭次用
雄黃　雌黃　硫黃　白礬
[illegible]黃連[illegible]黃柏[illegible]輕粉[illegible]　號丹[illegible]
右並細末外用[illegible]
末摻其上妙甚
又方先用[illegible]煎湯洗拭次用
木香　檳榔　五倍子　白芷
貝母[illegible]
又方
猪牙皂[illegible]　雞心檳榔[illegible]　[illegible]　輕粉[illegible]
右末[illegible]調傅先[illegible]湯洗拭後用藥兩日一換
又方
中鯽魚[illegible]
穿山甲[illegible]
右細末先以井花水洗[illegible]汁用白竹葉[illegible]針[illegible]孔[illegible]

於瘡上候水出盡然以麻油輕粉調藥傅

又方 先用鹽漿水温洗淋洗次用

生礬 猪牙皂角 各[illegible]

右碾極細乾摻[illegible]次日以新水洗去藥又用温漿水洗拭

摻藥

[illegible] 治妬精瘡

青黛 [illegible] 款冬花 [illegible]

右末先以[illegible]白芷[illegible]湯洗軟帛拭乾次以津唾調

藥傅

又方 久年[illegible]皮青紙以津唾粘濕貼上明日又重貼勿動自愈

得青紙蓋取青黛殺虫[illegible]性耳

又治下疳瘡方

綠色爐甘石 [illegible]分 真蚌粉 半分

右細末洗傅

[illegible]治陰蝕瘡

綠豆粉 [illegible]灰 分 [illegible]脂 半分

右細末乾摻

[illegible]取及[illegible]白芷

煎湯温和以帛蘸洗候瘡出盡拭乾傅藥

蒲尺皂角 麻竹大[illegible]

厚黃柏 鷹爪黃連 [illegible] 白芷

右㕮咀為末每二分麻油調抹自然生肌神效[illegible]

又[illegible]不止

大黃[illegible]湯温洗[illegible]松柏樹皮[illegible]洗效

[illegible]可服內消[illegible]須用藥

煎湯

[illegible]治諸瘡[illegible]熱及婦人血風瘡身紅斑圓點

斑中漸發[illegible]



白芷 細辛 [illegible]

雞心檳榔 當歸 生乾地黃 川芎

赤芍藥 川獨活 牽牛 蒼术

桑白皮 枳殼 川草烏 [illegible]

右剉散每服二錢入[illegible]同煎[illegible]五葉[illegible]同煎服

如大便秘加此[illegible]傅瘡

貝母散

貝母 半夏生 南星 五倍子

白芷 厚黃柏 苦參 [illegible]

雄黃 [illegible]

右細末初用[illegible]水調傅一二次後只乾摻先以[illegible]白芷

[illegible]煎湯[illegible]洗拭乾即用藥或間有[illegible]不瘥以

好[illegible]

[illegible]

赤石脂 [illegible]明 [illegible] 黃丹 [illegible]

右細末[illegible]調傅先以[illegible]水[illegible]洗拭乾用

又方 [illegible]為末入此[illegible]摻

又方 治久不瘥

透明硫黃 黃連 等分

右細末以雞子清[illegible]打破[illegible]末 又上[illegible]

[illegible]調傅先用白芷[illegible]煎洗

[illegible]

蒲尺皂角 黃連 赤色[illegible]

五倍子 蛇床 黃丹 輕粉

右細末[illegible]煎湯洗拭後摻或用[illegible]

[illegible]調傅

又[illegible]方

黃連[illegible]

治頭瘡方

五靈脂　白礬　白芷

青黛　好草烏各等分

右為末麻油調傅

[illegible]方　頭瘡後生正者為肥則者為癬

用淨[illegible]洗[illegible]後用剃刀[illegible]

右[illegible]調[illegible]刮上切用手按即消或用[illegible]

上燒乾加之尤好亦治頭瘡

治[illegible]方

大乾芭蕉葉燒中內燒存性

右為末[illegible]打和傅頭瘡以軟紗帛換[illegible]二次或脫

或破黑痕

又方

穿山甲　鉛粉各等分

右[illegible]方[illegible]一兩

右末[illegible]調傅

治[illegible]方

生艾　白芷　大腹皮　連根葱

右煎湯洗拭以[illegible]入些[illegible]搗細煎水為膏傅亦治

惡瘡

又[illegible]方

硫黃　黃連各[illegible]　黃丹　赤石脂

蛇床　樟腦　蘆薈各等分

右末濕則摻乾則[illegible]油調傅

又方

白礬　五倍子　厚黃柏　黃連

黃丹　海螵蛸　貝母各等分

右為末入[illegible]少許摻痛則加[illegible]癢則加[illegible]

又方用[illegible]見[illegible]加[illegible]尤好[illegible]用



[illegible]末抹[illegible]方內去[illegible]

[illegible]頭[illegible]入法[illegible]頭以[illegible]傅

# 疥癬

疥癬方論

疥與癬風毒客於肌膚所致也風毒之浮淺者為疥風毒之沉深者為癬疥則多因風毒挾熱得之癬則多因風毒挾濕得之疥發於手足或至於遍身癬則肌肉[illegible]或圓或斜或如苔莓走散內藏汁而外有蟲二者莫不均有蟲也亦皆易為之滋蔓[illegible]濕疥[illegible]作瘡有膿[illegible]焮赤癢痛[illegible]搔[illegible]知痛[illegible]疥[illegible]搔之汁出[illegible]乾疥[illegible]小瘡常常[illegible]汁[illegible]名曰[illegible]則[illegible]出白屑[illegible]然[illegible]則淫[illegible]蟲行搔之多汁[illegible]則爪搔[illegible]不知痛[illegible]則狀如牛領皮厚而堅[illegible]時作[illegible]白點相連[illegible]之[illegible]謂[illegible]無[illegible]縱橫不定[illegible]之[illegible]癬之[illegible]然[illegible]治法[illegible]殺蟲[illegible]然殺蟲於其外亦[illegible]以[illegible]服[illegible]而[illegible]起其根矣若大[illegible]者有熱[illegible]而乾者無熱用藥加減又[illegible]

疥癬證治

[illegible]方

[illegible]明生[illegible]黃　明白礬[illegible]

右末[illegible]調抹

又方

硫黃　明礬[illegible]　黃連[illegible]

雌黃　胡粉　蛇床[illegible]

右細末猪脂[illegible]抹

又方

生明礬　黃丹　樟腦[illegible]　輕粉[illegible]

疥瘡

右末乾擦熱疥赤腫加[illegible]
又方 生明硫黄[illegible]石膏[illegible]黄丹各[illegible] 右末[illegible]油調抹
[illegible]方 生明硫黄[illegible]胡粉 黄丹各[illegible] 右末乾擦
[illegible]方 滿尺小柱皂角[illegible]
右入[illegible]末半兩[illegible]調抹[illegible]
[illegible]方 斑猫[illegible]明硫黄 蘆薈[illegible]輕粉[illegible]
右細末[illegible]油調擦
又方 [illegible]魚[illegible] 生[illegible] 明硫黄
雄黄各半兩 生猪脂[illegible]
右件先煎猪脂溶消即入[illegible]
入[illegible]末拌和磁器收用
又方 草烏頭[illegible]
右末酒糊圓梧子大每服伍圓茶酒任下亦治諸風[illegible]
[illegible]方 先用[illegible]煎湯温洗次用
吳茱萸 生半夏 草烏
白芷 赤小豆 等分
右細末米醋夾生[illegible]稀調傅
又[illegible]方 蛇背草入生明[illegible]研細傅两三次[illegible]
又[illegible]方 生硫黄 消石 明礬[illegible]
雄黄[illegible] 輕粉[illegible]

疥瘡 雄黄 巴豆 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

右細末好[illegible]油調傅[illegible]
又方 猪[illegible] 小兒[illegible]
[illegible]方 狼毒 草烏[illegible]斑猫[illegible]
右生為末津[illegible]調抹
[illegible]方 明礬[illegible] [illegible]胡粉
黄丹 水銀各[illegible]
右末用[illegible]油[illegible]兩先研令水銀星盡[illegible]收用
又方 斑猫[illegible]
右為末以[illegible]取肉研圓[illegible]調抹
[illegible]方 [illegible]皮鞋底燒存性[illegible]調抹
又[illegible]方 石榴根取皮[illegible]明[illegible]末[illegible]用[illegible]則虫[illegible]
[illegible]方 五更[illegible]
調[illegible]
[illegible]方 川烏 草烏 何首烏
白芷 蘇木 等分
右截小片[illegible]入[illegible]少許[illegible]
壹[illegible]酒調空心服
又方 雌黄末入[illegible]調抹

# 諸蟲 附 

諸虫方論

經云人身中有八萬尸虫若無即人身不成不立尸虫與人俱生狀如馬尾或如薄筋出則在脾入則五臟之俞居之然人亦不必盡有有亦不必盡多也古方論臟腑九虫多寡有無固未可必亦當備識其名目九虫者何一曰伏虫二曰白虫三曰肉虫四曰肺虫五曰胃虫六曰弱虫七曰赤虫八曰蟯虫九曰蛔虫蛔虫俗謂之食虫倜不待辯而知矣其他皆由臟腑不實脾胃俱虛雜食生冷甘肥油膩鹹藏等物節宣不時腐敗停滯所以發動虫之為候嘔惡吐涎口出清沫痛有去來作作止止寸白虫色白形褊損人精氣力之瘦弱蟯虫細如菜虫能為痔瘻瘡癩疥癬癰疽等患寸白蟯虫是三者皆九虫數中之一物也外此又有兒童疳蟨昏睡煩燥鼻爛汁臭齒齦生瘡下利黑血及傳尸勞瘵附之其傷寒狐惑證虫食下部為狐下唇有瘡虫食其臟為惑上唇有瘡活人總括言之詳矣

諸虫證治

[illegible] 取諸虫
雞心檳榔 蕪荑 木香
右末每服壹錢當晚先煎石榴根湯至五更喫炙肉壹片嚼細引虫上至喉以石榴根湯調藥服虫自殺而下

木香檳榔圓 殺下諸虫
雞心檳榔 大香 鶴虱 貫衆
錫灰 乾漆 史君子肉
輕粉 雷圓 巴豆肉
右細末飛白麪糊圓麻子大每服貳拾粒五更粥飲下或石榴根煎湯下

錫灰圓 取寸白諸虫
錫灰 雞心檳榔 貫衆
木香 輕粉 黃丹
右細末酒麪糊圓如麻子大每壹圓米泔浸軟日晒乾先喫飯了至黃昏不飲食將時喫肉脯壹片引虫候少刻溫酒嚼下天明虫出又石榴根湯亦治寸白虫

[illegible] 殺虫
大黃 木香 雞心檳榔
貫衆 桃仁 苦楝根 酸石榴根皮
蕪荑 鶴虱 巴豆肉
右末粳米粉糊研圓麻子大每服拾圓五更石菖蒲煎湯下

[illegible] 殺諸虫
鶴虱 蕪荑 乾漆 直僵蠶
貫衆 酸石榴根皮 朱砂
雄黃 雷圓 甘遂
右細末粳米粉糊圓麻子大每拾圓五更粥飲下

化虫散
雷圓 雞心檳榔 鶴虱 大史君子
右細末入輕粉少許分作兩服當晚用精猪肉壹兩切成片以皂角漿浸宿至五更微火炙熟又用芝麻拭肉候溫取壹服藥末摻於肉上略烘過空腹食之至巳刻虫自下過飲食

[illegible] 取寸白諸虫五更嚼炙肉壹片莫吞候虫尋肉其頭向上却吐出肉嚼史君子肉苦楝根湯吞下少頃以當晚所煎[illegible]送下粒瀉下皆虫也

[illegible] 殺諸虫
醇酒 蜜 黃蠟 乾漆
右銅銚內慢火同熬可圓即圓如梧子大每服壹圓溫酒化下

排瘀服之必自下

# 蠱毒

## 蠱毒方論

蠱害人利己蓄者不念於人畜獲之而況傷人性命以圖其道之溫燥此為富不仁之甚者也夫蠱毒有數種皆妖魅變惑之法其怪使然人有造作而得之者多取虫蛇之類以器盛貯之任其自相啖食其間一物獨存則以之為蠱即能變惑隨酒食以毒害於人使人受殃則蓄蠱之家日益富盛又有一種飛蠱從廟去來狀如鬼氣得之者一呼毋怪乎變現惑人之不可曉也凡中蠱毒不論年月遠近但煑一雞卵去殼以小銀釵插入其中併含入口一飯之頃取視釵卵俱黑即為中毒又法以水一椀唾津液入水其唾沉則為蠱浮則非蠱又法口含大豆中蠱者豆脹而皮脫非蠱則豆不脹其候面目青黃力乏身體唇口乾焦煩燥而悶胸脇妨滿肚脹皮堅腹中攪刺切痛如虫齧又如虫行喉吐鮮血小便淋瀝大便膿血雜下病人所食之物皆變化而為虫侵蝕腑臟蝕盡則死矣死則病氣流注復染著於傍人夫是之謂蠱疰

凡中蠱人男婦已瘥之後飲食末不得喫冷若飲食帶冷鬼氣乘之毒虫復生竟不能救

## 蠱毒灸治

治蠱毒挑生毒神呪出大藏經典凡在外飲食先默誦此咒則其毒不行呪曰姑蘇琢磨耶琢吾知蠱毒生四角父是穹隆窮母是舍耶女蕃孫百千萬吾今悉知汝摩訶薩摩訶如飲食上有蜘蛛絲便莫喫又法每遇所到處念藥王萬福不止亦可辟之灸蠱毒於足小指尖上灸三壯即有物出酒得之隨酒出飯得之隨飯出肉菜得之隨肉菜出

[illegible]治蠱毒[illegible]一切蠱毒[illegible]出則消神仙[illegible]



朱砂研 大山豆根 雄黃 黃丹
麝香 黃藥子 續隨子[illegible]
川巴豆[illegible] 斑猫[illegible]
糯米[illegible] 赤蜈蚣[illegible]

右十味各修治入乳鉢研和於端午重陽臘日修合不令雞犬婦人見用糯米稀糊圓如圓眼核大陰乾磁合收每服一圓好茶清吞下不得嚼破須臾病人自覺心頭如拽斷皮條聲將次毒物下或自口出或大便出嫩則是血老則成鱉或蛇蜈蚣諸雜帶命之物與圓藥血並下以水洗淨收之可救三人如中毒口噤即挑開下藥或蛇蝎馬汗諸毒以好醋磨服患處立解服藥已效如知毒害之家不必研究若訴之其毒再發不救瘥後更忌酒肉毒食一月稚軟飯可也或急用但擇吉日精潔修合

[illegible]圓 治蠱毒心腹堅痛羸瘦骨立

朱砂研 雄黃[illegible] 蕪荑[illegible]
鬼臼[illegible] 肥巴豆肉[illegible] 麝香[illegible]
青色大蝦蟆[illegible] 斑猫[illegible]

右細末煉蜜和搗伍伯杵圓如小豆大每伍圓空心溫酒下少刻再喫粥飲壹盞利出虫蛇惡物若不吐利更服貳參圓必效

[illegible]散 治蠱毒挑生毒草毒蕈毒獸毒 方見[illegible]門

[illegible] 治蠱毒方

五倍子[illegible] 硫黃[illegible] 甘草[illegible] 丁香
木香[illegible] 輕粉[illegible] 麝香[illegible] 糯米[illegible]

右捌味剉細入磁瓶內用水滿於分煎取柒分候藥面帶皺皮為熟生絹濾去滓空腹通口服幫令病人平正仰睡高起頭覺腹中有物衝心者三即不得動若吐出以桶盛之如魚鰾之類乃是惡物吐罷飲茶壹盞瀉亦不妨少進白粥

爲補忌生冷油膩魚腥鷄鵝五日後服[illegible]圓貳粒留

日又服貳粒自然平複

**生犀圓** 治蠱毒

正料平胃散

右用好生犀和圓梧子大每服拾粒空腹温酒下加至百粒

**歸魂散圓** 治蠱毒及虫蛇畜獸毒

雄黄　明白礬 生研等分

右端午日研細溶黄蠟爲圓梧子大每服圓入[illegible]

**[illegible]** 上吉嚥茶漏送水送下

破鼓皮[illegible]

**又方**

蚕退紙不拘多少[illegible]

右爲末研細新水調[illegible]諸中毒面青脉絶昏迷如醉

口噤吐血服之即甦

**七寳圓** 治蠱毒

破鼓皮　蚕退紙[illegible]刺蝟皮　五倍子

續隨子　朱砂各　雄黄各

右等分爲細末糯米稀糊圓梧子大每服圓空心熟水下

**又方** 治蠱毒亦治挑生毒

川升麻細剉壹兩作壹服水煎常服

**又方**

明礬生末次好茶水調服百毒

# 挑生

挑生方論

人苟愛身不可輕於溪水江南有射工毒虫其長色黒形如肉

口中横骨如角弓生溪澗内或因雨落逐水而入人家含沙射



人之影得之寒熱悶亂頭目俱痛亦如中尸卒不能語又水毒

虫一名溪溫得之病狀與射工相若但有瘡爲射工無瘡爲

溪溫特少異耳又沙蝨亦細如疥虫初不得見遇陰雨則行出

草間著人身則鑽入皮裏刺如針芒甚三者爲病頗相類皆

能殺人以方術灸法[illegible]治之不可不愼生蟲蛊蛇入患

腹食五臟而死矣挑生之毒其類甚于挑生多於飲食過度

凡魚肉果菜茶湯酒醋之中皆可挑毒以中人自嶺以南率多

有此其候初覺胸腹作痛次則漸漸覺刺十日生於腹中生則

能動矣台法胸痛則爲生在上膈腹痛則爲生在下腸在上膈

者用[illegible]錢投入壹盞熟茶之内候藥溶化通口服之少頃

以雞翎攪剌喉中取吐在下腸者用[illegible]貳錢末之米湯調

下即瀉出惡物吐瀉以後以人參壹分白茯苓倍之碎[illegible]

末新汲水和入磁瓶中慢火煨至半日每壹盞通口服日兩餐

嶺南[illegible]毒挑生呪[illegible]誦之[illegible]有間[illegible]廣山谷間有草曰[illegible]

[illegible]亦曰[illegible]或以藥人急水吞之急死緩以水吞之緩死又

有取毒蛇殺之以草覆蛇以水洒草數日菌生採取爲末入酒

毒人始亦無虞後再飲酒毒發立死其俗淫婦多偶合北人情

好雖篤不肯歸北陰以藥置食中與之還即叩之曰子某年來

若從其說復以藥解之若過期不來則斃矣戒之哉戒之哉

**[illegible]圓** 治挑生毒[illegible]藥毒草毒金石毒百虫毒蛇畜獸

惡毒鬼胎鬼氣癰疽諸病一切毒出入可以此藥隨身若覺意

思不快四大不和即磨服之乃[illegible]

挑生諸治

**治挑生方**

好茶　生明礬各壹錢[illegible]湯調服即吐毒

中諸毒並治

**[illegible]** 治虫蛇蜈蝎蚖蛇蜘蛛沙虫等傷毒

大[illegible]川椒[illegible]　一豆致[illegible]

右同入口嚼爛，唾在手心，次將[illegible]末調和，得所，仰傷處盦，水自出，續又再傅神效。

又方

貝母（為末）

右每服半兩，令病人盡量以酒調服，良久酒化為水，從傷處出，候出盡，又以貝母末塗瘡口，妙不可言。

蠼螋方 蠼螋，妖虫也，隱於壁間，尿射人之影，令人遍體生瘡，如湯火所傷，治法以

雞羽（燒存性）

右麻油調傅。雞食百虫，故能治之。或用燕窠土水調傅，或南向[illegible]自東取土末之，新水調傅。

天蛇毒方

秦皮煮煎服，外以滑石、貝母末傅。

諸蛇傷螫方

朱砂　雄黃　等分為末，法醋調入口罨。

治諸虫咬毒方

川升麻多煎服。

[illegible]方

藍青葉多研水調服。

[illegible]方

半夏末水圓，風乾，入[illegible]回則活。

[illegible]方 藜蘆末搽髮。　又方 麻油調[illegible]塗髮。

[illegible]方 水銀和[illegible]末，帛裹之，為索繫之，蟲自落。

[illegible] 解諸毒，蟲毒，蟲咬諸毒。

右取甘草，[illegible]，或水煎服神効。入甘草貫以真麻油浸，年歲愈多愈妙。





新刊仁齋直指方論卷之二十六

# 婦人（附）

論婦人傷寒大論

壹表　出明　拾遺

或問婦人病與男子何得同乎？曰：傷寒三百九十七條，一百一十三方，此張氏論傷寒之筆削也。[illegible]以男女為別者，要之，其書去取之間，或後男子所無論證明其論以[illegible]世俗之[illegible]。蓋婦人以血為主，[illegible]寒熱，經水適來，經[illegible]熱除而脅滿，[illegible]則邪氣結於[illegible]，[illegible]之傷風，經日續得寒熱，發作有時，經水適斷者，是則血結而不行，當以小柴胡湯[illegible]。所謂治之而愈者此也。至如傷寒發熱，經水適來，晝日明了，暮則譫語，如見鬼狀，是則熱入血室，無犯胃氣[illegible]，所謂不治自愈者此也。前乎此，血下血兩，[illegible]以[illegible]。

[illegible]，[illegible]，詳矣。抑產前產後，治法將何以為？曰：產前安胎，產後[illegible]，是[illegible]，條例斟酌輕重而調理之。安胎者何？[illegible]，為安胎。[illegible]，要[illegible]，[illegible]，[illegible]則不可輕用也。消散者何？川芎、[illegible]、[illegible]，[illegible]，則不可輕進也。朱氏以[illegible][illegible]而[illegible]末[illegible]，為安胎之[illegible]，[illegible]以[illegible][illegible]，[illegible]，[illegible]天[illegible]，為產前[illegible]，以小柴胡湯去[illegible]，[illegible][illegible]中以[illegible]一法，[illegible]半夫之，既非大便秘澀，又[illegible]一法，真可活人。然則產婦[illegible]，觀此可以問[illegible]，[illegible]安胎則不可不調氣，[illegible]則不可不扶虛。[illegible]以[illegible]也，[illegible]以[illegible]以扶虛也。[illegible]解肌則[illegible]，[illegible]則[illegible]助陽則[illegible]。[illegible]，[illegible]末備古人之[illegible]，然而[illegible]，[illegible]，皆不越古人之意，然[illegible]以[illegible]之[illegible]。

男女均有此血氣，人皆同。婦人以血爲本何耶？蓋其血勝於氣耳。血藏於肝，流注于脈，而上爲乳汁，下爲月水，合精而爲胞胎，猶非血乎？血之所以滋暢於經絡者，衝任使之。又不可舉一而遺一也。女子十四而天癸至 [illegible] 太衝之脈盛，月候以時而下。衝任者，血之海也。月水者，經絡之餘也。經言其常，其來有期，無過不及。反此者，病。其不行，則大甚，百病生焉。○自其血氣和平，陰陽調順，則精血聚而胞胎成。胞胎已成，而心腎二脈其動也。[illegible] 心之所主者血，腎之所主者精。精血交并而成之。精勝則爲男，血勝則爲女，此亦自然之理也。○自其血氣不調，陰陽相伏，過於陽則經脈前期而來，過於陰則經脈後期而至。蓋血性得熱則宣流，得寒則凝澁。陰氣乘陽，則內寒血澁，故其來下少；陽氣乘陰，血熱流散，故其來下多。過與不及，皆按病也。○然經脈不行，其候有三：一則經絡之閉，其脈滑實見之 [illegible] 一則 [illegible] 經絡涸澁，其脈虛弱見之 [illegible] 一則風冷內傷七情，內則以致經絡痺滯，其脈浮澁見之 [illegible] 經脈不行，此諸病之所由生也。○是故血虛閉熱，盜汗 [illegible] 則爲虛勞；血少水涸，燥氣乘肺，則爲乾嗽；宿寒留血，血與氣搏，則爲癥瘕；敗血結塊，時發寒熱，則爲痃癖；或風寒滯經，血化爲水，流溢四肢，謂之血分；或脾不制水，血與水并，浮腫肌肉，謂之水分。或衝任氣虛，內邪風邪，冷熱之氣，入於胞門，滯於血相傳而下，冷則多白，熱則多赤，冷熱不調，赤白相半，謂之赤白帶下。或衝任勞損，經海傷動，則虛衝弱，不能約制其血，經然暴下，謂之崩中。○有非時血行，淋瀝不斷，謂之漏下。崩中、漏下，已後有亦，血時崩時止 [illegible] 以至腹痛 [illegible]



鬱怒，熱在表裏，小便不禁，此婦人以血受病，最多而血之爲病 [illegible] 然則產前一科可得聞乎？曰：產前之病，其脈貴乎實；產後之病，其脈貴乎虛。產前則安之順氣安胎，產後扶虛消瘀，此其要也。抑考有子之後，血最氣養胎，胎成未產，飲食起居，猶宜謹一有不順，猶易受 [illegible] 婦人血氣滑 [illegible] 但用四物湯加以 [illegible] 之；陰勝加參，陽勝加芩 [illegible] 無不效。若胎難，若胎未不下，若胎損腹中，則入醋炙 [illegible] 前之以水醋或 [illegible] 用 [illegible] 此外有 [illegible] 以 [illegible] 調理胎。婦胎動下血，可以 [illegible] 之，至若胎漏喘咳，則 [illegible] 分入 [illegible] 最良。胎婦則 [illegible] 分入 [illegible] 大小產後，津液涸燥，而血停留，勞至大便秘結 [illegible] 加 [illegible] 二，用茶水同煎，入醋數沸可也。姙胎之劑 [illegible] 不可無，安胎之劑 [illegible] 以不可闕。婦人多因怒氣傷胎，所以安胎尤要先於順氣。其於產後發熱 [illegible] 加 [illegible] 入 [illegible] 亦佳。產後 [illegible] 之大，宜則補 [illegible] 敗血爲害，輕者大則，稽中所論產寶方論，其來書 [illegible] 別有經驗，節本解 [illegible] 明此，可爲產科之綱。

## 孕育備論

經云：少陰脈動甚者，有子。然其何哉？曰：手少陰之經屬心，足少陰之經屬腎。心之所主者血，腎之所主者精。精血交合，氣而成之也。然而抱明子乃又所以爲精血之會，其於尺部一脈，尤有可驗者焉。且婦人尺部之脈，沉其實血，實必主月事。行其來時，或中絕而不至者，此皆無孕。精滑而不絕，略無間斷，於其間此，則有胎孕之脈也。已婦人懷胎，臟氣壅閉，不可多睡，不可 [illegible] 不可食 [illegible] 又不可妄施針灸，所

貴時時變故調暢自然使氣得其中若酒醉及勞動而動搖者
或觸犯胎氣傳以熱氣毋服藥餌破血動胎於未時將偏煩意
然後則易致滑泄或腹痛方產則力大早若氣則胎動胎轉未
得若抱持不正令兒偏遇若產難須[illegible]則易致產難
既產之後或過用人力或產有難阻或血氣逆或虛極產後
則血塊脹悶之證生矣○然而安胎之法有二因母病以致動
胎者但療母病其胎自安或胎氣不固以致動以致母病者則
安胎而母自是以[illegible]佐之為良雖產多
劑前所謂四物湯加[illegible]入前安前[illegible]煎湯調
下貴其[illegible]後血運先以[illegible]向其[illegible]次則[illegible]
[illegible]半生半熟入[illegible]前[illegible]湯調與之[illegible]入[illegible]
[illegible]以[illegible]或[illegible]用童子小便溫溫調劑可也○損孕
驗法婦人面色青手足冷指甲黑而且氣不仁腰腹痛割其
或面青唇青以至舌間黑口角沫出則不治以人力勝之大
一[illegible]十[illegible]一[illegible]
要將產腰痛腹痛物驚動且須扶物而行直至腰痛子臨門方
可用力若腎氣滯而胎氣於腎故也○俗於產下多用[illegible]
[illegible]甘而滯不若但用[illegible]俗於小兒初生多用[illegible]然
是益傷胃不若但用[illegible]前[illegible]入口良久送用此物自出
俗於胎孕已成多服[illegible]須以[illegible]
為佐產後飯食米飲勿用產後湯洗沸湯是當調血以[illegible]透
所以[illegible]人所共知也若夫順氣寬胎則產後有[illegible]而
並用之

論王叔和劉元賓別男女法
叔和以左手太陽浮大為男右手太陰沉細為女元賓以右手
浮大為女左手沉實為男蓋是一說不無牴牾然而[illegible]脈經本
旨而詳之又有若異而實同者焉曰左手沉實為男右手浮大
為女又曰左右手俱沉實者生二男元賓
所主亦如之也經曰左手尺中浮大者男右手尺中沉細者女又



曰尺脈俱浮產二男尺脈俱沉產二女叉[illegible]所主者[illegible]何
若沉細之說與沉實[illegible]不同左尺浮大之[illegible]右手[illegible]若
亦異歟知男女之法大抵沉實者可以為男沉細者亦[illegible]為女
右手浮大者固知其女左尺浮大者大抵皆男沉細為女[illegible]
為男即所謂諸陽為男諸陰為女者[illegible]右尺浮大為男右手
浮大為女即所謂左為男右為女者是也元賓[illegible]具[illegible]
合左右手而別陰陽相和其[illegible]得不過脈經論尺脈
尚有異同之辯哉[illegible]云凡脈得太陽為男得太陰為女
蓋太陽則浮大太陰則沉也脈經云尺脈左偏大為男尺脈右偏
大為女左右俱大產二[illegible]大者大而有力也左右手脈俱在一
手脈來[illegible]逆而不[illegible]又胎左尺脈帶強右尺脈帶[illegible]為
男右尺脈帶強左尺帶弱者為女胎偏[illegible]而行[illegible]從後呼
之左回首者為男右回首者為女或於[illegible]所呼之[illegible]向又[illegible]
其夫左乳有核者生男右乳有核者生女

論崩中帶下
下部出血不止謂之崩中[illegible]常[illegible]帶下崩中失血多因
衝任[illegible]得之帶下多因下焦不固內挾風冷
得之是固然爾然崩中者投以[illegible]之[illegible]
治[illegible]而終不止帶下者投以[illegible]之類[illegible]
飲而終不歇其故何哉經曰衛氣者所以溫分肉充皮膚肥腠
理司開闔衛氣若虛則分肉不溫皮膚不充腠理不肥而開闔
失其司況胃為血海水液會焉胃者中央之土又所以主肌
肉而約血水也衛氣與胃氣俱虛則肌弱而膚空血之與水不
能約制是以滑泄[illegible]作無時而不暫停矣然則封之止之
其可不加意於衛胃[illegible]以[illegible]之[illegible]用[illegible]
[illegible]書而[illegible]以之[illegible]二者俱不
可闕也○雖然[illegible]有[illegible]熱而下血者[illegible]則[illegible]
間[illegible]所不可無肺經脈微亦主帶下此則[illegible]可[illegible]水

亦須以[illegible]佐之。若夫帶之為患，出於風冷停宿，[illegible]補而用之，蓋[illegible]
[illegible]散其寒邪，然後為之封固，所謂[illegible]
云。○凡婦人大小產及諸下血，新產未得經久，[illegible]事俱作
由中[illegible]下二帶之疾，又有月事久閉，[illegible]一通，下部為風邪所
搏，致便收斂，出而未盡，亦作崩中漏下，或水或紅紫，淋漓無時。
其崩中下血不止者，[illegible]以[illegible]陳米[illegible]煎湯食前送下。
又方 人參[illegible]木[illegible]等分[illegible]
煮前服 又方 [illegible]剉碎，以[illegible]汁和麵捏餅，包果炙令香，研
去[illegible]服[illegible]之，糯米糊圓，桐子大，每服伍拾圓[illegible]
[illegible]合半食前[illegible]送下。此皆止血之藥也。

# ○血氣 附 吐衄 九竅出血

血論

人具此陰陽，即有此血氣。氣陽也，血陰也。男以陽為主，則陽勝乎陰；女以陰為主，則陰勝乎陽。氣血之為病，男女則同耳。人皆知百病生於氣，又孰知血為百病之胎乎？血猶水也，水行乎地中，百川理而無壅遏之患；人之血脈一或凝滯於經絡腸胃之間，百病由此而根矣。乍寒乍熱，發黃發斑，[illegible]，煩悶[illegible]，[illegible]自汗，閉熱[illegible]，淋瀝崩吐，衄咳唾，以至眩暈，[illegible]，[illegible]忘[illegible]，痹痛，[illegible]起上逆溺，九竅迸出血而何？經所謂先血然後調之，良有以也。夫血得寒則凝泣，得熱則宜流，然熱盛[illegible]風冷交侵，固易為虛勞，[illegible]之證其若出血，[illegible]大抵多因[illegible]之藥，其道一，開解血亦為之，不然[illegible]川芎[illegible]血中之氣也。治血[illegible]益母，以胃藥收功，蓋[illegible]主血，脾藏血，胃[illegible]又所以生其血而能使之[illegible]歸元，故其血自止。經又云乎血隨氣行，逆則血逆，於此尤當加意。

血疾證治

[illegible]加[illegible]米[illegible]下[illegible]



血崩漏下，[illegible]以[illegible]黃剉碎和入同煎，[illegible]
[illegible] 血氣虛損，腰[illegible]疼痛[illegible]加[illegible]白[illegible]則去[illegible]
加人參白朮
嗽血吐血 [illegible]加[illegible]末少許，略煎，食後服
肺熱嗽血 [illegible]方見咳嗽門 加[illegible]去心同煎
[illegible]熱[illegible] [illegible]服
[illegible]吐瀉，血不止[illegible] 方見諸氣類
大便下血 [illegible]加[illegible]
口舌出血 [illegible]為末傳之

血遇熱則宜流，故止血多用涼藥，然亦有氣虛挾寒，陰陽不相為守，榮氣虛散，血亦錯行，所謂陽虛陰必走，是爾。外證必有虛冷之狀，去當溫中，使血自歸於經絡，可用[illegible]加[illegible]或[illegible] 方見[illegible] 加川芎 或[illegible]其效甚著。又有飲食傷胃，或胃虛不能傳化，其氣逆上，亦令吐衄，[illegible]

[illegible] 通用

[illegible]治虛極而理氣不歸元，衄血喘嗽痰作，[illegible]
[illegible]各[illegible]貳[illegible]右件別研細，糯米糊圓，[illegible]子大，每服伍拾圓，空心[illegible]加[illegible]下，或[illegible]湯[illegible]
[illegible]下 方見[illegible]
出血者，益母以胃藥收功，用[illegible]白朮[illegible]貳分
[illegible]分 方見諸氣[illegible]加米湯[illegible]下，或[illegible]
[illegible]次和[illegible]米湯調下。已上並用[illegible]略煎，亦得，右[illegible]不惟益胃，且以調氣，與之並行。若夫[illegible]
次和[illegible]方見[illegible]入[illegible]少許佐之。又調氣之上藥也。

[illegible]治諸血諸氣痛不可忍

血竭 沒藥 沉香 辰砂各等分[illegible]

木香　麝香各半分

右生爲末磁器收之[illegible]圓如皂子大每壹圓[illegible]湯嚼

下産後血痛氣痛並主之亦治腰痛

[illegible]治月事不調心腹刺痛寒熱間作

當歸　川芎　赤芍藥　牡丹皮

南木香　細辛　辣桂　延胡索

乳香　沒藥各等分

右爲末醋糊[illegible]圓如梧桐子大每

服柒拾圓[illegible]湯送下有熱多加[illegible]湯

[illegible]治瘀血不消腰脅引腰背俱痛

川芎　當歸　芍藥　生乾地黄

三稜　莪朮　白芷　延胡索

蒲黄　香附子　澤蘭　細辛

川白姜　厚朴　桃仁[illegible]

辣桂　半夏　甘草[illegible]

右剉散每服叁錢[illegible]食前服

[illegible]治胎動腹痛[illegible]或心痛失氣胎又不動或血水間下

縮砂　桑寄生　當歸　川芎

艾葉　阿膠　南木香　甘草

右剉散每服叁錢[illegible]伍片棗兩枚煎服下血水者更以[illegible]

[illegible]加[illegible]佐之

[illegible]治血結作痛

生地黄　生薑[illegible]

右末每服貳錢温酒調下或男女血熱心煩或産後傷風則

以[illegible]煎湯調下

[illegible]治男女諸熱出血衄血[illegible]

柴胡　黄芩　人參　甘草

半夏[illegible]



[illegible]煎[illegible]服

[illegible]治男女下焦蓄血小腹急痛内外有熱大便[illegible]

大黄半兩　桂枝　甘草　桃仁

芒硝

右剉散分作叁服每煎至臨熟入[illegible]再煎沸温服以

通利爲度

[illegible]治男女諸虛出血胃寒不能引氣歸元無以收約其血

甘草炙　川白姜　右剉散每服叁錢食前煎服

[illegible]治血氣不足脇肋之力或瘀血腹痛或下血過多

當歸　川芎　白芍藥　乾薑

南木香　甘草

右剉散每服叁錢食前煎服若腹不痛則無瘀血更加人參

又能益血

[illegible]治吐血下血崩中帶下常服治喉中痛虛腫亦消伯瘀

百病通用

闘白[illegible]

右末米糊圓如[illegible]豆大日乾每服肆[illegible]温熱水下

[illegible]治諸竅出血並主之

隔年蓮蓬　敗棕櫚　頭髮

右爲末每服貳錢煎[illegible]湯調下或只用棕櫚燒灰米湯

調下亦可

[illegible]治吐血衄血

米花　紫蘇莖葉

右散新汲水壹碗[illegible]貳錢旋服仍以大

蒜兩[illegible]兩脚心[illegible]中有蒜氣其血

立止若下部出血可以[illegible]兩掌心

[illegible]治上焦有熱咯血[illegible]血煩悶燥渴

黑豆[illegible]　紫蘇[illegible]烏梅[illegible]

右水大椀同煎臨熟入薑汁叁大匙食後按服

阿膠散 治肺破嗽血唾血

人參　伏苓　生乾地黃　天門冬 各壹兩

北五味子 各壹分　阿膠 炒　白芨 各貳分

右白芨別爲末餘藥剉散每服叁錢水大盞入蜜貳大匙秫米百粒薑五片同煎臨熟入白芨少許食後服

[illegible] 治肺損吐血嗽血

生地黃 取汁　鹿角膠 炒

右爲末拌和每服叁錢童子小便壹盞煖熱入薑汁少許調下無[illegible]則以[illegible]炒酥代用

[illegible] 治肺癰唾吐膿血

薏苡 貳合　黑豆 百粒　烏梅 壹箇

右水貳盞煎達壹盞入[illegible]各壹錢每煎沸食後服

[illegible] 治大便下膿血

艾葉 壹握　黑豆 百粒

右新水壹大盞煎陸分入生薑汁叁大匙稍熱服

又方

黃連 貳錢　南木香 壹錢 剉細慢火煎八分食前服

[illegible] 治諸血妄行

黃連 [illegible]　獨頭蒜 [illegible]

右入米醋些子搗和爲圓梧子大日乾每服肆拾圓陳米飲下

人參散 治吐血咯血

新羅人參慢火煎服

又方

人參　川芎　北[illegible]

甘草 炙 各壹分　半夏 各叁分

右剉每服叁錢薑伍片煎服

[illegible] 治諸熱吐血衄血



生藕搗取汁半盞入白鹽少許服之立效如無生藕節以

用[illegible]壹分微炒[illegible]半分剉散用煎亦效

[illegible] 治吐血衄血

亂髮燒存性

右研細每服貳錢米湯調下衄者更以少許吹入鼻

小便出血則小腸氣秘氣秘則小便難甚痛者謂之淋不痛者謂之尿血

頭髮燒存性爲末新汲水調下妙

又方

車前子但曬乾爲末每貳錢以車前子葉煎湯調下

又方

海金砂爲細末新汲水調下[illegible]

[illegible] [illegible]煎湯調下

[illegible] 治諸下血

大香附 [illegible]

右爲末每貳錢米湯調下治崩帶用炒艾葉煎湯調下

又方

淨香附酒醋各半煮焙

右爲末黃秫米糊圓梧子大每肆伍拾圓米湯下

又方 治血下帶下

香附 [illegible]　艾葉 [illegible]

右爲末秫米糊圓梧子大每伍陸拾圓艾醋湯或醋湯下

[illegible] 治血閉腹痛産後瘀血腹痛

新布數重包裹白鹽壹合炭火燒存性

右研細溫酒調下新布即青麻也能逐瘀血

[illegible] 治打撲傷墜瘀血[illegible]身體疼痛

辣桂

右爲末每貳錢溫酒調下或用[illegible]各半分

每叁錢生姜[illegible]煎服取下黑物即安或未有[illegible]辛且服
米醋壹小盞亦[illegible]血

[illegible]丹 治打撲驚忤血入心竅不能語言
朱砂為細末
右以雄猪心生血和圓麻子大日乾每服亦同石菖蒲煎湯
下東湯亦可

[illegible]方
天門冬去心 青黛[illegible] 生蒲黃
川姜黃 油髮灰[illegible]
右末煉蜜圓桐子大每伍拾丸入[illegible]中用紙包煨香熟
冷含[illegible]煎湯臨卧嚥下[illegible]能亦[illegible]血為胆嘔血為[illegible]

[illegible]方
荊芥酒煎通口服

又方 暴驚風九竅血其脉虛者
靈砂百粒分叁次人參煎湯下[illegible]

又方 治傷寒嘔血繼而鼻衄將[illegible]流血不止
開口川椒肆拾玖粒
右用法醋大盞同煎臨熱入白礬少許漱口含在口中少頃
吐出再嗽漱而含

[illegible] 治諸血作痛血運昏迷血滞難產一切出血過多
川芎 當歸 等分
右為麄散每服叁錢水壹盞半取壹盞稍熱服不拘時加[illegible]

[illegible] 治勞傷血氣月水過多淋瀝漏下連日不斷臍腹疼痛
治胎動腹痛漏血[illegible]
經血淋瀝不斷
熟乾地黄 白芍藥[illegible] 當歸 去芦[illegible] 艾葉[illegible]各壹兩
阿膠[illegible] 芎藭 甘草 炙[illegible]兩
右為麄末每服叁錢水壹盞酒[illegible]分去滓熱服空



心食前日叁服病甚者連夜併服

[illegible]圓
赤石脂 煅 艾葉 補骨脂 炒 木賊 各半兩
附子 壹隻炮
右末陳米飲和圓梧桐子大每服伍拾圓食前溫酒送下

[illegible] 治氣血不調肢體羸弱
熟乾地黄 壹兩半 澤蘭 去枝 人參 去芦 兩
黄芪 去芦[illegible] 牛膝[illegible] 赤石脂[illegible] 白茯苓 去皮
木香 萆薢[illegible] 附子[illegible] 續斷 各叁分
乾薑 炮 肉桂 去粗皮 芎藭 白术
當歸[illegible] 甘草[illegible]各半兩
右為末煉蜜圓如梧桐子大每服叁拾圓溫米飲下空心食
前産壹百日內每日常服壯氣益血

[illegible] 治婦人一切血氣虛損 方見虛損門
[illegible]圓 方見産後門
[illegible] 治胃脘逆冷心腹疠痛 方見[illegible]門
[illegible] 能類陰陽扶虛補損治心腹冷痛小兒慢驚風或
吐利不止變成慢風搐搦者非風也胃氣欲絕故也用伍粒
研碎米飲送下老人伏暑迷悶紫蘇湯下婦人産後血逆上
搶悶絕并噎塞上及赤白帶下並用醋湯下常服和陰陽
益精神散腎陰濕止腹脇冷疾癖諸疾不辨陰陽證並宜服
之 方見[illegible]門
[illegible] 方見[illegible]門
[illegible] 升降陰陽[illegible]補腎氣衛胃脘脹脹刺痛 方見[illegible]門
[illegible] 固其氣治衄血 方見脾胃門
[illegible] 治婦人血氣滯下腹病助陽接氣升降陰陽 方見[illegible]門
[illegible]湯 調中快氣治心腹刺痛
烏藥[illegible] 香附子[illegible] 甘草[illegible]

右為細末每服壹錢鹽少許或不着鹽沸湯點不拘時
[illegible]方見虛勞門

# 拾遺

附方
明白礬　黃丹入麝少許末之傅
又方
白礬研飛過臨卧以絲綿揉上神手[illegible]狂以礬傅臍腹下
令熱痛即換衣着舊衣用灰汁洗
又方[illegible]半生半煅為細末入少[illegible]研細每半錢已浴後
以生薑汁調擦候十分熱痛即上
又方治夜下遺臭不可向邇
大蜘蛛[illegible]以黃泥入少[illegible]并鹽杵為窠子[illegible]
蛛燒令通紅候冷取蜘蛛研細入[illegible]
卧浴淨傅之腋下米早為黑汁其物為效理之僻處
又方[illegible]為末用豉汁調傅
跌破出血方[illegible]細末傅亦治湯火傷[illegible]
頭破傷風方[illegible]水調塗四圍水出為效
[illegible]葱酒[illegible]令醉[illegible]入鼻嚏即正
[illegible]方　大川椒去目炒出汗　蓽撥
辣桂　川白薑　華陰細辛各等分
右為末酒糊圓桐子大每三十圓食前溫酒下

新刊仁齋直指方論卷之二十六

虹橋涉川足以為福田乎溱洧濟人[illegible]
為惠然成者有時而壞也紅粟振飢[illegible]
為陰德乎翳桑待哺不能家給然利者有
時而病也人生天地間溥万物為一體豈
大造為全仁盡思所以廣其濟余每見人
以疾痛為憂財匱者無力名醫力到者無
醫能療雖藥偏嘗付性命於一擲未嘗不
為之扼腕焉於是竊暇燈窗研精脈法上
稽靈素之書下及湯液之論張長沙鳴於
漢孫地仙鳴於唐与夫晉宋而下諸賢之
所撰次者搜覽迨盡将以推廣不忍人之
仁就是而得三昧竊謂大科傷寒法度為
甚嚴小科驚風方論為難盡傷寒治法表
裏陰陽出入傳變若綱在綱固不容紊若
夫嬰兒驚風急轉而慢實俄而虛形似實
非尤難臆度自非審脈驗證達變知幾鮮
有不以嬰兒為戲此驚風証治指要之所由
作也證以言驚風之狀治以言驚風之方
指者直訣以曉人要者精義以致用王氏
非無家傳然方粹而證不詳錢氏非無以明

法然義涂而方難用是編所作本之前聖大賢之方論參之聞人高士之見聞得之先疇已試之効虛實補瀉之辨其証參參桂朮之隨其方覽者歷歷可曉惠之方來傳之同志使據病可以識證因證可以得方爲天下拯提囬生立命起愈扶衰倚執此以登盧扁之門或可爲消埃萬分之助周流人間衛生救物獨不得如封君達之用心乎徑刺諸梓嘉與四方共之庶幾廣濟於無窮也或曰子胡不私諸已爲家傳計余應之曰喜捨方便釋氏書第一義也政使學者復之幾之推是以及人之幼百若南陽一書余嘗紬繹其說目曰活人總括嗣此以求其傳堂上呼盧喝六作五小子則不敢知景定庚申閏朔三山郡北后曹楊士瀛登父自序

十九

# 新刊仁齋直指小兒方論目錄

環溪書院刊行

〇卷之一

## 初生


〇初生噤風撮口臍風方論　噤風撮口臍風證
風噤方　控痰散　益脾散
辰砂膏　僵蠶方　甘草湯
擦風散　蜈蚣方　蜘蛛方
牛涎方　立聖散　安臍散
博臍方　臍風錮口方　千金龍膽湯
朱銀圓　天麻圓　定命丹
〇初生不乳證治　伏苓圓　治胎寒腹痛方
治惡穢入腹令兒嘔吐不止方


## 變蒸


〇變蒸方論　變蒸證治
柴胡湯　紫霜黑散　紫圓子
當歸散　調氣散


## 驚


〇急風慢風慢脾風總論　虎口三關紋訣法
驚風方論　驚風證治　全蝎散
羌活膏　來復丹方見嘗用　星香散
本事人參散　至寶圓　驅風散
雄黃散　消驚圓　聚寶圓
安驚圓　參砂膏　定心圓

驚熱

○驚熱方論　驚熱證治　犀角湯
銀嚢湯　清心圓　伏神圓
膽星圓　羚羊角湯

胎驚

○胎驚方論　胎驚證治　太一散
參蝎散　猪乳膏　金蝎散
朱麝散　獨活湯　朱銀圓
千金龍膽湯

急驚

○通關定驚方論　通關定驚證治　開關散
開牙散　嚏驚散　開關聖散
○截風定搐方法　人參羌活散方見傷寒門　一字散
陽癎散　擒風湯　定搐散
瀉青圓　木通散　清寧散
阿膠散　定命丹　利驚圓
防風湯　宣風散　枳殼散
小柴胡湯方見發瘧門
○治驚稍重下法　揭風湯　朱砂膏
疎風散　小柴胡湯
○治驚重下法　青金圓　天麻圓
蘆薈散　牛黃涼腦圓　青金丹
王監京墨圓
○和胃助氣治法　生氣散　銀白散
伏苓二陳湯　異功散　天麻蘇合香圓
天麻防風圓　蘇合香圓方見氣門　參苓白朮散
和中散　醒脾散方見慢驚門　定志圓
溫膽湯　定心圓　百枝膏



○卷之二

慢驚

○方傳慢驚證法　太一保生丹　聚寶丹
蝉蝎散　神保既濟丹　來復丹方見氣類
王氏惺惺散　醒脾散　大醒脾散
溫白圓
○已傳慢驚證治　星香全蝎散　定命飲
四聖散　烏蝎四君子湯　南星散
烏沉湯　沉香散
○慢驚下痰證治　天南星圓　蘇合香圓方見氣門
白圓子方見痰門　神保既濟丹方見上　蝉蝎散
靈脂圓　七珍圓　黑附湯
慢脾風生胃回陽治法
川烏散　金液丹方見氣門　生附四君子湯
瀉肝散　陰癎散　靈砂
震靈丹方見氣類

慢脾風

○慢脾風下痰證　神保既濟丹方見慢驚門　白殭蚕圓
辰砂膏　七寶妙砂丹　木通湯
○急慢脾風證治　星蘇散　南星醒神散
神聖圓　虎蝎圓　乳麝圓
鎮心圓　木香湯　至聖保命丹
太一萬金丹　香餅子
蟬蝎散　快脾湯　助胃膏
沉附湯　鎮痰圓　利痰圓

客忤

○客忤方論　客忤證治　雄麝散
蘇合香圓　麝香飲　犀角散

安神圓 伏龍肝方 千金龍膽湯
馬尾方
【驚積】
○驚積方論 驚積證治 辰砂膏方見
青黛圓 朱銀圓
○天弔方論 天弔證治 鈎藤飲
保命丹
○驚風內弔方論附盤腸氣吊 驚風內弔證治
乳香圓 木香圓 白豆蔻散
蘆薈子散 化虫圓 安息香圓
茴香散 芎歸散
養臟湯

# 中風

中風方論 五癎灸穴 中風證治
排風湯 小續命湯 交濟湯
搖生飲 星香飲 附子散
阿膠散 追風毒剉散 肥兒圓
星蘇散方見前 木通湯 通關散方見前
【痓痙】
痓痙方論 痓痙證治 小續命湯方見中風門
防風溫膽湯 敗毒散 小柴胡湯
大承氣湯 麻黃葛根湯 桂枝葛根湯
理中湯 三生飲
【痿痺】
○痿痺方論 諸癎不治證候 風癎證治
敗風丹 保安圓 獨活湯
細辛大黃湯 牛黃圓



癖論證治 比金膏 鎮驚圓
虎睛圓 七寶鎮心圓 清神湯
寧癎蟬花散 紫霜圓 妙聖丹
天麻圓方見
○五癎治法 錢氏五癎圓 南星散方見
猪心湯 本事雄黃圓 蛇黃圓
消癎圓 當歸大黃湯 蝎虎散
代赭石散 日應丹 地龍散
定癎圓 全蝎五癎圓 金朱丹
千金龍膽湯方見 星朱散 猪膽南星散
肥兒圓方見風門中
論灸癎穴
論胎癎疳積紛已諸等不可輕用 論蟆蚧有毒

# 疳

諸疳方論 諸疳證治 集聖圓
療疳散 黃連肥兒圓 大蘆薈圓
脂連圓 五疳良方 胡黃連圓
至聖圓 通神圓 伏神圓
天麻圓 生熟地黃湯 地黃圓
走馬疳方 清肺飲 化䘌圓
蝦蟆圓 下虫圓 龍膽圓
黃連圓 消疳圓 木香圓
褐圓子 蘆薈湯 澄心煎
蚵蚾圓又方 十全丹 五疳圓方見
按疳圓附 小黃連阿膠圓 龍膽湯
○疳瘡方論 疳瘡證治 猪肚黃連圓

# 積

○積滯方論　木香圓　大異香散（方見脹滿門）
知荊異香散　和劑流氣飲（方見諸氣門）　下積圓
五珍圓　挨積圓（方見[illegible]）　[illegible]圓（方見風門）
青龍圓（方見[illegible]門）　朱銀圓（方見[illegible]門）
○痞結證治　聖惠甘遂散
○癖氣證治　木香圓（方見[illegible]）　取癖圓
挨癖圓　代赭圓

# 熱

諸熱方論　諸熱證治　加味清涼散
人參芎歸散　豬膽圓　龍膽草圓
清解散



○卷之四

# 傷寒

○傷寒方論　傷寒證治　桂枝麻黃湯
香蘇散　升麻葛根湯　小柴胡湯（方見[illegible]門）
理中湯（方見[illegible]）　甘露散　四順飲（[illegible]）
五苓散（方見[illegible]門）　參蘇飲（方見[illegible]）　人參羌活散（方見[illegible]）
人參潤肺湯（方見[illegible]）　紫[illegible]圓（方見[illegible]門）　人參敗毒散

**瘧**　寒瘧證治　常山散

**[illegible]**　[illegible]寒證治　地黃圓（方見[illegible]門）

**汗**　虛汗證治　團參湯　撲汗方

# 痰嗽

○痰涎證治　風痰證治　朱砂圓
奪命散　青州白圓子

**咳嗽**　○咳嗽喘嗽證治　杏仁膏　紫菀湯
人參[illegible]湯

# 脾胃

脾胃虛實證治　和脾胃進飲食證治

**吐**　○嘔吐證治　消乳丹　益胃散
半夏散
○吐瀉證治　雞舌香散　交泰散（又[illegible]）



不換金正氣散（方見寒類）　鐘乳[illegible]丹（方見[illegible]）　木香[illegible]散
○泄瀉證治　和安散
肉豆蔻散

**痢**　○瀉痢證治　[illegible]石子圓　赤痢肚熱方

**腹痛**　腹痛證治　四順清涼飲（方見[illegible]）　指迷七氣湯（方見諸氣門）
蘇合香圓（方見[illegible]門）　桔梗枳殼湯（方見諸氣門）

**腫**　○腫脹證治　葶藶散　分氣飲
○陰腫證治　桃仁圓　傅藥
母蠣散（又[illegible]）

**[illegible]**　○遺尿證治　雞腸散（又[illegible]）
○尿白證治　伏苓散（又[illegible]）

○諸淋證治　葵子散　導赤散
尿血方
○大小便不通證　没藥散
○脱肛證治　龍骨散


## 丹毒

丹毒證治　敗毒散（方見…）　又方


失血

吐血衄血證治　蒲黄散　地黄汁方
鼻衄方


## 雜證

○顖陷證治　顖填證治
解顱證治　錢氏地黄圓　又方
口舌證治　口角瘡爛方
重舌證治　木舌證治
喉痺證治　喉痺腫痛方　滞頤證治
語遲證治　菖蒲圓
夜啼證治　鈎藤散　又方
眼病證治　眼睛白膜方
耳病證治　龍骨散　月蝕耳方　又方
龜胷證治　龜背證治
癎病證治　安腳散　臍瘡方
○鶴節證治　行遲證治　地黄圓（方見…）
虎骨圓　五加皮散
頽疝證治　五苓散（方見…）　當歸散
川楝散
○瘡癬證治　鯽魚方　又方　漏瘡方




諸瘡又不瘥方　癧瘡方　魚膽瘡方
蛔蟲瘡方　癬方　前甲散


○卷之五

## 瘡疹

瘡疹方論　瘡疹備論　瘡疹證候
瘡疹治法　論升麻葛根湯　瘡疹異證
瘡疹證治　參蘇飲　惺惺散
升麻葛根湯（方見…）　人參敗毒散（方見…）　化毒湯
消風散（方見…）　加味四聖湯　紫草飲子　又方
紫草木香湯　紫草木通湯　快斑散
絲瓜湯　犀角地黄湯　大連翹湯
人參羌活散（方見…）　天麻防風圓　甘露飲（方見…）
五苓散（方見…）　小柴胡湯（方見…）　四順清凉飲（方見…）
大如聖湯　鼠粘子湯　麻黄黄芩湯
桔梗枳殼湯（方見…）　二陳湯（方見…）　甘草散
烏梅湯　木香理中湯　甘草乾薑湯
獨聖散　宣風散　五福化毒丹
加味宣風散　調解散　不換金正氣散
黄柏膏　豆皮飲　螺蛤散
治諸眼病　斑瘡方　鴿鵓油劑方　又方
瘡後服藥法　察小兒眼中神法


新刊仁齋直指小兒方論目錄

新刊仁齋直指小兒方論卷之一

三山名醫仁齋楊士瀛登父撰次
建安儒醫拿峯詹宏中洪道校定

# 初生

小兒病證惟驚疳瀉痢四者難治古語有之急慢脾風與夫諸風種類余於驚風證治指要言之詳矣諸疳方論於此又詳備焉所關者惟瀉痢兩件而已然小兒病狀亦不止乎瀉痢如直指方論前後編集諸病證治小兒類有之但病各有原治各隨證由博而約不過大人方法推之也雖然小兒多熱用藥不可過溫惟小小分劑調而平之毋至以藥勝病則得之矣其他嬰幼證類大人所與者併與名方駢集于後

初生噤風撮口臍風方論

初生噤風撮口臍風是三者一種病也噤風者眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中感受熱氣流毒於心脾故形見於喉舌間也抑亦生下後為風邪擊搏致之自滿月至百二十日見此名曰犯風噤依法將護防於未然則無此患○撮口者面目黃赤氣息喘急啼聲不出蓋由胎氣挾熱兼風邪入臍流毒心脾之經故令舌強唇青聚口撮面飲乳有妨若口出白沫而四肢冷者不可救藥其或肚脹青筋吊腸卵疝內氣引痛皆腸胃鬱結不通致之治法貴乎疏利撮口最為惡候一臘內見之尤急○臍風者斷臍之後為水濕風冷所乘風濕之氣入於臍而流於心脾遂令肚脹臍腫身體重著四肢柔直日夜多啼不能吮乳甚則發為風搐若臍邊青黑撮口不開是為內搐不治爪甲黑者即死其或熱在胸堂伸引弩氣亦令臍腫可與[illegible]如前三者受病之源非一朝夕大抵裹氣鬱結壅閉不通並用取下胎毒[illegible]可量與之[illegible]小兒始生其氣尚[illegible]



然若有微熱即須下之若不時下則成大疾疾成則難療[illegible]
[illegible]可量用之[illegible] 方見變蒸門

噤風撮口臍風證治

[illegible]先用[illegible]吐風涎次與[illegible]和胃又用[illegible]利驚即愈或手拳噤口不開者不治

[illegible]

蝎尾 銅青各半錢 朱砂壹錢
膩粉壹字 麝少許

右為末每服壹字腊茶清調下先吐風涎然後和胃或後與[illegible]吐痰隨輕重用

[illegible]

白茯苓 人參 草果 木香[illegible]
甘草炒 陳皮 厚朴製 蘇子炒

右等分為末每壹錢薑棗煎服

[illegible]

辰砂叁錢 硼砂 馬牙硝各壹錢半 玄明粉貳錢
全蝎 真珠末各壹錢 麝壹字

右為末和勻用好單包起自然成膏每服壹豆粒許治諸驚[illegible]湯下潮熱[illegible]湯下月內用[illegible]調傅妳上令吮下

[illegible]治撮口

直殭蚕貳枚去嘴略炒為末蜜調傅唇口中

[illegible]治撮口取吐

甘草生壹錢

右剉煎服令吐出痰涎却以[illegible]點入口中即瘥

[illegible]治撮口

赤脚蜈蚣半條炙 蝎梢[illegible] 朱砂
直殭蚕炒 血竭[illegible]各等分 麝[illegible]

右為末每服壹字取[illegible]調下[illegible]解熱

□□方治口噤不開不能收乳
赤足蜈蚣半枚去足炙令焦
右為末入麝香少許以豬乳一合和之分三服豬乳主小兒口
噤不開最良
□□方治口噤不開不能吮乳
蜘蛛壹枚去足及口炙令焦細研
右用豬乳一合調和分為三服徐徐灌之神妙千金亦用□□
治□□
□□方取東行牛口沫塗兒口及額上即效
□□散治小兒口噤
蝎梢七箇　乾蜘蛛一箇去口足先以新竹瓦上焙□□□□□□□
右同末研極細入麝香少許每壹字用乳汁調時時滴入口中
□□散小兒斷臍後便傳之
赤蜈蚣□□一條　羊角□□一錢　亂髮□□□□□□□□
麝少許　僵蠶三枚
右為末斷臍後便傳之
□□方
瓜蒂　南星　白斂　赤小豆半分
右為末每服壹錢用芭蕉自然汁調傳臍四邊
□□撮口方
金頭蜈蚣一箇　蝎梢五箇　直僵蠶七箇　瞿麥半錢
右為末每壹字吹入鼻內啼則可醫仍用薄荷湯調壹字服
千金龍膽湯方見驚門
□□圓方見驚門
天麻丸亦治□□□□下痢
初生不乳證治
嬰兒初出胞胎其聲未發急以手拭撥其口令惡血淨盡不得
下咽則無他病若拭口不前惡穢入腹則腹滿氣短不能飲乳



或生時難取冷凋冒受胎中受寒則令兒腹痛不肯飲乳□□入腹
宜用茯苓丸
赤茯苓　川黃連□□□□　枳殼□□
右等分為末煉蜜圓梧桐子大每壹圓乳汁研灌下
□□□□□方
木香　陳橘皮　檳榔各一分　辣桂
川白薑生　甘草炙各半分
右末取壹錢水煎以綿蘸與之
治嬰孺入腹令兒嘔吐不止方
木香　乾薑生　茯苓　甘草炙各一分
酸木瓜　丁香各半分
右為末每服半錢水煎以綿蘸與之

## 變蒸

變蒸方論
變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就是五臟之變氣而
七情之所由生也三十二日一變其後三大蒸總五百七十有
六日發若上氣蒸者躰熱微汗每經一變情態即異輕則發熱微汗
其狀似驚重則壯熱脉亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五
日解重者七八日解其候與傷寒相若亦有變蒸之餘續感寒
邪者但變蒸則耳冷骶冷上唇發泡狀如濁珠若寒邪搏之則
寒熱交爭腹中作痛而啼叫之聲日夜不絕變者易也蒸於肝
則目眩微赤蒸於肺則嚏嗽毛聳凡五臟六腑筋脉骨節皆循
環一匝各有證應其陰陽水火之變蒸治法和平之劑微表熱
實者微利之或不治亦自愈
變蒸證治
柴胡湯治變蒸骨熱心煩啼叫不已
人參　甘草微炙　麥門冬　柴胡各二錢

龍膽草　防風各壹錢

右剉散每服參字煎服

［illegible］解利熱氣

麻黃不去節壹兩　大黃半兩　杏仁去皮尖貳分

右件同一處擣和並焙燒存性再以杏仁少許研膏和之密器盛每用壹豆許乳汁和咽之

紫霜丸解利積氣實熱

代赭以醋淬七次研細壹錢　赤石脂壹錢

巴豆去皮膜油炒　杏仁去皮伍拾箇

右代赭石脂研細先擣末和杏仁巴豆擣三千杵若硬加蜜少許更擣圓如粟米大用瓷器收每服貳圓以乳汁送下如更有熱不泄明日再與二圓此藥兼治驚積痰癖食癇溫壯蒸

當歸散治變蒸有寒無熱

當歸貳錢　木香　官桂辣者

甘草炙　人參各壹錢

右剉散每服壹錢薑棗煎食前服

調氣散治變蒸吐瀉不乳多啼

木香　香附　厚朴炒　人參

橘皮　藿香　甘草炙各壹錢

右爲末每服參字薑棗煎服

## 驚

急風慢風慢脾風總論

小兒急慢驚風古所謂陰陽癇是爾急者屬陽陽盛而陰虧慢者屬陰陰盛而陽虧陽動而躁疾陰靜而遲緩其始也皆因臟腑虛而得之虛能發熱熱則生風是以風生於肝痰生於脾驚出於心熱出於肺而心亦主熱（大抵驚者生人而驚……）之驚風痰熱合爲四證四證已具八候生焉（搐搦掣顫反引竄視）

（……）凡搐眼摇頭張口出舌唇紅臉赤面眼青唇（……）大防髮際印堂青筋三關虎口紋紅紫或青者皆驚風狀也大抵熱論虛實證別逆順治有後先蓋實熱爲急驚虛熱爲慢驚慢驚本無熱所以發熱者虛使然爾急驚屬陽用藥以寒慢驚屬陰用藥以溫甚不可以陰陽無別故曰熱論虛實者此也男搐左視左女搐右視右男眼上竄女眼下竄男握拇指出外女握拇指入裏男引手挽左直右曲女引手挽右直左曲凡此皆順反之則逆亦有先搐左而後雙搐者但搐順則無聲搐逆則有聲其指紋形勢彎弓入裏者順出外者逆出入相半者難痊（……）五心煩熱之證却不發搐（……）發搐也但實證直視……發搐者（……）大熱則頭……火乃……故曰證別逆順者此也（……）熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搐治搐先於截風治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先於解熱其若四證俱有又當兼施並理一或有遺必生他證故曰治有先後者此也綱領如此若析爲急慢驚風而言之則暴烈者爲急驚沉重者爲慢驚而慢脾則重而深矣急驚之候牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦顫動（……）唇口眉眼眨引頻併口中熱氣頰赤唇紅大小便黃赤其脈浮數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生風而發搐肝風心火二臟交爭血亂氣并痰涎壅塞所以百脈凝滯關竅不通風氣蕃盛而無所泄故暴烈也治法大要用藥有序通關以後且與截風定搐搐定而痰熱尚作乃下之痰熱一泄又須急與和胃定心之劑如搐定而痰熱無多則但用輕藥消痰除熱可也然急驚雖當下切不可過用寒凉及銀粉巴豆之類（……）醫家不得已而用之搐定痰去即止或不……

而用或當用而過焉往往由此成慢驚矣

勢已輔化龍腦人黃可也 欲下之法須當問前人已下未

下或曾經吐瀉否已下及吐瀉者不可再下但驅風化痰消熱

而已大約痰熱十分且泄其三之二下劑中須以[illegible]

氣通心之類佐之蓋急驚在一時治之不可孟浪稍緩則證

候轉深若一時體認未明又不可妄施藥餌截風定搐先須

[illegible]嚏驚輩次則人參[illegible]

[illegible]以意擇用○下劑有三

輕下則用[illegible]

○稍重下則用[illegible]加大黃[illegible]重

下則用[illegible]

圓輩○下後和胃助氣如[illegible]

天麻[illegible]之類皆可選用○

定志寧神則以[illegible]與之他如[illegible]

[illegible]不冷不熱祛風鎮驚之劑又當繼此以

防其再發也下之後諸證猶存者未易痊愈更勿再下當作慢

驚理之○其有搐搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎者未可

直指以為驚風恐是傷風傷寒傷食成三等證或夾驚而成如

錢氏假搐之說 傷風夾驚神困昏睡[illegible]先用人參羌活[illegible]

傷寒[illegible]

熱溫壯或吐不思食大便酸臭先用人參[illegible]

脈表消[illegible]用驅風鎮驚之劑 凡搐搦者不可把握但扶持之

否則風癇逆入經絡遂使手足拘攣以成廢疾此治驚之大

要然也[illegible]或吐或瀉涎鳴微喘眼開神緩睡則露睛驚

跳搐搦乍發乍靜或身熱或身冷或四肢熱或口鼻冷氣面色

淡白淡青[illegible]昏闇或青或黑其脈沉遲散緩蓋由急驚過用

寒涼或轉下太驟傳變成之又有吐利不止而成者有氣虛[illegible]

吐瀉而成者[illegible]

日固腸 有臟腑虛洞泄成者[illegible]

有久痢氣脫成者有下積取瀉成者有吐血瀉血成者有感風

不解誤藥成者有傷寒傳變陰證成者有得之久嗽作癇者有

得之發癇不已者有得之積衝心者有得之卻腫感氣服寒[illegible]

者其或日夜汗出脾困多睡煩燥引飲四肢浮腫大小便閉乃

[illegible]腹走[illegible]吐瀉積痢成虛致之

則證候甚速[illegible]

乃慢驚[illegible]

非也[illegible]

重女子以吐得之為重治法大要須當問源流不可概曰慢

證如吐瀉得之則[illegible]中湯加[illegible]以溫其中[illegible]以導其水

臟寒洞泄得之則先與[illegible]下積取轉得之則先與[illegible]

外感寒邪得之則先與[illegible]並其他可以類推矣然

慢驚雖屬陰亦須准較陰陽虧盛淺深如何不可純用溫藥及

燥烈太熱之劑惟於生胃氣中加以截風定搐如[illegible]

[illegible]方傳慢候而尚有陽證者[illegible]

在不必回陽但與截風調胃可冷可熱均平陰陽而已[illegible]

[illegible]

[illegible]可選用之若陽證已傳陰證純深[illegible]

[illegible]搐曳反引竄視之證而但昏沉者[illegible]之屬○若手

足水冷方可回陽用[illegible]○慢驚下[illegible]身冷[illegible]

回[illegible]而不可下

痰者[illegible]一切

禁止[illegible]不知

但見引搐便用腦麝銀粉及寒涼等[illegible]若慢驚已

傳其眼半開半合則當預作慢脾風調理之於斯時也[illegible]氣為

盛陽氣為微時刻少[illegible]力不及[illegible]又不可純

進一二劑須當有無揣於疾稍定則和平宜分輕重則以別劑投
之此治慢驚之大要然也[illegible]而有額汗舌短頭低眼
合不開困睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手足微搐而不
收或身冷或身溫而四肢冷其脈沉微陰氣極盛胃氣極虛十
救一二盡由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所
受故曰脾風若逐風則無風可逐若療驚則無驚可療但脾間
痰涎虛熱往來其眼合者脾困氣乏神志沉迷痰涎凝滯然耳
世所謂慢風難療者慢脾風是也然慢脾一名虛風凡小兒或
吐或瀉之後面色虛黃大勢虛損若因虛而發熱纔此必得慢
脾[illegible]驚見搖頭斜視以手摸人昏困喜睡額上汗多身亦粘汗
其[illegible]沉小而焦即是脾風之證不必皆由急慢風傳次而至又
當識之治法大要生胃回陽[illegible]各
半生附四君子湯可斟酌用胃氣漸復則[illegible]溫平而調
理之如[illegible]等亦可參用○若其眼半開
半合手足不冷證候尚在慢驚則勿用回陽或已入慢脾而
陽氣未甚脫者亦不可用[illegible]凡服回陽劑手足漸煖
者仍以[illegible]等繼其後以調之○慢脾下痰用[illegible]
[illegible]重者[illegible]其則[illegible]慢脾逆惡證
喉諸藥不效者如有太衝脈則取百會穴灸之此治慢脾風之
大要然也 灸百會穴者見于後 雖然小兒有病問之則幼不能
言望之則易驚易至診之則或揚或動自六歲以下黃帝不載
其說者以其難也又況驚風一科古無全書則尤為難如前所
云固足以知三證之詳矣至於辨析體[illegible]之際有言而不
能盡其蘊者可不深加之意乎驚風一也痓痙[illegible]中天[illegible]
撮口亦風之種類焉○[illegible]者手足冰冷[illegible]者舉身僵仆[illegible]而
病當以陽剛陰柔別之剛者有汗柔者無汗肢體強直腰身
反張甚於風癇大抵不治○[illegible]者目睛凝流神氣不動四證不
入沉默昏憒似死似生其聲遲啞 身重背強有聲者為癇身癱

[illegible]與聲者為[illegible]不啼叫[illegible]行小便
剛癇亦多種錢氏有牛羊雞犬豬之說大抵以風驚食三證別
而治之○中風者五臟各有脈證隨五臟俞以施灸法與大科
則同特小小分劑耳○天釣者身體壯熱翻眼掉精手足搐掣
其狀如魚之上釣又內釣腹痛多啼唇黑囊腫伛僂反張眼有
紅絲[illegible]急攣搦之○撮口者一臘內之驚疾膈
風胎風鎖肚臍腸伸瘡俱至撮口蓋風入心脾故令小兒氣促
口撮如囊而不乳也○其有初生百日頻頻吐涎呵來啼去睡
與多驚眼翻肚脹手足緩弱煩燥多啼者當作胎驚風理之○
又有變蒸亦發微驚不治自愈○又癮疹欲發亦或搐掣如風
右[illegible]腳冷或冷耳後有紅脈赤縷者必是癮疹[illegible]證慎不可
以[illegible]開勝及[illegible]等轉下而水痘之是辨析之不可不審
也至若眼陷無光白睛淡人爪甲青黑四體垂[illegible]
可[illegible]而亦如斜面青背冷頭目仰後足冷目青腹脹胸
高手足[illegible]口氣冷[illegible]頭坑啼哭無淚冷汗不
止汗出如珠如油眼青[illegible]黑血閉凝入心肺嗌舌出口咬人五
硬五軟五冷五乾皆惡證也○[illegible]眼[illegible]轉口中出血兩足
擺跳腹肚搐動或神緩而摸體尋衣或證[illegible]而神昏氣促噴藥
不下通關不嚏心中痛絕忽大叫者難愈○[illegible]四肢厥冷叫
瀉加嗽面黯唇慘胃痛[illegible]兩脇動氣口生白瘡[illegible]
直搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎口眼手足一邊牽引者難痊○[illegible]
[illegible]身冷粘汗直臥如尸喘嗽頭軟大小便不禁行毋口噤頭搖
者皆難為力○或者慢[illegible]之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸
麁大脈來浮數涎[illegible]陽氣已復[illegible]與峻藥
下痰痰[illegible]下氣[illegible]人以[illegible]此則不[illegible]
之證雖不下痰亦無生意矣○又有喉中痰涎聲如扯鋸一兩
日間但閉目不開者此為虛極○極虛痰飽[illegible]
下痰亦未可深如以[illegible]合[illegible]

子1.57 3.1

之後兩日再發面色變易又三四日定而復發其後遂延必至
沉重若急救治猶候彼知定搐不去驚熱纏延搐究速初為安未
發復搐是為過街候○若慢驚之候乃脾胃已虛而虛之數日未
甚者或妄攻之則前功俱廢是難治之不可不精也 日或病且
[illegible]
之而發風須當[illegible]自去矣 按錢
氏方小兒發搐身熱喘急目斜露睛四肢逆冷李醫某以定驚
搐一劑與之殊無主對錢遂別之曰發搐為肝實身熱喘為肺
肺虛目斜露睛為肝肺相勝四肢冷為脾虛治法先用益脾補
肺胃氣稍復然後瀉肝涼驚而安○一證直視而不能食或渴
神祟便然錢知其為肝旺勝脾與之瀉脾而愈○一證吐瀉或
利小便過多以致脾虛不食錢用[illegible]作效已經數日忽附
不語發驚錢以[illegible]劑主之錢無寸效錢氏用[illegible]數劑
補腎於是能言所以然者前手清利小便太過瀉便脾腎俱虛
[illegible]
錯已補脾而腎尚虛故爾○至論肺虛痰實治去當下故下之
必先益脾然後瀉肺 [illegible]
[illegible]
[illegible]
不退則與之助胃胃不虛則熱不生或胃虛不食又且大小便
難則不為之疏利蓋利之則胃氣虛而身必冷○其有傷風寒
而吐瀉者欲止吐瀉不特溫脾須以發散之劑先之風寒散而
吐瀉自止矣不特此爾小兒平常服藥過多而玩臟腑調和之
劑不愈則易之以攻擊峻厲之劑太過則時乎而疏利主治在
我不可不問源流不可偏徇病家所欲關鍵之變消息輕重而
應之是通變之不可無法也大抵小兒臟腑柔嫩易實易虛易
冷易熱兒有大小壯弱病有輕重淺深所貴乎臨視指切意度
心臨權變斟酌對治用之得中為上矣

虎口三關紋訣

虎口若又手底是也三關者第二指之三節是也 [illegible]
近虎口第一節為初關亦名風關第二節為中關亦名氣
關近指端第三節為末關亦名命關男以左手女以右手側看
之發風初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色赤而
紫看病又傳過其色紫青病勢深重其色青黑 [illegible]
若見純黑者危不治大抵紅者風熱輕赤者風熱盛紫者
驚熱青者驚積青赤相半驚積風熱俱有主急驚風青而淡紫
伸縮來去主慢驚風紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出不出主
慢脾風凡手紋在初關者易治過中關者難治透末關者不治
三關直透大抵不治然紋勢彎曲入裏者病雖重而證順猶可
用力若紋勢弓反出外曲覆於指甲者斷不可回其有三關
外如流珠流米三五點相連或形於面或形於身危惡尤甚○
陽為男陰為女三關虎口紋男以左手女以右手驗之蓋取左
手屬陽男以陽為主右手屬陰女以陰為主耳然男女一身均
具此陰陽左右兩手亦當參驗左手之紋病應心肝右手之紋
病應肺脾於此消息又得變而通之之意

驚風方論

驚者虛惕怔忪氣怯神散痰涎來去其瀉必青漸生風而未至
風也驚邪入心則面紅臉赤惕惕夜啼驚邪入肝則面目俱青
眼睛竄視驚邪入腎則面黑惡叫嚙齘咬牙驚邪入肺則面色
淡白喘息氣乏驚邪入脾則嘔吐不食虛汗多睡面色淡黃
脈觀之虛則散而濡實則數而緊治法鎮驚化痰安神定志亦
須究竟其臟受病之處而調理之然有所謂溫驚有所謂利驚
有所謂涼驚虛者溫之實者利之熱者涼之是為治法 [illegible]
[illegible]者易治[illegible]者難痊

驚風證治

全蝎散 治小兒驚風不語通[illegible]諸疾大人通用
全蝎去毒各用紫蘇葉[illegible] 塗蜜炙重包又塗蜜炙

右細末每服壹字薄荷汁入蜜授和含化
[illegible]治小兒驚風痰涎
天麻　赤伏苓各半兩　羌活　防風各二分半
人參　全蝎　朱砂研　明硫黃
水銀各一分
右[illegible]同研如泥次以余味末夾和煉蜜圓皂子大研
碎薄荷湯調下
[illegible]方見暑門治小兒[illegible]風昏塞以貳參圓薄荷泡湯研灌
下得泄即愈若驚風對證用藥已效若覺未甚蘇省可與[illegible]
[illegible]圓數酌量用
[illegible]治小兒急慢風搐搦竄視涎潮
南星一兩泡　白僵蠶半兩　木香　橘紅各半分　全蝎一枚
右剉細入薑錢肆片煎熟灌下大便出涎即愈
[illegible]治慢脾風神昏痰盛
人參半兩　圓白大南星一兩[illegible]
右末每壹錢水壹盞薑叁片[illegible]擂細少許同煎取半盞
作兩叁次灌下
[illegible]圓治小兒驚風痰熱
螺青半兩　京墨四分　巴豆去油一分　北五靈脂二分半
輕粉　腦各半分　史君子十四箇連殼煨取肉
麝字　飛白麵二分
右末井水搜圓桐子大每壹圓水研下
[illegible]治諸癎口眼相引上視涎流手足抽掣頭項反張腰背
強直
朱砂研　雄黃研　蛇皮炙黃　石膏煅通紅出火毒各一分
蜂房炒　遠志[illegible]　細辛[illegible]　麻黃去節
直僵蠶炒　川大黃生　川芎　獨活各一分半
右末每壹錢[illegible]入少[illegible]煎湯溫[illegible]調灌大兒增用

[又方]
雄黃　朱砂各分
右末每壹錢猪心血夾[illegible]水調下
[illegible]治顛癎乃發痰涎嚼舌眼瞪[illegible]
雌黃　黃丹各一兩　麝另研
右細末用[牛乳汁]半升投藥成膏即入上項藥和杵叁伍
伯下圓如麻子大每叁肆圓溫熟水下日三服
[illegible]治諸癎
人參　天麻　伏苓　朱砂
全蝎焙　直僵蠶炒　羚羊角　犀角各一分
牛膽南星四分　麝少許
[illegible]圓治諸熱癎[illegible]定心鎮痰所謂重可去怯之劑
右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓菖蒲煎湯調下
紫石英　代赭石　蛇黃[illegible]　鐵粉各一分
朱砂　龍齒　白附子焙　遠志肉各一分
右為末研極細稀麵糊圓桐子大每服壹圓金銀煎湯調下
[illegible]
[illegible]圓治諸驚風癎或大驚畏物驚怖打墜不省人事並主之
遠志肉[illegible]　淨鐵粉　朱砂　人參
伏神各半兩　全蝎二十一箇焙　南星[illegible]
白附子[illegible]　[illegible]蛇頭[illegible]
右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓菖蒲燈心煎湯調下[illegible]
劑紫菀散
[illegible]通心氣除膈熱去痰涎
朱砂　人參　南星炮　伏神
遠志肉[illegible]　天麻　白附子　僵蠶[illegible]
鵬砂　麝少許
右為末煉蜜為膏圓桐子大金箔為衣每壹圓麥門冬湯調下

[illegible]心圓治驚熱用此

伏神　白附子炮　南星炮各三分　人參

遠志肉薑製　蝎梢各一分半　白僵蚕十四个炒　乳香二字

右爲末牛膽汁圓桐子大每服壹圓金銀煎湯調下

## 驚熱

### 驚熱方論

驚熱者內蘊實熱積勃發驚則搐掣變而癇耳治法疏導積熱利驚定心亦有變蒸微驚以其熱盛得之但與輕藥或不治亦自愈

### 驚熱證治

犀角湯治心驚熱盛

犀角　防風　木通　赤伏苓

桑白皮炒　甘草炙各等分

右剉細每參字水煎服

[illegible]治驚熱潮熱

麥門冬　地骨皮　遠志肉薑製　人參

伏苓　防風　甘草各二分　大黃一分濕紙煨

右爲末每半錢煎服

清心圓治驚熱煩燥

人參　伏神　防風　朱砂

柴胡各二分　金箔三十片

右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓竹瀝調下

伏神圓治壯熱發驚發搐直視

南星　胡黃連　天麻　伏神各二分

青黛　牙硝　朱砂各二分　麝一字

右爲末粟米糊圓桐子大每服壹圓石菖蒲荊芥煎湯調下

[illegible]圓鎮心壓驚利痰解熱



牛膽南星製　朱砂　防風各二分　麝一字

右用臘月黃牛膽汁和南星末竹筒盛掛當風處四十九日和下項藥末研細浸牛膽皮湯爲圓如桐子大每服壹圓井花水調下

羚羊角湯治諸驚壯熱

羚羊角　蟬殼半分　伏神去心　麥門冬

柴胡　地骨皮各一分　黃芩　甘草炒半分

右剉散每壹錢水壹盞煎服

## 胎驚

### 胎驚方論

胎驚風以胎婦調適乖常飲酒嗜欲忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故子稟母氣生下即病也其候月內温壯擲眼搖拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐掣驚啼腮縮顖開或頰赤或面青眼合（胎風眼合不可誤作慢脾妄用温藥）其有著噤撮口之類亦此一種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若黯黑青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治紋反出外者不治治法解散風邪利驚化涎調氣貼顖甚則以[illegible]圓利之

### 胎驚證治

太一散治胎驚

天漿子去殼微炒　南星　白附子各炮　天麻

防風　伏苓各二分　全蝎　朱砂各一分

麝少許

右爲末每服半錢乳汁化下

[illegible]散治胎驚定心神

天漿子　天竺黃　人參　朱砂

全蝎　天麻　蟬殼等分　麝一字

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓金銀湯下

猪乳膏 治胎驚最妙

琥珀　防風一分　朱砂半分

右為末猪乳調壹字抹入口中

全蝎散 治諸驚胎癇

全蝎[illegible]　琥珀　朱砂各少許

右為末每服壹字麥門冬煎湯調下

[illegible] 治胎風心熱痰壅

人參　朱砂各一分　牛膽南星　天竺黃

牙硝　鐵粉各半分　麝香少許

右為末每服壹字生薑薄荷湯調下

[illegible] 治胎驚發散風邪

羌活　獨活各一分　檳榔　天麻

麻黃去節　甘草炙半分

右㕮咀散每服半錢水煎服於內加[illegible]調可貼顖用

[illegible] 治胎風壯熱痰壅翻眼口噤取下胎中蘊受之毒亦治驚積但量用之

水銀一錢[illegible]棗肉研如泥　白附子半一分　蝎一分

南星　朱砂一分　天漿子　牛黃

蘆薈各半分　鉛霜半分[illegible]水銀研　腦一字　麝香半分

白殭蠶炒七箇

右為末粟米糊圓芥子大每壹圓薄荷湯下如未通利加至貳圓

[illegible] 治胎驚月內壯熱發熱兄驚風撮口比熱皆可用

龍膽草　釣藤　柴胡　黃芩

桔梗　赤芍藥　茯苓　甘草炙半兩

蜣螂二枚去足炙　大黃[illegible]

右為末每服壹錢[illegible]煎服或加[illegible]以導心熱



[illegible]半用

# 定驚

## 通關定驚方論

諸風搐搦關竅不通皆由痰塞中脘留滯百節即所致痰之所為潮塞者氣實使之治風痰絕不出[illegible]以[illegible]服[illegible]亦須先用[illegible]入[illegible]少許以薑汁侵薄荷湯調和與之善使氣下則痰下痰下則關竅自通

## 通關定驚諸治

[illegible]

赤蜈蚣一條炙　直殭蠶　南星各一分

麝香一字　猪牙皂角一錠略燒存性

右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥兩三點涎出自開

[illegible]

華陰細辛　南星　朴消各一分

麝香半分　蝎梢伍條

右為末以少許用烏梅肉揉和擦牙兼用[illegible]吹入鼻中

[illegible]

半夏生一分　皂角半分

右為末用壹豆許用管子吹入鼻立醒

[illegible]

赤蜈蚣一條[illegible]　全蝎一箇[illegible]

右各為末左眼翻左手搐以左藥末搐入左鼻孔右眼翻右手搐以右藥末搐入右鼻孔雙眼翻雙手搐兼用之

散風定搐治法

[illegible] 散風邪除風熱初作急風每服一二字

卽者紫蘇薄荷湯調下搐掣緊急者[illegible]煎湯調下亦良
[illegible]加減[illegible]亦可常用兒得速捷[illegible]
[illegible]圓治驚風痰搐
天麻　直僵蚕炒　南星各二錢　麝少許
赤蜈蚣大者一條酒浸炙　白附子炮　防風
朱砂　全蝎炒各一分
右爲末煉蜜圓荊子大每服壹圓薄荷湯下
[illegible]截風定搐
全蝎眉色者足一个　赤蜈蚣一條炙焦黃去足
朱砂半分　腦　麝少許
右爲末每服壹字薄荷湯調下先以些少用管子吹入鼻中
自然噴嚏
[illegible]治驚風搐痰熱
朱砂　蘆薈　白附子生各一分　麝少許
輕粉一字　胡黃連一分　蝎尾十四个　直僵蚕若个
赤蜈蚣一條炙　金箔十片
右爲末每服壹字薄荷荊芥泡湯調下如口不開先吹入鼻中
[illegible]治急風定搐
白附　僵蚕　全蝎各炒一分　川薑黃
赤蜈蚣一个去足頭酒浸炙　南星炮
麻黃去節　羌活各一分　牙消半分
右爲末每服壹字薄荷湯調下
[illegible]治急風定搐
赤蜈蚣大者一條酒浸炙　麻黃去節　南星炮
白附子　直僵蚕炒　羌活　代赭石火煅醋淬七次
蝎梢　川薑黃各一分　麝半分　朱砂一分
右爲末每服壹字荊芥紫蘇煎湯調下如搐不止加[illegible]
[illegible]圓治驚積發搐痰熱

龍膽草　梔子仁　大黃濕紙煨　羌活
防風各一分　川芎一分半
右爲末煉蜜圓桐子大每服壹圓煎竹葉泡薄荷湯調下
[illegible]瀉肝風降心火最利驚熱
山梔二分　大黃濕紙煨　羌活
木通　赤茯苓　甘草各一分
右爲末每服壹字紫蘇煎湯調下
[illegible]治驚熱出於心肺積從小便利之
桑白皮炒　葶藶炒　赤茯苓　車前子
梔子仁一分　甘草炙各半
右爲末每服半錢蜜蔥煎服
[illegible]治風熱涎潮喘促搐掣竄視
透明阿膠炒二分半　紫蘇一分
右爲末每服壹錢入[illegible]少許同煎灌下神效熱出於肺
熱則生風[illegible]消肺行小便故也肺風用之尤妙
治驚輕下法
[illegible]治急驚天吊撮口通利痰熱
全蝎炒　天麻　南星炮　白附各一分半
朱砂　青黛各一分　輕粉　麝各半分
腦一字
右爲末粟米糊圓菉豆大每服壹圓荊芥薄荷湯調下先研
半圓吹入鼻中
[illegible]圓利驚下痰消熱
龍膽草　防風　青黛　蘆薈
南星炮　釣藤各一分　牙硝　鐵粉各一分
腦　麝少許
右爲末麪糊圓麻子大每服貳圓煎金銀湯下
[illegible]治風熱痰壅大便不通

羌活　防風　枳實各半兩　川芎
甘草炙　大黃濕紙裹煨各一分半
右剉末每服一字薑棗煎服
□風散疎導風熱
雞心檳榔一個　甘草　橘紅各半兩　牽牛二兩半生用半炒熟
右為末每服半錢蜜湯調下
枳殼散小兒痘中痰實以此導之
小柴胡湯加枳殼大黃最能利風熱解血熱兒得用銀粉研細
治驚搐重下法
□風湯利下痰熱
青黛　蘆薈　全蝎各一分　南星
全蝎焙各三色　朱砂一分半　牙硝　輕粉各一字
右為末每服一字煎金銀薄荷湯調下
朱砂膏治驚風痰盛
朱砂　馬牙硝一分　川鬱脂　蘆薈各一分半
麝半分　腦一字
右研細□□為圓菉豆大金箔為衣每服一圓薄荷湯調下
□風散治痰風痰熱俱盛
檳榔　陳皮各二分　牽牛　大黃各一分
右為末每服半錢生蜜調下
小柴胡湯最利熱實方見疹痘門加大黃少許
治驚重下法
青金圓治風痰壅盛
巴霜一字　青黛　南星炮各一分
輕粉半分　滑石一分　全蝎一分
右為末稀糊圓麻子大每服一圓薄荷湯熟水送下
天麻圓利驚下痰凡動腸鎖肚撮口可通用
南星炮一分　白附子炮　牙硝　天麻

川鬱脂　全蝎焙各一分　輕粉一錢　巴霜一字
右為末稀糊圓麻子大每服一圓薄荷葱錢湯送下
□□□治驚風痰盛發搐
全蝎五個　巴霜一字　輕粉　蘆薈
南星炮　朱砂各一分　川鬱脂
腦　麝各一字
右為末每服一字煎金銀薄荷湯調下
牛黃涼心圓治熱盛涎潮
馬牙硝　寒水石煅　硬石膏　甘草各半兩
牛膽南星二錢半　紫石英一分　牛黃
腦　麝各半分
右為末甘草膏為圓雞頭大每服一圓橘皮湯調下
青金丹疎風利痰
蘆薈　牙硝　青黛各一分　史君子二個
南鵬砂　輕粉半分　蝎梢二七個
右為末用蟾酥水浸圓麻子大每服一圓薄荷湯吞下
王氏□□圓治痰熱驚積
青黛　史君子　蘆薈　牛膽南星
川墨各二分　膩粉　麝半分　腦一字
右為末飛白麪糊圓豌子大每服一圓薄荷湯調下婺州王
監貴此疾名大利痰熱驚積有積
和胃助氣治法
宜氣散調風疏利後以此調氣
丁香三字　白朮　青皮各一分
甘草炙　木香　人參一分
右為末每服半錢沸湯點服或用□□方□□散亦得
銀白散助胃祛風嘔吐作□者通用
石蓮肉　白扁豆炒　茯苓各一分　人參

定驚

天麻　白附 炮　全蝎 炒　丁香
甘草 炒　藿香 半分　陳皮 一分
右為末每服壹錢薑棗壹片入[illegible]煎或用陳
米飲調下
[illegible]和胃助氣加[illegible]用薑棗煎
[illegible]溫中正氣吐瀉不食用此
人參　伏苓　白术
甘草 炒　橘紅　木香 各半分
右為末每服壹字薑棗煎服
[illegible]煎湯調下
[illegible]用[illegible]煎湯調下
[illegible]和胃氣止吐瀉
伏苓　石蓮肉 各一　藿香　人參
天麻　白扁豆 製　木香　白术
甘草 炒各半分
右剉散每服參字煎服
[illegible]二方并[illegible]見初傳慢驚門皆和胃助氣
定志寧神治法
[illegible]驚風已退神志未定以此調之
琥珀　伏神　遠志 薑製焙　人參
白附子 炮　天麻　天門冬　酸棗仁
甘草 炙等分
右為末煉蜜圓皂子大[illegible]為衣每服壹圓燈心薄荷煎湯調下
[illegible]治驚悸煩燥
半夏 製　枳實 各二[illegible]　伏苓 半兩　橘紅
甘草 各一分半　酸棗仁 [illegible]
右剉散每服壹錢入[illegible]少許用薑棗煎服
[illegible]治驚悸煩燥

定驚

北參　遠志 去骨薑製炒　伏神　天麻
犀角 各一分　防風　朱砂 一分　麝 一字
右為末煉蜜圓皂子大金箔衣每服壹圓燈心薄荷湯調下
[illegible]安心寧神
人參　防風　天麻　伏神 各半分
白附子　酸棗仁　琥珀　石菖蒲 各一
辰砂 一
右為末煉蜜圓七子大入麥門冬湯調下壹圓

新刊仁齋小兒直指方論卷之一

# 慢驚

方傳慢驚證治

[illegible]治慢驚尚有陽證
全蝎 去毒各拾 白附子 生 直僵蚕 牛膽南星
蟬殼 琥珀 各貳錢 麝 半錢 防風 朱砂 各一錢
右為末粟米糊圓如桐子大金箔為衣每服一圓薄荷湯調下

[illegible]傳慢驚可用
人參 伏神 琥珀 天麻
直僵蚕 炒 防風 南星 炮 白附 生
蝎 炙 烏蛇肉 酒浸焙 朱砂 半錢 麝 少許
右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓菖蒲湯調下

[illegible]治方傳慢驚
全蝎 [illegible] 蟬殼 [illegible] 甘草 [illegible] 大天南星 [illegible]
右為末每服半錢[illegible]煎服

[illegible]分陰陽平冷熱定吐瀉斂痰涎
硫黃 鉛硝 五靈脂 青皮
陳皮 半夏 [illegible] 各等分
右硫硝夾研用磁器銚汁傾出候冷再研細旋入諸藥末拌
和粟米糊圓麻子大每服[illegible]圓[illegible]米飲下

[illegible]升降陰陽鎮風利痰[illegible]
[illegible]治吐瀉脾困內虛
人參 伏苓 木香 天麻
白扁豆 陳米 炒 全蝎 炒
右等分為末每服半錢[illegible]棗煎服

[illegible]治吐瀉脾困不食
全蝎 [illegible] 白附子 炮 天麻 [illegible] 甘草 [illegible]



人參 白伏苓 石菖蒲 [illegible] 木香
石蓮肉 白木 各壹錢
右為末每服半字[illegible]煎服有熱者去木香

[illegible]
南星 白伏苓 橘紅 各一分 全蝎 [illegible]
甘草 炒 白附子 炮 石蓮子 人參
木香 各半分 陳倉米 [illegible]
右為末每服半字[illegible]煎服驅風醒脾兩方[illegible]用亦可[illegible]
小兒胃虛不消乳食尤須節約

[illegible]驅風豁痰
人參 防風 白附子 生 直僵蚕
全蝎 [illegible] 南星 [illegible] 天麻 各[illegible]
右為末飛白麪糊圓桐子大每服壹圓[illegible]薑湯調下

已傳慢驚證治

[illegible]治慢驚風昏迷痰搐
南星 [illegible] 木香 人參 橘紅 [illegible]
全蝎 [illegible] 甘草 [illegible]
右剉細每服[illegible]錢入紫蘇[illegible]煎[illegible]以匙送下有熱加[illegible]

[illegible]治慢驚吐瀉困重欲傳慢脾通用
圓白半夏 伏苓 木香 老生薑 [illegible]
白木 甘草 [illegible]
右為末每服半錢[illegible]調下

[illegible]治慢驚痰涕塞閉[illegible]搐搦[illegible]以少許用管吹入鼻中
全蝎 [illegible] 直僵蚕 [illegible] 大南星 [illegible] 川烏 [illegible]
右將[illegible]為末水調作餅[illegible]外用濕紙重包慢火
灰中煨令赤色[illegible]每服[illegible]前金銀湯[illegible]
好茶清少許調下

[illegible]加川烏生全蝎各為末各少許每服
也一錢薑棗煎服如再服即去川烏

八仙散驅風豁痰

南星[illegible]

右為末不入麝香牛黃全蝎末各壹錢每服半錢煎生薑防風湯調下

烏沉湯治慢驚驅風助胃

天麻壹錢　人參　真川烏生　全蝎焙
南星炮　木香　沉香各壹錢　甘草炒半錢

右剉散每服叁字薑叁片慢火煎取其半與之

沉香散生胃氣止吐瀉

伏苓壹錢　沉香　丁香　木香
藿香　川厚朴製　甘草炙壹錢

右為末每服壹字米飲調下

慢驚下痰[illegible]治

天南星圓治慢驚痰壅惟身熱者可服

南星壹兩[illegible]
麝香研　丁香各壹兩　龍腦研　辰砂別研[illegible]

右為細末入研藥勻煉蜜丸[illegible]酒同朱砂為衣每服壹丸許生
薑煎湯調下

蘇合香圓一倍方見血氣類白圓子二倍方見痰飲類丸和每
服半錢薑湯調下

大醒脾散治慢驚眠盛見方脾胃門

奪命散最能利痰無慢脾風通用

青礞石[illegible]

右為末雪糕糊圓如綠豆大每服貳圓[illegible]泡湯



調下慢風慢脾風用[illegible]前湯調下[illegible]
雖能利痰然其性非胃家所好須以[illegible]佐之

定命圓治慢驚痰盛搐搦

五靈脂　白附子　木香　直僵蠶
全蝎　朱砂壹錢　大南星

右為末米醋煮生半夏糊為圓麻子大每服[illegible]圓薑湯送下

大效圓治諸風頑痰癱瘓大小通用

細辛　川靈脂　直僵蠶
白附子　朱砂　全蝎

右為末用大南星注為末煮糊圓麻子大每服伍圓薑湯送下

慢脾風生胃回陽治法

黑附湯治慢脾風盛四肢厥冷

附子　木香　白附子壹錢　甘草

右剉散每服叁字薑伍片煎取其半以匙送下若手足煖而
藥省即止後劑

川烏散驅風回陽

真川烏生　全蝎　木香各半分

右為末每服叁字薑肆片煎取其半旋滴入口中嘔吐者加
丁香

金液丹見血氣類白圓子等分祛風回陽二藥為末每服半
錢陳米飲調下

生附四君子湯助胃回陽四君子湯加生附子末四分之一每
服若對加每服半錢薑五片慢火熟煎以匙送下

蝎附散回陽豁風痰

全蝎　附子　南星
白附子　木香

右為末每服半錢薑肆片慢火熟煎旋服

陰癇湯祛風豁痰回陽正胃

白附子　黑附子　南星　半夏

右為末井水浸七日逐日換水浸乾控乾次入全蝎末貳錢

每服壹字生薑湯調下

[illegible]止胃回陽能止嘔吐溫利痰涎但瀉者勿用為細末以少許米飲調下或用粟糊圓如粟米大兒兩叁圓米飲送下

[illegible]方見血氣篇治慢脾風吐瀉不止每服壹圓研細入參

[illegible]前湯無熱調下。已上諸藥溫熱並乳食前服

# 。急慢脾風

慢脾風下痰涎治　見方論慢驚門

[illegible]方傳慢脾陽氣未甚虛者可用亦能截風

牛膽南星　全蝎　直僵蚕炒　錢子地龍乾

五靈脂

右為末水煮生半夏糊圓如麻子大每服五圓生薑湯下

[illegible]治慢脾冷痰壅滯手足冷而微搐

黑附子　南星　白附子炮　川五靈脂　蝎梢

右為末煉蜜圓桐子大每服五圓生薑汁泡湯下

[illegible]利痰奇效慢驚慢脾通用須以[illegible]

[illegible]牙後上下有兩月片者其色淡黑燒小諸錢以一兩及燒

題頭於炭火內燒少頃以盆上下各出黃汁烘乾研出候冷細

入瓷中只作壹服用米飲調下人參前湯亦得

急慢脾風諸治

[illegible]治急驚風口噤不語

天南星[illegible]散每服半字薑汁[illegible]

入[illegible]少許溫和服尤不語者大小便須要[illegible]

風不語只用南星[illegible]以人參[illegible]

[illegible]治諸風失音

木通　石菖蒲　防風　北梗

桑螵蛸　全蝎　直僵蚕　甘草

南星

右㕮咀散每服叁字紫蘇叁葉生薑壹片煎與之大便不通更

加[illegible]

[illegible]治驚風痰盛搐搦口眼牽引

烏蛇肉　直僵蚕炒　防風　天麻

南星　五靈脂　代赭石

全蝎　朱砂

右為末粟米糊圓如桐子大每服壹圓煎薄荷湯調下慢驚

用生薑湯

[illegible]治驚搐上視搐搦治風涎潮

虎睛　全蝎　天麻　防風

南星　直僵蚕炒　乾蝎

右為末[illegible]圓如桐子大每服壹圓荷湯調下

[illegible]

一字南星　生薑

右[illegible]以南星[illegible]拌勻神定次用[illegible]

[illegible]開風乾為末每服壹字薄荷紫蘇泡湯調下大

人服半錢或吐或汗或下皆病氣出也

[illegible]化痰

朱砂　牛黃　蠍梢

琥珀　人參　茯神

全蝎　防風

右為末煉蜜圓桐子大每服壹圓薄荷湯調下如無牛黃以

[illegible]代之

[illegible]治急風慢脾皆效

南星（炮裂熾） 白附子（炮） 天麻 木香
橘皮 白伏苓 石蓮肉（各去心） 黄耆
白朮 石菖蒲 甘草（炙各半分）
右為細末每服半錢薄荷湯煎服
[illegible]圓 治驚風手足搐搦反折
赤蜈蚣（[illegible]） 花蛇肉（[illegible]） 直僵蠶（[illegible]）
南星（[illegible]） 朱砂 蝎梢（各壹錢） 乳香（半錢）
麝（壹字）
右為末飛白麪糊圓桐子大每壹圓金銀煎湯泡薄荷調下
。蒲陽趙公施此多所全活
[illegible] 治驚風痰熱
代赭石（[illegible]） 全蝎（焙） 朱砂 琥珀（各壹錢）
南星（[illegible]） 白附子（生） 防風 烏蛇肉（[illegible]）
天麻（各壹錢） 麝（壹字）

右為末粟米糊圓桐子大每服壹圓[illegible]薄荷湯調下初[illegible]
慢驚尚有陽證用[illegible]湯
[illegible] 治慢驚初傳涎潮昏搐
全蝎（[illegible]） 麻黄（[illegible]） 花蛇肉
烏蛇肉（[illegible]） 直僵蠶（[illegible]） 白附子（[illegible]） 人參
天麻 防風（各壹錢） 乳香（半錢） 麝（壹字）
右為末用[illegible]煮糊圓桐子大捏作餅日乾每服[illegible]
薄荷湯調下
[illegible]散 治驚風搐掣胎驚夜啼
青色全蝎（[illegible]） 防風 天麻
白附子 蟬殼 直僵蠶（[illegible]）
南星（炮[illegible]） 麝（半錢）
右為末粳米飯圓桐子大朱砂衣每壹圓薄荷湯調下
[illegible] 治急驚身熱痰滯

大乾蠍（[illegible]） 直僵蠶 蟬殼
蝎尾（各[illegible]） 白附子（[illegible]） 五靈脂 蘆薈
琥珀（各壹分） 朱砂（[illegible]） 麝（半錢）
右為末每服半錢荊芥煎湯調下
[illegible]湯 治慢驚脾困不食和胃祛風
大南星（[illegible]）
白伏苓（半兩） 木香 人參 天麻（各[illegible]半）
全蝎（[illegible]）
右為末每服半錢甘草生薑煎湯調下
[illegible]散 治慢風吐瀉不進乳食
人參 白朮 石蓮肉（[illegible]） 丁香
檀香 舶上茴香（炒） 白豆蔻 木香
甘草（炙各壹錢）
右為末粟米糊圓桐子大每[illegible]圓紫米飲調下脾困不醒[illegible]

[illegible]湯 治慢脾泄瀉[illegible]吐瀉
沉香 丁香 木香 黑附子（炮）
白附子（炮） 全蝎（焙） 藿香 天麻（各[illegible]分）
右為末每半錢炙甘草生薑煎湯調下身温則去附子
[illegible]圓 治諸風頑痰喉風纏痺
北礬（[illegible]） 直僵蠶（各壹分） 大南星（[illegible]）
右為末稀糊圓麻子大每服伍圓姜湯送下喉風用[illegible]
水研灌下
[illegible]圓 治諸風諸癇痰熱
圓白半夏（[illegible]）
右為末放入臘月猪膽汁[illegible]以香潤[illegible]研細[illegible]焙為
末各壹錢[illegible]貳錢[illegible]和研[illegible]所圓如麻子大每
服肆伍圓薄荷生薑泡湯送下隨大小加減用

慢驚慢脾危惡證候，藥力不到者，但看兩脚面中間陷處有太衝脉，即灸【百會】穴。其穴直取前後髮際，折中橫取兩耳尖，折中在頭之中心，端正旋毛處是也。如有雙旋，另旋毛不正者非所。捏艾炷約如小麥許，但三五壯而止。灸後仍與醒脾之劑。

# 客忤

客忤方論

客忤者，小兒神氣嫩弱，外邪客氣，獸畜異物，暴觸而忤之。其候口吐青黃白沫，水穀鮮雜，面色變易，喘息腹痛，反側瘛瘲，狀似驚癇，但眼不上竄耳。脉來弦急而數，視其口中懸癰左右，若有小小腫核，即以竹針刺潰之，或以爪摘之。治法辟邪正氣，散驚定心。延久則難為力也。大抵客忤中惡，急作醋炭，以[illegible]處之。

客忤證治

【雄黃散】治客忤腹痛危急

雄黃壹錢　乳香半錢　麝香[illegible]

右為細末，每壹字，刺雞冠血調灌之。

【[illegible]】方見咳嗽門。用薑湯調灌，次用【[illegible]】合水煎擣為圓，如雞子大，以摩兒顖上及足心各五六遍，次摩臍心及上下，良久擘開，有白有毛即擲之。

【麝香散】麝香少許，研細，乳汁調塗口中，仍以母衣覆其身即愈。

【犀角散】治客忤驚啼壯熱

天麻　犀角　麥門冬　鈎藤

朱砂各壹錢　鐵粉　雄黃半錢　麝少許

右為末，每服半錢，以金銀煎湯調下。

【安神圓】

生犀末　人參　茯苓　菖蒲

朱砂　雄黃等分

右為末，研桃仁膏為圓，如麻子大，每服壹圓，紫蘇湯下。

【伏龍肝方】

竈中黃土和醋擣圓，栗子大，摩兒頭及五心。

【[illegible]】方見胎驚風門

【[illegible]】治中馬汗氣，及馬氣或馬鳴驚忤

馬尾燒烟，熏兒面，頻熏以瘥為度。

# 驚風雜治

驚積方論

驚積者，受驚日久，而積成之。其狀額上有汗，喘息煩渴，潮熱往來，肚皮有熱，睡中覺腹內有物跳動，瀉下如白脂豆沙是也。治法量輕重而疏導之，仍與調氣和胃，取愈。大凡小兒腹肚或熱或脹或硬，皆為內實，法當疏利。

驚積證治

【[illegible]】疏利驚積 方見[illegible]門

【[illegible]】治驚積有熱

青黛　伏神　蘆薈　南星[illegible]

麝少許　輕粉　巴霜壹字　全蝎[illegible]

右先將巴豆研如泥，次入諸藥研令極細，圓如粟米大，【朱砂】衣，每服壹圓，薄荷湯送下。

【朱砂圓】治驚積 方見胎驚風門

天瘹方論

天瘹壯熱，驚悸，眼目翻騰，手足抽掣，或啼或笑，喜怒不常，甚者爪甲皆青，如祟之狀。蓋由乳母酒肉過度，煩毒之氣入乳，遂使乳兒心肺生熱，痰鬱氣滯，加之外挾風邪，致有此耳。治法解利風熱則愈。

天麻散治

[illegible]
釣藤　白茯苓　各半　大黄　[illegible]
防風　朱砂　蟬殼　羌活
獨活　青皮　甘草　炙各二錢半
右為細末每服壹錢[illegible]煎服

[全蝎散]
全蝎　炒　蟬殼　直僵蠶　炒　天麻
犀角　天竺黄　蝎子　白附子　南星　炮
青黛　朱砂　川鬱金　各等分　麝香少許
右為末雄猪膽汁為圓菉豆大先將井水調開一圓入鼻令
嚔次以[薄荷]煎湯調服

驚風內釣方論　附盤腸氣吊啼

驚風內釣腹痛多啼唇黑囊腫伛僂反張眼內有紅筋斑血者
[illegible]寒氣壅結兼驚風而得之又盤腸氣與虫證亦令腹痛多
啼但伛僂若但盤腸氣痛則腰曲乾啼額上有汗是小腸為冷
氣所搏然虫痛則啼吐清沫痛有去來是蛔化為虫[illegible]
滯然痛內[illegible]用調氣[illegible]之劑盤腸宜用温和調氣之劑
虫證宜用殺虫之劑條列于後請詳酌之

驚風內釣證治

[乳香圓] 治驚風內釣腹痛驚啼
乳香　半錢　沒藥　沉香　各壹錢
蝎梢　拾肆個　雞心檳榔　壹錢半
右為末[illegible]為圓桐子大每服二圓[illegible]煎湯調下

[木香圓] 治[illegible]風內釣吐瀉驚啼
沒藥　木香　舶上茴香　炒　釣藤　等分
全蝎　乳香　各[illegible]
右先將[illegible]別研次入諸藥末和勻取[大蒜]少許研[illegible]
和圓桐子大日乾每服二圓[illegible]湯下

[白豆蔻散] 治盤腸氣痛
白豆蔻仁　縮砂仁　青皮　陳皮
甘草　炙　香附子　蓬莪朮　各壹錢
右為末每服壹錢紫蘇煎湯調下

[鉤藤膏] 治盤腸內釣啼
[illegible]不拘多少
右為末每服半錢[illegible]煎湯調下或只入[蘇合香圓]則用[illegible]
湯調下

[化虫圓] 治虫痛
蕪荑　川鶴虱　雞心檳榔
乾蝦蟆　炙焦　各壹分　蘆薈　半分
右為末[illegible]為圓麻子大每服伍圓陳米飲下或[使君]
子煎湯送下九虫月首日頭向上清晨可服藥

[安息香圓] 治內釣盤腸氣痛虫痛通用
安息香　桃仁　去皮尖　蓬莪朮　煨　史君子肉　各半兩
阿魏　壹錢　茴香　炒　全蝎　各壹分
右[illegible]并[安息香]以酒少許於湯瓶口上以蓋盛[illegible]去沙
旋入[阿魏]同研次入諸藥末煉蜜圓桐子大每服二圓生薑湯
調下

[三稜散] 治小兒腸下氣塊刺痛
京三稜　炒　蓬莪朮　茴香　炒　青皮
甘草　各壹分　辣桂　木香　各半分
右為末每服半錢紫蘇湯調下

[當歸散] 治內釣胎疾腹痛驚啼
官桂　當歸　川芎　香附　各壹分
川白芷　木香　甘草　炒各半分
右為末每半錢[illegible]煎[illegible]服

[illegible]右為末研服時挾冷作湯內服一名[illegible]

當歸　沉香　木香　桂

川芎各半兩　丁香一分

右為末每服二錢用薑煎食前服

# 中風

## 中風方論

小兒中風者以其血氣未定寒溫失調內則臟熱蘊積外則腠理虛開故風邪乘其外虛而搏中之其狀皆不知人壯熱狂燥搐掣顱顖口噤涎潮是也心中風則偃臥不能傾側發熱失音其舌焦赤若汗流唇赤者可治灸心俞或唇間白黑青黃乃心壞為水或面目亭亭時時悚動者並不治肝中風則踞坐不得低頭左脇疼痛諸筋攣急頭目瞤動上視多怒其目青若遶兩目連額微青唇青而黃者可治灸肝俞或大段青黑其目一黃一白者不治腎中風則踞坐而腰痛引小腹其耳黑若兩脇左右未有黃色起者可治灸腎俞或脇間如黃土其髮直而齒黃赤者不治肺中風則偃臥而胸滿短氣冒悶汗出其鼻白若目下至鼻四圍及口間白色者可治灸肺俞或色帶黃乃肺壞為血併手尋衣縫者不治脾中風則踞坐腹滿皮肉瞤動四肢不收其唇黃若一身通黃口吐鹹汁者可治灸脾俞或手足青而厥冷者不治凡人為風邪所中皆從背上五臟俞入之風入於頷頰之筋則口喎而牙噤風客於咽喉聲音之門則語不出而失音風與氣搏氣以痰隔則喉間如鋸聲是其風也始入於腠膚次達於經絡而搏於筋脈筋得寒則拘急得熱則緩弛不遂風挾寒邪即攣急也風挾熱氣即緩弛也挾寒而拘攣脈必浮緊挾熱而緩弛脈必浮洪其者與小續命湯熱者與[illegible]之類大抵脈浮者病在表脈實者病在裏脈促者病在上在表則發散之在裏則疏導之促於上而涌泄之湯吐之[illegible]則[illegible]又不可輕古人治法雖以為是大人方論實驗[illegible]亦須消息增損[illegible]此法自大人方論實驗而得之若過大人中風[illegible]以此推之[illegible]風寒暑濕皆能中人况又有因氣而中者人之臟腑[illegible]中風一時倉卒若未能精審且先與下氣[illegible]中皆因[illegible]氣滯而作[illegible]以蘇合香圓[illegible]煎湯和[illegible]灌以[illegible]下牙緊者[illegible]末之入[illegible]自開進藥之後痰消氣下病勢稍疏却子細體認五臟外證而調理之至若口開手散眼合遺尿聲如鼾睡頭面赤而目直視手足垂軟或面色黯慘或汗出如珠如油皆不治也又一證小兒多因傷風咳嗽不能發散遂成肺風痰涎喘促淚出面色青黃日能認人口不能言如此者當以[illegible]主之仍灸[illegible]取愈大人小兒凡病目陷而冷如按瓜或鼻冷不回或干其髮潤其身如洗皆不可救

### 五臟俞穴

[illegible]二穴在背上第五椎骨下兩傍各一寸半[illegible]二穴在背上第九椎骨下兩傍各一寸半[illegible]二穴在背上第十一椎骨下兩傍各一寸半[illegible]二穴在背上第十四椎骨下兩傍各一寸半[illegible]二穴在背上第三椎骨下兩傍各一寸半小兒艾炷如小麥大但三五壯而止取分寸法大人小兒男取左手女取右手比第中指第二節為一寸見千金翼方第二十六卷指根也

### 中風證治

[illegible]治中風昏冒或在語或失音

白鮮皮　白朮　芍藥　官桂去粗皮

川芎　當歸　杏仁去皮尖　防風

甘草炙各一兩　麻黃去節　川獨活　白茯苓各一兩去皮

右細剉每服壹錢水一小盞煎

[illegible]治中風不省人事涎潮反張失音厥冷
麻黃去節 人參 黃芩 川芎
芍藥 甘草炒 杏仁去皮尖炒 防己
官桂 防風 附子
右除[illegible]外並搗為麁末次入貳味夾和每服壹錢[illegible]
片煎食前服
[illegible]治中風肢體緩弱筋節疼痛[illegible]二藥夾和
入[illegible]用[illegible]煎服次以[illegible]加[illegible]送之
[illegible]治中風
南星 半夏 南木香
細辛 石菖蒲 蒼术 甘草
右㕮咀散每服壹錢重[illegible]片慢火煎取其半調[illegible]
灌下痰盛者又加[illegible]
[illegible]治中風
南星 木香 橘皮
全蝎 甘草
右㕮咀細每服壹錢重[illegible]片慢火煎熟與之痰盛者加[illegible]
[illegible]許添[illegible]
[illegible]治中風厥冷
生附子壹分 木香半分
右㕮咀細每服半錢薑肆片煎服
[illegible]專治小兒肺風喘促涎潮眼斜視
透明阿膠剉細炒如珠
右用紫蘇烏梅肉焙乾末之為末煎人參湯送下或以[illegible]
炒為末和人參[illegible]同煎亦得[illegible]育神丸驚風後服
中癱人不正可以[illegible]壹倍人參半倍煎與之
[illegible]治中風內外皆熱
大黃壹分 檳榔 桑白皮 羌活

防風 郁李仁
右[illegible]每服壹錢用[illegible]拾粒同煎乳食後服
[illegible]治風後瘖不能言
蘇[illegible] 神麯 麥蘗 黃連
右為末[illegible]丸麻子大每服伍圓用[illegible]
[illegible]湯送下兼[illegible]能去心竅惡血故爾
[illegible]治中風不語
[illegible]

## 痓痙

痓痙方論

[illegible]痓證候先傷於風又感寒濕致之此虛極生熱熱極生風之甚者也傷風發熱頭痛汗出又自嘔逆汗之必發痓濕家發汗亦多亦發痓婦人新產血虛汗出傷風發痓無疑矣項背強直[illegible]反張搖頭[illegible]噤口不語發熱腹痛鎮日不醒其狀可畏[illegible]在足太陽經剛痓無汗柔痓有汗其面紅眼赤牙緊手張[illegible]堅盛昏憒煩渴小便赤澁先譫語而發者此剛痓也其大便[illegible]泄不渴不語先手足冷而發者此柔痓也剛柔二痓亦如陰[illegible]陽陰陽之類剛痓為之發汗柔痓為之解肌並以[illegible]加減剛痓去[illegible]用[illegible]柔痓去[illegible]用[illegible]大便利而[illegible]逆者則以[illegible]佐之其間一證身體壯熱譫語口乾手足[illegible]微寒大便反滑泄此為剛柔不分之痓可用[illegible]要之得病以來無汗則[illegible]按方有汗[illegible]謹勿用也其若[illegible]塞氣盛則[illegible]以消其[illegible]以順其氣痰消則風止氣順則神醒治療之法先與消痰[illegible]為上[illegible]是病勢稍止然後審其熱之輕重而解利之熱輕者與[illegible]熱盛者與[illegible]壯熱胃滿口噤吸齒而大便秘結者是為內實[illegible]下之又法剛痓[illegible]柔痓[illegible]

凡痙最難痊十救其一過三日不治請早圖之餘見傷寒類書

活人總括

痙痓證治

小續命湯方見中風門

[illegible]治痰順氣踈風

半夏製 枳殼麩炒 伏苓各半兩

橘皮 防風各壹錢半 甘草炙壹錢半

右剉散每服壹錢入生薑三片煎服

敗毒散

人參 伏苓 甘草炒 芎藭

前胡 羌活 獨活 柴胡

北梗 枳殼

右加防風等分為麁末每服壹錢入薄荷少許煎服

小柴胡湯治剛痓有熱

柴胡壹兩 黃芩 人參 半夏製

生薑各叄錢半 甘草炒壹錢半

右剉散每服叄字入棗煎服

大承氣湯治剛痓胸滿內實口噤咬齒

大黃 芒硝各半兩 厚朴壹兩 枳殼貳枚

右剉散每服叄字薑叄片煎服

麻黃葛根湯治剛痓無汗

麻黃去節 赤芍藥各壹兩半 乾葛壹兩半

葱白叄莖 豉半合

右剉散每服叄字煎服

桂枝葛根湯治柔痓有汗

桂枝 芍藥 甘草炙各壹錢

葛根叄錢 生薑叄兩 大棗肆枚

右剉散每服叄字水煎服

附子散治柔痓厥冷自汗

人參 川白薑炮 甘草炒 白朮等分

右剉散每服叄字煎服

白朮湯治柔痓自汗肢體厥冷

天南星生壹兩 川烏半 附子各半兩 木香壹分

右剉散每服壹錢生薑伍片慢火煎取其半通口與之

## 發癎

### 發癎方論

癎者小兒之惡病也小兒血脉不斂氣骨不聚為風邪所傷驚怪所觸乳哺失節停滯結癖而得之其候神氣怫鬱瞪眼直視面目牽引口噤涎流腹肚膨緊手足搐掣似死似生或聲或啞或項背反張或腰脊強直但四體柔軟發而時醒者為癎若一身強硬終日不醒則為痓痙矣癎曰[illegible]五臟而系目瞪吐舌嚙齒心下煩燥氣短息數者曰心癎面青唇青眼上竄手足拳攣抽掣反折者曰肝癎面黑而晦振目視人口吐涎沫不動如尸者曰腎癎面如枯骨目白反視驚跳搖動亦吐涎沫者曰肺癎面色痿黃眼睛直視腹滿自利四肢不收者曰脾癎此五臟之證然也調理之法惟以陰陽二種陰陽二證別而治之陽癎者汗出解肌風邪乘虛其初屈指如計數有熱生痰是也陰癎者寒熱驚怖打墜積驚其初驚叫大啼恍惚神魂是也食癎者食時得驚停宿結滯其初吐乳不哺大便酸臭或結成乳癖先寒後熱是也別之以陰陽則始者身體有熱抽掣啼叫是為陽癎陽病脉浮面色光澤病在六腑肌膚此猶易愈始者身體無熱手足清冷不抽掣不啼叫是為陰癎陰病脉沉面色黯晦病在五臟骨髓此最難痊或以仰臥屬陽覆臥屬陰亦可參驗蓋陽證不可用溫陰證不可用寒陽癎則先為之截風[illegible]則先為之利驚[illegible]則先為之消積[illegible]

主之若臟者腑一陰一陽又固不可無別大抵血滯心竅邪氣
在心積熱○心經通行心氣調平心血順無驚癇又其要也夫今
小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆驚癇之漸
即以[illegible]圓導之時間量與[illegible]其[illegible]則無驚風癇
之患癇證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之急為[illegible]
破須令血出啼叫尤得氣通[illegible]兒長不可露天[illegible]
物所污染觸其間未有不為[illegible]
人著以[illegible]諸癇瘖不能言者蓋咽喉為氣之道[illegible]風傷其氣以致
聲音道路之門抑亦血滯於心心竅不通所致耳[illegible]
[illegible]調和少許啖之[illegible]若夫[illegible]
[illegible]湯調下[illegible]以和[illegible]治[illegible]要藥也
故表而出之

諸癇不治證候

目直無聲　目睛不轉　眼生白障　眼瞪瞳黑　[illegible]人睡[illegible]
眉間色青黑　面青指黑　口中涎沫如白膿　口禁肚脹不
乳　喉如鋸聲多睡不乳　身熱下血不食　身體痿軟不醒
腹痛虛鳴　厥逆而痛　吐利不止　汗出壯熱不止　眼
又不寤　瘈瘲身體反張大人脊下容側手小兒脊下容三指
並不治　諸癇僵仆痛聲但扶持之謹勿把捉

風癇證治

[illegible]風丸　治風癇先用此
黃牛膽南星　羌活　獨活　防風
天麻　人參　荊芥穗　川芎
細辛 各等分
右為末煉蜜圓梧子大每服[illegible]圓薄荷紫蘇湯調下

[illegible]丸　治諸風癇久遠亦驗
川烏　五靈脂
右為末猪心血圓如梧子大每服[illegible]圓薑汁[illegible]湯調下

[illegible]　治風癇解表通裏
獨活　麻黃　川芎
大黃　甘草
右剉散每服[illegible]

[illegible]　治風癇內熱
天麻　防風　細辛　人參
川芎　甘草
右剉散每服[illegible]不[illegible]煎服

[illegible]　治風癇[illegible]
牛膽汁和南星末　全蝎　蟬殼
防風　白附子　天麻　直殭蠶
麝
右[illegible]為末[illegible]取肉和水銀半錢研極細次入藥末
和[illegible]豆大每服[illegible]荊芥生薑湯下

[illegible]　治[illegible]
人參　琥珀　白茯苓　遠志肉
朱砂　天麻　石菖蒲　川芎
[illegible]　青黛
右為末煉蜜圓梧子大每服一圓金銀薄荷湯泡調下

[illegible]　治一切驚癇
紫石英　鐵粉　遠志肉　茯神
人參　琥珀　滑石　南星
蛇黃　龍齒　熊膽　輕粉
右為細末煉蜜圓朱砂衣梧子大每服一圓金銀湯調下或用
[illegible]調[illegible]入口中

[illegible]　治[illegible]癇邪氣入心
[illegible]　遠志　[illegible]角　大黃

石菖蒲　麥門冬[illegible]　蜣螂[illegible]

右為末粟米糊圓桐子大每服[illegible]竹葉煎湯調下或金銀煎湯下

[illegible]治驚癇心熱

遠志肉[illegible]　雄黃　鐵粉　琥珀[illegible]

朱砂[illegible]　金銀箔[illegible]

右為末棗肉圓桐子大每服[illegible]圓去心麥門冬煎湯下

[illegible]治驚癇

犀角　遠志肉[illegible]　白鮮皮　石菖蒲

半夏[illegible]　伏神[illegible]　大黃[illegible]　人參　甘草[illegible]

右為末每服[illegible]字去心麥門冬煎湯調下

[illegible]治驚癇入心不語神效諸驚失音大人通用

密陀僧為細末

右每服壹字米醋湯調下大人用貳錢熱酒調下

食癇證治

[illegible]治食癇先用此取積

代赭石[illegible]　赤石脂[illegible]　巴豆[illegible]　杏仁[illegible]

右件合研細湯浸蒸餅圓麻子大每服[illegible]圓米飲下

[illegible]治食癇通利

代赭石[illegible]　雄黃　蝎梢　朱砂各壹分

輕粉　麝香[illegible]　巴豆[illegible]　杏仁[illegible]

右為末蒸棗肉圓桐子大每服壹圓[illegible]煎湯調下

[illegible]治食癇[illegible]

定癇治法

[illegible]

朱砂[illegible]　水銀[illegible]　鉛[illegible]

雄黃[illegible]　真珠[illegible]

右為末[illegible]蜜圓桐子大每服貳圓金銀煎湯下

[illegible]方見[illegible]　如大便泄下惡物急宜與和胃之劑

[illegible]治五癇頭癇及心風血迷神效

甘遂末壹錢

右用帶性豬心壹箇取交會頭血[illegible]如血多只滴藥末得中和將豬心批作兩片將所和藥入在內再合用綿縛定外以濕紙包慢火內煨熟不可過度取出去紙取藥細研次入[illegible]半錢和之分作肆圓每服壹圓以所煨豬心煎湯調下後別用豬心煎湯重者只守本方輕者加[illegible]壹粒准過半日不動又進壹服如大便已下惡物[illegible]止後別[illegible]與[illegible]以助胃氣

[illegible]治頭癇搐搦[illegible]

雌黃　黃丹[illegible]

右為末拌和用牛乳汁[illegible]熬成膏入藥末杵[illegible]百下圓如麻子大每服貳圓溫熟水下

[illegible]治諸癇

蛇黃[illegible]　鬱金　雄黃[illegible]

鐵粉[illegible]　青礞石　朱砂各[illegible]分

右末粳米飯圓桐子大每服[illegible]圓人參煎湯調下

[illegible]治諸癇發盛

皂角[illegible]　白礬[illegible]

南星[illegible]　蝎梢[illegible]　殭蠶[illegible]　雄黃[illegible]

朱砂　白附子[illegible]　烏蛇[illegible]

赤蜈蚣[illegible]

右為末用水煮[illegible]糊和劑[illegible]為圓桐子大每服壹圓[illegible]湯調下

[illegible]治諸癇壯熱利下心中惡血

大黃[illegible]　甘草[illegible]　當歸[illegible]　赤芍藥[illegible]

半夏[illegible]　川芎[illegible]

右為末每服半字薄荷湯調服
[illegible]治驚癇發搐
蝎梢生鳥[illegible]研
右入朱砂末并麝香少許同研薄荷湯調作膏服數年驚癇不
作殺蓋癇疾皆心血虛滯生血可以官守其血證是即以[illegible]
[illegible]湯之若無生地黃湯當取蒂性龍腦心血代用入于[illegible]
[illegible]亦作效
[illegible]治陰陽癇通用
代赭石[illegible]
右每服半錢以金銀煎湯和金銀箔調下連進三服久久小
兒頭脛上自有赤斑即邪氣發出不須再服若無赤斑則[illegible]
治也
[illegible]治頭癇連年不瘥
黑錫　硫黃　水銀研　鐵粉研
金銀箔各[illegible]
右水銀[illegible]同研[illegible]用大銚內熔開次入
[illegible]不住手就銚內研令極細候[illegible]煙氣欲盡次入餘藥就火
上同研少頃時傾出在地上[illegible]出火毒再研細用米飯為丸如
子大朱砂為衣每服叁圓食後人參煎湯下
[illegible]治諸癇發歇無時
乾地龍[illegible]　虎睛[illegible]　人參[illegible]　金銀箔[illegible]
天竺黃　朱砂　代赭石[illegible]　鐵粉各[illegible]
雄黃[illegible]　輕粉[illegible]
右為末每服半錢紫蘇湯調下
[illegible]治小兒五癇
赤蜈蚣[illegible]　蝎梢　白附子生
烏蛇肉[illegible]　大南星[illegible]　白僵蠶[illegible]
白礬[illegible]
熊膽

右為末稀麪糊圓如桐子大朱砂為衣每服[illegible]薄荷湯化下
[illegible]治五癇
赤蜈蚣[illegible]　南星[illegible]　麝香[illegible]
全蝎　防風　朱砂研　遠志肉[illegible]
白附子[illegible]　薑蠶　延胡索[illegible]　金銀箔[illegible]
右為末入麝香和糊為圓如桐子大每服壹圓[illegible]煎湯調下
[illegible]治一切癇
赤蜈蚣[illegible]　烏蛇頭[illegible]　延胡索[illegible]
白附子　遠志[illegible]　鐵粉　透明防風
全蝎[illegible]　天麻[illegible]　金銀箔各[illegible]　大南星[illegible]
右為末以[illegible]打糊入[illegible]汁少許和圓
桐子大朱砂為衣每服貳圓金銀薄荷煎湯泡薄荷調下
[illegible]治諸癇壯熱[illegible]
[illegible]差癇利痰[illegible]
南星[illegible]　朱砂[illegible]
右為末用獖豬心血為圓如桐子大每服壹圓煎防風湯下
[illegible]治癇後瘖不能言
大天南星[illegible]香
右為末每服壹字猪膽汁調下
[illegible]治小兒心經有瘀血痞不能言[illegible]石菖蒲煎湯下
[illegible]以其心中有[illegible]能去惡血[illegible]
[illegible]油髮燒灰存性每服壹字米湯調下
論髮際穴
小兒初誕收生者多於頭額前髮際中間灸之蓋取其可以截
風路也若風驚證藥力不及者急灸[illegible]沉綿哭然無聲於此灸艾每
有扶危之功然亦觀[illegible]後[illegible]劑何如耳見集所載百會一穴
在頂心端正旋毛間亦灸危急者以是哉
論腦麝銀粉巴硇等不可輕用

小兒急驚風古人以其內外熱熾風氣暴烈而無所泄故用下之
藥以通其關鍵[illegible]以下其痰熱蓋不得已而用之
其實為風熱痰實者設也世俗無見不擇輕重每見驚發搐
輒用腦麝輕粉水銀巴豆芒硝等劑投之以為常殊
其不當用而輕用或當用而過用之是以急驚轉為慢驚吐瀉
胃虛荏苒時月變成慢脾之所為難療者比比皆然也萬一發熱驚搐
本為傷風傷寒傷暑瘡疹蓋而作誤藥至此其為害豈淺淺哉以
理觀之能以[illegible]之類以為發散勝如腦
麝能用[illegible]山梔[illegible]之類以為通利勝如銀粉芒
硝設或當用而不可無之亦須酌量勿過可耳此幼幼書所謂
[illegible]以大黃用之上藥者良以是故論此以為輕用
藥者勸

論蝦蚣有毒

蝦蚣有毒惟風氣暴烈者可以當之以其風氣暴烈則蝦蚣
藏能當之亦不[illegible]止但用之[illegible]若病稍當當帶[illegible]圓或半字或
一字或桐子大圓或桐子大圓在酌量而作劑也若或過之為
害當以[illegible]為解

凡幼兒欲發驚風先神志不定恍惚懼人搭眼上視左顧右
盼伸手握拳悶鬱氣清態不若尋常如此者有驚即截驚
有熱即退熱痰實即去痰實熱退則不生痰痰散則不生風
壅滯通則氣得其平病無由作是固當以小劑治之若未患
在痰熱全未有風搐搦顛引之狀則只可退熱化痰如參
蘇飲之類也謹勿妄投通關利膈等劑恐或透其熱流入經
絡反成風疾此又小兒無病不可服藥之戒

世俗玩習以為小兒體熱或遇潮熱即與以牛黃湯水之中風
冷外傷水濕內溼頃刻間感成風搐或吐或嘔或昏迷失
音或瀉泄不已變如慢驚風疾所難以治者不可不戒







# 疳

附 積 熱

## 諸疳方論

兒童二十歲以下其病為疳二十歲以上其病為勞疳與勞皆
氣血虛憊臟腑受傷致之同出而異名也何者小兒臟腑嬌嫩
飽則易傷乳哺飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆乳食不調
甘肥無節而作也或嬰幼闕乳粥飯太早耗傷形氣則疳之根
生或二兩睡後乳食稍多過飽無度則疳以傷得或恣食甘肥
粘膩生冷鹹酸以滯中脘則疳因積成或乳母寒暄失理飲食
無常喜怒房勞即與兒乳則疳因母患傳氣而入此非病家不
能調節之過乎疳皆脾胃受病內無津液而作也有因吐瀉之
後妄施吐下津液虛竭得之者有因潮熱大下利無禁約胃中
焦燥得之者有因傷寒裏證冷下太過渴引水漿變而生熱熱
氣未散復下他邪得之者又有癖疾寒熱脇下痞硬或者不能
漸與消磨遽以硇巴峻決津液暴傷得之者此非醫家輕率燥
痞之過乎疳之為候頭皮光急毛髮焦稀腮縮鼻乾口饞唇白
兩眼昏爛揉鼻捋眉脊聳體黃鬭牙咬甲焦渴自汗尿白瀉酸
肚脹腸鳴癖結潮熱酷嗜瓜果鹹酸炭米泥土而飲水者
皆其候也疳曰五疳病關五臟以臟別之心疳即驚疳由乳食
不調心臟受熱所致也蓋其血氣未充乳餔有傷易生壅滯內
有滯熱未得疏通故心神驚鬱而作驚疳之候外證身體壯熱
臉赤唇紅口舌生瘡胸膈煩悶小便赤澀五心皆熱盜汗發渴
嚙齒虛驚夫是之謂心疳肝疳即風疳由乳食不調肝臟受熱
所致也若乳母寒溫不調恣味不節或外感風寒內傷喜怒邪
氣未散遽以乳兒多成風疳眼目昏眼之候上膈伏熱痰涎壅滯
以致肝風入眼赤腫羞明生眵[illegible]或咳嗽[illegible]
[illegible]月眼白赤[illegible]外證[illegible]眼青[illegible]頭[illegible]

或方傷青肌熱甲瘧筋露□涕淋汗多下痢[illegible]是之謂肝疳[illegible]則急疳由乳食不調肥甘伏熱所致也凡甘味入於脾而動虫虫動則瘦疾眼睛[illegible]腹脹提心下懸關若上蝕齒齦則口齊出血齒色紫黑下蝕腸胃則下痢肛爛濕痒生瘡時有寒熱喬瘦精神消耗雖以有疳蟲者蓋也[illegible]多因疳傷久則腸胃受濕得之狀如狐惑傷蝕齒之證或以赤馬命名是亦傷骨皆主虛熱受熱邪疳氣直奔上焦故以走馬為喻初作口氣名曰臭息次第齒黑名曰崩砂盛則齦爛名曰潰槽熱血迸出名曰宣露甚者齒皆脫落名曰腐根其根既死雖得全活齒不復生外證腦熱肌削手足如冰寒熱時來滑泄肚痛口臭乾渴齒齦生瘡爪黑面[illegible]身多瘡疥夫是之謂腎疳[illegible]即氣疳由乳食不調壅熱傷肺所致也肺主乎氣鼻乃肺氣所通其氣不和則風濕乘虛客於皮毛入於血脈故鼻下兩傍赤癢瘡濕是為鼻疳其瘡不痛汁所流處隨即成瘡亦名[illegible]疳外證欬嗽喘逆壯熱惡寒皮膚粟生鼻癢流涕咽喉不利頤爛吐紅氣脹毛焦泄利頻併夫是之謂肺疳[illegible]即食疳由乳食不節脾胃受傷所致也或乳母恣食生冷肥膩或乳兒過傷或飯後與乳致使吐乳多啼久則變為乳癖腹脇結塊亦名奶疳外證面黃身瘦肚大腳細吐逆中滿乏力[illegible]水穀不消泄下酸臭合面困睡減食喫泥夫是之謂脾疳[illegible]五臟府傷大抵如爾析而論之曰五疳出虫曰[illegible]疳曰脊疳曰腦疳曰乾疳曰疳渴曰疳瀉曰疳痢曰疳腫脹曰疳勞曰無辜疳曰丁奚曰哺露諸狀非一可不舉要而條析之乎五疳出蟲者疳傷之源雖起於乳餔不調然臟腑停積已久莫不化而為蟲其蟲或如絲髮或如馬尾多出於頭項腹背之間黃白或赤者可醫青黑則難療也[illegible]疳者失乳飯早食肉太早或濕實生甜脹化為蛔蟲攻得多啼嘔吐清沫腹中作痛肚上青筋唇口紫黑腸頭齒癢[illegible]食蚘虫不可[illegible]疳者虫蝕脊膂身熱羸黃積



中生熱煩渴下利拍背如鼓鳴脊骨如鋸齒或十指皆瘡頻齧爪甲是也腦疳者胎中素挾風熱生下乳哺失常頭皮光急滿悶頭頸腦熱如火髮結如穗遍身多汗囟腫囟高是也[illegible]乾疳者瘦瘁少血舌乾多啼其病在心目不轉睛乾啼少淚其病在肝身熱尿乾手足清冷其病在腎聲焦皮燥大便乾結其病在肺搭口癡眠胸脘乾渴其病在脾總為五乾疳是也疳渴者臟中夙有疳氣加之乳母恣食五辛酒麪炙煿使小兒心肺壅熱日則煩渴引水乳食不進夜則渴止是爾疳瀉者毛焦唇白額上青紋肚脹腸鳴泄下糟粕是爾[illegible]疳痢者挾受風寒暑濕或冷熱不調或停積宿滯水穀不聚頻下惡物是爾疳腫脹者虛中有積其毒與氣交并故令腹肚緊脹由是脾復受濕故令頭面腳手虛浮是爾[illegible]疳勞者潮熱往來五心煩熱手足心及胸前熱而瘦[illegible]盜汗骨蒸嗽喘枯悴是爾或渴而復瀉飲水惡食肚硬如石面色如銀斷不可治無辜疳者腦後項邊有核如彈按之轉動軟而不疼其間有虫如米粉不速破之則虫隨熱氣流散淫蝕臟腑以致肢體癰瘡便利膿血壯熱羸瘦頭露骨高是爾[illegible]或浣濯兒衣露於檐下為雌鳥落羽所汚兒著此衣虫入皮毛亦致此病之疾兒衣宜曬須微火烘之其若手足極細項小骨高尻削體痿腹大臍突號哭胸陷或生穀癥是為丁奚虛熱往來頭骨分開翻食吐虫煩渴嘔噦是為哺露丁奚哺露皆脾胃久虛不能化水穀以榮血氣故肌肉消爍腎氣不足複為風冷所傷使然亦有胎中受毒臟腑少血致此[illegible]皆無辜種類之疾病而至此不可不知識故又有小兒久患腎疳內虛不食其者以此例治法當用[illegible]加[illegible]疳等方與貼頂強筋若天[illegible]之不治大抵疳候凡有二種有吐瀉日久氣虧成者有肝膜伏熱面赤唇紅煩燥此者有傷於不及發表成疳者有風邪入肝以至[illegible]

氣肝熱者腎熱重以涼肝並與調節則順性復也王氏注曰倒者難痊故丹及之雖然疳之不一熱則可冬寒則治之法將何擇焉錢氏曰治疳當辨冷熱肥瘦初病為肥熱疳久病為瘦冷疳熱者宜涼之冷者溫之冷熱者溫涼之此其要也熱疳病多在外鼻下赤爛頭瘡濕瘡五心煩熱掀衣氣粗渴引冷水焦臥地肚熱脚冷潮熱往來皆熱疳也冷疳病多在內利色無常其沫青白肢體軟弱目腫面黧又當兼瀉滑泄時地似有熱狀惟飲食不進滑泄無已亦冷疳也其有渴多臟血口加瘦弱此則謂之冷熱疳大抵疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄表過涼治冷不可峻溫驟補故錢氏又曰小兒易為虛實脾虛不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此而勿誤是果非切切之細頌而上醫與此消積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶之淡薄飲食以養之榮衛調和臟腑自然充實一過劑多致其熱也敗積之法又當明可積者疳之母由而虛謂之疳疳者有積者無不肚熱脹冷須酌量虛實而以之若積而虛甚則先與扶胃使胃氣內充然後為之微利若積勝乎虛則先與利藥斟酌得宜漸以和胃之劑為之扶虛然取積雖當緩利如[illegible]圓子[illegible]消積等藥亦不可與腦間癖痛亦虛中之積也先實脾胃然後[illegible]水不食或渴飲水以致喘嗽錢氏有癖為潮熱之疏治法解散其熱且與下藥合是而疏發作不同臟腑不一又可無擇乎[illegible]飲水不已食則饑瘦多啼[illegible]上顆果者不治肝疳[illegible]瓔嘛數吐涎目睛青筋眼角黑若不治[illegible]飲水[illegible]便如乳汁樣者[illegible]若不治[illegible]上藥生其色斑黑者不治肺疳喘嗽[illegible]水穀不消[illegible]人中平滿者不治其或滑泄不休脫肛[illegible]黃瘦[illegible]甚者[illegible]



[illegible]大非[illegible]不食等皆危篤矣抑有間焉[illegible]而以譬水條木而川[illegible]人受父母之氣以生精血不榮胞胎有損如草木萌芽之受傷望其華實之不損痛者難矣丁奚哺露腦疳疳癇[illegible]中已受之病乎不特此爾究方渴瘳母復有乳汁成寒[illegible]小兒神氣不致胃立脾氣是謂[illegible]九此等類[illegible]難[illegible]其巧余於終篇所以為之抱門學論云

## 諸疳證治

**錢氏圓** 諸疳通用

蘆薈　北五靈脂　好使羽砂　蟾砂

橘皮　青皮　蓬莪朮　木香

史君子　黃連　蝦蟆[illegible]

右末雄豬膽貳枚取汁和藥入糕糊圓麻子大每拾伍圓米飲下[illegible]本方加[illegible]半[illegible]

**[illegible]** 

蘆薈　黃連各[illegible]　瓜蒂

蝦蟆灰[illegible]　豬牙皂角

右末吹入鼻[illegible]則可療

**[illegible]圓** 治一切疳及疳眼赤腫[illegible]昏暗[illegible]或經月合眼

雞爪黃連　蕪荑　蘆薈

神麴　青皮　史君子肉

右末[illegible]豬膽汁[illegible]糕糊圓麻子大每[illegible]米湯下疳熱眼[illegible]仁煎湯下

**大蘆薈圓** 治諸疳

蘆薈　蕪荑　木香　青黛

檳榔　川黃連　胡黃連

蟬殼

右末[illegible]大每貳拾圓米飲下

〔蘆薈圓〕治五疳潮熱肚脹髮焦
胡黃連半兩　蘆薈　五靈脂各一分
右末猪膽汁圓麻子大每服拾伍圓米飲下五疳潮熱證
勿用〔大蘆薈圓〕

〔五疳保童圓〕
川黃連去鬚　蕪荑去皮仁　砂細研　麥蘖炒
橘紅　木香　蝦蟆各炙焦　史君子去殼各壹兩
肉豆蔻煨　雞心檳榔　麝香別研
右細末雄猪膽貳枚取汁入好酒打糊爲圓芥子大每服
拾伍圓米飲下

〔胡黃連圓〕治熱疳
胡黃連　川黃連各半兩　朱砂別研壹分
右貳連爲末和〔朱砂〕入猪膽內緊縛於銚中懸挂炊
取出研〔蘆薈麝香〕各貳錢半夫乂〔〕貳錢〔〕少許搜
米飯圓麻子大每每拾圓食後米飲下

〔至聖圓〕治冷疳泄瀉
丁香　丁皮各壹錢　木香　紫厚朴製
史君子肉　肉豆蔻　橘紅各
右末神麴糊圓麻子大每服拾圓食前米飲下

〔通神圓〕治冷熱疳
胡黃連　川黃連　木香　蕪荑各
丁香　肉豆蔻生　史君子
大蝦蟆乾
右末膏和圓麻子大每拾圓米飲下

〔大神圓〕治心疳驚疳
伏神　蘆薈　琥珀　川黃連
赤伏苓　釣藤皮　遠志肉　蝦蟆灰
細節石菖蒲　麝香



〔〕粟米糊圓麻子大每拾圓薄荷湯下

〔天麻圓〕治肝疳風疳疳眼
青黛　川黃連　天麻　北五靈脂
夜明砂　川芎　蘆薈　龍膽草
防風　蟬殼去足　全蝎　麝香
乾蟾頭
右末猪膽汁浸糕圓麻子大每拾圓薄荷湯下

〔生熟地黃湯〕治疳眼閉合不開內有瞖霧
生乾地黃　熟地黃　川芎　赤伏苓
枳殼　杏仁　川黃連　半夏麴
天麻　地骨皮　甘草
右剉每服貳錢黑豆拾伍粒水煎臨卧服

〔地黃圓〕治腎疳
大熟地黃　赤伏苓　山茱萸
當歸　川芎　川楝子肉　牡丹皮
山藥　史君子
右末煉蜜圓桐子大每参圓空心温湯化下

〔〕治口齒出血臭氣
銅綠　生蜘蛛
右研細入麝少許夾和擦齒如無蜘蛛即用蝦貳箇

〔清肺湯〕治肺熱疳𧏾餘爲穿孔汁臭或生息肉
桑白皮　紫蘇　北前胡　黃芩
當歸　天門冬　連翹　防風
赤伏苓　北梗　生乾地黃　甘草
右剉每服貳錢井水煎食後服次用〔化𧏾圓〕

〔化𧏾圓〕
蕪荑　蘆薈　青黛　川芎
白芷梢　胡黃連　川黃連　蝦蟆灰

右末豬膽汁浸糕糊圓麻子大每服貳拾圓食後[illegible]
煎湯下其藥常以[illegible]湯小兒先灸前藥各進數服却
用[illegible]等分[illegible]少許細
末入鼻數嚏

[illegible]圓 治脾疳食用
北九蟲脂　縮砂仁　白豆蔻仁　麥芽 分
蓬朮 [illegible]　青皮 去白　橘紅　史君子肉 各貳錢
蝦蟆 炙焦
右末米糊圓麻子大每拾圓米湯下

下蟲圓 治疳蟲
新白苦楝根皮　[illegible]　綠色貫衆　木香
桃仁　蕪荑　雞心檳榔 [illegible]
鶴虱　輕粉　乾蝦蟆　史君子 [illegible]
右末飛麪糊圓麻子大每貳拾圓天明清肉汁下 [illegible]加[illegible]

[illegible] 各貳錢半治脊疳兼疳勞方可擇用

龍膽圓 治腦疳腦熱餅瘡
龍膽草　川升麻　苦楝根皮　防風
赤茯神　蘆薈　油髮灰　青黛
黃連 各等分
右末豬膽汁浸糕糊圓麻子大每貳拾圓薄荷紫蘇湯下
食後仍以[illegible]入鼻

[illegible]圓 治疳渴
黃連 [illegible]　瓜蔞根
烏梅肉 [illegible]　杏仁 [illegible]　石蓮肉 各等
右末牛膽汁浸糕糊圓麻子大每拾伍圓煎烏梅[illegible]湯
下又[illegible]後附[illegible]方[illegible]內[illegible]可治疳渴及五疳

[illegible]圓 治疳瀉
黃連　肉豆蔻　木香　訶子

縮砂仁　茯苓 各等分
右末粳飯圓麻子大每拾伍圓食前紫蘇飲下

木香圓 治疳痢
黃連 [illegible]　木香　紫厚朴　縮砂仁
夜明砂 [illegible]　訶子肉 [illegible]
右末粳飯圓麻子大每拾伍圓乾艾葉生薑煎湯食前下

褐圓子 治疳腫脹
蘿蔔子 [illegible]　陳皮　青皮 去白　好檳榔
黑牽牛 [illegible]　北五靈脂　赤茯苓
蓬莪朮 [illegible]　木香 [illegible]
右末飛麪糊圓菉豆大每拾伍圓紫蘇子木通桑白皮煎湯下又治
[illegible] 加[illegible]末煎紫蘇湯調下少香[illegible]
[illegible] 治疳脹肚皮緊

[illegible] 治疳勞
黃耆 [illegible]　當歸　川芎　白芍藥
生乾地黃　蝦蟆 [illegible]　[illegible]　人參
白茯苓　橘皮　半夏 [illegible]　柴胡
史君子 [illegible]　甘草 [illegible]
右麤末每貳錢薑棗煎食前服之

[illegible] 治熱勞
人參　川芎　蕪荑　柴胡
史君子 [illegible]　胡黃連　川黃連 [illegible]
右用[illegible]入[illegible]會兩[illegible]和貳[illegible]次早[illegible]乾
透[illegible]血口[illegible]貳連[illegible]末粟米糊圓麻子大
每貳拾圓食前熟水下

[illegible]圓 治[illegible]用[illegible]服[illegible]
[illegible]
[illegible]中以[illegible]之[illegible]不與[illegible]

[illegible]殺頭在虫中悲無虫食者日夜次以成布作細末[illegible]
數定置之急流宿取出焙為末入[illegible]子和殺搗圓
麻子大每服貳拾圓米飲下

**又方** 治無辜疳
夜明砂炒為末入諸飲食中與之

**千金方** 治丁奚哺露
青皮　陳皮各去白　蓬朮　川芎
北五靈脂　白豆蔻仁　雞入[illegible]　蘆薈各半兩
木香　史君子肉　蝦蟆灰各壹錢
右末猪膽汁浸糕糊圓麻子大每服貳拾圓米飲下有熱則薄荷湯下

**五疳圓** 治疳傷肚大 **金蟾圓** 治疳積 方並見前積

**[illegible]方** 小[illegible]阿魏圓 療治小兒諸疳疳熱疳瀉每服貳拾圓米飲下

**疳瘡不能食者方** [illegible]圓每服拾伍圓[illegible]粒入米炒 **五靈脂** 末各少許以 **石菖蒲** 煎湯吞下

**龍膽湯** 治疳病
龍膽草　鉤藤皮　柴胡　桔梗
芍藥　川芎　茯苓　甘草各貳錢
人參壹錢　大黄[illegible]
右剉散每貳錢井水煎服仍以紅綿[illegible] **[illegible]** 送下 治疳帶

疳勞方論

凡人自襁褓以至成童[illegible]是疳氣使然[illegible]耗其精液[illegible]熱[illegible]遍身熱[illegible]也須用[illegible]圓[illegible]治以 **大蘆薈圓** [illegible]煎湯治之 **[illegible]圓** **肥兒圓** 一藥夾和佐之可也

**[illegible]圓**
疳[illegible]治



雄猪肚壹具淨洗　[illegible]黄連[illegible]
右剉作小截少水和搗納猪肚中用線縫密蒸在伍升粳米上蒸上分爛取放臼中入些蒸飯搗千餘杵如得所搗手捏圓如小桐子每服貳拾圓米飲下量子增之病者又增之仍以 **[illegible]** 調治[illegible]以[illegible]潮熱[illegible]皆一種病也用藥[illegible]前[illegible]不[illegible]則[illegible]常[illegible]識

北安

# 積

積滯方論

小兒有積面目黄腫肚熱脹痛覆睡多困酷啼不食或大腸閉澀小便如油或便利無禁糞白而酸此等皆積證也然有 **冷積** **熱積** [illegible]要當明辨叶乳[illegible]乳其氣酸臭此由啼叫未已以乳與兒停滯不化得之是為乳積[illegible]或嘔此由飲食無度[illegible]後即睡[illegible]是為食積[illegible]利如[illegible]此由觸[illegible]不和[illegible]得之是為氣積合用[illegible]不思飲食昏昧神[illegible]喉[illegible]熱[illegible]發搐推此[illegible] **[illegible]** [illegible]者少與之[illegible]用[illegible]食而[illegible]乳[illegible]而[illegible]有熱傷積明醫[illegible]所未識[illegible]而[illegible]不止[illegible]不可[illegible]小兒消積多用 **[illegible]** [illegible]勿[illegible]

積滯證治

**木香圓** 治[illegible]積食積氣積
木香　蓬莪朮　縮砂仁　青皮去白
牛[illegible]　八[illegible]　丁香[illegible]　川巴豆肉[illegible]

右細末和勻飛白麪糊圓麻子大風乾每服貳拾圓乳汁下食傷米飲下後與大芎黃湯[illegible]下積圓亦得藥須橘皮煎湯下下後與和中[illegible]

下積圓治乳食傷積心腹脹滿氣粗壯熱或瀉或嘔

丁香　縮砂仁　使君子

烏梅肉　川巴豆肉

右末研細和勻爛飯圓麻子大每服叁圓橘皮煎湯下

蓬莪圓治酒食積通用

青皮　乾薑　北五靈脂　蓬莪朮

右為末水和秤藥末壹兩用巴豆肉以石壓去半油秤壹錢研細拌和粳米飯圓麻子大每服叁伍圓米湯下不飢飽時服

[illegible]圓治痞積 [illegible]

[illegible]圓治諸積有熱 [illegible] 木香圓治冷積 [illegible]

痞結證治

痞者塞也結者實也氣血壅滯於胸膈之間留飲聚於腹脇之內於是榮衛不得流行臟腑不得宣通由脹滿而至痞結勢使然耳此熱實之證也所以或發為壯熱[illegible]主之

[illegible]

甘遂　青皮　黃芩　川大黃

右麁末每服壹錢水小盞煎去滓溫和服量大小增減用得通利則止後服和後以[illegible]補之

癖氣證治

癖者血膜包水癖側於脇傍時時而作痛也惟癖為能發潮熱惟癖為能生寒熱故瘧家中脘多有黃水日久而後結癖寒熱之不已者以此小兒臟腑和平[illegible]則津液自然流通縱使多飲水漿不能為病惟夫[illegible]一焦閉[illegible]以致水漿停滯胃不能宣行冷氣[illegible]於是[illegible]者用[illegible]



木香[illegible]圓

[illegible]　莪朮

辣桂　蓬朮　青皮

木香　桃仁　五靈脂

右細末入去油巴豆壹錢研和十分細飛麪糊圓麻子大風乾每服壹圓[illegible]湯下泄後以[illegible]補仍和胃

[illegible]圓治乳癖[illegible]中[illegible]精

[illegible]

蓬朮　五靈脂

青皮　北大黃　木香　巴豆

右末醋麪糊圓麻子大每服貳圓食後[illegible]湯下

[illegible]圓治小兒痰中結癖[illegible]

代赭石　川大黃　木香

朱砂　[illegible]　桃仁　五靈脂

巴豆肉　辣桂

右細末麪糊圓麻子大每服伍圓[illegible]湯下

# 熱

諸熱方論

小兒有諸熱[illegible]大熱[illegible]則[illegible]口熱[illegible]煩[illegible]大小便難[illegible]則面色青白[illegible]神[illegible]口中清冷[illegible]多[illegible]汗[illegible]溫[illegible]上[illegible]下泄[illegible]不分此則冷熱不調之[illegible]

[illegible]

調則[illegible]小兒[illegible]熱[illegible]

[illegible]

發汗則表熱盡除其或表裏已解而熱又時來此則表裏俱虛
氣不歸元而陽浮於外不可再用涼藥當與解表收斂和其胃
氣使陽收斂而歸內身體自涼參苓白朮散方見嘔吐門 黃芪建中湯
皆可服

諸熱證治

秘旨解飢散治小兒頭熱身熱口中氣熱大便或赤不通方見前
加川芎嫩蔓荊最妙

人參羌活散治小兒寒熱[illegible]頭痛[illegible]或骨蒸[illegible]

北參　當歸　遠志[illegible]　柴前胡
柴胡　地骨皮　防風　北梗
枳殼[illegible]　半夏[illegible]　川芎　茯苓
赤芍藥　麥門冬[illegible]　甘草[illegible]

右剉細每服貳錢水小盞薑三片紫蘇[illegible]煎服[illegible]
兼服[illegible]圓[illegible]別作小圓不惟治[illegible]治瀉[illegible]

潮熱而肚脹者米飲常服貳拾圓

[illegible]圓治小兒每日早晨發熱夜則身涼此[illegible]熱也
胡黃連　[illegible]　宣黃連　赤芍藥[illegible]

右末猪膽汁和成劑入膽皮中懸掛以漿水煮熟取藥研
細糊圓麻子大每貳拾圓米飲常服

龍膽圓治疳熱
龍膽草　黃連　史君子肉　青皮等分

右末猪膽汁圓麻子大每拾圓食後熱水下

清[illegible]散治感風發熱頭疼鼻塞涕流及溫壯悲啼之
北參　防風　天麻　北前胡
茯苓　北梗　枳殼[illegible]　甘草[illegible]
細辛　柴胡[illegible]　川芎[illegible]

右末每壹錢水小盞[illegible]煎溫和服

新刊仁齋直指小兒方論卷之三



新刊仁齋直指小兒方論卷之四

# 傷寒

## 傷寒方論

或問小兒傷寒可得聞乎曰小兒傷寒與大人法度則同但分
劑少異用藥少冷[illegible]於前矣然而驚風瘡疹亦與此相類
尤不可以[illegible]而[illegible]驚風挾寒者必[illegible]人識身引
衣[illegible]是為表證可微取其汗也[illegible]熱內實者必頭[illegible]面揚
手擲足煩渴燥糞掀衣氣粗是為裏證可略與疏利也至若頭
額冷手足涼口中冷氣面色黯淡大便瀉青此則陰病裏虛當
以溫藥救其裏也表證之若汗下過之夫可以類推矣發汗用
[illegible]加[illegible]解肌用[illegible]散加[illegible]通利用四順清
涼飲[illegible]微利人參羌活散[illegible]或[illegible]
[illegible]以參蘇飲併風發人參羌活散或天麻防風圓
其有[illegible]者[illegible]加[illegible]小便不[illegible]
者[illegible]表裏俱熱[illegible]表裏俱見之證[illegible]
主之[illegible]則人參[illegible]散加[illegible]食[illegible]圓[illegible]然
亦須審其小便或赤或白可以知裏熱之有無或清或濁可以知
裏熱之輕重[illegible]則以虎口指紋之紅色重之長而[illegible]
則以一指按其三關按左手人迎之脈[illegible]斷之所謂七十二
證其辯[illegible]皆無[illegible]宋[illegible]例[illegible]不過[illegible]分劑而[illegible]
也不然幼幼新書[illegible]小兒傷寒[illegible]一二而[illegible]以
活人書為法果何異哉故附于卷末以備學者之觀覽云

## 傷寒證治

桂枝芍藥[illegible]湯[illegible]
桂枝[illegible]　芍藥半兩[illegible]　甘草[illegible]
麻黃[illegible]　杏仁[illegible]
大棗[illegible]

右剉如麻豆大每服伍錢水壹盞半煎至八分去滓溫服

香蘇散 治四時瘟疫傷寒

香附子 紫蘇葉 各肆兩 青橘皮 [illegible] 甘草 壹兩

右爲麤末每服叁錢水壹盞煎柒分去滓熱服不拘時日叁服 [illegible] 若作細末只服貳錢入鹽點服

升麻葛根湯 治小兒時氣瘟疫頭痛發熱肢體煩疼 方見[illegible]

小柴胡湯 方見驚癇門 理中湯 方見[illegible] 甘露飲 方見[illegible]

五苓散 方見水氣門 參蘇飲 方見[illegible] 人參羌活散 方見[illegible]

人參[illegible]湯 方見咳嗽門 [illegible]圓 方見[illegible]

人參敗毒散 方見[illegible]

# 寒瘧

寒瘧證治

常山散 治小兒發瘧發寒熱煩悶

川常山 川大黃 甘草 各[illegible]

桂心 烏梅肉 各[illegible]

右剉細每服壹錢井水小盞煎半候冷未發前與之

# 虛寒

虛寒證治

惟腎乞虛亦惟腎受寒小兒骨氣未就雖虛而不宜補但以地黃圓補之 方見[illegible] 瀉者以[illegible] 湯調下 泄者專用木香白朮[illegible]各壹分 [illegible] 甘草 各半分 剉細量大小作劑入陳米煎服

# 虛汗

虛汗證治

[illegible] 治小兒虛汗盜汗或心血液妄發爲汗[illegible]收斂心氣

新羅人參 川當歸 各[illegible]

右剉細用雄猪心壹箇切[illegible]每服貳錢猪心壹片井水壹盞半煎[illegible]食前兩次服

又撲汗方

黃連 牡蠣粉 貝母 各[illegible] 米粉 [illegible] 末傅

# 痰涎

痰涎證治

痰涎方論直指謂之詳矣但小兒受病多生於熱熱則生痰痰者諸病之根也故申言之用藥白圓子 方見[illegible] 加朱砂同研細薄荷泡湯入薑汁少許調下風痰[illegible]蘇合香圓并天麻防風圓 方見[illegible] 加朱砂末薑汁泡湯調下餘方見直指方痰飲類

經驗

風痰證治

朱砂圓 治[illegible]風壅痰

朱砂 [illegible] 直僵蠶 [illegible] 天南星 [illegible] 白附子 [illegible]

全蝎 [illegible]

右末飛白麵糊圓麻子大每服伍圓薄荷湯溫服

保命丹 控下風痰全活危急

青礞石 [illegible]

右末每服壹錢匕急風薄荷汁入蜜調下涎痰自大便出狀如糊[illegible]次服退痰截驚等劑慢風[illegible]入少蜜煎湯調下涎即墜入腹中次服[illegible]等劑

青州白圓子

圓白大半夏 [illegible] 川烏 [illegible] 白附子 [illegible]

圓白天南星 [illegible] 天麻 [illegible] 全蝎 [illegible]

右細末生薑汁煮糊圓麻子大每[illegible]薑湯[illegible]下

紫白圓子末紫蘇烏梅湯又黃連湯調下又白圓子半兩
牙…分為末米飲調下大抵小兒諸病乘虛則邪留治法惟平
胃為上上策

## 喘咳

咳嗽喘嗽證治

杏仁煎治小兒久患咳嗽

杏仁去皮尖兩半　茯苓壹兩　紫菀壹　皂角去皮弦炙半兩

右末每半錢生薑調入蜜杏湯泡調服

紫菀湯治小兒喘嗽

紫菀茸　貝母　蘇子炒　杏仁水浸去皮尖

北梗　陳皮　麻黃去節　半夏麯

赤茯苓　桑白皮炒　甘草炙等分

右剉細每服壹錢薑叁片紫蘇叁葉并烏梅少許水煎服

人參散治感冒咳喘胃滿痰嗽

人參去蘆　枳實炒　桑白皮炒　半夏麯

赤茯苓　五味子　細辛去葉　北梗

麻黃去節　阿膠炒　甘草炙各半兩

右剉散每壹錢薑叁片紫蘇叁葉水煎服凡治喘嗽不論肺實肺虛可汗可溫可下藥中須用阿膠使得安肺潤肺其性和平肺經要藥

## 脾胃

胃氣虛實證治

凡人以胃氣為本惟治病亦然胃氣有虛有實虛則有嘔吐不食之證實則有痞滿內熱之證虛者益之實者損之欲得其平則可矣胃虛用異功散參苓白朮散等劑胃實用枳殼丸保和丸等劑若夫胃中積熱則…不可闕

胃在…以下…與之大足立乃為平胃

驚惕不食

心者脾之母進食不止於和脾蓋火能生土當以心藥入於脾胃藥之中庶幾兩得古人進食方劑多用益智者此也

益智仁　石菖蒲　白茯苓　蓮子肉

陳皮　縮砂仁　半夏麯　木香

厚朴薑製　甘草炙各等分

右剉細每服壹錢薑叁片棗壹枚水壹盞煎不飢飽服

## 吐瀉

嘔吐證治

消乳丸治乳哺不化停滯在脘或作嘔惡

丁香　木香　青皮　生肉荳蔻

三稜　蓬朮等分

右細末稀麵糊圓麻子大每服伍圓米飲下日貳服

益胃散快膈和脾止嘔進食

木香　丁香　藿香　陳皮

縮砂　白豆蔻仁各壹分　甘草炙壹錢

右細末每服叁字煎棗湯或熟湯調下或加…

半夏丸治小兒胃虛嘔吐水穀不能入

圓白半夏湯洗…　陳粳米叁合

右剉細每服壹錢水大半盞薑伍片北棗壹枚煎半溫服

調中香散治小兒吐瀉

吐瀉證治

良薑　香附　天台烏藥　辣桂各貳分

甘草炙　加陳皮　藿香各壹分

右細剉每服壹錢水煎…別煎與乳母服

…散治霍亂吐瀉

藿香菓 陳皮 肉豆蔻(炮) 半夏(泡)
青皮 酸木瓜 甘草(各炙) 石菖蒲(各等)
右細剉每服壹錢薑叁片紫蘇叁葉水煎服若月加木香
又方[illegible]甘草生等分麄末水煎入法酒些少服
又方
藿香 肉豆蔻(各壹分) 甘草(生半分)
右為麄末每服壹錢新水煎服
不換金正氣散(方見[illegible]) 加木香伏苓治嘔瀉
泄瀉證治
[illegible]治小兒胃泄面黑[illegible]脘骨力弱小腹痛泄多
白膿[illegible](方見[illegible])叁圓為末入[illegible]半錢以[illegible]
壹錢半[illegible]壹錢大棗貳枚煎取清汁乘熱調空心灌下
木香益黄散治胃虛腹痛泄利
陳皮(壹兩) 青皮 訶子肉(各半兩)
丁香(貳錢) 木香 甘草(各貳錢半)
右細末每服壹錢陳米少許水煎服
肉豆蔻散治小兒腹痛大瀉
肉豆蔻([illegible])[illegible]為末米飲調下
[illegible]治小兒冷熱不調上盛下泄
木香 當歸 川芎 北前胡
柴胡 青皮 北梗 甘草(各)
羊赤色伏苓(等分)
右剉散每服壹錢薑棗煎不飢飽服
瀉痢證治
没石子圓治赤白痢或大便瀉
白没石子 白豆蔻仁 訶子肉 木香 黄連
右末粳米糊圓麻子大每服拾伍圓米飲下
赤痢壯熱方 藍青搗汁每服[illegible]

## 腹痛

腹痛證治
腹痛多因邪正交爭與臟氣相擊而作也挾熱作痛者以面赤或壯熱四肢煩手足心熱見之挾冷作痛者以面色或白或青見之冷甚而證變則面色黯黑唇口爪甲皆青矣熱證四順清涼飲加[illegible](方見[illegible])冷證指迷七氣湯(方見[illegible])加[illegible]調[illegible](方見[illegible])乃邪正交爭冷熱不調則[illegible](方見[illegible])加[illegible]為妙

## 腫脹

腫脹證治
[illegible]散治小兒水氣腫痛
甜葶藶([illegible]) 牽牛([illegible]) 桑白皮(炒)
[illegible] 川大黄([illegible])
右為末每半錢水半盞薑[illegible]片蜜半匙煎湯調下或[illegible]大便
[illegible]研青木香圓灌下
分氣飲治小兒腫脹作喘氣短而急
桔梗 赤伏苓 陳皮 桑白皮(炒)
大腹皮 枳殼 半夏 真蘇子
紫蘇 甘草 草果仁
右剉每服壹錢半水小盞薑叁片棗壹枚煎半服
陰腫證治
人有常言天生地長多與小兒近地然兒有大小壯弱起止中節可也夫苟[illegible]至石不起冷氣[illegible]之或近地經久風邪[illegible]為陰腫[illegible]有啼叫[illegible]氣閉[illegible]下結聚不散加以水[illegible]不[illegible]治法用桃仁圓
桃仁[illegible] 牽牛[illegible]

白蒺藜（炒去刺） 牡丹皮 川大黃（各□□）

右末煉蜜圓如梧子大每服五圓或七圓［illegible］入鹽

小麝煎湯下或煎［illegible］湯下［illegible］

［illegible］ 母蠣灰（煅） 乾地龍（各等分）

右細末津唾調傅外腎熱者雞子清調傅

［illegible］治小兒外腎腫入莖物通明

母蠣粉研十分細先以津唾塗腫處次以母蠣粉摻傅

又方 卵腫研桃仁唾調傅

# 大小便諸證

遺尿證治

小便者津液之餘也腎主水膀胱爲津液之腑腎與膀胱俱虛而冷氣乘之故不能約制其水出而不禁謂之遺尿睡裏自出謂之尿床此皆腎與膀胱俱虛而挾冷所致也用雞腸散

雞腸散 雞腸（一具） 牡蠣灰 白茯苓 桑螵蛸（炒各半兩）

辣桂 龍骨（各一分）

右麄末每服一錢薑棗煎服

又方 雞肶胵（一具） 雞腸（燒存性）

右爲末每壹錢酒調下男用雌雞女用雄雞

尿白證治

小兒尿如白米泔狀由乳哺失節有傷於脾致使清濁不分而色白也久則成疳亦入腸伏熱兼而得之用茯苓散

茯苓散 京三稜 蓬莪朮（煨） 縮砂仁 赤茯苓（各半兩）

青皮 陳皮 滑石 甘草（炙各一分）

右末每服半錢燈心煎湯調下

又方 大甘草頭煎湯服

諸淋證治

葵子散 治小兒諸淋

葵子 車前子 木通 瞿麥

桑白皮（炒） 赤茯苓 山梔仁 甘草（炙各半分）

右剉每壹錢井水小盞葱白一寸煎半分食前溫服

［illegible］ 治小兒血淋

生乾地黃 木通（各□□） 黃芩 甘草（各一分）

右爲末每服壹錢井水入燈心煎服仍以米飲調［illegible］

心湯下

［illegible］方 生蒲黃 生地黃 赤茯苓 甘草（炙等分）

右剉每壹錢水小盞煎半分調［illegible］食前服

大便不通證治

［illegible］ 治小兒風與熱血留畜上焦胃腸高起大便不通

没藥 大黃 枳殼（炒） 桔梗（各炒等）

木香 甘草（炙各□□）

右剉每壹錢薑二片水煎服

脫肛證治

［illegible］ 治小兒大腸虛肛門出

龍骨 訶子肉（□各□□） 没石子（大者一枚）

罌粟殼（去蒂） 赤石脂（各□□）

右末每服壹錢米飲調下

# 丹毒

丹毒證治

熱毒與血相擊而風乘之所以赤腫遊走而遍身也此由乳母酒麪煎炙過度或夫婦不慎冷而即著衣或此故致［illegible］

於手足或發於面目胸背令兒燥悶腹脹其熱如火痛不可言遂有入腹入腎之證便不可救㬵通用[illegible]加減

又方 外用[illegible]并水入藍研傅

又方

桔梗　天花粉　乾葛　川升麻

川芎　赤芍藥　獨活　柴胡　甘草等分

右剉散每服壹錢薑貳片井水煎服餘見丹疹門

## 吐衄

### 吐衄證治

[illegible]治小兒吐血咯血

生蒲黃　油髮灰等分

右研細每服壹錢[illegible]調下或米飲亦得

[illegible]方 治小兒吐血衄血

生地黃汁取壹合調髮灰半錢分作兩服食後少頃灌下

[illegible]方 生蘿蔔根汁仰頭滴下鼻仍飲其汁

## 雜證

### 顖陷證治

始因臟腑有熱渴引水漿致成泄利久則血氣虛弱不能上充腦髓故顖陷如坑不得平滿[illegible]炙黃為末雞子清調傅之

### 顖填證治

顖填者顖門腫起也脾主肌肉乳哺不常飢飽無度或寒或熱乘於脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹顖突而高如物堆垛毛髮短黃自汗是爾若寒氣上衝則牢鞕熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者凉之劑量輕重兼與調氣小兒肝盛風熱交攻亦然未易退瘥

### 解顱證治

小兒年大頭縫開解而不合也腎主骨髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足所以頭顱開而不能合凡得此疾不過千日終成廢人特與錢氏地黃圓

大熟地黃洗焙　山茱萸　乾山藥各貳錢

澤瀉　牡丹皮　白茯苓各壹錢半

右末煉蜜圓桐子大每服貳圓溫熟水空心調服仍用[illegible]微炮為末米醋調傅於絹帛烘熱貼之

又方

華陰細辛　桂心各半錢　乾薑[illegible]

右等分為末乳汁調傅

### 口舌證治

[illegible]方 髮灰細末豬脂和傅[illegible]亦好

### 重舌證治

重舌者心脾俱有熱也心候於舌所主者血脾之絡脈出於舌下若心脾有熱則血氣俱盛附舌根而重生一物形如舌而短小是也有著頰裏及上腭者以重腭有著齒齦者以重齦皆當刺去其血也用[illegible]傅之或[illegible]傅之或[illegible]傅之或[illegible]亦好

### 木舌證治

木舌者心之候脾之脉絡於舌也臟腑壅滯心脾積熱熱氣上衝故令舌腫漸漸脹大塞滿口中是為木舌若不急療以至害人

[illegible]研細[illegible]調下○又方[illegible]研細[illegible]半之同研[illegible]○又方[illegible]貳分[illegible]壹分[illegible]半分同研每半錢[illegible]井水調傅

### 滯頤證治

小兒滯頤涎流出而漬於頤間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎液自流不能收約法當溫脾

半夏　　木香　　丁香各十五　川白薑生
白朮　　青皮　　陳皮各等分
右細末糕糊圓麻子大壹歲拾圓貳歲貳拾圓米湯送下
嘔吐證治
[illegible]散方
蛇蛻　前件等分
右每半錢乳汁調下或用[illegible]燒存性為末每半錢乳汁調下
語遲證治
言心聲也小兒受胎其母卒有驚怖邪氣乘心故兒感受母氣心管不守舌本不通四五歲長大而不能言也菖蒲丸主之
菖蒲丸
人參　　石菖蒲　　麥門冬去心　遠志取肉薑製各等分
川芎　　當歸各二錢　滴乳香　　朱砂各壹錢研
右末煉蜜圓麻子大每服拾圓粳米飲下
夜啼證治
夜啼者臟冷也陰盛於夜則冷動冷動則為陰極發躁寒[illegible]作痛所以夜啼而不歇也鉤藤散主之
鉤藤散
鉤藤　　茯神　　茯苓　　川芎
當歸　　木香各壹錢　甘草炙半錢
右末每服壹錢薑棗略煎服其或心熱而夜啼必有臉紅舌白小便赤澀之證[illegible]加朱砂末壹錢研和每服壹錢[illegible]湯調下又有觸犯禁忌而夜啼者醋炭熏服[illegible]以方術斷之
又方　[illegible]心灰存性塗乳上與之
服藥證治
[illegible]方
[illegible]分[illegible]
右入[illegible]大[illegible]以綿裹[illegible]
耳病證治
耳者腎之候小兒腎經蘊熱上衝於耳遂使津液壅滯為稠膿為清汁者此也亦有沐浴水入耳中水濕停留搏於血氣醞釀成熱亦令耳膿久不瘥變成聾
[illegible]散
枯礬　　龍骨各[illegible]　黃丹　　胭脂[illegible]　麝香少許
右細末先以綿杖撚去水次以鵝毛管吹藥入耳本方加[illegible]
龜胸證治
[illegible]亦好
又方　蝦蟆燒灰存性搗為末和猪膏傅
胡粉和東方壁土為末傅
龜胸證治
龜胸高脹比狀如龜此肺經受熱所致也乳母酒麵無度或夏月熱酒熱乳與兒得之或乳母多食五辛亦成此候
川大黃[illegible]　天門冬去心　杏仁去皮尖　百合
木通　　桑白皮炒　甘草[illegible]　石膏各[illegible]兩
右末煉蜜圓綠豆大每伍圓食後臨臥熟水化下
龜背證治
小兒生下不能護背客風吹脊入於骨髓致之或小兒坐早亦致佝僂背高如龜雖有良方然此多成痼疾間有灸法收功肺俞穴第三椎骨下兩傍各壹寸半膈俞穴第七椎骨下兩傍各壹寸半以小兒中指中節為壹寸文灸艾炷如小麥大但灸伍壯而止
臍病證治
[illegible]治臍中汁出或赤腫
白石脂末[illegible]出火氣傅之日三度或[illegible]灰傅或[illegible]傅
[illegible]
當歸末傅[illegible]灰傅亦好
鶴節證治
小兒稟受不足血氣不充故肌肉瘦薄骨節呈露如鶴之膝亦腎虛得之腎虛則精髓內耗[illegible]中不榮易為邪氣所襲日就

右件其豬蹄之節以前項[illegible]加[illegible]酥炙川
[illegible]參貳錢修合服[illegible]同參錢以下[illegible]以上[illegible]
伍圓

行遲證治

骨者髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨故軟弱而不能行
抑亦肝腎俱虛得之肝主筋筋弱而不能束也

[illegible]圓方見[illegible]門加牛膝五加皮酒炙[illegible]

又方[illegible]圓

麝香[illegible] 生乾地黃 酸棗仁去皮炒香
白伏苓 辣桂 防風 當歸
川芎 牛膝等分

右末煉蜜圓麻子大每伍圓酒調下或煎木瓜湯下

五加皮散治小兒參歲不能行

真五加皮 牛膝 酸木瓜乾各半分

右為末每服壹錢半以粥飲調次入好酒貳點再調食前服
日貳服

癩疝證治

癩疝者陰核氣結腫大而為痛也多因小兒啼怒不止協動陰
氣故陰氣下聚結聚不散而得之或胎婦啼泣過傷令兒生下
小腸氣閉亦致此候推是陰氣不得流行加以風冷入焉血水
聚焉故水氣上乘於肺先喘急而後疝痛其狀有如李者亦有
稀軟者亦有并腎腫大者亦有不疼者臍下痛甚皆不能忍用
藥行心氣逐腎邪利其大小二便更無捷法

[illegible]散方見水飲門 木通入少許煎湯調下以利小便

[illegible]散

陳桂 牽牛[illegible] 當歸
[illegible] 桃仁[illegible] 全蝎[illegible]

右銼散每壹錢水入[illegible]煎服以利大便利後[illegible]

木香[illegible]圓和胃[illegible]治

川楝[illegible]散治小兒疝氣小腸痛引腰脊[illegible]身不能直

木香 檳榔 三稜 蓬术[illegible]
青皮去白 陳皮 川楝肉 芫花[illegible]
辣桂 牽牛[illegible] 川巴豆肉[illegible]

右細末飛麪糊圓麻子大每參圓空心溫服午前壹服薑湯
送下

瘡瘍證治

[illegible]黃方治小兒白禿[illegible] 雄黃[illegible]

鯽魚[illegible]

右同末生麻油調傅先以鹽水洗拭後用藥

又方 桑榆白皮為末醋調傅

又方 楝樹枝皮燒豬骨調傅

又方 蛇皮燒存性為末豬脂調傅

[illegible]方 煉成松脂末并髮灰生豬[illegible]調傅

[illegible]方 白膠香半兩[illegible]研和豬脂調傅或
豬骨髓調 白[illegible]亦治大風[illegible]投冷水中為末
水調空心常服

[illegible]方治卒得瘡瘍 赤爛[illegible]燒灰研細傅

[illegible]方 瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿
蛇退皮燒存性細研豬[illegible]清調傅

[illegible]方 [illegible]研細豬脂調傅

[illegible]方 水銀[illegible] 胡粉[illegible]水研入雞冠血傅

[illegible]散治小兒頭瘡[illegible]
穿山甲前膊[illegible]焦為細末麻油輕粉調傅

# 瘡疹

## 瘡疹方論

小兒瘡疹大抵與傷寒相類發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠嗽喘痰涎傷寒證候類有之始發之時有因傷風傷寒而得者有因時氣傳染而得者有因傷食嘔吐而得者有因跌撲驚恐蓄血而得者或為竄眼驚搐如風之證或為口舌咽喉腹肚疼痛之狀[illegible]或為煩躁狂悶昏睡譫語之形或自汗或下利或發熱或不發熱證候多端卒未易辨方論所載以耳冷骫冷足冷驗之蓋謂瘡疹屬陽腎臟無證耳與骫及足俱屬於腎故腎之所部獨冷然疑似之間或中或否不若視其耳後有紅脈赤縷為真於此可以稽驗矣調護之法首尾俱不可汗下但溫涼之劑兼而濟之解毒和中安表而已如欲解肌乾葛紫蘇可也其或小兒氣實煩躁熱熾大便秘結則與犀角地黃湯或人參敗毒散輩又或紫草飲多服亦能利之小便赤少者分利小便則熱氣有所去而出凡熱不可驟遏但輕解之若無熱則瘡又不能發也已發未發並與紫草飲[illegible]蓋虛者益之實者損之冷者溫之熱者平之是為權度借喻而言亦如庖人籠蒸之法但欲其松耳如苟妄汗則榮衛既開轉增瘡爛如苟妄下則正氣內脫變而歸腎[illegible]何者為順反熱眼合肚脹其瘡黑壞十無一生[illegible]五臟各有一證未發則五臟之證悉具已發則歸於一臟見之故肝臟水疱[illegible]肺臟膿疱[illegible]心臟[illegible]脾臟[illegible][illegible]腎[illegible]取火也[illegible]取水也以火用事[illegible]卒不治哉然則發黑陷者何如曰先瀉膀胱[illegible]

黑陷錢氏云黑陷青紫者百祥丸下之不黑者謹勿下余知其所下者瀉膀胱之邪也[illegible]或寒戰咬牙為逆余知其脾強者土可以制水也百祥丸太峻當以宣風散代之瀉後溫脾則人參[illegible]是多半為妙蓋瘡發肌肉陽明主之脾土一溫胃氣隨暢獨不可消膀胱已泄之邪水乎此錢氏不刊之秘旨也雖然瘡黑未為惡證治之有方猶有幸而生者至於調攝之際乳母不能謹口以流毒於小兒或嬰乳不時使之飢虛或衣被不遇致傷風冷以至[illegible]外邪有時則亦冰硬燥黑而歸於腎自我致寇又誰咎耶能調護者以溫散[illegible]乳哺之[illegible]風寒使之氣體和適其衣[illegible]勿令飽而[illegible]飢而內疏斯得矣此尤在家[illegible]者焉

## 瘡疹備論

瘡疹之論餘漢以來其詳可得聞也[illegible]自宿鶴翁公作古以為嬰孩湯散當先和節陰陽調治榮衛乃利臟腑即熱氣漸解而董汲張渙初虞世楊真子諸醫咸贊為確每曰瘡疹證候初發即疏利之以宣其毒又曰已出者不可疏利瘡出已定卻用利之余竊疑焉蓋嘗深索古書早見其謹護持重不直曰利臟腑而必以和陰陽調榮衛先之則知古人所謂利者蓋流行之謂初非剪決峻下者比也況曰已患之後[illegible]大小便不通不能調湯劑以和之[illegible]曰已出者可服平和湯劑[illegible]小便不通調劑以和臟腑[illegible]敗熱於其間是古人之利大肝臟解其敗熱以防熱毒攻服是其解熱又易[illegible]不用和平之劑乎然則破諸家似是之非開後世未明之惑惟錢氏[illegible]宋氏活人書其說為甚正錢氏解瘡疹證候惟用溫涼藥治之不可妄下不妄吐[illegible]朱氏曰瘡疹[illegible]未發[illegible]不可疏轉此為大戒又曰瘡疹首尾皆不可下[illegible]用利藥則毒氣入裏殺人以此

觀之痘疹證狀雖與傷寒相似而痘疹治法實與傷寒不同傷[illegible]

[illegible]

[illegible]之類則可以調護矣繼自今小兒凡覺身熱證似傷寒但未經痘豆疑似未明且先與[illegible]或人參[illegible]或草熱甚則與[illegible]人參[illegible]豆已出則少與化毒湯出不快者[illegible]木香[illegible]或[illegible]太盛者人參[illegible]小便赤澀者[illegible]便秘結內煩外熱者[illegible]加[illegible]或小小[illegible]喉痛者[illegible]腹脹痛者[illegible]加[illegible]下利嘔逆者[illegible]下利[illegible]陷入者[illegible]其足噴其衣服併以厚綿蓋之若猶未也[illegible]調劑或不用酒則[illegible]煎湯若其瘡[illegible]黑乃可用錢氏[illegible]加[illegible]主之然而瘡疹用藥固有權度大便小便不可不通其有大便自調所下黃黑則毒氣已減不必多與湯劑但少用[illegible]可也大小[illegible]則腸胃壅塞脈絡[illegible]從而發泄[illegible]不擇[illegible]而皆發[illegible]搐而後發瘡者生瘡[illegible]而後發[illegible]或吐或瀉者死[illegible]利而後瘡出者[illegible]瀉不止者[illegible]痂皮若順[illegible]瀉血而水穀不化者[illegible]血而痠[illegible]無膿者亦不可救[illegible]

可一日而不強也世俗無知每見瘡疹不論男女[illegible]用[illegible]以傳其身內消毒物以充其腹猥曰使瘡出決其閒兒氣本怯或遇天時陰寒猶可扶之而[illegible]若春夏之間陽氣發越或兒氣素強酒熱助之則以火濟火[illegible]熱熾盛焉血聚瘡出愈艱亦或為之黑陷當此之時能用[illegible]前湯入生犀[illegible]和[illegible]少許以解之猶可指手或者更與熱毒之物復使咽喉結閉耳目口鼻腫滿悉平大便秘堅小便出血而死矣又或妄施巴豆取積之劑則臟氣暴脫熱又不除邪氣愈甚[illegible]為喘滿使血凝結殘裂而死矣吁自詒伊阻如是其可畏哉雖然瘡亦有再發者特間有之瘡皮厚而色頑濁者發於臟其候重瘡皮薄而色精明者發於腑其候輕臟熱則為豆瘡腑熱則為細瘡熱重者瘡亦重熱輕者瘡亦輕平復以後須清解餘毒[illegible]人參[illegible]常須與之否則敗熱留於肌肉之間亦令四肢肉膩或癰腫而不[illegible]更餌之以毒必致纏綿患痕腮腫兒口撮[illegible]欬之甚者潰爛成片者[illegible]乾傳膿多痛甚者乾[illegible]主之不傳之瘡在口中痛不能食者[illegible]或注蜜陂痕[illegible]取汁嗅之爲佳凡瘡欲成痂頭以[illegible]之可挹即挹血出無害若乾硬已久必成瘢痕如茶如豬肝豬血之狀與食之則已脫之遲必為之黯然而痕痂已脫肌肉猶嫩不可盥洗太早亦不可以手加之也[illegible]能辟惡氣左右所不可無或[illegible]用之亦可瘡[illegible]而[illegible]七日而乾又七日則平復如舊矣大抵調順血氣品和腑[illegible]平冷熱則瘡出為易[illegible]實實虛虛損不足而益有餘則瘡出為易難調解之法無以逾此故備論之以解世俗之惑云脉證于後

瘡疹證候

瘡疹[illegible]自[illegible]眼睛[illegible]目脹亦[illegible]足亦[illegible]手足冷耳尖冷[illegible]身熱或乍涼乍熱頭痛腰背痛咳嗽噴嚏呵欠

煩悶搐搦驚悸昏昏多睡。小便赤少。大便不通。不惡寒。惟腰痛
方其身熱未即發斑。若其身涼然後發出。三部脈洪數弦乘
大小不準指而疾。

瘡瀉治法

一曰內虛泄瀉。二曰外傷風冷。三曰變黑歸腎。蓋內虛泄瀉者
或因臟腑虛怯。其證已逆而發以來自然作瀉。或未發之前誤
服涼藥以致泄下。凡此者其瘡未發。搐形見小點。淡紅而白。或
白而微黃如水泡之狀。治之當用人參白朮散加木香湯調
下。先與止瀉。然後以溫和之劑發之。外傷風冷者。或因煩燥惡
熱。出頭露面。點點方萌。遂為風冷所折。或發出如珠。或與解脫
以取涼快。而風冷襲之。凡此者輕則其狀如蚤。色紅而不發。重
則陷如石巨。脚色白而冰。遂治之當溫血散寒邪。用不換金正
氣散加川芎[illegible]甚則更加官桂[illegible]然後用發瘡之劑。或
內虛泄瀉。或外傷風冷。陷由經日胃氣損。由是而變壞。為黑
今其毒反熱甚。其瘡青紫變黑。此則腎證。蓋黑者北方水
是以其色黑。其證逆。治法先瀉膀胱之府。而後急與溫脾。若其
瘡不黑則斷非腎證。誰不可下。請[illegible]之。瀉膀胱。先用[illegible]
宣風散[illegible]等分為末每服一錢[illegible]調下。次用[illegible]一錢
加[illegible]煎服。若瀉下黑物急以[illegible]劑救之。有甚為陰邪
穢氣所傷。亦令發變。可用[illegible]解之

論升麻葛根湯

升麻葛根湯按和劑方。瘡疹已發未發者皆可服。世俗皆為常
談。不問小兒虛實冷熱自真否。率多用之。其者方發而不快
既發而復陷。亦以升麻葛根湯為常用之劑。其為害可勝嘆哉。何者
葛根解表。升麻性寒。小兒氣弱。病熱多服之。猶可以消毒。蓋瀉一內
虛胃弱則以水濟水。豈不能損胃氣。水凝血脈而瘡[illegible]為之
逆陷乎。夫古人所謂未發者。方身熱尚疑似之時也。所謂已發
者既發而微。欲成瘡之候也。蓋因以發而不快。與發而復陷爲可

用治之哉。況不辨明為恐世俗相傳枉死者半矣。又況人之稟
受大氣未壯。或若相引發瘡陷。不益者不問虛實一概用之。其害
又有甚於升麻之不當也。蓋瘡疹隨陷有因外感風寒而
發之者。治法則當解散寒邪。有內氣大虛保護不得調暢而出
不快者。治法則當和氣脈安可概以冰冷直用人參[illegible]逐使小
兒服之。[illegible]解[illegible]治其發出。稍遇寒冷。往往坐此而不救者為
不用[illegible]為何哉

瘡疹惡證

瘡疹屬陽。其真多為順。故冬為逆。冬月寒盛。腎水得時多歸於腎
或先如瘀後發瀉。其瘡色如鐵血。此腎證也。不治。○初發為
金。肚不可見黑。為水尅火。秋旺之子為火尅金。冬春之子為土尅水
並逆。○舌黑。或鼻有黑氣。並不治。○瘡已出而譫語者為惡證
○燥渴。小便泄瀉不入食。不治。○瘡成餅。[illegible]不發。其瘡
焦啞。不治。○兩眼閉而黑睛淡。昧暗不治。○面腫鼻乾口閉
頭響戛齒者不治。○頭面腫大。發熱不散。或鼻不可近。或脚冷至
腑並不治。○瘡小黑而[illegible]風。或頭額發黃腫便或閉而突出
不治

小兒諸病但見兩眼無精光。黑睛無運轉。目睛無神。如魚眼
猫眼之狀。皆不治。或神藏於內但外若分因者無妨。其有瘍
貧而眼中神氣不脫者。雖可以治。眼者五臟六腑精氣之所萃
精氣已脫。形雖僅存亦未能保

瘡疹諸合用藥方

[illegible]

前胡去苗　人參去蘆　紫蘇葉　乾葛　先
半夏湯泡七次焙乾切　茯苓去皮各三分　枳殼去瓤麩炒
陳皮去白　甘草炙　桔梗去蘆
右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片棗一枚煎七分去滓微熱
服不拘時

〔惺惺散〕治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱
白茯苓去皮 細辛去葉 桔梗 瓜蔞根
人參去蘆 甘草炙 白朮 川芎各等分
右爲末每服壹錢水小盞薄荷叁葉同煎肆分溫服如要和
解入生薑煎服不拘時
〔[illegible]〕治大人小兒瘡疹已發及未發疑貳之間並宜服
之方見[illegible] 〔[illegible]〕方見[illegible]
〔[illegible]〕瘡豆已發以此消毒
紫草茸壹兩 川升麻 甘草各貳分半
右剉散每服貳錢糯米伍拾粒同煎溫服
〔消毒飲〕方見頭瘡門 〔[illegible]〕加紫草末治小兒瘡豆或發未透或未發初
因青暴呼爲風邪所傷用此主之瘡豆證以耳以尻令足下
冷及耳後有紅縷驗之然須見心細詳細點如粟起則爲真痘
〔加味四聖散〕治瘡豆出不快及倒靨者
紫草茸 木通 南木香
黃耆蜜炙 川芎 甘草等分
右爲末煎壹錢不時服大便秘加〔[illegible]〕少許大便如常加〔[illegible]〕
〔[illegible]〕首糯米解毒解[illegible]而發之
〔紫草飲子〕
紫草壹兩
右剉細百沸湯大碗沃之蓋定勿令氣出逐旋溫服〔[illegible]〕能
導大便發出亦輕
〔又方〕
紫草茸壹分 陳皮半分
右爲末新汲水煎服
〔紫草木香湯〕治瘡出不快大便泄利
紫草 木香 茯苓
白朮等分 甘草少許

右入糯米少許蓋〔紫草〕能利大便〔木香〕〔白朮〕所以佐之也
〔紫草木香湯〕治瘡疹出不快
紫草 人參 木通
茯苓 糯米等分 甘草減半
右剉散貳錢溫服如虛大便利者可入〔南木香〕去〔紫草〕
〔[illegible]〕治瘡豆出不快
紫草 蟬殼 人參 白芍藥各壹分
木通壹錢 甘草炙半錢
右剉散煎貳錢溫服
〔絲瓜散〕發瘡疹最妙
絲瓜連皮燒灰存性百沸湯調下
〔[illegible]〕治瘡出得大盛以此解之 方見諸熱門
〔[illegible]〕治瘡疹壯熱小便不通
連翹 瞿麥 荊芥 木通
車前子 赤芍藥 當歸 防風
柴胡 滑石 蟬殼 甘草各壹錢
山梔仁 黃芩各半錢
右剉散每服壹錢加〔紫草〕煎溫服
〔[illegible]〕方見眼目門 治小兒瘡豆因服熱藥多發而不透
身熱煩悶兩目皆腫連日風搐驚身硬〔[illegible]〕井〔[illegible]〕
〔[illegible]〕調服
〔[illegible]〕方見積熱門 〔[illegible]〕方見[illegible]
〔小柴胡湯〕方見瘧門 〔[illegible]〕方見積熱門
〔大[illegible]〕〔[illegible]〕 即[illegible]
〔二陳湯〕方見諸飲
〔[illegible]〕治瘡豆略出煩渴不止
粉草炙 栝蔞根等分
右爲末煎服壹錢〔[illegible]〕通血脈發瘡苞

## 三豆飲子 瘡豆煩渴

小黑豆　菉豆各一合　烏梅兩箇

右㕮咀新汲水壹椀煎取清汁旋服

## 木香理中湯 即和劑理中湯加木香甘草湯調 方見吐瀉

## 參苓四聖散 方在前 蘇葉湯或用酒煎或用熱酒調亦得

## 猶豫湯

穿山甲湯浸炒令焦黃

右末每服半錢入麝香少許用木香煎湯調下或紫草煎湯入

紅酒少許調下

## 勻氣散

檳榔一箇　陳皮　甘草炙各一分　黑牽牛半兩半生半炒

右細末幼者半錢壯者壹錢蜜湯調食前服

## 四順清涼飲 方見和劑方

## 加味宣風散 治斑瘡豆黑陷以前方宣風散去分氣帳者

外加南木香壹錢每服壹錢蜜湯調下先下黑糞次下褐色糞然

後以和胃藥加丁香服之良久黃糞自纔出又以胡荽酒

煎酒傅其身即得發起

## 調解散 治瘡豆已發或為風冷所折榮衛不和或為宿食所傷

內氣壅遏以致水疱並主之

青皮　陳皮　桔梗　枳殼製

半夏製　川芎　木通　乾葛

甘草炒　紫蘇等分　人參減半

右剉散每服二錢薑棗煎服

## 不換金正氣散 方見霍亂

## 黃栢膏 瘡疹初萌急以此防服

黃栢去皮一兩　新菉豆　紅花各一分　甘草半生半炙

右為末麻油調為膏薄塗眼眶四圍頻用為妙或用胡荽酒傳之

亦可若用胭脂塗亦先塗目

## 人參羌活散 治痘瘡攻眼赤腫用人參羌活散煎湯調下

## 蜜蒙花散 治斑瘡入眼生翳

白菊花　綠豆皮　穀精草各壹分

右末每服壹錢乾柿一枚粟米泔壹盞同煎候米泔盡只喫

柿乾日兩枚

## 通聖散 治斑瘡翳眼

真蛤粉　蟬蛻去足各一分入焙研

右細末入麝香少許每服壹錢米泔溫調臨睡服

## 治豬眼昏翳風痒方

真杏仁叁伍箇滾水浸去皮尖

右細嚼和津液吞五更端坐常服杏仁潤肝去風痒也

## 又癖方

生綿油以針刺其血旋盛之點入霧上自愈

## 小兒方 一二歲發熱恐成瘡豆以此止之

生麻油　童子小便各半盞

右二味旋攪和以柳枝頻攪令勻溫服貳蜆殼許服畢令小兒

少時但令肆暖大小便利身體熱退仍不成瘡豆之證若形

證已露則不可服也

又以手蘸麻油摩其背脊中間亦驗

## 灌藥服藥法

小兒時藥以銀器盛水半盞淀藥多又加多焉其或不能灌藥則

以匙送下服藥未盡旋旋與之藥性溫熱乳食前服藥性寒涼

乳食後少頃服和平之劑隨意無拘

## 察小兒眼中神法

凡小兒病證雖可其而大體有脈神氣未脫顖門未陷顏色猶

中未至黯黑者猶可為力雖然五臟六腑之精氣皆上注於目

望而知之當先以目中神氣為驗

新刊仁齋直指小兒方論卷之五

脉訣一書世之宗叔和者尚矣其間
複或有所未諭焉余於暇日采摭前哲
和為經以百家為緯講明指要條析件畫
目曰醫家真經經者理也蓋先哲未言之蘊
而撰之理經者正也約諸子異同之說而
歸之正診視活法瞭然在目求之有餘師
務与叔和俱来者之意也劉元賓自序脉
括有曰覽之者不知以我与叔和為如何
余則曰不知是篇与元賓之書又如何景
定壬戌七月既望三山楊士瀛登父序

# 醫學真經 察脉總括


三部九候論　臟腑部位論
診候論　脉病消息論
脉病逆順論


## 脉訣


臟腑定位　七表脉狀
八裏脉狀　七表主病
八裏主病


## 七表脉


浮脉病證　芤脉病證
滑脉病證　實脉病證
弦脉病證　緊脉病證
洪脉病證


## 八裏脉


微脉病證　沉脉病證
緩脉病證　濇脉病證
遲脉病證　伏脉病證
濡脉病證　弱脉病證


## 九道脉

附 雜證脉


長脉證狀　短脉證狀
虛脉證狀　促脉證狀
結脉證狀　代脉證狀
牢脉證狀　動脉證狀　細脉證狀
心部諸脉證　肝部諸脉證
腎部諸脉證　肺部諸脉證
脾部諸脉證　五臟平脉
病脉大者順　病脉小者順
太衝尺脉　脾胃有脉
陰陽脉證順逆　溫汗下脉法
有孕無孕脉　胎婦脉
察病識法　五臟所主
心病虛實證　肝病虛實證
腎病虛實證　肺病虛實證
脾病虛實證　察色聽聲
面目察色　面色逆順
口味　聲志　虛實
論[illegible]脉　論絶脉


醫學真經目録終

# 察脈總括

三山名醫仁齋楊士瀛登父編撰
建安儒醫翠峯詹宏中洪道校定

## 三部九候論

三才天地人，三部寸關尺。凡人左右手分寸關尺者，六脈之要會也。寸部為陽，取法於天；尺部屬陰，取法於地；關部陰陽相半，蓋取諸人。合三部，凡一寸九分。寸在前，尺在後，而關處其中也。從關至魚際陽得九分，有奇數；從關至尺澤陰得一寸，有偶數。其關前為陽，其脈常浮而速；關後為陰，其脈常沉而遲。關居兩境之間，介乎一陰一陽之上，可以通天下，可以通地，陽出陰入，以關為限也。是以寸部脈病，病在頭目胸膈之上；關部脈病，病在腹腸胃脘之中；尺部脈病，病在臍腹腰腳之下。三部之內，各有浮中沉，此之謂九候。候者，隨其浮中沉舉按而消息之。浮為陽，陽脈行之於皮膚；沉為陰，陰脈行之於筋骨；中為胃氣，胃氣行乎肌肉之中。浮者病在表，沉者病在裏，胃氣居中，若其無，人之本敗。所謂魚際、尺澤，又不可不知也。寸上一分，掌骨後際，如魚之頭際，故曰魚際；尺脈之外，肘脈入而不出，如入深澤，故曰尺澤。有其名必有其義。不（六脈無虛亢疾須以胃氣為本）

## 臟腑部位論

左心小腸肝膽腎，右肺大腸脾胃命，此臟腑一定之位，而男女不可易者也。別而言之，左手寸口心臟脈所出，小腸為之府，心與小腸合而居乎左寸一部也；右手寸口肺臟脈所出，大腸為之府，肺與大腸合而居乎右寸一部也；左手中關肝脈出焉，膽者肝之府也，肝合於膽而居左手之關；右手中關脾脈出焉，胃者脾之府也，脾合於胃而居右手之關；腎臟之脈出於左尺，府曰膀胱，腎與膀胱合，即左手尺部取之；命脈之脈出於右尺，府曰三焦，命與三焦合，即右手尺部取之。腑者陽也，其脈在上；臟者陰也，其脈在下。浮之為陽，脈諸陽主表；沉之為陰，脈諸陰主裏。此臟腑之所以合氣，而人身之所以具此陰陽也。然左右手寸關尺之部，五臟何以分定位耶？曰：心者君主之火，君取其尊，火性上炎，故居左寸。肝者心之母，母上生心火，木位東方，故居左關。腎者肝之母，母上生肝木，水性就下，故居左尺。肺為五臟華蓋，覆之於上，金生於土而居右，故居右寸。其所以下生腎水者，順水之性而生之也。脾為中州中央之土，下禀心包絡相火之氣，上生肺金，故居右關。其所以為中也，果非五臟之不可易者乎？異同然尔。胃與脾並位，其應右關，又何以氣行乎諸臟腑？曰：人以穀為生，而受氣於穀，穀入胃而傳氣於肺，五臟六腑皆取氣於胃。其清者為榮，其濁者為衛，榮行脈中，衛行脈外，周養一身，况飲食貴以胃氣為本。古人所謂有胃氣則生，無胃氣則死，而生死雖多，不使飲食之氣者是何？况夫胃合土家之氣，若五行之主，而浮中沉三候，其中各有胃氣之脈存焉，此其所以氣行諸臟也。

或者又曰：小腸為受盛之府，大腸為傳送之府，膽者清淨之府，胃者水穀之府，膀胱津液之府，府之名有五，而謂六府，何哉？蓋三焦為右尺命脈之府，自膈以上曰上焦，位居膻中；自臍以上曰中焦，位居中脘；自臍以下曰下焦，腎間之動氣應焉。三者熟化水穀，引導陰陽，分別清濁，宣行榮衛，所以主持諸氣，有其名而無其形者也。然而右尺之命脈與右腎之命門，又若同而實異耳。右尺之命脈，即心主包絡者，是三焦為之府，取象於相火，相行其心君，火之命宣流氣血，一名膻中，上朝膈戶，下接元陽，七氣與子午相為流通，蓋得陰中養陽之候。難經有曰：五臟六腑經十一耳，其一經者，心主脈也。心主與三焦為表裏，俱有名而無形，後設圖而明之，曰手厥陰心包絡之經者，正謂此也。若夫右腎之命門，謂腎有兩物者，是左為腎以藏志，右為命門以舍精，腎主納氣，收血化精而運入命門，長養骨髓，故男則化

而為精女則蓄血而主月事兩者很尾水而氣實相通難經有曰命門者諸神精之舍元氣之所繫男子以藏精女子以繫胞者此之謂也學者但觀俗呼小便曰水大便曰火則知左尺膀胱腎滑腎水右尺三焦熱穀食皆合膀胱左尺之脈純乎水命合三焦右尺之脈純乎火水火之義不待辯而自明矣然則右手尺部其經手厥陰其臟心包絡其腑三焦其名命脈決非命門君子於此究見定為命門玉函可隅反而類推矣雖然左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命叔和契而冠脈書之首若人不可以易此也後繼之曰女人反此背看之尺皆五臟六腑其果固殊於人乎抑是論男女尺脈沉弱浮盛之不同耳蓋陽從地長也氣上騰故男子尺脈常弱而沉二陰從天生天氣下降故女子尺脈常盛而浮男子陽多而陰少其脈多應於關上所以寸盛而尺弱女子陰多而陽少其脈多應於關下所以寸沉而尺盛故男子不可以久瀉女子不可以久吐男得女脈為不足以陰主內故病在內女得男脈為太過以陽主外故病在四肢左關之病在右右關之病在左不足者虛太過者實二者皆不得其平也甚之謂反反之為義蓋男子尺脈當弱而今反盛女子尺脈當盛而今反弱故也否則如褚澄所謂婦人左手寸下之關為脾關下之尺為肺右手寸下之關為肝關下之尺為心自附其説於反此背看之例寧不左道以惑衆耶五臟六腑既移易位況彼其不謬於診耶世為神農學者當以尺脈第三同斷病之語為的大陽以黃帝陽曰來聽

## 診候論

凡人平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進血脈未亂於斯時也清明在躬志氣如神一診之餘洞見所蘊若有緩急設不可以此為拘亦須俟持端坐平心定氣勿動勿言俟其定而後應之以下指之法三指齊按不若一指隨部之為精三指齊按亦以定寸關尺之大略可以知浮沉遲數之大綱至於每部各有浮中沉之法三部分而九候皆是也一説診脈以三指定明寸關尺然後用矣況夫心肝脾肺腎各有浮沉陰陽平分而各有部位而人之五指中指差長或伸或短或緊按之次既有輕重之不等寸若診被復書但用一指隨部按之得其情況三部之脈大約一寸九分人之長者僅知之寸中人以下多不及此分寸也究其指微關之部位於肌肉陰陽高中取其關而上下分之則人雖長矮不能出三部之外亦隨其長短而自定矣凡人先按關以次及於關尺次及尺部關下指初則輕按消息之次則中按消息之又次則沉按消息之浮以診其腑沉以診其臟中以診其胃氣於是擧指而上按指而下又緩緩指進退而消息之心領意會中得八九然後三指齊按候其來去緩急以審何如耳肺之脈取以三菽在皮毛之間取以六菽在於血脈候脾以九菽按至肌肉候肝以十二菽按與筋平若骨而得之候腎者其推腎家之脈也然而右尺之診六腑之脈又何以推耶華佗以尺澤之診雖當重手按之而右尺象六腑之則浮而上也所以六腑之氣其下者氣為其上者為浮也下六十取之可也斯病之法因時四季之節脈若為五臟六腑候脈沉之極抑而病機此之脈驗彼之證灼見其病機皆病之顛陷其虛實而直指之立説可以決病機矣所以其所以之氣然後可以取病人之息人以一呼一吸為一息一息之間脈四至者為平脈五至為太過六至為數謂之不及則謂之損至脈離經一息六至損脈離經至至脈奪精二息一至損脈奪精一息一至離經者離其正脈氣之數也奪精者精氣消神氣亂精神散脫之兆也然則和平之脈何如哉曰不大不小不短不長不緩不急不促不緩不急不結不代三部之中各指按常然而見其脈動至和此和臟腑和此其所謂和平之脈也否則尺寸參差上下呼吸心法或動失紀綱而不平矣古人之惜對於此

脉與形氣相得乎否也人有長短小大老幼強弱而脉亦如之性有剛柔緩急動靜之不一也而脉亦如之形氣不相得者為形氣相背危形氣反者難治陰陽反戾作數此雖純而不全者其難可言得也何則人長脉亦長人短脉亦短老者脉沉少者脉浮老者脉衰少者脉盛性急者脉疾性緩者脉遲性剛者脉強性靜者脉和凡此皆順順則生也其或人長而脉短人短而脉長人大而脉小人小而脉大人壯而脉弱人羸而脉強性急而脉緩性緩而脉急凡此皆逆逆者幾何而不殆哉又況稟賦之殊彼此風氣之腠不同草布之緻踈纖錦之堅亦異其於平時嗜好飲食居處勞逸與夫臨病之喜怒憂懼驚恐五色所形五味所欲寒不齊者經所謂以所喜者勝之以所惡者攻之尤當明辨審思而執劑也有能參其證之有表有裏驗其氣之有虛有實度其剛者之易為熱柔者之易為寒實則瀉之虛則補之不實不虛調而平之此則了然於心智與神融而易於斟酌必有擇之精者

脉病消息論

脉者血也息者氣也脉不自動氣為之使然則人之脉乃其氣血之先見也故氣血盛則脉盛氣血衰則脉衰氣血熱則脉數氣血寒則脉遲氣血微則脉微氣血平則脉和消息盈虛其驗如此浮為風為虛沉為水為實遲為寒為冷數為熱為煩大為痛為痞弦為勞為瘧洪為熱為狂滑為痰為吐緊為痛實為下動為驚為痛為勞拘急則弦風結則緩氣聚則實氣乏則散急弦風熱洪數伏陽沉冷微寒伏積實滿濇為霧露所傷為寒傷暑者虛緩中濕者沉細亂夫血而溢血而漏虛損而弱筋痿風則浮虛寒則牢堅沉潛水蓄支飲急弦結甚則積甚結微則積微澀則血少而氣多滑則血多而氣少以至陽弦頭疼陰弦腹痛陽微自汗陰微自下陽數即吐陰數即瀉陽微心寒陰滑食注陽惕陰惕浮大之脉為陽屬病以晝加沉細之脉為陰屬病以夜作七表之脉屬諸陽腑病易治八裏之脉屬諸陰臟病難瘥

知乎此則是脉之雖百變若形可驗矣諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸氣膹鬱皆屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸熱瞀瘛皆屬於火諸痛痒瘡皆屬於心數為熱在腑遲為寒在臟浮而盛者病在表沉而實者病在裏浮而緊者痛在外小實而緊者痛在內短而急者病在上長而緩者病在下上盛則氣高下盛則氣脹前大後小頭痛目眩前小後大胸滿氣短脉出魚際喘急逆氣呼吸不足胸中氣促上焦之病寸脉主之中焦之病關脉主之下焦之病尺脉主之其臟有證又以其臟之脉參之積陰氣也陰沉而伏發有常處痛不離其部聚陽氣也陽浮而動發隨上下痛走注不常氣來實強謂之太過其病在外氣來虛微謂之不及其病在內而不外心腹積也外而不內身有熱也下而不上腰足清也上而不下頭項痛也至如諸有水氣目下微腫蓋水者陰也腹者陰也目下亦陰也氣類相從有諸中必形諸外矣然而腎之與肺皆積水也其本在腎其末在肺腎氣上逆則水氣乘於肺中故喘而嗽腎為水臟也知乎此則受病之要為可推矣又傷於寒春必病溫傷於濕夏必飧泄夏傷於暑秋必痎瘧秋傷於濕冬必咳嗽喜則脉散而氣受之怒則脉激而氣上悲則脉縮而氣消恐則脉沉而氣下驚則脉亂而氣亂思則脉滯而氣結勞則脉動而氣亂寒則氣收熱則氣泄思則氣結勞則氣耗久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋體中有寒故能急而攣痛體中有熱故緩弛而不收遇寒若逢寒則皮中癢如虫行遇熱若逢熱則四肢縱而不能收濕傷形而不傷氣寒則衛氣不利也暑傷氣而不傷形熱則氣消也大腸小腸有以寒作痛者有以熱為痛者有以熱不調而使數者五色見面黃亦有為熱白者為寒青黑則痛無以加矣大凡邪客皮毛則腠理開腠理開則邪入客於孫絡脉滿則邪入於經脉經脉滿則邪入於腑臟積留腸胃水有其出也其若脉來乍大乍小乍短乍長乍去乍來錯雜無常此則

汗渠然之知乎此則得病之所為可攻可治只實則瀉之虛則
補之陰陽相搏損益治之或虛微弱者可溫浮溢洪緊者可汗
弦而小緊以至滑實與肌肉相得者可下勿汗勿溫勿吐虛細
勿吐脉微此為大戒所貴乎識病標本消息虛實從逆邪
氣盛者直攻之病在於血當調其榮病在於氣當調其衛氣燥
隔則與之消暑除煩之劑寒氣凝則與之溫中散寒之劑以
得病之滲其濕與風受邪為之法其虛禮中有寒[illegible]
則治之以溫禮中有熱蓄經不收則治之以寒用其寒熱欲
逐熱其寒也熱者寒之散者收之抑者散之燥者潤之急者
緩之堅者耎之脆者堅之有餘損之不足益之形不足則溫之
以氣精不足則補之以味食酸以收之食甘以緩之食鹹以耎
之食苦以堅之泄之食辛以潤之散之酸走筋故收甘走肉故
緩鹹走血故耎苦走骨故堅辛走氣故散其形若者而越之以
病在上而湧吐之也其下者引而竭之以病在下而利導之也
詳觀本草藥性之寒熱甚其病情則識症狀既知其病之用其藥
證以脉辨藥因證尋其以上熱下冷上熱下寒[illegible]吐
而痰證依指反者又當精思審察斟量增減而調護之知乎此
則治病之方又有得其所謂活法者矣雖然浮與芤相若弦與
緊似同緩與遲滑與數差於毫釐之間伏之與沉濇之於
微虛之於弱大抵相類有如脉訣所謂一陰一陽沉於浮而長一
陽二陰長而沉濇一陰二陽浮而長時乎一沉一陽一陰沉
濇而短時乎一浮者是三部之脉雖有異行學者又當熟此而
究之也故扣有曰在心易了指下難明亦在乎人變之而已由
能熟之則浮芤相搏中風亦浮沉滑相搏中風比之[illegible]洪
中風下病浮緩與中風相似乎也之脉中[illegible]
中風發熱與一為何食以此推其義可以刃而解矣
素問云夫不得臥而臥則喘者水氣客之也
水者循津液而流也[illegible]水[illegible]津液生[illegible]



與喘也○凡肚皮痛者蓋脾虛不能制腎水
水氣流走肌肉之間當用溫脾逐水劑○
虛腫用藥固當溫脾頭氣逐水雖此不可無
活血之劑蓋水是肌肉之間則血化為水其
之但腫凡虛腫者面面黃身無血色黯慘
不寧以此可知也
脉病逆順論見直指方一卷內

# ○脉訣

## 臟腑定位

左心小腸肝膽腎　右肺大腸脾胃命
命脉外診三焦病　腎家之腑是膀胱

## 七表脉狀

浮按不足舉之強　芤脉中空有外傍　滑體如珠行有力
實形過過壯而長　弦如平按緣弦狀　緊若牽繩急轉撥
洪緊按之皆滿指　此為七表屬諸陽

## 八裏脉狀

脉微如有又如無　沉舉全無按有諸　遲緩一息三至[illegible]
濡來散細軟如虛　伏須附骨其形隱　弱軟而沉快快如
濇似採刀輕刮竹　陰象八裏載書

## 七表主病

浮主中風芤失血　滑吐實瞞分明別　弦為拘急緊為疼
若是洪來多發熱

## 八裏主病

微寒沉氣遲風結　滯血須知其脉濇　伏則積聚濡人寒
濇弱多虛[illegible]

## 九道脉

[illegible]者陽也[illegible]之不足與之有餘濇損浮[illegible]

浮脈病證

浮脈多因外中風　寸浮頭痛熱來攻　關浮腹脹胃虛空

尺見二便秘不通 [illegible]

芤者陽也浮大而軟尋之中空傍有[illegible]

芤脈病證

芤為失血熱妄流行　吐衄浮流寸口經　關中腸癰腸中痛

尺部下血[illegible]形 [illegible]

滑者陽也往來流利如盤中珠重手則伏不進不退

滑脈病證

滑脈膈嘔吐時　寸曾氣逆[illegible]　尺閒便血腸中痢

月信難通不主之 [illegible]

實者陽也舉按不絕逼逼而長其動有力

實脈病證

實為熱毒陽居　寸實胸中熱有餘　關實[illegible]

小便澀脹尺求諸 [illegible]

弦者陽也按之不移舉之應手其來端直狀如絲弦

弦脈病證

弦脈勞疾拘急然　寸弦寒痛[illegible]前　關弦[illegible]

尺脈臍間并小[illegible] [illegible]

緊者陽也其來勁急按之則長舉之亦彈如[illegible]之狀

緊脈病證



[illegible]為疼痛見頭間　寸緊夾頭關腹中　尺部[illegible]來臍下痛

熱[illegible] [illegible]

洪者陽也按之極大數之似然脈脹而上其動滿指

洪脈病證

洪之為熱屬於陽　寸主心胸及膈傍　關則胃間多熱壅

尺中經澀腸[illegible] [illegible]

微者陰也指下依稀其來輕細若有若無

微脈病證

微而為證多寒虛　腹內疼兮冷氣頑　寸口上焦[illegible]

關於心胃尺臍間 [illegible]

沉者陰也輕手全無重手乃得其如綿裹砂之狀 [illegible]

沉脈病證

沉主水兮冷氣攻　寸沉寒飲在胸中　關沉氣短心疼痛

尺數小便腰腳疑 [illegible]

緩者陰也往來徐而來指下和軟舉之如楊柳舞風小於遲脈特

一閒耳

緩脈病證

緩乃風邪頭痛餘　寸於肩項及風痺　關中胃弱風攻腹

尺[illegible] [illegible]

澀者陰也[illegible]如來細而遲有如刀刮竹之狀

澀脈病證

濇為血少之形 寸濇傷生閉不行 心血氣衰兩濟
尺閉足冷脛中鳴
[illegible]

遲者陰也重手按之隱隱然呼吸三至去來極遲有力於
遲脈為寒本臟虛 寸遲心痛冷氣 關遲…腸閉冷
遲脈病證
腰脚疼…尺遲
[illegible]

伏者陰也沉隱不出呼吸本甲重指着骨略得之矣
伏脈病證
伏脈積冷積聚中 寸伏氣逆暖於胸 當關伏…洩泄
尺伏疝瘕攻
[illegible]

濡者陰也虛軟無力應指散細輕手乍來重手却去
濡脈病證
濡脈真陽已久衰 汗多氣怯寸中濡 關濡…
尺部…
[illegible]

弱者陰也…而沉細怏怏不前按之似絕不能舉之則無
弱脈病證
弱脈如…筋已痿 陽虛寸弱汗淋漓 至關…
尺弱…
[illegible]

長者陽也…如竿過於本位
長脈證訣



長脈居中狀若竿 尋之太過度三關 …陽…
大抵消腸始得安
[illegible]

短者陰也狀如米粒來去中間有…之不及本位
短脈證狀
…於前上去來頭 中有似無米粒形 宿食不消…
長噓短氣下之醒
[illegible]

虛者陰也狀如…而遲按不足
虛脈證狀
…軟而遲散浮 肉皮之上…楊花 如…
多汗…
[illegible]

促者陽也貫珠而上促於寸口出於魚際數之數多時以止而
復來
促脈證訣
促來頻數出於魚 急慢前前若貫珠 …
漸加不退付長吁
[illegible]

結者陰也…之狀如…旋引旋收聚而…散而還…時以
止而復來
結脈證訣
結者回旋脈在尺 聚而還…來遲 …
腰痛股疼略為之
[illegible]

代者陰也動中有止不能自還因而復動…後止…

則起如更代之代大抵形見於外

代脉證狀

代形筋肉動時浮 時起因而便上留 口不能言元[illegible]
形散枯悴病沉[illegible]

[illegible]

牢者陰也狀如弦華而浮輕手則來重手則散[illegible]

牢脉證狀

牢似浮弦病主勞 脉浮居表附皮毛 胃前[illegible]身紅腫
水火相刑命不[illegible]

[illegible]

動者陰也其狀如豆兀兀然動於內不往不來舉之卻有[illegible]之
過無[illegible]在關部

動脉證狀

動如豆子不流通 其動[illegible]肉中 勞損關中[illegible]血[illegible]
內疼氣[illegible]無功

[illegible]

細者陰也指下如絲如綫下往下來當[illegible]之稍細耳

細脉證狀

細則如絲脉甚微 往來[illegible]下亦何稀 腰疼[illegible]元泄
濇者如何不見[illegible]

[illegible]

右七表八裏九道並法象乎二十四氣

心部諸脉證

心脉[illegible]形比利紅 [illegible]脉中空 [illegible]
[illegible]煩疼面熱風 [illegible]脉舌強 [illegible]血[illegible]
[illegible]虛傷[illegible] [illegible]則[illegible]不通 [illegible]



[illegible]水逆刺心中 若逢三部俱[illegible] 狂燥[illegible]

肝部諸脉證

肝[illegible]失血眼如遲 肝[illegible]面目斜 眼痛[illegible]大[illegible]
[illegible]氣之眼生花 [illegible]來血[illegible]風熱 [illegible]加
[illegible]筋疼頭目眩 [illegible]拘[illegible]邪 血虛腸脹[illegible]
[illegible]筋[illegible] 目[illegible]多[illegible] 三關[illegible]盜汗[illegible]

腎部諸脉證

腎部如何[illegible]脉形 [illegible]腸氣[illegible]精 [illegible]腰[illegible]風攻腎
[illegible]水道[illegible] [illegible]腸淋[illegible]痛 [illegible]耳[illegible]不聞聲
[illegible]間氣 [illegible]腰疼[illegible]行 [illegible]多應下血
小便秘澀色[illegible] 真元虛敗皮[illegible] 三部俱[illegible]冷[illegible]

肺部諸脉證

肺[illegible]大便難 [illegible]不開[illegible]乾 [illegible]
[illegible]來關熱[illegible] [illegible]大[illegible]利 [illegible]毛焦[illegible]不[illegible]
[illegible] [illegible]血熱來[illegible] [illegible]腸鳴[illegible]
[illegible]中冷結看 [illegible]流[illegible] 肺風三部[illegible]

脾部諸脉證

脾[illegible]上[illegible] 消中飢渴日焦枯 中風[illegible]中[illegible]
[illegible]下疼[illegible] [illegible]熱嘔 [illegible]氣[illegible]肌膚
[illegible]腸 肝勝血[illegible]舌[illegible] [illegible]則脾中疼欲吐
[illegible]時食[illegible]轉[illegible] 三關[illegible]象 嘔[illegible]未得蘇

五藏平脉

浮大而散心之常 肝脉[illegible] 肺[illegible]大
沉[illegible]

病脉大省顧

傷寒發熱[illegible] 四[illegible]熱[illegible] 水氣[illegible]小腸氣
積成[illegible]中[illegible] 風[illegible]伏[illegible] 中[illegible]流行[illegible]
咳嗽[illegible] [illegible] [illegible]血[illegible]

一壁癰傷小腸內絕　[illegible]大[illegible]無足慮　[illegible]細[illegible]必難痊
病脈小者順
久欬吐喊食難消　心腹延疼上氣抽　氣快作邪為腹脹
中風口噤或筋抽　汗之不止加身冷　俯逆前衝事來采
下痢泄瀉并霍亂　金瘡傷重血類流　鮮泉吐汁兼腸血
產後損紅月信留　[illegible]皆可治　[illegible]以難瘳
太衝尺脈
寸關無脈已沉昏　脈由指着尺脈存　此理恰如枝葉拌
尚餘生意在其根
脾胃有脈
尺中弱甚似無根　脾胃于今脈尚存　大腑色黃猶進食
斯人數不到泉門
陰陽脈澀順逆
證屬於陽陰脈形　神丹執劑少安平　若還病候閒陰證
陽脈回時又知生

人仙求訣　十

溫汗下脈法
大凡溫藥脈沉遲　[illegible]須知汗可施　脈若來長[illegible]
此為可下不須疑
有孕無孕脈
婦人月信不通行　尺脈來之[illegible]動頻　斷絕其間無孕疾
來而不絕定懷身
胎婦脈
少陰動甚主懷胎　血旺諸經氣[illegible]推　尺滑[illegible]兮中不絕
雙關滑[illegible]胃難開　浮沉二部俱平等　流利相通來往來
下脈切繩珠轉然　[illegible]腰痛產相催
察病截法
浮緊主風或風痺不仁　肝[illegible]主風　[illegible]大傷風[illegible]
或傷於寒或中寒　[illegible]寒[illegible]　[illegible]而[illegible]



[illegible]腎寒　[illegible]而[illegible]肺寒　[illegible]相合　乍疎乍[illegible]寒熱
[illegible]而[illegible]實熱汗下　[illegible]胃熱煩渴熱[illegible]　[illegible]主熱
[illegible]結熱　[illegible]　[illegible]而[illegible]心煩疼
[illegible]心下熱煩亦主消渴　諸脈[illegible]推腎脈[illegible]主消渴
心肝肺[illegible]潮熱　[illegible]虛熱　關脈[illegible]胃熱
[illegible]腎熱　心肺[illegible]吐血
右尺[illegible]三焦熱　[illegible]血實　[illegible]血崩
肝[illegible]數[illegible]而絕下血
[illegible]而堅如彈結　寸[illegible]尺滑彈血塊熱為淋
[illegible]擬痛　[illegible]癖痛　[illegible]癖氣　[illegible]疝瘕
[illegible]耳辨　[illegible]而缺刺痛　[illegible]而鉤脇下刺痛
[illegible]而[illegible]脇下痛　關脈[illegible]而缺氣痛
[illegible]而[illegible]支痛　關脈[illegible]而[illegible]心痛　[illegible]主虫痛
肺[illegible]熱欬　寸口[illegible]氣逆喘急　肺[illegible]大咳嗽
肺[illegible]氣壅　[illegible]大[illegible]滿喘息　[illegible]而[illegible]吐逆

人仙求訣　十

寸脈[illegible]吐　脾[illegible]嘔吐　[illegible]嘔吐　[illegible]停飲
[illegible]停飲　脾脈大有涎　[illegible]宿食　[illegible]宿食
[illegible]而[illegible]病食積　[illegible]胃穀不消　[illegible]而[illegible]積
[illegible]積　[illegible]積聚　[illegible]主中痛　[illegible]筋攣
肝[illegible]筋[illegible]急　[illegible]不往不來亡日　[illegible]霍亂
[illegible]多忤　[illegible]癥瘕　[illegible]癲狂　尺[illegible]二便難
[illegible]二便澁　尺[illegible]二便澁
[illegible]小便赤澁　腎[illegible]小便多　心脈[illegible]胃脈虛亦為漏精
心虛腎[illegible]而散少血漏精　諸脈[illegible]尺脈[illegible]虛勞
脾脈[illegible]手足之　脾[illegible]而[illegible]飲食不進
脾[illegible]嘔吐或飲食停滯　脈[illegible]陽氣不升降
肝[illegible]而痰頭旋目暈亦主血疾　下部脈[illegible]男子失精婦人帶下
三部[illegible]形如散沒無根脈[illegible]則生脈[illegible]則不保
五臟各有本臟之脈但三部皆要和緩中有胃氣

五臟所主

精神聲音屬腎心　血脉皮便汗司者　肝主爪筋兼眼泪

藏魂生血貫衝任　腎司耳骨并腰脚　齒唾精元水髓屎

氣魄皮毛俱屬肺　膀胱[illegible]　肚腸唇口并肌體

涎沫於脾好自斟　皆以五行生尅論　要令和順莫相侵

[illegible]

心病虛實證

心虛恍惚且多驚　色少胸滿眼不停　膞脚背脊并腸強

舌乾面赤實之形

肝病虛實證

肝實頭旋目怒紅　腸攻氣逆耳偏聾　如人將捕為虛證

筋脇拘攣兩眼濛

腎病虛實證

腎虛腰逆脚寒時　腹脹胃疼數小遺　旺則腹滿而腰體

[illegible]

溺黃汗出面肢黑

肺病虛實證

肺盛壞胃嗽喘咳　背有腋脛尻疼多　咽乾咳血流清涕

弱狀無如氣之何

脾病虛實證

脾衰肢弱吐多酸　腹泄腸鳴不任餐　強候腳攻身體重

苦飢腹滿小便難

右五臟病證虛者補之實者瀉之

察色聽聲

四時明辨色安平　察之聲音五臟音　聲色前知神聖事

良工揣度在胸襟

面目察色

目如赤白黑兼青　面帶黃時病必平　目若黑青并赤白

面無黃色命難存



面色逆邪

假如肝病面青時　白色當看木易衰　是謂肺金來尅木

其餘做此以推之

口味

肺辛心苦及肝酸　鹹腎甘脾驗舌端　所好即知其臟病

更將脉證細參看

聲志

心喜笑兮肝怒呼　呻吟屬腎恐尤多　肺哀哭哭憂為志

脾志乎思謳以歌

審夢

陰盛水兮陽火光　陰陽俱盛鬪而傷　下虛飛去上虛墮

喜怒憂思以臟詳

論祟脉

祟家面色顛倒或紛擾如[illegible]兄脉乍大乍小乍浮乍沉乍長乍短乍有乍無或錯雜不倫或刮駛暴至或沉伏或雙弦或鈎啄或如運或横過或促散或尺部大於寸關或關部大於尺寸是皆祟祟得之刮駛鈎啄多見於脾洪運來多見於肝横過沉散多見於心肺大抵祟家心脉虛散肝脉洪盛尤可驗焉蓋心藏神肝藏魂心虛則驚惕昏迷神不守舍而邪氣得以入其魂

論絕脉

彈石之脉狀如硬物彈石辟辟而急腎氣絕也解索之脉狀如繩索解脫散於兩傍[illegible]精血竭也雀啄脉狀如雞雀顛啄止而復來[illegible]脾穀氣絕也屋漏狀如水滴地上久復跳起胃氣絕也蝦遊狀如蝦子不動即去[illegible]來神魂絕也[illegible]一脉如魚[illegible]翔魚翔狀如遊魚高沉頭定尾搖命脉絕也[illegible]上肥涌涌而浮此陰陽之氣絕也所謂偃刀者如側刀刃其狀彈石類焉若代若牢亦為死脉代者動中一止如更代之代牢似乎革經曰渾渾革至如涌泉綿出而不返也又曰牢而搏[illegible]

尽劳異泉然者死年之與脈無以異也前所論覆溢二脈自關前進上出於魚際者謂之溢自關後退下入於尺澤者謂之覆是皆陰陽不守雖經無損必死之脉也凡傷病六脉滑刮按之無力若能用藥誘得胃氣脈回三部和緩遲遲而來必有生意或一向滑刮而胃氣之脉不回是雖息數循存終不能保其諸篤證但見右尺命脉和數而大啟疾其有濟乎

新刊仁齋直指方論醫脉真經卷之 終

新刊仁齋傷寒類書活人總括目錄


○卷之一

活人證治賦

○卷之二

傷寒總括

調理傷寒統論　陰陽虛盛用藥寒溫辯義

表裏虛實辯義　六經用藥格法

○卷之三

傷寒證治

表裏汗下二證　三陽三陰脉　三陽外證

三陰外證　汗下溫正法　變汗法

變下法　變溫法　傷寒傷風脉證

傷寒見風傷風見寒脉證　太陽陽明併病

三陽合病（明 附）　春溫夏熱　風溫濕溫

風濕中濕　溫毒中暑　痓病溫瘧疫癘

痰證傷食類傷寒　虛煩脚氣類傷寒

○卷之四

發熱　潮熱　寒熱

寒熱似瘧　熱多寒少　汗後寒熱

下後有熱（勞復食復）　惡風　惡寒

背惡寒　四逆　厥

頭痛　項強　咽痛

身痛　腰痛脇　奔豚動氣

腹滿　胸脇滿　腸痛

自汗　無汗　頭汗出

手足汗　不得汗　不可汗
不可下
○卷之五
懊憹　痞　結胸
氣短　喘　咳嗽
咳逆　乾嘔　嘔吐
吐血　衄血　下膿
發黃　發斑　舌白胎
口燥咽乾　煩燥　渴
漱水不嚥　可與水　小便自利
遺溺　小便難　大便下利
霍亂　失音
○卷之六
怫鬱　冒眩　心動悸
發狂　直視　讝語
搖頭　戰慄　瘈瘲
筋惕身瞤　不仁　不得眠
多眠　瘥後昏沉　飲酒獲
尋衣摸空　百合　臟結
兩感　蚘厥狐惑　陰陽易陰陽交
陰毒陽毒　陽證似陰陰證似陽
○卷之七
小柴胡湯加減法
傷寒別名　傷寒戒忌　傷寒諸舊證
撮脉　譬省　藥有寒溫相濟
產丹　藥方





新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之一

三山名醫仁齋楊　士瀛　登父撰次
建安儒醫畢素齋　宏中　洪道校完

# 活人證治賦

論傷寒溫熱諸種病證治法　理內通撤　攻取陰陽

風寒暑濕 [illegible] 昏瘧熱決 [illegible] 曰溫曰斑曰毒 [illegible] 如痓如風 [illegible] 風溫 [illegible] 溫自汗多發汗逆 [illegible] 風濕中濕 [illegible] 便與便通 [illegible]

論陰陽虛盛表汗裏下及表裏餘證

夫陽虛則陰從內出而惡寒，陰虛則陽自外入而結熱。[illegible] 惡寒者為表邪，汗則必愈；結熱者為裏病，下 [illegible]

[illegible]

非汗[illegible]又不可下表裏無證但解和[illegible]

[illegible]有浮脈[illegible]接依裏[illegible]內外俱見惟滲泄[illegible]

㊂論證[illegible]隨應不可拘以日數及傳經府臟受病深淺

意同脈以證別潛因脈辯[illegible]

長弦而盛陰家細微緩而沉[illegible]始證[illegible]陽盛即下胃府[illegible]初得[illegible]臟病直溫少陰[illegible]

如脈浮多日以有表但病在太陽而究[illegible]

脈為榮榮行中衛行外[illegible]肌肉屬胃[illegible]陽胃入裏[illegible]尤深[illegible]

㊃論一證之中有表有裏

豈不以惡寒一也外熱屬陽無熱屬陰[illegible]

發熱一也不渴為表見渴為裏[illegible]

有先溫乃汗之證[illegible]

先解後攻之理[illegible]

---

[illegible]乃以熱[illegible]身[illegible]作熱證之浮則脈候外應體痛自利沉[illegible]

而得則臟家病起[illegible]

堅便為裏水[illegible]身熱而[illegible]渴曰支飲涼而脇[illegible]

[illegible]體如火反欲被寒在骨[illegible]

隨熱在皮膚身[illegible]猶惡表寒在皮膚[illegible]在骨髓[illegible]

㊄[illegible]

大抵無身熱無頭疼則溫以陰經之劑[illegible]有嘔妨有胸痛則吐其[illegible]

膈上之悶[illegible]

三陽明俱可下惟合病惡寒者有表當汗[illegible]

[illegible]併太陽在外解者歸根所以[illegible]

入胃者本條用攻[illegible]

陽經有桂枝之證陰多戒承氣之[illegible]

[illegible]當下而汗為無陽為厥竭為譫語當汗而下為痞氣為[illegible]

懊憹為結胸[illegible]失下則血瘀氣滯以熱[illegible]

[illegible]當臟[illegible]失汗則熱結[illegible]

……下後脉數久便堅當解於紅之毒……少者熱壯與斷下……

（六）論當證投藥不可輕用

當攻夫無汗煩燥而脉浮緊者可服青龍……無汗惡寒而脉單浮者勿投白虎……熱遠熱之義當用寒遠寒而後愈……用……陽明自汗……次則五苓散非可輕進……太陽自汗數尿且桂枝湯不容妄服……以甘草瀉心湯……氣……吐取豉行……口噤咬齒大承……心……嘔而發黃……奔豚動氣……

（七）論脉證順逆及諸惡證不治

又當知陰病陽脉與汗後而平靜者治陽病陰脉兼汗已而咳……洪者亡……而頻加吐瀉腎證未息……利及能食除中……或氣出嘔悶或肢冷睛硬……

或口噤汗戰或肝弦上膚……兩感之與臟結……多日而發狂陰毒陽毒……重陽……直……縮囊咳逆……雜……代脉……

（八）論則大當通變

陽之日陽明偏汗少陰反熱取表以溫……少陰口燥陽明汗……多急攻其內……下腹滿……溫……脉……發……與夫陰證似陽陽證似陰至若陰……又當識脉之所在……

[illegible]

傷寒括法張長沙撰其源朱奉議導其流前哲後賢發明秘括皆儒之孔孟矣世有謂傷寒論其辭艱深亦有以問答繁之增益意度活人書者多見其不知量也活人宗師張朱倣古是篇刊布不敢名撰使學者藉為驗灸以溯古人之用心皆吾兆敬

增修仁齋傷寒類書活人總括卷之一



# ○傷寒總括

## 調理傷寒統論

傷寒汗下溫之法最不可輕須以脈以驗證問證而對脈太陽者陽證之表也陽明者陽證之裏也少陽者二陽三陰之間太陰少陰厥陰又居於裏總而謂之陰證也發於陽則太陽為之首發於陰則少陰為之先太陽惡寒而少陰亦惡寒但太陽之脈多浮少陰之脈沉細與其他證狀亦自異也發熱惡寒身體疼痛或自汗或無汗是為表證可汗不惡寒反惡熱手掌心并腋下濈濈而汗口燥咽乾腹滿小便如常不白不少而大便秘硬是為裏證可下厥冷踡臥自利煩躁而無身熱頭疼是為陰證可溫單浮與浮洪浮數浮緊者此表病之脈滑實弦緊洪數盛者此裏病之脈沉而微細纖弱者此陰病之脈在表者邪搏於榮衛之間在裏者邪入於胃府之內胃府而下少陽居為表傳次三陰則為邪氣入臟矣[illegible]榮與衛均為表也亦均可汗也然自汗者為傷風惧傷衛氣衛行脈外其脈浮緩而病尚淺則以桂枝湯助陽而汗之輕與汗者為傷寒寒傷榮氣榮行脈中其脈浮緊而病稍深則以麻黃湯助陽而汗之重榮衛風為表也胃府亦可以為表也然以府臟而分表裏則在府者謂之表在臟者謂之裏胃取諸府可以表言若合榮衛府臟而分之則表者榮衛之所行裏者胃府之所注而臟則又深於裏者矣[illegible]當脈問證辨名定經真知其為表邪則汗之真知其為裏邪則下之真知其為陰病則溫之表有邪則為陽虛陰盛而發表之藥溫裏有邪則為陰虛陽盛而攻裏之藥寒陰經受邪則為臟病而溫陰之藥熱是三者貴乎得中不得則寧可不及亦不可太過得中者上也不及者次也若苟太過則斯為下矣蓋

得中者如此而汗后彼而下又如彼而温桂枝承氣投之不忌
而理中發而必重者用藥緊輕者用藥緩不拘陰陽深合
法度故曰得中者上也寧可不及者證與脉大同而小異名與
證似異而實同當五分取汗而三分之劑散之當七分轉下而
三分之劑導之當純剛温裏而少溫之劑扶持之未可汗下者
與之和解未可遽温者且安其中於猶未也則投減於其間細
細而加消詳徐徐而就脩理雖未遽安亦無傳變故曰寧可不
及者次也太過者粗工不知深淺輕舉妄動者為之或問證而
不知法執脉而不對證或名實之不辨或日數之為拘遂有
大之失其首尾曰不問陰陽當汗而反下則為痞為結
自汗懊憹當下而反汗則為讝語為亡陽動經為下厥上竭至
於陽證似陰之類誤以剛劑投之若黑發狂悶亂可以性命至
實可輕試哉故曰夫為太過則斯為下矣大抵治傷寒有法與
治他病不同條例當的藥進病除已則少差性死立異在之人
既方立論曰可汗曰可下曰可温曰和解曰少與曰急下曰隨
證滲泄與夫先溫其裏乃發其表先解其表乃攻其裏謂知者
者若綱在綱有條不紊此固得中者之事也若班固所謂有病
不服藥常得中醫許仁則以為守過七日最為得計此未可
不及之意乎王叔和善脉而且以承氣為戒初處相善方而論
傷寒一節且謂麻黃桂枝非深於其道則莫之敢為又非所以
為大過者之戒乎論而至此則知古人之立論甚嚴而傷寒汗
下温之法其不可輕也信矣雖然汗下温之法固自有定論也
經云傷寒六七日目中不了了無表裏證脉雖浮亦有可下者
少陰二三日無證亦有可汗者陰證四逆法當用温而四逆散
草中有柴胡枳殼此豈厚誣哉曰醫在九流之中外關機之士
不足與語也何者脉雖浮而亦可下者無表裏證謂六七日大
便難也雖使大便不難其敢輕下之乎少陰病亦有發汗治
陰證初病便屬少陰而反發熱少陰本無熱今反發熱者是表

猶未解故用温藥微取其汗也雖使身不發熱其敢輕汗之乎
四逆湯用薑附四逆散用枳柴一熱一寒並主厥逆固不侔矣
然傳經之邪與陰經受邪初病便厥者不同故四逆散用藥寒
主先陽而後陰也四逆湯用藥熱主陽不足而陰有餘也其敢
例視陰逆一切温之乎不特此爾傷寒有始得病其脉沉數外
證腹滿口燥煩渴則為陽盛入內之證醫法以下劑攻之不可
除以一二日太陽而發表也前所謂陰證傷寒初病以來便見
脉沉厥冷惡寒更無頭痛則是少陰受病之證醫法以乾薑附
子輩温之又不可除以三陰傳次先太陰而後少陰也若張氏
之論日數則曰日數雖多但有表證而脉浮者猶可發汗日數
雖少若有裏證而脉沉實者即須下之是日數之不可拘也如
此孫思邈云服承氣得利謹不中補熱氣得補復成此所以言
實熱也王叔和有曰虛熱不可大攻熱去則寒起此所以言虛
熱也二人之言殊途同歸是虛實之不可不辨也如此又況寒
温熱同得治不同名曰溫風其種而有兼病異氣之相乘他邪
之並作表證中之有不可汗裏證中之有不可下三陰可温而
攻積證若不同表裏俱見與半表裏無表裏者有異中暑熱病
疑似難明傷寒傷風脉證互見陽明本多汗而有反無汗之形
少陰本無汗而有反自汗之證或陰極發燥熱極發厥陰證似
陽陽證似陰差之毫釐繆以千里又有痰證食積虛煩脚氣證
似傷寒不可以傷寒之法拘之自非心領意會達變知幾體認
之精發用之審則縱橫逆應將何而不窮哉孔子曰可與適道
未可與立可與立未可與權其說也亦在夫人精之而已矣

陰陽虛盛用藥寒温辯義

外有脉內無脉為外實內虛外無脉內有脉為內實外虛虛實
之義隨其脉之有無者言之人所共知也若夫傷寒一書所謂
陰陽虛盛則精微之義不無難析其間四十八難曰病之虛
實出者為虛入者為實言外有脉者表之真陽氣虛故陰邪以

盛出而乘陽是以脈浮於外其病在表法當汗之當其陰[illegible]
表脈浮於外之時不可自惑以為陽脈盛也內有脈若裏之其
陰氣虛故陽邪以盛入而乘陰是以脈實於內其病在裏法當
下之當其陽熱入裏脈實於內之時不可自惑以為陰脈盛也
是說非古人之立意也蓋使人知如此之為陰盛則抑陰而助
陽如彼之為陽盛則抑陽而助陰陰盛而邪出於外者發表之
藥當性溫以助陽如桂枝湯之類是也陽盛而邪入於內者攻
裏之藥當性寒以抑陽如承氣湯之類是也或曰陰出而乘於
外是陽之不足也發汗則亡陽而汗之何哉是大不然陰邪持
於外不汗之則邪何由去桂枝之性溫溫之乃所以助陽陽有
所助而長則陰邪之所由以消甘辛發散為陽者此也張氏所
謂承氣入胃陰盛以亡者正恐陰盛出外而誤以承氣下之外
得寒以助邪內攻虛而損正安得而不亡或者又曰陽入而乘
於內是陰之不足也陰受病則當有以溫養而下之何哉是又
不然陽邪入於內不下之則邪何從出承氣之性寒寒之乃所
以抑陽陽有所抑而微則真陰之所由以長酸苦湧泄為陰者
此也張氏所謂桂枝下咽陽盛即斃者正恐陽盛入內而誤以
桂枝汗之內得熱以助邪外被虛而損正又安得而不斃觀古
人發表之藥多溫攻裏之藥多寒則知陰勝虛盛之意微非止
為汗下設正所以為用藥寒溫設也可不明辯哉[illegible]

表裏虛實辯義

傷寒治法內則當辯脈外則當辯證大要辯表裏虛實而病在表
有表虛有表實病在裏有裏實有裏虛又有表裏俱虛表裏俱
實當權之分貴乎早辯表虛者脈浮而緩自汗惡風用桂枝湯
以解肌表實者脈浮而緊無汗惡寒用麻黃湯以發汗裏實者
脈伏而牢心腹痛結或大便堅小承氣湯大柴胡湯以下之裏
虛者脈沉而弱自利厥冷理中湯四逆湯以溫之若表裏俱
虛則惡按脈虛如急救表裏之類下利身疼先與四逆湯清便
自調後與桂枝湯是也表裏俱實則舉按脈實如表裏俱見之
類脈浮亦與五苓散誤下腹痛與桂枝大黃湯是也大抵出
入傳變各有虛實淺深輕重時刻異同精以辨差毫釐見效

六經用藥格法

太陽膀胱非發汗不能愈必用桂枝麻黃以助陽卻邪陽明
為胃非通泄不能痊必用大黃芒硝以疏利陽熱少陽為膽無
出入道柴胡半夏能利能汗消解血熱黃芩佐之太陰脾土性
惡寒濕非乾薑白朮不能溫燥少陰腎水性惡寒燥非附子不
能以溫厥陰肝木藏血榮筋非芍藥甘草不能滋養此用藥經
常之道也然三陽汗下和解人皆知之至若太陰溫燥不行則
亦當溫利如桂枝加大黃之類是太陰自陽明而出也少陰雖
用附子亦有麻黃細辛之證是少陰自太陽而出也厥陰雖例
其間有用桂者是厥陰自少陽而出也其或太陽少陽二經皆
閉門三陰皆自陽明出焉故三陰皆有下證如太陰腹滿時痛
為有積少陰咽乾口燥為熱聚汁乾厥陰煩滿耳聾舌卷囊縮為
毒氣入臟皆當下之知乎此則傷寒用藥之法隨變隨應而不
窮矣雖然傷寒七日傳遍六經此約法也或首尾只在一經或
間傳一二經而止又不可拘但據脈與外證驗之是為活法
足太陽膀胱即太陽胃即陽明膽即少陽大陰曰脾少陰
曰腎厥陰曰肝蓋取其[illegible]工耳

傷寒病當大熱通利之後已得輕瘥且量進白粥兩三日未
可遽與和胃之劑恐熱氣復之又復作也繼此投以和胃溫膽
湯入竹茹投之或二陳湯加前胡亦可矣二藥傷寒瘥後通
用無熱者只守本方世俗以四君子湯為貴細細習用之不
思內有白朮溫而閉氣往往因此而燥悶矣

仁齋傷寒類書活人總括卷之二

# 傷寒證治

表裏汗下二證

發熱憎寒體痛時　脈浮解表定無疑
不惡寒却潮熱　多汗咽乾裏下之

○表證脈浮身體肢節疼痛惡風惡寒。○裏證脈實而不浮不惡風寒反惡熱身不疼自汗譫語不大便或咽乾腹滿。○表裏俱見證張氏用五積散真人用桂枝大黃湯一服生薑兩片同煎大黃[illegible]滴漏水煎存七分表裏傷寒只一掃除

三陽三陰脉

陽屬膀胱胃膽關　陰居脾腎更連肝
浮長弦細沉微緩　審脈仍將外證看

三陽外證（足之三陽從頭走足）

腰脊頭疼并惡寒　目疼汗熱鼻中乾
耳聾口苦時乾嘔　胃腸堅實熱干

○太陽證腰脊強頭項痛發熱惡寒若傷風則自汗惡風。○陽明證目疼身熱鼻乾不惡寒反惡熱自汗出不得臥胃實大便難。○少陽證耳聾脇痛或口苦咽乾目眩或往來寒熱而嘔。○陽病體輕脉輕外證壯熱煩渴大小便秘頭面有汗作渴氣從陽手擲足

三陰外證（足之三陰從腹走足）

腹痛脈溫利不煩　舌乾燥渴或增寒
唇青舌卷多煩痛　筋急囊縮又攣

○太陰證腹滿或痛手足溫自利不渴咽不乾。○少陰證口燥舌乾而渴或口中和則惡寒常默默欲寐不欲見光明有時煩燥又有咽痛二證。○厥陰證唇青舌卷煩滿囊縮消入肌或消渴飢不欲食食則吐蚘。○陰病體重脉重外證厥冷唇青腹痛不渴大小便自利惺惺而靜語言不足踡而臥。三陰病無身熱無頭痛其或肩背強腰吐。○陰證唇青舌黑或內胎或卷強者用生附[illegible]頻頻擦唇口續又易之遺能回陽生胃解而溫血散氣擦之後陰消陽長黑轉而紅自取爲良法

汗下溫正法

○太陽傷風自汗惡風用桂枝湯傷寒無汗惡寒用麻黃湯風寒俱盛則以大青龍湯。東用白汗小便數者勿用桂枝可加[illegible]生[illegible]湯[illegible]月用之須加[illegible]。○陽明不惡寒反惡熱自汗大便難用小承氣大柴胡汗多者胃汁乾急下大承氣湯汗惡寒[illegible]有汗脈遲微惡寒爲表未解用桂枝湯脈浮無汗麻黃湯。○少陽證屬小柴胡湯[illegible]月用之須加桂枝。○太陰自利不渴爲臟寒[illegible]實[illegible]四逆湯理中湯[illegible]手足必微厥甚手足溫便是太陰胃腸腹滿[illegible]脈浮桂枝湯腹滿時痛桂枝加芍藥湯[illegible]桂枝加大黃湯。○少陰脈沉口不乾舌不燥及背惡寒者用附子湯小便白者用四逆湯始得病脈沉反發熱麻黃附子細辛湯口燥咽乾而渴急下之用大承氣湯。○厥陰脉微浮爲欲愈不浮未愈小建中湯脈浮緩如瘧狀者囊不縮亦欲愈桂枝麻黃各半湯脈沉短者囊必縮爲毒氣入臟可下承氣湯下之利不止用[illegible]四逆湯。○三陰中寒微則理中湯甚則四逆湯或中寒下利見[illegible]大段重者用四逆湯無脈者用通脈四逆湯六經惟少陰難治大要以口燥咽知其熱脈沉而遲別其寒外證消渴則裏熱但煩躁默默不欲見光明其脈沉細或時腹痛此可以[illegible]增加[illegible]對[illegible]增損理中湯亦可矣凡陰證[illegible]散通用者且以理中湯[illegible]代之雖然陰與[illegible]有適

熱盛而煩手足溫　風生寒脉浮全
不煩少熱肢微厥　疾證兼風浮緩然

○傷風見寒脉傷寒見風脉爲榮衛俱受邪用大青龍湯然大青龍不可輕用須是風寒俱盛又加煩躁一證方可與之敘易簡者謂二證交攻則桂枝麻黃各半湯亦爲穩當

二陽合病

太陽合胃脉浮長　若兼浮弦合少陽
膀合胃時強不順　更將外證子推詳

○太陽陽明本太陽病若汗若下若利小便與胃中乾燥轉屬陽明故大便堅小便利是爲脾約宜脾約丸主之若惡寒則用升麻葛根湯以惡寒反惡熱大便秘或譫語宜[illegible]下之與白虎湯不惡寒反惡熱大便秘或譫語宜調胃承氣湯下之喘而胸滿者不可下用麻黃湯○太陽少陽頭痛身熱脇下痞滿目眩往來寒熱諸證並小柴胡湯○少陽陽明本少陽病因發汗利小便後胃中燥大便難宜[illegible]正陽陽明本經風盛氣實也大柴胡湯大小承氣湯主之○又三陽合病頭痛身重面垢譫語遺尿口中不仁宜白虎湯或舌乾口燥不仁並惡寒者通用○太陽陽明少陽陽明少陽陽明無表證皆俱可下惟惡寒中寒爲太陽陽明合病本太陽經却屬表可發汗用桂枝麻黃各半湯若在裡則從過經則下也○三陰無合病

太陽陽明併病

太陽已汗併陽明　不惡寒兮裏未解
全入陽明須下劑　汗之猶在太陽經

○太陽陽明併病本太陽初病發汗而汗出不徹轉屬陽明續微汗自出不惡寒也併歸陽明也○若太陽證尚在宜桂枝麻黃各半湯○若太陽證已退但有陽明者宜大承氣湯下之

春溫夏熱

春溫浮緊易調安　發熱頭疼渴兼干
夏月傷寒爲熱病　脉來洪盛踈應難

溫病發於春間及夏至以前是也發熱頭疼渴兼干口中淡多脉浮緊特其病輕耳○熱多者小柴胡湯主之小者升麻葛根湯頭痛身疼不渴者小柴胡湯○渴者小柴胡湯去半夏加人參栝樓根脉實煩渴大柴胡湯利之以貝實而大便秘也凡時用竹葉石膏湯○秋者小柴胡加桂枝○夏月傷寒是名熱病其熱頭疼肢體俱重或惡寒或惡熱其脉洪盛宜用[illegible]不可入品汝桂枝麻黃湯之屬須以石膏知母佐之○熱病三日外脉皆浮數尚在經絡未入藏腑者宜石膏湯三月至夏者之脫發熱者亦或[illegible]

風溫

風溫汗後脉多浮　喘渴擁眠難不收
膿痛腳微頭目痛　溫溫漿漿汗頻流

風溫尺寸俱浮傷於風因而傷熱風與熱搏即發風溫其外候則四肢不收身熱自汗頭疼喘息發渴昏睡或體重不仁誤汗之則譫語獨語目亂無精誤下之則小便難若小則發癇發瘛瘲如驚癇目斜視張氏又云寸脉浮清人脉濡弱不可下下之則失溲直視若被火則發黃色劇則如驚癇時瘛瘲身熱病在少陰厥陰二經宜萎蕤湯人參敗毒散○身灼熱者知母乾葛湯○渴甚者栝樓根湯○脉浮身重汗出者漢防己湯汗用防己○渴甚者葳蕤湯或○龐氏用葳蕤湯取微汗○脈暴化全沸草散○渴而加杏仁細辛○未細聞湿溫即湿溫[illegible]

湿溫（湿溫）濕溫而痛又小而急其傷於湿因而中暑湿熱相搏即發濕溫其候身重胸滿頭目痛妄言多汗兩脛逆冷宜白虎加蒼朮湯不可發汗汗之使人不能言耳聾不知痛處其身青而色變重暍而發之○濕溫病在太陰經日白虎加蒼朮湯加桂枝○其氣脉則身盡痛[illegible]

執身黃小便不利大便反快用五苓散腹脹虛大便
滑者理中湯加蒼朮白茯苓虛滑甚者朮附湯○暑氣勝則
壯熱煩躁小便不利大便閉澀用[illegible]不知[illegible]臟腑
閉而煩渴者白虎加蒼朮湯

風濕中濕

風濕浮兮額汗微　　腫皮發熱重衣

身黃熱痛沉而緩　　中濕腹脹小腑稀

風濕脈浮先傷濕而後傷風故也外證肢體腫痛不能轉側
額上微汗怯寒而不欲去衣大便難小便利熱至日晡而劇
治法但微解肌若發正汗則風去濕在於徒無益而又害之
○治法微解肌用麻黃杏子薏苡甘草湯加白朮防己[illegible]
不惡不渴脈虛浮濇者桂枝附子湯○濕多身痛小便不利
甘草附子湯煩渴小便不利五苓散○外不熱內不渴小便
自利朮附湯○[illegible]腰痛身重自汗[illegible]大便不利不禁[illegible]
濕多加白朮少用甘草○身腫痛微喘惡風杏仁湯○通用
人參敗毒散○濕而煩渴者加[illegible]若誤下之小便必不利
可與五苓散○中濕脈沉而緩風雨襲虛濕氣入多為
濕所傷也一身盡痛重者發黃關節煩疼發熱身黃或脹
滿大便利小便難其內證耳濕家不可汗汗之則發痙或為
痊者死亦不可下下之則額汗胸滿微喘而噦小便不利全
濟亦難經云治濕之法不利小便非其治也○中濕小便不
利大便自利甘草附子湯五苓散或[illegible]主之
小便皆自利則與朮附湯身體痛或重[illegible]
中濕寒濕交攻疼痛重者[illegible]甚者[illegible]加
附子○風寒濕合而為痹其何以為之治曰寒多則為
疼痛當用[illegible]風多則為走注當用[illegible]
濕中氣則為堅頑[illegible]所不可闕中濕則為[illegible]
能以[illegible]應手而愈

溫毒中暑

溫毒春聞斑發廢　　嘔而咳悶透心膓

背寒面垢虛來脈　　自汗倦煩是暑傷

溫毒冬間感受寒毒中氣至春而發也表證未退毒氣不
散所以發斑肌肉瘡紋心下煩悶嘔逆咳嗽後必下利寸脈
洪數尺脈實大其為病異為陽氣盛耳○治法通用黃連橘皮湯
[illegible]升麻亦主之或用玄參升麻湯加黃芩咳悶而嘔清汁者
[illegible]證治[illegible]葛根橘皮湯○中暑脈虛弱或沉伏身熱
背寒面垢自汗煩燥大渴毛聳惡寒昏倦而身不痛經
云寒則腠理閉暑則腠理開開則洒然寒閉則熱而悶經謂
不備以備暑為熱病誤人多矣○內外俱熱口燥煩悶四肢
微冷而不痛白虎湯○反逆惡寒[illegible]熱悶不惡寒[illegible]
[illegible]○頭疼惡心煩躁心下不快五苓散[illegible]霍亂
吐瀉香薷散溫服○[illegible]中暑用小柴胡湯脈乳身體

八八

閉洒然毛聳口前板齒燥白虎加人參湯○傷暑發
大熱頭痛自汗咽乾煩燥腹中熱結諸藥不效者[illegible]
最良小便不利五苓散○熱病中暑暑溫難皆因暑所致然
脈證不同當明辨之熱病者冬間感寒至春暑氣盛而後發此
即夏月發寒但熱多而脈洪盛是也中暑者病在太陽外證
身熱病相似但熱病脈盛肢節痛重中暑脈虛肢節不疼兼
面垢背寒而手足微冷是也暑溫者濕熱相搏致之病在太
陰其脈寸濡而弱尺小而急外證胸滿頭目痛身熱汗多
而足脛逆冷是也以上三證夏月病多有之須別其治法無
差釐千里之繆○凡夏月傷暑雖則熱毒作患皆因脾胃虛
怯而得之乃屬然後伏暑伏暑然後須燥其內飲水過多及
用解暑涼藥太過傷動其中氣內耗嘔吐不食自利不渴
六脈沉微按之隱隱是為表熱內[illegible]陰盛隔陽之候不可
更泥中暑伏熱之說急以理中湯[illegible]

煩小便不利斷不可以為熱也又有冷藥過度則水停水瀾熱而嘔或身熱微煩此亦陽浮外而不內可與[illegible]或加[illegible]脾胃素弱者[illegible]主之雖然抑猶有戒也夏月病多傷暑暑家脈虛面垢冷汗手足微寒有不熱甚裏熱之證妄以剛劑投之抱薪救焚不發黃則發斑甚至蓄血悶亂而死矣可不塞源徂流而精審云○假如夏月泄瀉不止胃脘閉隔飲食不進或心腹痛滿大抵因暑得之泄瀉中痛者[illegible]加[illegible]下[illegible]心腹刺痛者[illegible]加[illegible]下[illegible]但得其便○假如夏月下痢赤白煩渴嘔逆腹中[illegible]痛小便不利是亦因暑得之可與[illegible][illegible]之屬若以此嘔證為脾胃虛寒則誤矣

○痓病溫瘧疫癘

痓甚風癇强體肢　柔剛二證汗若推

後寒先熱名溫瘧　疫癘之邪責四時

[illegible]先傷於風又感寒濕致之發熱腹痛口噤頭搖瘛瘲不語項强背直腰身反張或目疼或目赤或閉目或反目或足冷或足溫或妄行其脈沉弦而遲亦或帶緊此為惡候不救者多若脈如雨濺散出於指外者[illegible]痓也傷風頭痛發熱常出微汗又自嘔逆汗之必發痓新產血虛汗出傷風亦致發痓大發濕家汗亦作痓熱而痓者死痓初發爽多有腹痛之證內經曰戴眼反折瘈瘲汗出如珠者身不流太陽絕也其謂死乎○發熱無汗惡寒厥語為剛痓曰陽[illegible][illegible]○發熱有汗不惡寒為柔痓曰陰[illegible]於[illegible][illegible]○二痓通用[illegible]陽痓去[illegible]陰痓去[illegible][illegible]○剛痓胸滿口噤咬齒腳攣卧不著席[illegible]下之○柔痓[illegible]○[illegible]即瘧病也又寸俱弦先熱後寒吐汗下後重感於寒得之寒多者其脈弦遲熱多者其脈弦數寒熱乃陰陽之爭也

或者謬論傷寒誤藥變病吐汗下後續生寒熱則曰傳末必死所幸分而成之不思古人一藥對一病藥準病除安有所謂分為寒熱者哉噫此可為智者道也○先熱後寒及寒熱相半並[illegible]先寒後熱[illegible]○多熱但熱而煩少頭[illegible]或[illegible]○多寒但寒者[illegible][illegible]加[illegible]虛人寒甚[illegible]○熱多寒少嘔不入食[illegible][illegible]○小便不利汗出煩渴素有痺氣不伏水土而嘔[illegible]○大便秘嘔吐寒熱無時脈小緊者[illegible]下之○瘧脈自弦弦數多熱弦遲多寒遲弱可溫緊浮可汗緊實可下浮大而實滑者可吐○經云夏傷於暑者秋必病瘧因冰傷寒之謂然瘧有寒有溫瘧一證若纏綿不已腹中必有癥瘕用藥對治或者妄塗而同歸活人書以[illegible]取或吐又不愈者服[illegible]亦諸瘧中通用之劑耳惟癥瘕能生寒熱凡瘕皆有水癖血包裹而成也[illegible]中有逐水破血之劑為能下之痰水在上者[illegible]中有[illegible]甚能吐之瘧家多蓄黃水若水不在於上焦則[illegible]亦能下之也一法[illegible][illegible]一倍[illegible]炙[illegible]各半新汲水隔宿煎之最服又法[illegible]等為細末研[illegible]入[illegible]圓如桐子大每三十粒[illegible]下此皆勝瘴瘧者可與[illegible]痰飲中節致生寒熱若亦與[illegible]條見似瘧條例○[illegible]傳染老幼皆相似調治一也寸濡弱尺弦緊或肝脈濡細是雖責邪四時然發汗吐下條例通行故曰明知節候正行無問雖然陰陽表裏俱須通行困也然其毒癘之氣蘊蓄于中亦須隨其溫涼權其輕重而利導之庶毒有所泄則易為力也○病源一狹雜瘍之氣壯熱煩痛發為心腹脹滿者不治○春感清邪在肝[illegible][illegible]○夏感寒邪在心[illegible][illegible]○秋感熱邪在肺[illegible]加[illegible]發其汗[illegible]○冬感溫邪在腎亦名冬溫[illegible]一無正形因火而名

當隨經取之此大槩然耳。痰證者[illegible]
可選用[illegible]內用[illegible]只可芷之寒濕出感於
通用之劑。溫疫通用[illegible]

。痰證傷食類傷寒

有痰頭項背和暢　外熱惡寒寸洪上
頭疼右數身不疼　左手脈平傷食狀

[illegible]寸口脈浮發熱憎寒惡風自汗胸膈[illegible]而氣上衝咽不
能息頭不疼項不強為異耳。有熱用[illegible]
[illegible]。[illegible]
滿發寒熱亦是痰證但脈緊而不大[illegible]此之此不可謂痰
證但無頭疼當以他證參之也。[illegible]右手關脈緊盛而數
頭痛發熱惡寒但身體不疼中脘痞悶噫[illegible]食臭為異耳熱
邪伏於脾胃則食不能消經云人迎緊盛傷於寒氣口緊盛
傷於食人迎主外風寒入之氣口主中飲食傷之是以有左
右手之別。中脘痞悶嘔而熱者[illegible]以脈滑痛者[illegible]加[illegible]。寒
多不甚熱者[illegible]下之。
胸膈滿而嘔吐者食在上脘[illegible]吐之。夾食傷寒證脈
按病源云下後六七日不大便煩熱腹滿而痛為胃中有乾
糞挾宿食故也當如是則夾食傷寒即大陰證大陰主胸脘肚痛
[illegible]加[illegible]者是爾所以太陰受病主胸膈肚腹嘔吐痰
涎宋氏以為飲食得之如曰大陰證飲食不消[illegible]不快用
[illegible]加[illegible]或[illegible]或[illegible]皆[illegible]治也今
推明治法有表者宜[illegible]有裏證者[illegible]與
者與[illegible]若表證已解但有裏證者[illegible]
之可也張氏[illegible]傷食[illegible]入湯劑中正此意耳
雖然夾食傷寒則脾胃已傷若加下不可也若發其汗亦
不可也識者於此又當推[illegible]以霍亂條例。夾食傷寒便
見吐利脈逆而不挾表證者依陰病及霍亂等治之若吐利

吐逆而挾表證者即依先救裏後救表之法

。虛煩腳氣類傷寒

虛煩身首全無痛　脈自和平若熱壯
轉筋頭食大便難　腳氣腳發病弱腫

[illegible]虛煩熱也不惡寒身不痛頭不疼脈不浮不緊數為
異耳[illegible]。重者[illegible]嘔者
[illegible]也不可汗下。腳氣證虛煩外熱內寒時節疼痛
[illegible]。[illegible]初病發熱憎寒頭痛嘔噦不開食臭或節酸疼
大便難或發脹痛攣起[illegible]轉筋弱疼痛重重痺頑
為異耳。腳氣通用[illegible]
[illegible]只可[illegible]用[illegible]
湯調下。毒氣入腹衝心作痛吐[illegible]或
用[illegible]煎熱入[illegible]妻之。寒多者[illegible]
[illegible]加[illegible]。熱多者[illegible]並加[illegible]或
[illegible]加[illegible]。四多者[illegible]
。濕多者[illegible]痰多者[illegible]下[illegible]
考[illegible]。煩渴者[illegible]大便秘者[illegible]
加[illegible]或[illegible]加[illegible]。風毒腫痛[illegible]
。筋[illegible]湯[illegible]。又法[illegible]
錢[illegible]兩箇取皮肉坐新尾上[illegible]經一節和之新
汲水煎空心熱服腳氣風痛痺皆作效更加[illegible]
腳氣證假與傷寒無異或發熱頭痛或身體冷或寒熱
往來或自汗惡風或無汗惡寒或大小便秘澀腹痛下利胃
氣短怔忪煩悶嘔噦狂沫疰悶食臭大類傷寒但卒起腿
腳無力頑痺腫節攣急痠疼或歷節又嘴痹開燃然赤腫為
異耳傷寒傳足六經腳氣亦傳足六經在太陽則頭痛項強
腰背脊重在陽明則口燥鼻乾惡熱譫語在少陽則耳聾口
苦脅肋俱疼在太陰則腹脹滿疼腫在少陰則咳嗆

咽嗌咽痛而熱在厥陰則囊縮節陰囊縮引腹痛六經所傳又有合病併病外證與傷寒並同凡遇發熱煩躁大便不通嘔逆痰涎而惡食者須審問之脈浮而弦若起於風風則汗而愈濡而弱若起於濕濕則滲而愈洪而數者起於熱熱則下而愈遲而澀者起於寒寒則溫而愈風與濕溫證狀不同然風為充注寒為疼痛暑為熱煩濕為重著必有可驗之證治法總要貴乎疎導大便但不可過劑其補瀉之法則醫家之大戒也雖然肺氣漸入頭深非藥力相接不可也治之亦當究其源或因丹砂發動則為之解丹砂或因飲食釀成則為之消飲食氣釀而作者與之調氣續生他病者則以他病方藥理之所患氣實而死未有服藥致虛而斃其若喘嗽上氣衝築心疼嘔吐無已腹痛脹滿臍下痛疼不仁服為瘥候大緊然爾所謂實則溫之熱則實之在表則散在裏則下大虛氣之狀養其中是為不刊之法。千金翼法食鹽并灑中及等和炒熱熨臍盛而熨

傷寒傳經之邪病至厥陰其脈微浮緩之狀是則脾氣行復邪無所容必寒熱作而得汗解若尺寸俱沉短此為脾氣入臟土敗木賊脾受肝邪必有囊縮舌卷可議不知人之證當急下之五藏其一或脈來弦亦是邪也。許學士云輕手脈浮為在表表實浮而兼有力但浮無力表中虛自汗惡風常漸漸重手脈沉為在裏裏實脈沉來有力重手無力大而虛此是裏虛理端的氣口緊盛食必傷人迎緊盛寒邪熾趺陽胃脈定死生太谿腎脈以根蒂。治熱入血室血熱留滯小柴胡湯加生地黃治血結胸散之痛活人書海蛤散蓋血聚膻中則小腸必壅小便通則胸次之血散矣。凡小便或赤或澀皆其裏有熱也



## 發熱

發熱初陽汗必潛　陽明發熱汗之形
少陽脈細仍兼嘔　反熱而沉屬腎經

發熱多屬三陽太陰厥陰皆不發熱惟少陰有反熱二證然少陰發熱終是脈沉或下利手足冷也三陽發熱何以明之太陽發熱則惡寒陽明發熱則自汗少陽發熱必有乾嘔之證矣熱形在表而屬太陽此表熱而裏不熱也熱邪在裏而屬陽明此裏熱盛而達於表也若表證未罷邪氣傳裏裏未作實所在表證裏證之間若傳經之邪至於少陽於在二陽三陰之間其熱皆輕於純在表純在裏者也然而陽明裏實熱必用當攻之以寒太陽風寒外搏陰盛惡寒雖熱尤當溫散少陽和解雖為小柴胡微熱不渴若又當加桂是不可無以權之雖然傷寒發熱病之常也脈陰陽俱盛熱不止者作下利發熱者粗汗後復熱其脈躁疾為陰陽交此亡不治之證其可例視之乎。太陽發熱惡風有汗桂枝湯惡寒無汗麻黃湯。吐利發熱惡寒者為霍亂。發熱而渴白汗不惡寒是為溫溫若誤汗之必身灼熱溫溫各有本條。陽明發熱汗出脈實調胃承氣湯脈浮桂枝湯汗多者胃汁乾急下之用大承氣湯。少陽發熱脈細而嘔小柴胡湯。少陰反發熱有一證脈沉發熱者麻黃附子細辛湯若下利厥逆裏寒外熱脈不出者通脈四逆湯。身熱而不渴則為表熱小柴胡加桂湯身熱而煩渴則為裏熱白虎加人參湯。無表裏證發熱七八日脈雖浮數可大柴胡湯下之若下後脈數不解消穀易饑不大便則為瘀血屬抵當湯

## 潮熱

潮熱屬胃下之和　六結胃家本例圖
咳逆剝唇并表證　勿攻只用小柴胡

潮熱屬陽明一日一發日晡而作也若非日晡所發是謂其熱不潮盖陽明旺於未申故爾潮屬陽明故潮熱皆可下之診其脉或弦或浮大便或溏或利小便難渴外證猶有惡寒則其熱未全入府並不可下但以小柴胡湯和解之是必表證已退大便鞭結小便如常乃可攻也

○日晡潮熱屬陽明經證實可下證用小承氣湯大柴胡湯脉虛不可下者與桂枝湯○大結胸潮一證起於太陽用大陷胸湯○咳而潮熱○大便溏利潮熱○表證潮熱並用小柴胡湯○腹滿不大便只用小承氣湯微利之勿令大泄○日晡潮熱甚者循衣摸床獨語如怪直視微喘脉弦者可治脉濇者不治脉不實不虛但用小柴胡湯

○冬陽明潮熱有時脉浮緊者無汗脉但浮必盗汗並用黃芩湯

寒熱

往來寒熱關陰陽　大小柴胡及桂枝
結熱心煩仍喜嘔　渴而頭汗用之良

陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒寒熱往來者陰陽相勝邪正交爭而作也盖陽不足則陰邪出於表而與之爭故陰勝而為寒陰不足則陽邪入於裏而與之爭故陽勝而為熱若邪氣在半表半裏之間則外與陽爭而為寒內與陰爭而為熱出入無拘所以乍往乍來而間作也大抵邪居表多則多寒邪居裏多則多熱邪在半表半裏則寒熱相半此又可以知其受病之處用藥固自有條然小柴胡湯最主寒熱寒多者加桂熱結者加大黃脉不甚實而大便溢者加[illegible]寒熱相半只守本方是亦活法雖然寒熱之方來如波濤之洶湧其勢有不容遏者當遲之一二日俟少定而圖之經所謂其盛者可待衰而已是又不可不知

○病至十餘日結熱在裏往來寒熱大柴胡湯下之○心煩喜嘔胸脇滿不欲食寒熱往來小柴胡湯○或血氣弱腠理開邪氣交爭寒嘔甚者二陳湯○汗下後不嘔而渴頭汗出胸脇滿小便不利寒熱往來柴胡桂枝乾薑湯

寒熱似瘧

似瘧膀胱桂可醫　清便不嘔半麻枝
陽明只下浮須汗　血室柴胡小者奇

似瘧一名瘧狀作止有時非若寒熱往來或疎或數而作止無定時也凡感冒之人忽覺毛寒股慄筋節拘惓百骸鼓撼嘔不欲食其寒不可禦未幾復轉而發熱者此即温瘧不必謂瘧脉自弦或洪數或緊實或虛緩或沉濇皆為瘧狀但以外證別之用藥固有本條然小柴胡湯如前斟酌加減亦是活法雖然血虛能生寒熱敗血亦作寒熱陰陽相勝亦一證各有一方其間當以川芎為佐

○太陽似瘧脉洪浮與桂枝湯○清便自可不嘔日二發桂枝麻黃各半湯其脉微緩微浮則欲愈也○陽明似瘧證煩熱汗出日晡發熱脉浮虛與桂枝湯脉實與大承氣湯○病人熱入血室其血必結如瘧狀者小柴胡湯主之○瘧後寒熱或潮熱見瘧後皆沉條○諸瘧通用二陳湯熱多者加川芎桂枝寒多者加川芎草果○餘見温瘧

熱多寒少

熱多寒少治膀胱　不嘔清便各半湯
尺脉若遲為血少　脉皆微弱號無陽

熱多寒少陽乘陰也其間三證並屬太陽脉浮緊者可汗或遲或弱皆和解之清便自可謂大便如常也

○不嘔清便自可桂枝麻黃各半湯○尺脉遲佗少者先以小建中加黃芪湯以養血俟脉不遲即以小柴胡桂枝二越婢一湯主之○諸脉皆微弱無陽者用桂枝二越婢一湯不可正汗

汗後寒熱

汗餘寒熱脉中論　若見憎寒去用溫
沉實當攻浮再表　風溫誤汗熱而煩

汗後寒熱邪氣未解微也脉浮洪者邪在太陽法當再汗脉沉實者邪在陽明又須下之若厥陰餘熱加以下利厥逆惡寒[四逆湯]溫之無疑矣

○憎寒者屬厥陰大汗出熱不去拘急體疼下利厥逆而[illegible]溫之○脉沉實者屬陽明得汗後如瘧狀日晡而發[大柴胡湯]下之若只惡寒則爲虛用[illegible]只發熱則爲實[illegible]○脉浮洪者爲太陽汗後寒熱[illegible][illegible]○風溫不惡寒若誤發汗必身灼熱加渴獨語[illegible]○溫家汗後又熱脉躁名陰陽交不治熱病已得汗而脉躁盛亦不治詳見陰陽交條有再汗再下之劑

下後有熱 勞食復熱

下於汗後致傷榮　陰氣衰兮熱又生
瘥後熱名勞食復　心中痛者豉梔平

○大汗則損氣損氣則陽微脉虛而惡寒大下則傷血傷血則陰弱脉澁而發熱誤汗誤下亦猶是耳但陰以陽爲主陽以陰爲根血陰也氣陽也血非氣便不能自行令地下之亡陽是陽不主陰矣陰無所主而寒氣搏之所以脉澁與極血虛所以發熱方亡之剤其可輕乎

○汗後陽微而惡寒可[四逆湯]或用[illegible]○下後陰弱而發熱是爲內熱可[illegible]○瘥後勞復發熱[小柴胡湯][illegible]脉實則下之用[illegible]若脉浮則汗之用[illegible]下之用[illegible]經治論瘥後餘熱用[illegible]下利腹鳴瘥而者[illegible]小便不利[illegible]○交接勞復外腎腫腹中絞痛[illegible]勞役心力復熱用[illegible]以之餘見陰陽易條

後食復發熱[illegible]如[illegible]張飲傷飽或食肉或餅膈硬物不消皆復熱也傷食必有痞滿噯氣吞酸腹鳴下利等證可與[illegible]○下後身熱而心中結痛[梔子豉湯]○飲酒復熱有本條

惡風

惡風汗出怯風吹　脉緩而浮但解肌
發汗亡陽成漏者　溫經之法莫遲疑

惡風者見風則怯密室之中無所惡也風傷衛氣衛虛則腠理不密由是而汗出焉證雖屬表不可發汗但微解肌而已衛者陽也惡風防衛也所以表怯而惡風蓋亦陽虛故然邪出而表之特其病在皮膚邪氣尚淺耳

○[桂枝湯][illegible]主之壯熱者與[illegible]○發汗太過衛虛亡陽汗漏不止而惡風者法當溫經用[桂枝加附子湯]或小便難四肢微急難以屈伸並用[illegible]○身熱惡風項強脇滿手足溫而渴[小柴胡湯]○風濕惡風不欲去衣骨節間煩疼掣痛不得屈伸汗出短氣小便不利或身微腫[甘草附子湯]

惡寒

惡寒發熱爲於陽　陰病憎寒體白涼
浮數桂枝并越婢　沉而細者理中湯

惡寒者不見風而怯寒身雖灼熱亦不欲去衣被也此陰邪出而乘陽致之蓋寒傷榮氣榮行脉中居衛之下是爲表邪已深法當發汗間有一二自汗則其表已疏但與解肌可也然而發熱惡寒者屬陽無熱惡寒者屬陰在陽則發汗在陰則溫裏常須識之大要惡寒皆爲表證或裏證悉具而微惡寒者是表猶未解當先解表後不惡寒然後可以攻裏設傾[illegible]○發於陽者脉浮數[illegible]輕重用

○太陽證發熱或未發熱必惡寒有汗用桂枝湯無汗用麻黃湯○陽明證固當下之惟惡寒中寒者係與太陽合病在經屬表可汗用葛根湯若脉遲汗多微惡寒者表未解也雖陽明病可桂枝湯○少陽證頭汗出微惡寒小柴胡湯○發熱微惡寒者柴胡桂枝湯○汗後反惡寒者為虛芍藥甘草附子湯○下後復發其汗心下痞而惡寒者表未解也當先解表用桂枝湯表解然後攻痞用三黃瀉心湯入生薑汁○發於陰者脉沉細理中湯四逆湯○少陰證脉沉細用之四逆湯若下利惡寒而踡手足溫者可治用小建中湯若惡寒而踡時時自煩不欲厚衣可大柴胡湯下之

背惡寒

背上惛寒值少陰　口和附子本條尋
舌乾口躁三陽合　白虎湯中好酌斟

背為陽腹為陰背寒者陽弱也然背寒有陰陽二證何以別之少陰一證以其陰寒氣逆不能消化津液故口中和三陽合病以其陽氣陷入津液為之乾焦故舌乾口燥陰寒陽熱識者以口中潤燥推之思過半矣

○口中和而背惡寒者屬少陰附子湯○舌乾口躁內有熱證口中不仁而背惡寒者為三陽合病白虎加人參湯經云腹滿身重面垢譫語遺尿口中不仁為三陽合病白虎加人參湯主之若自汗者亦用白虎加人參湯○又陽明證背微惡寒無大熱口中燥渴者亦用白虎加人參湯○中暑亦有背惡寒證但面垢自汗脉虛而伏自有本條○凡脾胃素虛之人遇暑月間或飲冷水或多喫茶或餐雪梨之屬易致生冷傷脾寒氣着背陰上乘陽故寒從背起冷如掌大此當以溫經主之

四逆

四逆須將四證詳　病家手足但微涼
枳柴芍藥傳經劑　邪中陰經四逆湯

手足不溫謂之四逆陰經之邪主之太陰受病手足自溫至少陰則有手足四逆之證四逆之與厥冷實相近也或者四逆耳而四逆湯一寒一熱用藥何不類耶蓋手足自熱而至溫由溫而至四逆此傳經之邪非虛寒之候也宜四逆散主之若得病以來手足不溫便成厥逆此則陰經受邪陽氣之不足也可以四逆湯溫之陰證雖然吐利煩躁既見四逆四逆下利惡寒而踡並屬少陰又為不治之診故併及之○少陰四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重並用四逆散○初病以來厥冷四逆用四逆湯○溫溫兩足脛逆冷有本條

厥

冷厥初來厥有源　沉遲而弱冷常存
熱深發厥初身熱　沉滑時乎指爪溫

陽氣伏藏陰氣越出陰陽不相順接所以厥也其手足逆冷之謂也蓋諸陽會於四末陽微而為陰所勝初病便厥者是為冷厥其脉沉遲微之則弱醒而靜惡寒引衣足多攣臥或身上粟形或下利清穀也熱伏於內先熱而後厥者是為熱厥脉以沉滑按之則數皆塞狂言發渴引飲揚手擲衣或燥不得眠或大小便不利也外證皆可驗焉若先厥而後得熱是則陰邪退而陽氣復矣傷寒熱多厥少其病當愈厥多熱少其病則進下利發厥一條亦以厥者復熱為有裏熱者復厥為已甚蓋下虛則厥陰實使之陽長陰消其可也雖然傷寒血證亦有四肢發厥以至皆迷悶絕者此又不可不知至若少陰下利惡寒而蜷手足厥冷與夫臟厥一證皆為不治之診厥之為厥可無辨乎○冷厥初病便作四肢逆冷足蜷惡寒引衣自蓋不渴大小便滑泄外證默默而臥可四逆湯[illegible]湯可選用○又寒厥[illegible]厥用[illegible]○熱厥初病

身熱然後發厥其人畏熱揚手擲足煩燥飲水頭汗大便秘
小便赤怫鬱昏憒蓋當下失下血氣不通故四肢逆冷所謂
熱深則厥深所謂下證悉具而見厥逆者此也與大承氣湯
大承氣湯[illegible]或白虎湯。熱厥與冷厥相類但指爪時溫爲異
耳若疑似不明且以四逆湯試之陽厥則有熱陰厥則無熱
之異熱而厥者一手或兩手無脉面色目昧不澤者與四逆
[illegible]人參[illegible]可以爲佐服微汗
解[illegible]生發[illegible]手或脉不至者不治○水氣厥者心下怔忪
茯苓甘草湯○邪氣結胸中而厥者脉乍緊乍結心煩滿飢
不欲食瓜蒂散吐之○藏厥者七八日逆冷下利發躁無時
暫安不治○痰飲厥逆脉沉小與[illegible]

## 頭痛

頭疼惡冷太陽先　惡熱陽明膽細弦
濕痹塞兮痰膈痛　厥陰乾嘔吐清涎

[illegible]

頭痛爲三陽[illegible]陽明少陽皆有之而太陽則專主是也太陽專
主頭痛則頭痛之屬表證者居多陽明少陽又次而輕耳三
陰經絡上不至頭故無頭痛惟厥陰循喉嚨之後上連目系
頂巔有頭痛乾嘔吐涎吳茱萸湯一證却無身熱亦與陽證
不同也雖然太陰少陰其經從足至胸並無頭痛是固然矣
然風溫病在少陰濕溫病在太陰而頭反痛至於陰毒亦然
是又其病則有其證脉絡相通不可拘也若夫頭痛甚入
連於腦手足寒此則真痛神丹在手其能救乎
○太陽頭痛發熱惡寒無汗[illegible]有汗[illegible]已汗未汗
頭痛如破連鬚葱白湯[illegible]不止[illegible]陽明頭
疼不惡寒反惡熱胃實氣實攻於頭也少與[illegible]○
少陽頭疼發熱脉弦細[illegible]○濕明以鼻塞以中寒濕
也[illegible]納鼻中黃水出則愈○痰涎頭疼胸膈滿發寒熱
脉緊不大[illegible]吐之可以痰釋除參驗○厥陰頭疼[illegible]

[illegible]不愈[illegible]
[illegible]若無熱似瘧亦欲愈[illegible]頭疼無
熱[illegible]用生薑葱白煎湯下

## 項強

項強葛根主表強　表虛桂枝去麻黃
結胸須進陷胸丸　桂入栝蔞痓反張

傷寒頭項強急太陽表證也必發散而解之若誤下太陽邪
氣乘虛入裏則爲結胸項強
○太陽病項背強無汗惡風爲表實[illegible]項背強發熱汗
出惡風爲表虛[illegible]不加[illegible]○誤下太陽結胸
項強[illegible]○太陽中風復感寒濕身熱足寒頭搖口噤
頸項強背反張其脉沉遲此爲痓[illegible]○項
強脇下滿[illegible]

## 咽痛

咽疼陽毒發成斑　肢冷咽痛陰毒看
肺燥無陽咽亦痛　脉微下利皆傷寒

咽喉不利或痛或瘡或痛不入而嘔吐者每氣上衝所致也陽
毒必熱發斑少陰四肢必冷其汗下利者可與[illegible]
[illegible]其不下利或小便赤而大衣者可與[illegible]
[illegible]入[illegible]使大便溏則黑臭毒出矣須以[illegible]
[illegible]湯調[illegible]解其毒也胃病咽痛下利猶熱
者未可用[illegible]即[illegible]
加[illegible]
○陽毒咽痛發斑唾膿血脉洪數用藥有本條○少陰咽痛
咽瘡出沉遲厥冷或吐利又陰陽脉俱緊反自汗亦細湯法
當咽痛而後吐利亦屬少陰也不可汗下重者[illegible]
粉溥之咽痛[illegible]若加冷者[illegible]
[illegible]○咽疼通用[illegible]焦燥熱加[illegible]

[illegible]○少陰傷寒一證乃非時暴寒中人伏於少陰之經
頭疼腰痛其脈微弱初咽痛似傷寒次必下利非時閉之此
咽痛[illegible]即[illegible]是也下利[illegible]或[illegible]咽[illegible]主
之○證治論曰咽痛用甘桔湯[illegible]一名[illegible]甘草湯
[illegible]咽中閉塞[illegible]○傷寒六七日大下之寸脈沉
遲尺脈不至咽喉不利唾膿血手足厥利不止者難治[illegible]
[illegible]

身痛

身疼浮緊太陽病　自利肝并腎[illegible]沉
中濕毒[illegible]與風濕　汗餘[illegible]本條尋

○證方[illegible]證云邪結在裏大便秘澀心腹痛鞕者可服若
身體疼痛表證未解不可與之然則身體疼痛不脈沉不
自利大[illegible]表證明矣其或自利脈沉此則陰證之身痛
家之[illegible]病云[illegible]

○太陽身疼痛[illegible]無汗[illegible]以汗之或尺脈遲若[illegible]不
足也先用[illegible]以養之俟其尺脈浮即用[illegible]太陽
病七八日脈細[illegible]為陰陽俱虛吐汗下並不可至再其人
素[illegible]素有熱可[illegible]陰
少陰身痛[illegible]必自利[illegible]中濕一
身疼痛不可汗下但利小便[illegible]有本條○陰毒身痛如被杖腰
中[illegible]有本條○風濕一身痛但微汗不可大
發汗有本條○發汗後身痛脈沉遲[illegible]汗
後身痛[illegible]邪在表脈沉遲為在裏用[illegible]
真[illegible]又汗後[illegible]身痛不休[illegible]

腹痛脹

腹痛[illegible]通脈湯　脾兼表證桂加黃
[illegible]大便結[illegible]利　脹則[illegible]

陰邪在裏[illegible]入裏[illegible]則為腹痛所以痛者有異[illegible]
脈實腹滿而大便秘者實痛也脈[illegible]而大便泄者虛痛
也陰陽異證用藥不同大抵腹為邪氣實法當疏利陰受病
則[illegible]證溫而利之○少陰腹痛四逆或[illegible]
或小便不利或泄利下重[illegible]下利清穀脈微欲絕[illegible]
[illegible]腹痛小便不利用[illegible]誤下太陽因而腹痛時
痛甚有表復有裏為太陰太陽俱病用[illegible]痛甚
[illegible]實痛者關脈實煩躁腹滿大便秘結[illegible]
[illegible]○虛痛者寸脈[illegible]泄利先與[illegible]不
瘥[illegible]之易[illegible]加[illegible]腹中
冷痛四肢厥逆用[illegible]○腹脹者陰陽不和也[illegible]
[illegible]最良

奔豚動氣

奔豚動氣最[illegible]方　左右高低細揣量
[illegible]　不堪汗下例中詳
玄朮理中并用桂

動氣者臟氣不調[illegible]跳動[illegible]而形見於臍之左右
上下也大抵真氣內虛水結不散氣與之搏[illegible]發奔豚以其
走痛衝突如豚之奔雖有發表攻裏之證汗之下之[illegible]不可
也然而不言當臍動氣者何即臍為中州以主津液妄施
汗下必先動脾是以不言而喻也[illegible]此動氣非問證何以知
之然則調理傷寒貴乎識[illegible]問證[illegible]
○太陽病下之後氣上衝者[illegible]若不上衝不可與也若
從小腹上衝於心[illegible]○發汗後臍下悸若欲作奔
豚[illegible]動氣通用[illegible]去朮加[illegible]蓋[illegible]利
小便泄奔豚故也奔豚一名腎氣[illegible]燥[illegible]閉[illegible]是以去之
○吐汗下後心下逆滿氣上衝胸起即頭眩其脈沉緊誤汗
之則動經故其身振振搖動[illegible]白朮[illegible]也此方用
白朮者蓋以誤汗動經故用白朮閉其汗也○奔豚動氣脈

沉弱吐利[illegible]可與[illegible]○動氣發汗諸用[illegible]

腹滿

腹滿脾家及胃家　三陽合病口頑麻
入邪吐汗下之後　胃證便堅承氣加

腹滿多為太陰蓋脾為中央土所以主腹滿之候腹中常滿者[illegible]實而可下時滿時減者[illegible]虛不可下當以溫藥和之其有吐汗下後因成腹滿者此則邪氣乘虛而入或誤利或溫散或[illegible]吐條例又不同焉審其邪氣之所起知其邪氣之所在斯可矣雖然太陰主腹滿固也陽證為邪必腹滿而咽乾陰證為邪以腹滿吐食而自利一熱一寒又不可以無別若夫腹滿而泄瀉以有據

○太陰腹滿吐食不可下[illegible]主之○誤下太陽因而腹滿時痛為太陰太陽俱病[illegible]重者[illegible]

○陽明發熱復無汗腹滿微喘口苦咽乾或不大便譫語火迫[illegible]

○諸此發證[illegible]而小便難加[illegible]又陽明脈大滿不大便[illegible]微下之陽明脈遲腹滿時時潮熱[illegible]

[illegible]發黃證有本條○三陽合病腹滿身重難以轉側譫語口中不仁必與[illegible]○吐後腹脹滿不減者胃中之邪下傳入胃擁而為實也必與[illegible]○汗後腹脹滿若胃盛而不能敷布諸氣壅滯也[illegible]

[illegible]若滿而痛則[illegible]微下之○妄下後腹[illegible]起不安者表邪未盡而入微於胃中也[illegible]

陰病六七日腹脹滿不大便[illegible]○腹皮滿若脹不脹小故求與[illegible]

[illegible]○腹滿[illegible]觀此腸鳴滑可知矣[illegible]

滿乃指氣若邪在裏而為實也腹滿而[illegible]者邪在表而為虛也以氣知條

○腹滿用藥皆去[illegible]不得腹而閉氣也

胸脇滿

胸滿多將表證看　半居表裏脇間堅
虛煩客熱須梔豉　瓜蒂扣半吐冷涎

胸滿者胸膈間氣塞滿悶非心下滿也脇滿者脇肋下氣脹填滿非腹中滿也胸滿多帶表證脇滿多在半表半裏之間○太陽病下後脈促胸滿[illegible]病在衛氣[illegible]入榮其性利故去之○陽明喘而胸滿此猶帶表證不可下可與[illegible]○胸脇俱滿或脇下鞕痛此半表半裏之證並用[illegible]和解之○胸中虛煩客熱或經汗下後煩熱窒塞氣逆搶心並[illegible]吐之若氣乏則與[illegible]若嘔則與[illegible]○胸中痰實宿寒[illegible]吐之○又陽明病心下鞕滿不可下下之遂利不止而死法當湯吐畔見結胸解題此則胃中虛而氣痞也或用[illegible]○邪氣留於胸中[illegible]○孫用和云胸滿則譫語瀉心湯審證用

法當湯吐其邪若因而越之是爾然有吐汗下後邪氣乘虛入而為煩是則胸中客熱以[illegible]吐之此吐劑之輕者也不經發汗吐下邪氣留聚煩滿發實是則胸中痰實以[illegible]吐之此吐劑之重者也均之為吐又當擇術

脇疼

脇疼多屬少陽家　煩悸陽明並小柴
裏水痞堅須十棗　陰痛引脇臟中乖

脇肋痛滿若邪氣在半表半裏之間也邪方傳裏未留為實氣鬱不行必當和解若大實必痛則下之不可也

○少陽病脇痛耳聾寒熱乾嘔或脇下堅滿並用[illegible]和解○陽明頭痛不解轉入少陽脇下堅滿乾嘔[illegible]又陽明潮熱不大便脇下堅滿舌上胎滑[illegible]○太陽病吐噦乾嘔引心下痞鞕引脇下痛身汗出或有頭痛此為表解裏有水[illegible]○病者脇下素有痞連在臍旁痛引少腹入陰筋者此名臟結

於臍傍引小腹入陰筋俱作痛此為臟結不治

## 自汗

自汗傷風暑不消　風溫風濕衛難調
無陽霍亂并柔痓　更與陽明共九條

衛氣所以實腠理而固津液也衛為邪所干不能護衛於是而汗出焉其傷寒榮氣汗獨無之惟風暑濕之邪有干於衛皆為自汗之證也若夫寒已入裏寒極生熱然則榮衛與腠理開又為陽明自汗是其熱越而汗出矣治法各自有條然而汗出以至發潤或汗出如油或汗出如珠凝而不流此皆不救他病見之亦然

○太陽傷風自汗脉浮緩者桂枝湯汗出而渴或小便難者五苓散不渴者茯苓甘草湯自汗小便數者勿用桂枝惟甘草乾薑湯主之自汗小便不數心煩微惡寒脚攣急桂枝湯[illegible]去加人參參以調榮脚必伸也○太陽中暑汗出惡寒身熱而渴白虎湯或用小柴胡湯○風溫多眠鼻息必鼾汗若誤汗之必身灼熱譫語並用萎蕤湯○風濕額上自汗關節痛重也不可發汗通用朮附湯和解○衛不和者臟無他病時發熱自汗出桂枝湯○亡陽者太陽證發汗多漏不止而惡風用桂枝加附子湯又少陰證尺寸脉緊反有汗出亦亡陽若冷汗為亡陽主咽痛吐利四肢疼冷不可發汗惡寒用四逆湯汗多不止溫粉撲之若汗不止惡風煩躁不得臥先服防風白朮牡蠣湯次服小建中湯咽痛通用甘桔湯○霍亂吐利汗出發熱惡寒手足拘急四逆湯又中暑霍亂煩渴五苓散○柔痓太陽病身項反張口噤瘈瘲發熱汗出桂枝葛根湯○陽明汗多而渴發熱譫語大便硬調胃承氣湯若小便自利而汗出者為津液少不可攻但用蜜煎導汗多身背汗乾急下大承氣湯陽明汗多而渴勿用五苓散陽明反無汗脉浮而喘麻黃湯

## 無汗

無汗因寒中太陽　三陰剛痓證中詳
冬陽明病并陰易　七例推尋各有方

腠理為風暑濕所干皆令自汗惟寒邪中經腠理密緻則津液內滲獨無汗焉此時傷寒在表然耳若陰病若水飲與夫亡陽久病亦皆無汗隨證各自有條惟熱病脉躁盛而不得汗出此陽極也當汗無汗與麻黃湯三投劑而汗不出者此亦不可治也知其可進則進知其不可則已之君請擇斯一者○剛痓陽證三陰病不得有汗蓋三陰證本無汗其或有汗者亡陽也○冬陽明脉浮緊者必發潮熱脉但浮者必有盜汗黃芩湯主之○盜汗者邪氣方侵於裏尚連於表睡則衛氣行裏而表陽不緻因其表陽不緻故津液得泄覺則氣散而還於表腠理閉而汗復止也是之謂盜汗此邪在半表半裏之間法當和表○餘證無汗治法各有本條

## 頭汗出

頭汗諸陽氣上蒸　身黃尿秘引漿頻
心忪水結瘀言血　表裏柴胡小是珍

諸陽之經會於頭三陰則至頸而還若裏虛表實腠理緻密熱不得越故陽氣上騰津液上湊而汗出於頭抑亦胞虛內涸使然耳夫裏虛則不可下內涸則不可汗頭汗之證得所謂表邪汗之斷不可也若夫陽明熱入血室燥糞譫語俟其過經利之以小柴胡湯是可概以推之哉大抵寒濕相搏與夫邪在半表半裏則有頭汗或小便不利內外關格頭汗則為陽脫濕家額上汗出而喘或小便不利大便自利亦為陽脫二者皆不可治譫語又當審斯

○發黃證頭汗及頸而止小便難引水漿此瘀熱也茵陳湯五苓散主之○水結胸證心下忪滿無大熱頭汗出小半夏茯苓湯○譫言頭汗是為血熱病屬陽明可以[illegible]

中燠懊而頭汗者梔子豉湯。○半在表半在裏及餘證悉具小柴胡湯。寒熱往來微汗惡寒為表脇下痛大便堅為裏。汗下後胃痛微結寒熱心煩嘔渴為表未解柴胡桂枝乾薑湯或柴胡桂枝湯

手足汗

手足如何汗不休　胃中熱聚液旁流
熱家燥糞為譫語　寒證雖教水穀留

手足汗者熱聚於胃而津液之旁達也亦有寒聚於胃致之故寒則水穀不分熱則燥糞譫語

○陽明病手足漐漐汗出譫語大便難此熱證也與承氣湯下之

○陽明中寒不能食小便不利手足濈然汗出大便初鞕後溏水穀不分則不可下少與理中湯

不得汗

汗之不得亦須蒸　躁極還經未必生
身痒浮遲推冬半　陽明虛證若虫行

傷寒欲得汗與麻黃湯數劑而汗不出者不治熱病脈躁盛而不得汗諸陽之極亦不治二者蓋真病也亦有寒熱而邪忽兩手或一手無脈是猶重陰欲雨之時必濈濈然大汗而解其或投藥無汗而脈不至者亦不可治也是可以容易發哉雖然諸虛少血津液中乾亦不能作汗病人有投湯忘如痰飲癥癖之類又隔汗而不能出也少血者養血以汗之必癖者開關散氣以汗之是為活法若夫汗出如油喘而不休未有能生者也

○服藥不得汗當用蒸法燒地令熱去其火以水洒之用蠶沙柏葉桃葉[illegible]相和鋪地厚二三寸許上鋪席令病人仰卧衣被蓋之少時周身至腳心皆汗出乃用溫粉撲身移上床。身痒脈浮遲為表虛亡陽不能作汗桂枝麻黃各半湯主之

○陽明反無汗皮中如虫行以久虛也宜[illegible]

○凡發汗須令上下周遍身上衣被如常腰以下厚蓋之若蓋覆不周汗出不匝不流必致肢體攣搐可與[illegible]

不可汗

不堪汗者脈微遲　溫濕虛尤壞病推
經水忽來兼失血　臍間動氣並如之

病在表而脈浮者可汗表證悉具若發渴若脈不浮是表帶裏也未可汗之傷寒不可汗條例最多其可汗者大抵脈證全在表也表固可汗然汗之太早太過或者津液泄而變生焉至於當下而誤汗則為亡陽為譫語為下厥上竭等證甚者人又棗耳聾或誤汗則[illegible]以救解之甚者去[illegible]

○有熱者去[illegible]吁此救其也謹之謹之[illegible]

脈微弱為亡陽不可汗用桂枝二越婢一湯尺脈遲為血少榮氣不足也不可發汗先與黃耆建中湯以益血後其脈不遲即以小柴胡湯或桂枝二越婢一湯和解之。風溫濕溫各有本條。痙病似傷寒卻不惡寒身不疼脈不緊並不可汗下可葛根湯或栝蔞桂枝湯。壞病者吐汗下溫不解知犯何逆以法治之並不可汗可小柴胡湯加減。經水適下表裏俱症不可汗小柴胡湯主之衄血下血雖脈浮緊無汗然衄者欲愈下者亦欲愈不愈則用犀角地黃湯但不可發汗。腹中左右上下動氣並不可汗下詳治論用理中湯去朮加桂動在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤為逆先服防風白朮牡蠣湯汗止次服小建中湯臍之動在右發汗則衄而渴心苦煩飲則吐先服五苓散次服竹葉湯動在上發汗則氣上衝心宜李根湯動在下發汗則心中大煩骨節增疼頭痛目運入食即吐先用大橘皮湯止吐次用小建中湯。下利清穀[illegible]或大便不通者皆不可汗。惡寒脈浮此為表證若渴則邪欲入

衰不可汗。咽乾喉塞亡血淋家衄家瘡家動氣並不可汗
諸治論皆用[小柴胡湯]加減不可汗[illegible]

不可下

不可攻浮又細虛　惡寒嘔吐與之俱
小便白利并清少　有表仍兼失氣無

病在裏而脈浮者可下裏證然具若惡寒若脈不實者[illegible]帶表也未可下之傷寒不可下條例最多其可下者大抵脈證全在裏也裏固可下然下之太早大過或者水穀脫而變生焉至於當汗而誤下則為痞氣為懊憹為結胸等證甚害人又連耳設或誤下則[理中湯丸]以救解之或寒甚則少加[附子]或轉損變逆則無與[四逆湯]輩呼此救失之謹之謹之。脈來細小困不可下若細小而牢緊又可下也。脈浮病在表不可下結胸脈浮大不可下。脈細遲或濡緩或尺部弱此凡皆為血氣衰不可下也。惡寒者表之虛證雖陽明惡寒則與大陽合病發表可汗不可下若[illegible]發熱惡寒則溫之。嘔吐者雖有陽明證謹不可下[illegible]主之。小便白利汗出者津液竭雖硬不可攻[illegible]而出也[illegible]亦可導之也。脾約證大便堅小便數者[illegible]。大便堅小便清者熱不在裏不大便不可下可[illegible]汗之。少陰證小便白為下焦虛寒用[illegible]。大便堅小便少者津液還入胃必先硬後溏不久自出惟小便如常乃可下之。有表證脈浮或惡寒或微汗寒熱並不可下。不轉失氣謂不下泄也不下泄則先硬後溏不可下大抵陽明譫語欲下之先與[小承氣湯]若轉失氣則必先溏後硬更進一劑不轉失氣則止又陽明譫語潮熱脈疾與[小承氣湯]不轉失氣則與[大承氣湯]若次日又不大便而脈澀則為實虛[illegible]主之凡陽證而脈澀謹不可下。頭汗出為津液少胸中虛不可下唯陽明證血熱而汗則可下。諸虛少血厥逆[illegible]喉閉嘔吐亡陽陰虛動氣皆不可下歷家[illegible]厥逆[illegible]咽喉閉塞[illegible]嘔吐[illegible]無陽陰虛而大便難者下之必清穀腹滿但用[illegible]。左動氣下之則[illegible]拘急氣動身雖熱反欲蜷先[illegible]次[小建中湯]。右動氣下之則津液竭咽燥乾頭眩心悸[illegible]。上動氣下之則掌握熱煩汗出欲灌水[illegible]。下動氣下之則腹滿清穀心痞頭眩[illegible]

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之四

懊憹（音）平又兩音

懊憹心堅用陷胸　舌間胎白豉梔使
發黃須與茵陳湯　燥糞陽明承氣攻

懊憹者懊惱鬱悶之狀蓋由表證誤下正氣內虛於是客氣乘虛入而動膈須臾欲攻待未至結胸之甚也由懊憹而結胸亦不難矣

○短氣煩燥胸中懊憹心下因鞕則為結胸用陷胸湯。舌上白胎虛煩不得眠心下懊憹或飢不能食頭汗出此邪熱鬱於胸中也並用梔子豉湯吐之。陽明病下之後懊憹而煩胃中有燥糞此熱結於胃也用大承氣湯攻之。陽明無汗小便不利心中懊憹者必發黃用茵陳湯是則胃中邪熱前後二部俱泄之也

痞

痞滿關沉痛不侵　關浮肝熱用連芩
惡寒勿下先投桂　痞利餘根及瀉心

當汗誤下或病屬陰而反下之輕則為痞其狀心下滿而不痛按之則濡是其虛邪留滯故但滿而不痛也通用桔梗枳殼湯最良若欲攻之亦須表證已解則可矣

八痞者關脈多沉用枳實理中丸主之九妙。關脈浮而痞此為肝熱用三黃瀉心湯若戰慄惡寒汗出用附子瀉心湯加附子瀉心湯服瀉心湯痞不解其人大煩渴小便不利五苓散主之。下後復汗心下痞而惡寒者表未解也不可攻痞當先解表宜桂枝湯表解乃可攻痞用大黃黃連瀉心湯表未解而心下妨悶[illegible]加[illegible]表證在數下之遂協熱而利心下痞鞕表裏俱病[illegible]下利心下痞鞕乾噫食臭腹中[illegible]傷寒論用甘草瀉心湯若利不止則治下焦用赤石脂禹餘糧湯又不止即利小便用五苓散○發熱汗出不解嘔吐下利心中痞鞕用大柴胡湯下之此太陽證○吐汗下後噫氣不除旋覆代赭湯若嘔逆氣虛則先用四逆湯胃寒則先用理中丸後用旋覆代赭湯若虛煩心下痞滿氣上衝咽頭眩經脈動身振搖茯苓桂枝白朮甘草湯

○十棗湯證須是身涼表解脇痛而痞則可用

結胸

結胸痛硬滿其中　大小隨名用陷胸
熱實多煩寒不熱　水兼浮脈豈容攻

○病發於陽而下之早或當汗而誤下外證項強心下滿硬而痛者結胸也結胸痛硬是為實邪在裏法當下之若脈浮大若表證若水氣戒不可下亦有不經下劑而心下鞕滿者此又有可吐可下不同焉經曰病人手足厥脈乍緊邪結胸中心滿而煩飢不入食當吐之是則病在胸中故也經曰陽明病心下鞕滿不可下下之遂利不止而死是則邪氣自表傳裏留於心下未全入腑法當吐之故有此戒當如是則經所謂高者因而越之是不吐下界限判然矣以結胸實例論之乎要之結胸治法大要審其邪氣所在而已矣或曰結胸證具加煩燥而不治者何此胃氣絕也胃氣既絕安能佈藥力以勝邪也故○凡病在胸膈皆上脘彭湃痰涎氣促粥藥不能下咽

結胸寸脈浮關沉或沉緊但當下若脈浮大或有表證則先用小柴胡湯表已解然後下之○大結胸不按而痛胸連臍腹堅痛不可近大陷胸湯大陷胸湯太峻合用者以與陷胸丸小結胸按之而痛只心下硬用小陷胸湯熱實結胸[illegible]煩渴心下痛[illegible]大陷胸湯寒實結胸無熱證三物白散枳實理中丸水結胸心下怔忪頭汗出無大熱小半夏加茯苓湯[illegible]小柴胡去棗加牡蠣湯[illegible]結亦是結胸

一種但舌上胎滑時時下利陰筋引痛者死○病人血結胸此熱入血室見譫語條下蓄血條○結胸只理其氣用藥不愈用[illegible]湯者加[illegible]證治論諸藥不愈用[illegible]丸凡結胸理氣已平放後大便澀者須利導之否則熱邪結為塊血○誤下後未成結胸宜[illegible]救解○陰毒陽毒隨氣逆上伏於胸中亦有結胸痛硬之證治法詳見本條

## 氣短

氣短裏實熱來潮　風濕汗難汗自流

停水心悶并裏水　太陽誤下結胸不

氣短者呼吸短促而不能相續是也其間呼多吸少者不接焉千金曰少氣不足以息者虛金匱曰短氣不足以息者實大抵短氣為實亦有表裏虛實之差心腹脹滿而短氣者邪在裏而為實也心腹濡滿而短氣者邪在表而為虛也其或怔忪氣短此則心下停水致之體認不精其差千里信矣○氣短潮熱腹滿而喘此為外欲解而裏實宜[大承氣湯]○風濕相搏汗出短氣小便不利惡風不欲去衣其證在表[甘草附子湯]○食少飲多水停心下亦令氣短[illegible]、身涼乾嘔短氣汗出不惡寒此表解而裏有水[十棗湯]○誤下太陽短氣煩躁心中懊憹陽氣內陷便為結胸[大陷胸湯]

丸 更發汗一篇

## 喘

喘不熱兮發解表家　汗多潮熱裏攻邪

滿胸合病尤須汗　水嗽青龍杏子去麻

○經云肺氣實則喘逆上氣所以氣逆者邪氣為實宜分虛實證喘邪氣在表者心腹濡而不堅外證無汗法當汗之邪氣在裏者心腹脹而為滿外證有汗法當下之又有水氣作喘心下怔忪即水為邪是以有[小青龍]之證若經汗下後水不痰飲喘促上攻難安寢不得息可以[illegible]吐之喘特病之常也其或目視譫語而喘汗出髮潤而喘身汗如油而喘皆不可救此邪氣內盛而正氣欲脫也臨證對境益消息焉○[illegible]專主治喘家湯劑多用[illegible]

○太陽證無汗而喘[麻黃湯]或誤下之利不止脈促有汗而喘[葛根黃芩黃連湯]下之微喘者[桂枝加厚朴杏子湯]發汗後不可更行[桂枝湯]若汗出而喘無大熱者[麻黃杏仁甘草石膏湯]○陽明證汗出不惡寒短氣腹滿潮熱而喘[大承氣湯]○[illegible]脈浮無汗而喘宜汗之用[麻黃湯]○太陽陽明合病喘而胸滿不可下可[麻黃湯]○水氣咳喘乃太陽汗後飲水多而水停心下[小青龍湯]去[麻黃]加[杏仁]主之小腹滿者[小青龍]去[麻黃]加[茯苓]○陰證喘則心促脈伏而厥[五味子湯]○鼻息鳴喘氣逆上衝[illegible]用和用[illegible]加[厚朴杏子]久喘咳嗽[illegible]

## 咳嗽

咳嗽多因喘為膀胱　寒熱胸脇在少陽

若是少陰傾下利　四肢沉重更清涼

○肺寒氣逆而不下則咳嗽熱邪乘之氣則燥熱寒邪乘之氣則冷滯水飲乘之又與寒邪相搏熱氣水飲皆能致咳嗽所從始乎陰陽治法間有條其間水咳三證不可無辨[小青龍]太陽之表水也[illegible]太陽之裏水也[真武湯]陰證之水氣也當須識之雖然古人一藥對一證所主各[illegible]水與表寒相合而咳則[小青龍]汗之水與裏寒相合而咳則[真武]溫之裏寒合水動而咳[illegible]所以下之也

○太陽病身熱咳嗽喘逆心下怔忪乾嘔微利此水氣在表[小青龍]○[illegible]小便不利小腹滿者去[麻黃]加[茯苓]發熱惡寒身體痛者只依本方若身涼咳嗽乾嘔微利心下痞滿引脇痛[illegible]為裏有水[十棗湯]○少陽病寒熱往來胸脇滿而痛咳嗽[illegible]

[illegible]或微利夫[illegible]加[illegible]〇少陰病水
氣咳嗽四肢痛重腹痛下利或嘔[illegible]加[illegible]
[illegible]少陰咳而四逆或腹痛或泄利或悸[illegible]加[illegible]
[illegible]少陰咳而嘔渴心煩不得眠下利[illegible]〇熱咳[illegible]
[illegible]或咽喉腫痛[illegible]加[illegible]〇咳嗽頭
痛不惡寒身大熱若臍腹外有熱而內作痛者須下之用[illegible]
[illegible]張氏曰發汗不解胸滿痛若急下之可[illegible]又
曰發汗中滿痛此為實[illegible]下之〇咳嗽中滿而喘用[illegible]
[illegible]辭制以後胃實不食則[illegible]加[illegible]
[illegible]痰多[illegible]加[illegible]治嗽通用[illegible]

## 咳逆

咳逆連聲是苦真寒　橘薑苓草膈宜丹
不至乳下難須灸　腹痛之時療已難

咳逆俗謂之噎古人謂之噦蓋胃氣本虛吐下太過或復以
之水以發其汗胃寒氣逆噦噫生焉病勢至此極矣雖然亦
逆出於胃寒固也其有水玦與氣相搏而成者則[illegible]
逐水主之[illegible]下氣[illegible]又有熱氣擁鬱氣不得通而
成者則[illegible]加[illegible]自有陰陽惟是噦而腹痛不得小便
或後部不通此為真病雖有神醫末如之何
〇[illegible]之以黃
擇用不瘥即灸乳下其法婦人屈乳頭向下盡處骨間一壯
丈夫乳小以一指為率灸三壯男左女右女負如小豆許大
抵乳直下陷中有動脈處是詳見下脈血條〇諸治論呃噦
手足逆冷[illegible]不安[illegible]〇陽證
咳逆潮熱[illegible]加[illegible]仍看其大小便何
部不調即通利之〇[illegible]而腹滿大便不利[illegible]噦而腹
滿小便不利[illegible]〇陽明傷風脈弦浮小便難潮熱而噦
[illegible]〇[illegible]論傷寒咳逆為熱氣所抑見之亦

[illegible]主之又方[illegible]大
抵咳逆不止者不可救藥〇水氣乘肺亦主喘逆微咳當以
表水裏水法治之見痰嗽條

## 乾嘔

乾嘔身熱小青龍　涎沫吳萸汗桂供
下利白通并四逆　脈浮十棗裏之攻

乾嘔者嘔而無物出也大抵熱在胃脘與穀氣并熱氣上熏
心下痞結則嘔而無所出爲少陰下利[illegible]主下利也厥陰
吐涎沫[illegible]主吐涎沫也乾嘔[illegible]主自汗也邪去則嘔者
定矣若夫水氣二證[illegible]當以表裏分之發熱欬喘而乾嘔者
此則水氣在表與[illegible]不發熱不惡寒脇痛咳利而乾嘔
者此則水氣在裏與[illegible]是又不可無別然而表水裏水
皆有欬嘔何耶曰水氣乘肺也
〇表不解心下水氣[illegible]熱乾嘔微喘或利[illegible]汗之〇乾
嘔吐涎沫頭痛一云少陰一云厥陰並[illegible]得湯反劇
者則與[illegible]〇汗出頭痛乾嘔[illegible]〇少陰下利乾
嘔脈微[illegible]利不止乾嘔而厥逆無脈[illegible]〇身涼汗出脇
[illegible]裏寒外熱脈微欲絕或乾嘔[illegible]無表證此裏有水
次乾嘔心下痞硬發熱而微利不惡寒[illegible]
[illegible]下之〇膈上有寒飲乾嘔亦爲少陰用[illegible]〇證
治論乾嘔而利[illegible]〇胃中似喘不喘似嘔不
嘔似噦不噦憒憒然無奈者[illegible]

## 嘔吐

嘔吐陽明氣逆行　數為胃熱遲寒生
太陽合病利不利　野證二條各有評

表邪傳裏裏氣上逆則為嘔吐水穀不下也仍傷寒嘔吐有
胃熱有胃寒有水氣有膿血辨是四者而已胃熱者脈數或
緊必有口苦咽乾而渴之證胃寒者脈弦而遲必有足冷下

食大小便自利之證水氣者先渴後嘔脇痛征忪若胃脘蓄血則腥氣燥氣奔逆上衝經所謂嘔家有癰膿不須治嘔膿盡自愈又謂服[illegible]吐者其後必吐膿血云云大抵嘔吐皆有所出已下咽而出者嘔也未下咽而出者吐也吐有其於嘔耳若乾嘔以嘔無所出則其間所謂乾嘔者何耶嘔吐多屬陽明氣逆而上行戒不可下汗後水藥不入口者為逆嘔而脉弱小便自利微熱而厥者為難治[illegible]嘔家湿熱燥者[illegible]代之

○陽明嘔吐[illegible]加[illegible]主之陽證通用嘔而發熱[illegible]嘔而渴[illegible]先嘔後渴此為欲解急與水解先渴後嘔為心下停水[illegible]汗後或發後胃脘飲熱停蓄嘔吐[illegible]加[illegible]吐汗下後虛煩不得眠而嘔[illegible]○寸脉數煩熱而吐為胃熱[illegible]汗下後關脉遲緩而吐為胃寒[illegible]加[illegible]不飲水而吐[illegible]去[illegible]加[illegible]太陽少陽合病自利不嘔[illegible]太陽陽明合病當自利若不利但嘔[illegible]胸中有熱胃中有邪氣腹痛氣逆欲嘔[illegible]太陽發熱汗出心下煩結轉下利嘔吐[illegible]○少陰嘔證[illegible]加[illegible]水氣或欬或悸身潤自利[illegible]去[illegible]加[illegible]膈上寒飲乾嘔吐涎沫[illegible]若更吐利手足逆冷煩躁甚者[illegible]又手足寒心中温温欲吐不得吐脉弦遲為胸中實可吐之或用[illegible]入[illegible]汁並治少陰○溫毒發斑心悶而嘔身熱足冷有本條。水逆證渴欲飲水水入即吐小腸不利故也[illegible]○金匱云諸嘔吐穀不下[illegible]似嘔似噦似喘心中憒憒[illegible]○傷寒發經吐下寒氣厥食入口即吐[illegible]○汗後水藥不入口為逆[illegible]○嘔吐膿血見吐血條

# 吐血

吐血諸陽受邪　表之不發與熱家　因而熱毒流於臟　地血三黃與犀角

諸陽受熱其邪在表當汗不汗致使熱毒入臟積瘀於內遂成吐血蓋傷寒失汗則邪熱化為瘀血或瘡毒不除亦能蓄瘀其血凡眼閉目紅神昏語短心忪痛悶眩冒迷忘漱水煩燥煩喘吐喘發狂譫語鼻衄咽啞紅背冷足寒骨熱膚腫四肢厥逆多汗頭痛胸脇小腹滿急大便黑而微利小便多而不禁此等皆瘀血證也男女均有此血脉婦人傷寒尤多見之以其從病於經水來去之期或受病中間經水適至耳血之為病大抵夜重日輕或晝明了而暮譫語血屬陰從其類也前證不必悉具但見其一二分曉便作血證主張[illegible]主之[illegible]加[illegible]白朮[illegible]量輕重用瘀血結其[illegible]主之諸證皆以[illegible]為佐取盡大便黑物則佳雖然傷寒咯血衄血猶易救療況吐血乎凡吐血皆外表未初病時可用工有陸續而來或經數時而復吐者斷不可救藥也○方藥詳見解題通用[illegible]一小盞入新汲水煎妥呑生之血熱者[illegible]論用[illegible]○大下後寸脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾膿血者[illegible]此有兩證一陽毒一少陰在陽毒則或用[illegible]在少陰則或用[illegible]加[illegible]服[illegible]吐者其後必吐膿血[illegible]非傷寒證而吐血者[illegible]若脉浮咳嗽吐血口苦咽乾[illegible]主之

衄血

衄血膀胱病欲解　脉微發表病家愁　緊而無汗麻黃進　脉緩熱熱以桂投

經絡熱盛陽氣擁重迫血妄行出於鼻者為衄其熱在表也是經表熱邪猶在經然亦不可發汗汗之則額上陷脉急緊

直視而不得以古人戒之所以無汗用[illegible]有汗用[illegible]
非治衄也散其經中邪氣耳若邪氣不得發散壅盛於經迫血而
衄後不止也太陽衄血因而欲解或有衄血不止但頭面汗
出其身無汗及發汗不至足者又為惡證當明辨之
○太陽證衄血及服[illegible]後致衄者皆陽氣盛也病欲解
也宜[illegible]○衄而脈微不可發汗宜[illegible]
[illegible]衄不止[illegible]○無汗而衄脈尚浮緊可再與[illegible]
[illegible]有汗而衄脈尚浮緩可再與[illegible]○衄而煩渴欲
飲水水入即吐者先服[illegible]次服[illegible]○陰證本無衄
若少陰證而無汗強發汗以動血血從耳口鼻而出者為
下厥上竭不可治宜要方用[illegible]○千金云凡時行衄血
不可斷之如或過多即可斷以[illegible]吹入鼻中或出血通
用○陽明發熱口燥漱水者必衄忌漱水條謹不可汗

## 膿血

下膿血室必譫語　瘀熱如狂腸胎解
消穀善飢下者　膀胱熱結六條合

○衝脈為血之海即血室也男女均有此血氣亦均有此衝脈
衝之行熱血必妄行在男子則為下血譫語在婦人則為經
水適來適去之時經氣尚虛邪氣乘虛入或熱退而留滯[illegible]
或蓄血而發熱似瘧皆謂之熱入血室私竊怪夫世俗常談
凡病皆先調氣而血之一字全不到其間一二亦知理血
則曰婦人有之不思血氣即陰陽也豈能偏勝而為
人誰獨無此血氣哉否則聖人之書所謂[illegible]
[illegible]之類是特為婦人設耶然而血證之昧何如曰挾血者
脈來洪而數閉灼明滅或沉細而澀也若大血熱交攻
則寸關盛大抵多於左手見之左手主血固如是前經云
血上逆則忘血下蓄則狂下焦蓄血小便以自利血結之[illegible]
又當以此推之外證具于吐血汗解

○陽明病下血譫語或腸癖女絡胃暴吸如見怪狀此為
熱入血室頭汗出者刺期門以瀉肝若不應可用[illegible]
加[illegible]○血痛小腹下滿血如魚脂如爛肉
汁曰或血[illegible]宜[illegible]治要方用[illegible]加
[illegible]或[illegible]○熱氣乘虛入於腸胃下有熱世汗亦黃
白服族[illegible]○與表裏證已下後脈數
不解消穀善飢多日不大便中有瘀血[illegible]
或[illegible]加[illegible]又脈數合胃熱消穀有本條下焦
蓄血其人如狂小腹結急小便以自利與[illegible]或[illegible]
加[illegible]大喉合用若只與[illegible]○太陽病不
解熱結膀胱其人如狂而血自下下者愈不愈用[illegible]○
瘀血多[illegible]至錢[illegible]倍之[illegible]及倍之新汲水煎入
醋下○失血少血或只脈遲或諸脈不出湯劑中須以[illegible]
為佐

[illegible]即三焦之府取穴以病人中指中節為寸合仰卧取臍
心正中向上五寸以墨點定復點兩邊橫量各二寸半是
約之而針其期門穴也針入四分此證治論中法可與喉之
收[illegible]不必參用

## 發黃

發黃類秋引清涼　便黑赤多血證黃
身熱濕蒸發甲亞　鼻乾腹滿胃風傷

發黃者濕熱在裏攻於外然胃蒸濕不散而得之或病屬
陽而用溫熱而被火亦發黃也濕氣勝則如熏黃而暗熱
氣勝則如橘黃而明傷寒至於發黃邪無除極熱勢極不
可以尋常治之如所謂寸口無脈鼻出冷氣如所謂形如煙
熏摇頭直視如所謂環口黧黑柔汗發黃不治者亦多矣然
而發黃之與瘀血大抵相類以作以新之日小便不利皆為
黃小便自利則瘀血也○千金云酒酒下之欲成黑疸

連根梔豉小效

○黃疸證脈沈滑而緊數弦微頭面汗出及頸而止渴引水

發黃[illegible]茵陳[illegible]

血證發黃如狂小便多大便黑[illegible]

[illegible]太陽中風發黃[illegible]熱毒鬱滯頭汗自出若發黃屎硬在裏

之可[illegible]若欲解散以用[illegible]

[illegible]病中濕傷中風與發黃不利小便非其治也○陽明傷

風發黃身汎氣短腹滿鼻乾心胸痛小便難潮熱咳嗽咽

痛身盡頭痛目脈弦浮大小柴胡湯○初發黃急用

瓜蒂散一字搐入鼻中出黃水次服茵陳[illegible]

發斑

斑如溫毒裏實同足　熱病重陽刺竹方

裏熱表虛斑發出　若還發汗因增劇

溫毒傷寒誤投涼藥或當汗不汗或當下不下或汗下未解

傷熱內伏未解外迫熱毒入胃所致發斑其狀如傷血紅斑

不散裏實表虛毛熱宗病出於皮膚輕則如疹子重則

如錦紋只斑家諸勿發汗汗之重令開泄更增斑爛加之

凡斑紀見一二須早用之宜手掩延緩陽結除不可以陰

發黑斑者熱爛胃爛無及矣然而斑之方萌與蚊迹相若又

不可誤用藥也發斑多見於胸腹蚊迹多在手足之間發前

陽脈洪大病人昏憒先紅後赤者斑也陽脈不洪病人白靜

先紅後黃者蚊也發斑陽陽毒其而陰脈形或大便自利

或怫鬱氣短而燥黃又不得通瘀偏復生黃能辨其巧

○溫毒發斑冬月冒寒至春陽氣盛則發病經汗下而

表未解毒未消也[illegible]主之肌肉斑爛咳而心悶下利嘔吐

清汗下部發或口瘡[illegible]主之○熱病發斑

時氣發斑大青四物湯[illegible]○陽毒同裏陽[illegible]斑有

本條○咽痛[illegible]○發斑通用[illegible]

[illegible]熱多者[illegible]加[illegible]

[illegible]可擇用有下證者少與[illegible]

[illegible]一劑[illegible]宜用白虎加人參湯[illegible]須以

[illegible]血熱內結者[illegible]○發斑小點指掌

色赤鮮紅者易治或紫赤紫黑者難治若初發色紅

漸次微紫及少黯又轉紅黑陽物黑暗者斷不可救初發

便如黑者亦然赤斑五死一生黑斑十死凡內外熱熾汗

下不解煩躁咳嗽足冷耳聾皆是發斑之證

舌白胎

舌胎大都表裏難　利服寒涼公嘔惡

爍爍渴飲并中濕　更兼臟結亦休看

病家邪氣在表舌上無胎自傳入裏津液結搏則舌生白胎

如滑之狀其亦丹田有熱也熱初傳裏其舌胎黃熱漸深

其舌胎黃徙入胃舌為之黃若舌胎黑色則病已深而熱

已極矣經云熱病口乾舌黑者不治蓋舌為心心屬火黑者

腎水熱所勝故舌胎反似其所勝也乎

○尺寸脈俱中熱氣而舌燥是名臟結鼻中涕出舌上胎

滑勿妄治也到七八日以來微熱手足溫者為欲解或七八日

以上反大熱者難治若腹痛者必欲利宜[illegible]若惡寒者

以欲嘔與小柴胡湯加人參[illegible]○太陽誤下胃中空虛

客熱動膈懊憹舌上胎梔子豉湯或陽明證具咽燥脈浮緊下之

而懊憹舌胎用藥同○陽明脇下鞕滿不大便而嘔舌上白

胎小柴胡湯○陽明中風舌上生胎以丹田有熱胸中有寒

濕也[illegible]主之○臟結亦從陽明舌上白胎者本條○古

黃者法當下之舌黑者不治

口燥咽乾

口燥陽明熱作渴　人參白虎解咽乾

少陽導以柴胡治　腎證難須急下安

脾胃有熱津液洞少所以口燥舌乾然而口中乾燥汗之所
何如曰汗之重無津液其咽乾若尤不可汗也治法因曰方
條或依條用藥而口中尚更不和則當以瘀血推之蓄積煩
漱水口燥咽乾血證有之矣。陽明口燥咽乾無大熱背微
惡寒煩渴白虎加人參湯渴欲飲水者用藥同。少陽口燥
咽乾小柴胡湯。少陰口燥咽乾而渴者急下之用大承氣湯
。血證口燥咽乾見漱水條。狐惑咽乾聲啞有本條

## 煩躁

煩燥來時熱氣非　陰為陽勝太陽經
陽明躁糞連臍痛　腎疾陽虛陰燥乘

心主火腎主水心熱則煩腎熱則燥此通論也傷寒煩燥則有陰陽虛盛之別焉陰虛而陽勝則為煩陽虛而陰勝則為躁有先煩而漸加躁者有先躁而後復煩若煩其熱之輕躁其熱之甚也或邪在表或邪在裏或陽勝或陰勝或火邪條例不一當詳審而調理之設若結胸證具而煩燥吐利四逆而煩燥下利發熱厥逆而燥不得眠惡寒踡臥脈不出而燥此皆不治之證或者見燥而作聲之可乎

。太陽證煩燥寸關脈浮數身熱是也風寒俱盛其脈浮緊無汗而煩燥當汗不汗其人煩燥並用大青龍湯心中悸而煩燥小建中湯。六七日渴欲飲水五苓散。無熱但狂言煩燥五苓散水調服。剛吐之自汗心煩小便數不可與桂枝湯只用芍藥甘草湯。服桂枝後汗出煩渴其脈洪大白虎加人參湯。陽明證煩燥以多日不大便有躁糞故遶臍痛而煩燥也以大承氣湯臨時輕重用。少陰證煩燥尺寸俱沉欲令自利是也。煩不得臥黃連阿膠湯吐利厥逆煩躁欲死吳茱萸湯。茯苓四逆湯。下利咽痛心中煩滿豬膚湯下利嘔煩渴不得眠豬苓湯。惡寒而踡時時自煩欲去衣被大柴胡湯。太陽病以火熏之而不得汗亦致煩燥或火劫其汗令人汗出大熱入胃而煩燥並宜白虎湯解之。汗後煩不得眠欲水者少與之小便不利與五苓散。下後發煩夜靜不嘔不渴無表證脈沉微乾薑附子湯若裏懊憹虛煩梔子豉湯發汗若下之病仍不解而煩燥茯苓四逆湯。吐汗下後虛煩心下痞滿氣上衝胸頭眩經動身為振搖茯苓桂枝白朮甘草湯。虛煩附入胸滿條。瘥後胃弱不能勝穀亦致微煩減穀則愈仍與小柴胡湯。陰極發燥或陰毒用火刼灸及投熱藥以致發燥者並不可誤用涼藥燥甚仍與熱劑用四逆湯吞下正元丹。陰盛隔陽身冷大燥欲飲水不入口不得睡脈細沉緊有本條

## 渴

渴為浮脈太陽臨　汗是陽明利少陰
陽毒熱多并中暑　其人引飲甚若深

熱氣薰蒸津液耗少所以發渴熱邪深淺雖條例不同然是渴者大抵裏有熱也或曰六經外證獨少陰曰渴厥陰曰消何耶少陰為腎主水熱氣既深腎水易渴安得而不渴厥陰屬肝心之母也病主消渴飲水多而小便少是其裏熱已極子氣乘母於是挾心火以為煩惟渴則消矣凡渴證用藥並去半夏以其性燥而遂水也若先嘔後渴則為欲解當與之水先渴後嘔則為水停心下屬赤茯苓湯故併述之

。太陽證渴則脈浮表不解心下水氣小青龍湯去半夏加括蔞根服桂枝湯汗出後煩渴甚者白虎加人參湯小便不利而渴五苓散身熱惡風手足溫脇滿而渴小柴胡湯去半夏加人參括蔞根大陽病無汗而渴勿用白虎湯可小柴胡湯若得汗後脈洪大而渴可少與白虎湯。風溫灼熱而渴括蔞根湯。陽明證渴則有汗脇下鞕不大便而嘔舌上白胎者小柴胡去半夏加人參括蔞根湯陽明病汗多而渴勿用五苓散可白虎湯若汗少小便不利脈浮而渴與五苓散一云豬苓湯

……以术为内有□□□□其性允利又当审之□发汗胃燥而汗
出小便不利渴引水浆者茵陈蒿汤○少阴发渴则
自利咳而呕引水欲饮猪苓汤下利而渴欲饮自利□□□脉微
细欲吐不吐心烦但寐小便白下利而渴□□□○阳毒大
热大渴黑奴丸□□□主之○中暑渴者白虎加人参汤若渴不已
与五苓散□□○渴欲饮水水入则吐曰水逆五苓散

漱水不咽

漱水阳明衄血时　头疼口燥无生肌
发狂发血无寒热　犀角桃仁类例推

唇燥口干血证类有之必欲取水而灌漱也然漱水而不欲
水何哉盖渴者为饮阳热入里胃中液干燥不与水耳惟
夫上焦瘀血下焦蓄血乘肺发燥渴证独然是以漱水而不
欲下咽也漱水条例惟血证有焉
○阳明身热头疼口燥漱水不欲入咽必衄血脉微者犀角
地黄汤○无表证不寒热胸腹满唇燥口干漱水不
咽小便多此为瘀血必发狂轻者犀角地黄汤桃仁承气汤
甚者抵当丸取尽黑物为度

可与水

可水除烦使胃和　当须少与勿令多
若还不与无由汗　强与还因水致疴

病非大渴不可与水渴不与水无由作汗则喘而狙也伤寒
饮水是为欲愈之候若渴者与之过多或小渴而强与之饮
腹中热少一不能消停饮作害者多矣曰水结曰喘悸曰咳
噫曰呕哕曰肿满曰下利曰小便不利安有不自水气得之
诊视又当识此
○太阳病发汗后大汗出胃中燥不得眠其人欲饮水当少
与之胃和则愈○厥阴病渴欲饮水者与水则愈○霍乱发
热头痛身疼热多饮水者与五苓散○呕吐病在膈上后必

忌水者与五苓散、水逆证见烦吐条、水结证见头汗出
条○饮水多水停心下气上乘心则为悸水气结于胸胁则
为水结胃中虚冷则为哕噎冷气相搏为噎上迫于肺则
为咳喘渍入肠中则为下利邪热所搏蓄于下焦则为小便
不利小腹满而里急溢于皮肤则为肿重○饮水过多者五
苓散导之

小便自利

小便自利血相干　审导阳明肾虚寒
脾约滋言此结坚　太阳汗下大便难

小便自利非血证则肾虚也惟血证则小腹结而如狂惟肾
与膀胱俱虚则不能约制水液是二者小便皆自利也若肾
虚而挟热为故乍难乍数谓之小便数
○伤寒下焦有热小腹必满应小便不利今反自利者此血
证也法当下之又有病在太阳身黄其脉沉结小腹鞕
坚而小便不利此则非血若或小便自利其人如狂血证谛
矣下之抵当丸○阳明自汗应小便少而反自利者津液
竭也粪虽硬但以蜜煎导之亦可以导○少阴四逆小便
自利为虚寒用四逆汤或真武汤去茯苓若小便白亦是下
焦虚寒与四逆汤○小便数大便难此为脾约麻仁丸
主之张氏云趺阳脉浮而涩浮则胃气强涩则小便数是为
脾约趺阳胃脉也此证消穀引饮盖胃壮而热矣○伤寒脉
浮自汗小便数若胃不和而谵语少与调胃承气汤○太阳
自汗四肢拘急心烦微恶寒脚挛急小便数误服桂枝得之
便厥可与甘草干姜汤芍药甘草汤○太阳吐汗下后小便
数大便因鞕小承气汤利之○小便来血证治论用犀角地黄

遗溺

遗溺风温戒利肠　腹满身重合三阳
下焦不摄兼停血　肾绝狂言五证详

水液之餘者入胞而為小便胞中虛寒不能約制水液加以邪氣乘之故旋溺自遺而不禁也

○風溫脉浮自汗體重多眠鼻鼾喘息不能言語下則小便不利直視失溲○三陽合病腹滿身重口中不仁面垢譫語遺尿並不可汗下少與白虎湯○膀胱滿水下焦不攝則亦遺溺經云邪中下焦陰氣為慄足脛逆冷便溺妄出合用四逆湯○下焦蓄血小腹結急小便自利不禁輕者桃仁承氣湯重則抵當湯○狂言直視遺尿腎絕不治

小便難

小便汗竭胃乾坐　多汗陽明並戒通
引飲濕黃須要利　溺難虛熱客胞中

汗自外泄津液中乾此小便所以不通也或陰虛而陽湊之小腸伏熱亦令旋溺赤黃數且難矣素問曰陽入陰分則膀胱熱而小便難其謂是乎多汗者以利小便為戒伏熱者以涼劑行之若夫中濕發黃不利小便非其治也

○發汗多亡津液胃中乾小便不利及陽明汗多小便不利者並不得利之小便自利則愈○引飲過多下焦有熱小便不利脉浮者五苓散脉沉者豬苓湯○中濕發黃家並與利小便○小便難者陰虛而陽湊之故小便黃為下焦熱以八正散導利之木通散亦可太陽汗後漏不止而惡風四肢急小便難桂枝加附子湯陽明中風脉浮弦大身黃潮乾氣短腹滿潮熱時噦心脇痛嗜臥小便難小柴胡加茯苓○表有水氣身熱而咳表不解心下停水小腹滿小便不利小青龍湯去麻黃加茯苓汗下後發熱頭項強痛無汗心下滿微泄小便不利桂枝湯去桂加茯苓白朮悸而發熱胸脇滿心下悸以小便不利小柴胡去黃芩加茯苓少陰病小便不利四逆散加茯苓

○瘥後腰下有水氣牡蠣澤瀉散主之

大便下利

利出腸胃清時溏　不渴脾寒濕腎虛
腸垢鴨溏并濕毒　讝言備載古人書

下利須別陰陽三陽下利身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身涼脉微此大概也自利不渴小便色白脉微者陰冷症寒凡此皆寒渴欲飲水家也如常泄下赤黃後重凡此皆熱要之風邪入胃木來勝土故大腸暴下其色或協熱者下利尤多或解散或和解或攻泄或溫中或固下焦或利小便隨證有條但不容發汗蓋邪氣內攻若外復泄其津液則胃氣轉虛必脹滿矣然則下利之脉何如曰身涼脉小者自身熱脉大者逆大則為進微弱則自止滑而數者是又有宿食也若夫下利譫語而目直視下利厥躁而不得眠下利發熱汗不止或厥不止下利厥冷無脉灸之身不溫而脉不回下利日十餘行其脉反實皆邪離正氣而下脫五奪之最急者也雖有工巧將焉用哉

○太陽陽明合病下利頭疼目疼鼻乾脉浮長葛根湯○太陽少陽合病下利頭疼胸滿乾嘔脉浮弦黃芩湯嘔者加半夏生薑○少陽陽明合病下利身熱胃脘滿乾嘔往來寒熱脉長大而弦為負負者死但長大而不弦為順又脉滑而數則有宿食小承氣湯下之遲而滑者亦少下之○太陰自和不渴四逆湯理中湯○少陰自利必渴腎虛引水自救脉微者白通湯厥逆無脉白通加豬膽汁湯通脉四逆湯若渴而嘔欬心煩不得眠豬苓湯自利清水色青心下必痛口中乾燥此不可溫須下之用大承氣湯三陰下利法當用溫若自利清水心下痛口乾燥須下之下利發渴屬少陰固也然三陽亦有欲飲水者乃有熱也○協熱利者曰腸垢臍下必熱便中垢膩亦黃或飲水乃熱也白頭翁湯黃芩湯此證最妙凡協熱下利通用之○胃寒利者曰鴨溏

臍下必寒腹脹滿便中或白膏黑或清穀四逆湯[illegible]理中湯[illegible]
四順附子湯或毒下利面戴陽者下虛也○濕毒利者腹必
痛下膿血如魚腦如爛肉汁[illegible]加[illegible]
用[illegible]加[illegible]○下利譫語有燥屎也附[illegible]微細
可下之用小承氣湯○三部脈平心下硬而下利者腸胃有
積結也急下之○下利心下痞者詳見痞條○陰毒陽毒亦
有下利者本條○下利身熱腹痛手足厥冷者急救裏用四逆湯脈
瘀後消穀此但身痛者急解表用桂枝湯○因下焦利小便
方論見飧泄風邪入胃下利熱則[illegible]冷則[illegible]
散或加[illegible]木香○假如他病腸風或血崩中漏血之人[illegible]
而下利大腸裏急痛不可忍雖與[illegible]取積已行踈滌其痛
獨存者此非積也察血虛少陽剛勝陰故當從藥當以川芎
為君察氣一調其痛立止設或小便不通五苓散不能作效
當以八正散加川芎[illegible]自然快利或熱結血滯
腹中痛甚踈通滯熱痛未得平亦當為之調血

霍亂

霍亂湯液用五苓　寒多不水理中尋
增損藿香兼甘附　中暑熱煩腹痛侵

張氏但稱吐利者為霍亂也霍亂邪在中焦以飲食與節居
變不常得之夾食傷寒陰陽乖隔上吐下利而燥擾痛悶是
其候偏陽則多熱偏陰則多寒卒然而來危甚風燭所仁
則謂濕霍亂死者少乾霍亂死者多蓋以所傷之物或因吐
利而出泄泄盡則止其死少也夫上不得吐下不得利所傷
之物擁閉正氣關隔陰陽煩燥喘脹其死多也○飲食起居
當以此為戒○霍亂吐利熱多而渴者五苓散　寒多而不飲
水者理中湯圓或不效腹滿而痛四肢拘急轉筋下利者理中湯
去朮加附子[illegible]○吐利汗出發熱惡寒手足厥冷拘急
其脈沉細四逆湯○中暑霍亂煩燥大渴心腹撮痛四肢冷

冷汗出脚轉筋香薷散○千金云轉筋者用理中湯加煅石膏
○汗後發熱頭痛吐利已止而身痛不休者[illegible]桂枝湯[illegible]
止汗出四肢厥冷[illegible]小便不[illegible]○霍
亂吐用藿香正氣散[illegible]
利加大黃[illegible]
加半夏[illegible]乾霍亂心腹[illegible]以鹽
湯[illegible]服[illegible]吐[illegible]
氣格[illegible]
用藿香正氣散加[illegible]
外入[illegible]
主之其或吐[illegible]
湯調下○大柴胡湯[illegible]
宜[illegible]者[illegible]此則非霍亂也

失音

失音發痓反張弓　狐惑唇瘡啞似聾
風熱血逆并舌卷　更兼中暑語難通

言心聲也而發音道路出於喉嗌肺亦主之若風若寒若血
若熱與夫邪毒之氣伏於心藏或滯於喉間皆令人失音或
語短而聲嘶是也活人書惟有發痓狐惑傷寒風濕而下諸
家之正說附焉○痓證口噤頭搖身強不語項強背直腰身
反張有本條○狐惑即濕䘌也蟲食下部為狐下唇有瘡其
咽乾蟲食其藏為惑上唇有瘡其聲啞有本條○風濕內有
一證發汗已身灼熱身重自汗失音下利不禁白[illegible]加[illegible]
木通湯○血證心熱語謇或昏迷忘語[illegible]○
厥陰舌卷[illegible]毒氣入藏或有不語此用小承氣湯○伏暑
發熱汗渴昏人心胞絡亦或不語此用小柴胡湯熱渴甚者
用竹葉湯○風熱喉啞不語[illegible]入[illegible]
[illegible]失音亦須調[illegible]大小便[illegible]

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之六

怫鬱

怫鬱陽氣蒸越聚胸膺　便堅爲實噦爲虛
二陽併病顏變赤　火迫身黃陽揚如

怫鬱者陽氣蒸越形見於頭面體膚之間聚赤而不散也其說則有異焉大便鞭而氣短者實也汗下後而得噦者虛也若虛若實當詳審之

○小便不利時有微熱大便乍難乍易怫鬱而不得卧此燥屎實也承氣湯主之○吐下後極虛而汗之其人怫鬱復與之水以發其汗因而得噦此胃中寒也人參湯加[?]○太陽初得病發汗不徹併歸陽明續自微汗面色赤者陽氣怫鬱也[?]主之或汗又不徹其脈緊者[?]○陽脈浮陰脈弱者以火熏劫欲令汗出客熱得火內則發揚外則怫鬱蒸肌身目發黃小柴胡湯加[?]與之

冒眩

冒因虛極有寒傷　頭痛胃堅爲二陽
吐汗下餘苓桂朮　脈沉自利理中湯

冒者蒙冒之謂眩者眩運之謂上虛則眩諸虛極而乘寒則冒二者皆相似眩其輕而冒其重也婦人新產血虛拱寒必冒冒家自汗則愈若少陰病下利止而頭眩時時自冒者此虛極而脫也其與諸逆發汗劇者言亂目眩設遇歧伯其能起之乎

○太陽少陽併病頭項強痛或眩冒胸中痞鞕刺太椎[?]不得發汗少陽本證亦有目眩見本條○陽明傷風頭眩見發黃疸○吐汗下後虛煩脈微或沉緊心下痞脇下痛氣上衝咽眩冒身瞤筋脈動惕久而成痿茯苓桂枝白朮甘草湯[?]脈沉遲面微赤身微熱下利清穀而必鬱冒汗出而解屬少陰理中湯四逆湯類經重用○太陽病若下之不愈因復發汗以此表裏俱虛其人必冒冒家汗自出而愈○又痰飲眩冒嘔吐少與[?]湯三生飲感濕頭重眩暈芎朮除眩湯○金匱曰產婦亡血復汗寒多故冒又曰產婦鬱冒其脈微弱不能食大便堅蓋血虛則厥厥而必冒皆爲虛寒

心動悸

心悸三陽證自詳　[?]詳胃調湯
冒旋甘桂瞤真武　小建中兼炙甘草方

動悸多生於停水或陽氣尚弱心下虛空正氣內動故之或汗下以後正氣內虛邪氣與之交搏而然也此蓋心悸而氣動其與驚惕不同焉

○太陽病小便利者以飲水多故心下悸小便少者必膀胱裏急也並用五苓散小半夏茯苓湯主之○陽明病壯熱往來心下悸小便不利心煩喜嘔小柴胡湯傷風往來寒熱或心下悸小柴胡湯○少陽病脈弦細頭痛發熱誤吐之必譫語煩悸爲胃胃和則愈胃不和則煩悸而大便鞭屬調胃承氣湯然[?]大略證治論只用小柴胡湯[?]微者可加大黃煩燥者可入芒硝此少見謂胃承氣證以此法代之尤爲穩當○太陽發汗過多其人叉手自冒心下悸欲得按者桂枝甘草湯○太陽病發汗不解仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者真武湯主之或理中湯加茯苓○傷寒二三日心中悸而煩與小建中湯經云先煩而後悸者爲熱先悸而後煩者爲虛惟虛則小建中主之○少陽病耳聾目赤胸滿而煩妄加吐下則悸而驚可與小柴胡湯[?]熱譫語即以小柴胡加[?]之○傷寒脈結代心動悸炙甘草湯○少陰四逆其人或悸以四逆散加桂主之○心下水氣厥而悸當先治水茯苓甘草湯然後治厥有本條不然水入胃必下利也○傷寒多因吐下或火灸或溫針以致驚惕○太陽病若下之胸滿煩驚小便不利譫語身重難以轉側用柴胡

(桂枝龍骨湯)不可發汗○風溫妄用火熏以致發黃劇則如驚癎時時瘈瘲此爲逆也(金匱風引湯)

## 發狂

發狂面赤傷重陽　葛根升麻及大黃
血證身黃仍漱水　尿多承氣地黃湯

陰邪併於陰則顚陽邪併於陽則狂傷寒熱毒在胃併入於心遂使神志昏亂言動急速而發狂也狂之發作少卧不飢妄語妄笑妄倨妄辯妄起妄行弃衣而走登高而歌甚則踰垣上屋皆獨陽亢熱使之非吐下不能止亦有當汗不汗瘀熱在裏下焦蓄血而如狂者小便必利特如狂而未至於狂耳其或熏熨迫汗灼艾燒針令人煩燥卧起不安則謂之火邪驚狂凡是數者各有條例若夫狂言直視旋溺自遺其與汗後熱多脉躁狂言不食皆者寒心焉

○重陽即陽毒脉實數狂走罵詈煩燥乾嘔面赤咽痛潮熱發斑○[illegible](陽毒升麻湯)(梔子仁湯)(三黃石膏湯)[illegible]([illegible])加(大黃)狂走者水調([illegible]末)吐痰([illegible])同吐

○血證如狂脉微而況身黃唇燥漱水不欲下咽甚者小腹鞕滿小便利大便黑而黑輕者(犀角地黃湯)重者([illegible])(抵當湯)或(抵當丸)取盡黑物爲効張云太陽病不解熱結膀胱其人如狂而血自下下者愈若外不解可與(桂枝湯)外已解但小腹結急乃以(桃仁承氣湯)攻之大抵傷寒當汗不汗熱畜在裏熱化爲血故喜忘如狂○陽狂(寒水石)([illegible])洛一錢冷水調下皆效發斑妄語未可下者(龍膽草一物湯)

○火邪驚狂者醫家以火熏熨迫汗及燒針灼艾而然也其人亡陽煩燥卧起不安(金匱風引湯)(柴胡加龍骨牡蠣湯)(桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯)又火劫腹滿微喘口乾咽爛或不大便譫語用(小柴胡湯)[illegible]([illegible]湯)

## 直視

直視無神不轉睛　衄兼少血汗猶輕
譫言喘滿搖頭證　脉濇猶衣亦卒傾

水之精爲志火之精爲神五臟六腑之精皆上注於目病人邪氣極盛冒其正氣遂使神志不慧目不轉睛而爲之直視傷寒至於直視證候最逆不漱者多亦有反目倒竄眼睛上膠此則腎絕雖曰陽引汗亦不及新矣

○衄血不可汗汗之則額上陷脉緊急直視不能眴不得眠○少血者肝氣虛目力弱若又發汗亡陽則陰陽俱虛必至直視二者雖逆猶未甚也○狂言遺尿反目直視腎絕不治○直視譫語喘滿者不治下利者亦不治○搖頭直視形如煙熏心絶不治○循衣摸床惕惕不安微喘直視日晡潮熱下之後脉弦者生脉濇者不治弦爲陽濇爲陰是陽病見陰脉邪盛而正脫也○無表裏證目中不了了睛不和大便難身微熱此非直視蓋內實也(小承氣湯)(大柴胡湯)

## 譫語

譫言脉數鄭聲虛　胃實身和熱有無
下利濕溫并血證　三陽合病各殊途

實則譫語虛則鄭聲經曰邪氣盛則實精氣奪則虛傷寒胃中熱盛上乘於心心爲熱冒則神識昏迷呢喃譫妄此邪氣盛而語言差也若汗後若病久本眞失而正氣虛則鄭重語散不知高下此精氣奪而聲不正也譫語爲熱獨語亦熱若狂語則其熱加多至於言亂罵詈又劇甚而難制矣大抵大熱入胃水涸糞燥必發譫語當下誤汗當汗過多亦發譫語譫語屬陽見陰證者逆譫語喘滿氣逆而上奔也譫語下利氣脫而下奪也真氣離絕謂之何哉

○譫語爲實脉洪數大便秘小便赤手足溫少與(調胃承氣湯)([illegible])陽實譫語脉短促者不治若逆冷而脉沉細者即死○鄭

譫為虛脉微細大小便自利手足冷用白通湯。胃實譫語身熱汗多胃中燥大便硬或潮熱少與調胃承氣湯大小承氣湯酌量用。身和譫語以發汗多亡陽津液不和致之不可下只與柴胡桂枝湯。下利譫語為有燥屎脉不微細即須下之用小承氣湯譫語而利不止則不治汲汗出譫語者風也須俟其過經乃下之。濕温苦妄言證有本條。瘀血譫語狂言漱水大便黑小便多遍身黄小腹滿緣當汗不汗蓄熱在裏熱化為血故爾輕者犀角地黄湯重者抵當湯丸。小柴胡湯。熱入血室譫語晝靜夜譫如見鬼狀速與小柴胡湯加生地稍遲則熱入胃津液燥中焦上焦不榮必為血結胸當針期門或脉遲身涼無熱胸脇滿如結胸狀亦刺期門若血熱犯於胃氣小腹急滿小便自利喜忘如狂晝夜譫語桃仁承氣湯主之。三陽合病譫語脉滑實身重難以轉側口中不仁面垢遺尿不可汗下少與白虎湯。發少陽汗則譫語經云汗之則譫語此屬胃有少陽也下之則額上汗手足逆冷謂下之早也。太陽病八九日下之胸滿煩驚小便不利譫語身重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯。發汗多亡陽譫語不可下與柴胡桂枝湯主之。火劫譫語口乾煩燥喘滿小承氣湯加[illegible]

## 搖頭

搖頭直視似煙熏　真病心家已絶根
痓證反張并口噤　頭中痛者戰而言

頭者諸陽之會陽脉有弁則頭為之搖動然有心絶而搖頭者有風盛而搖頭者有裏痛而搖頭者形證皆不類矣蓋陰根於陽陽根於陰陰陽互根氣血所以周流而無間也心絶則神去而陰竭陽獨無根不能自主是以頭搖經所謂陽反獨留形體如煙熏直視搖頭者此也。至於太陽發痓則風盛於上風主乎動是以頭搖經所謂獨搖頭卒口噤項背反張者此也言而搖頭者裏中有痛言則痛甚痛則必搖經所謂搖頭言者裏痛也又謂言或為虛不言為實此是也今是言之均是搖頭耳析而分之曰實邪曰虛邪曰真病又當明其臟否云。搖頭直視形如煙熏心家絶也真病不治。太陽發痓搖頭口噤項背反張身熱足冷有六條。搖頭言者其裏有痛言者虛也可與[illegible]

## 戰慄

戰動於身慄動心　正邪勝負兩般争
振振汗出將痊愈　鼓頷虛寒病已深

戰慄皆陰陽之争戰者身為之搖也慄者心戰而搖也邪氣外與正氣争則為戰邪氣內與正氣争則為慄戰者正氣勝慄者邪氣勝戰則欲解慄則其已甚乎。振振汗解者蓋邪氣欲出其人不虛故邪與正争發為振戰正氣勝則得汗而解矣。傷寒六七日欲愈必須振汗出而解其有身不戰而但鼓頷心慄者表邪陷裏此陰氣內盛正氣內虛不能勝邪反為邪所勝當以[illegible]併[illegible]之理至明矣經云陰中於邪必內慄也又云邪中下焦陰氣為慄足脛逆冷便溺妄出此合用四逆湯[illegible]切與發汗用

## 瘈瘲

瘈為引縮瘲為伸　熱極風生併在經
潤熱祛風猶可望　火熏發表促歸冥

瘈則急而縮瘲則緩而伸病瘈瘲熱氣極矣熱極生風風主乎動故筋脉相引而伸縮不寧傷寒至於瘈瘲疾勢過甚診視調理難乎不乖內經曰太陽終者戴眼反折瘈瘲汗出不流瘈瘲之為絶證也如此。瘈瘲最難療惟能明辯熱祛風之劑以折其熱間有可活之者治熱如[illegible]祛風如[illegible]之類是也。風温妄以火熏必於發黄甚則狀如驚癎時瘈瘲經云一逆尚引日再逆促命期設或為醫所誤以得與[illegible]火邪用[illegible]解

筋惕身瞤

筋惕身瞤發汗多　　眴暈真武更無過
左邊動氣如誤汗　　此證難醫未命何

發汗過多津液涸少陽氣偏虛筋肉失其所養故惕惕瞤瞤而跳動也張氏特設真武湯以救之然本方不特溫經助陽而已其間茯苓白朮皆於胃氣有關焉素問云脾中風則肌肉瞤蓋脾主肌肉胃為津液之海是雖過汗法當溫經助陽又不可不以胃氣為本也雖然已經吐下而復汗汗下而復燒針得之尤甚逆也經曰傷寒吐下後發汗脈微心下痞結虛煩眩冒氣上衝咽筋脈動惕者久而成痿又曰太陽汗後復下表裏俱虛更加燒針因胸煩面黃膚瞤者難治以至汗出如油口噤肉戰伸吟喘促者不治然則吐汗下可輕乎○陽氣之未有養筋發汗過多病[illegible]無陽筋必戰動或虛人微或汗或傷風自汗妄用大青龍湯[illegible]有疏逆筋惕肉瞤之證俱弱[illegible]若去[illegible]者去附子尤佳[illegible]用之○應發汗溢而腹中左右上下有動氣者並不可汗若汗之即筋惕身瞤其左邊動氣者尤不可汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤其候最逆且先服防風白朮牡蠣湯次服[illegible]之[illegible]湯十枚[illegible]二○太陽病發汗不解發熱心悸頭眩身瞤欲擗地真武湯○吐下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沉緊身振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯久而成痿者通用若心下痞滿兼與[illegible]湯加茯苓甘草

不仁

不仁口腹及膚皮　　痛癢寒溫總不知
正氣虛為邪氣伏　　榮衛傷敗形如尸

經曰諸虛乘寒則為厥鬱冒不仁蓋其血氣虛少不能周流於一身於是正氣為邪氣所伏故肢體頑痺不知痛癢寒溫誤如尸而鬱冒也苟其不仁脈或浮洪發喘無已水漿不下汗出如油喘氣絕於命門束手待盡而已○[illegible]加[illegible]或[illegible]湯以意處用○少陰脈不至腎氣微精血少寒氣上奔血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令其身不仁是為尸厥

不得眠

不眠皆溢利而煩　　大汗膀胱胃裏乾
吐汗下餘煩懊憹　　熱多熱少皆般看

素問云胃不和則臥不安所以不和者津液乾焦熱邪煩擾陽獨盛而陰偏虛故爾蓋夜以陰為主陰氣盛則目閉而臥安惟夫陰為陽所勝故終夜煩擾而不得寧所謂陰虛則夜爭者此也若陽虛而陰勝焉又有夜靜晝煩之證耳少陰下利而渴不得眠豬苓湯此得水也若二三日以上心煩不得眠黃連阿膠湯主之○太陽發汗多或大汗出胃中乾躁煩不得眠欲飲水者少與之胃和即愈若脈浮小便不利而渴五苓散○吐汗下後心中懊憹虛煩顛倒不得眠梔子豉湯或梔子甘草湯○大熱乾嘔呻吟錯語不得眠[illegible]子湯凡陽盛熱病皆不得眠○下後發汗無大熱脈沉微不嘔渴無表證夜靜晝煩而不得眠乾薑附子湯○陽勝陰則狂眠亂當用梔子豉湯陰勝陽則驚悸或沉用[illegible]○瘥後不得眠者熱氣與諸陽相并陰氣未復故也[illegible]或酸棗仁湯加竹茹亦可通用

多眠

多眠神思昏亦昏　　自汗風溫默默然
狐惑昏疲沉細脈　　太陽浮細亦嗜眠

陰邪勝陽人多昏默昏昏閉目者陰司闔也默默不言者陰主靜也多眠四證一者病在經若太陽脈浮細是陽氣未盡復也若狐惑瘥沉者得之下利則其亡陽可知亦此所以為陰勝也

○風溫證尺寸俱浮自汗體重不收嘿嘿欲眠不可
汗可萎蕤湯病在少陰厥陰二經○風溫證四肢沉重咽乾
聲啞上下唇瘡害人甚急有本條○少陰證尺寸俱沉細但
欲寐急與四逆湯復其陽氣又少陰欲吐不吐煩而多寐五
六日自利而渴張氏無治法若小便白者可用四逆湯張氏
又云少陰病脉微細沉多寐汗出不煩欲吐若變證五六日
自利煩躁反不得寐者死少陰變證難辨難治貴在審詳○
太陽證頭項痛惡寒嗜臥脉浮細或胸脇滿者小柴胡湯脉
但浮麻黃湯○胃傷風發黃嗜臥有本條

瘥後昏沉

瘥後昏沉似怪妖　或時寒熱或時潮
語言錯謬精神少　毒在心胞汗未消

傷寒瘥後半月以來終不惺惺錯語少神或無寒熱或寒熱
似瘧或潮熱頻赤盜汗以風熱治之非也是由發汗不盡餘毒
在心胞絡間致之
○瘥後昏沉不惺知母麻黃湯再取微汗○瘥後勞復食復
見下後有熱條○瘥後胃脘餘熱虛煩而嘔竹葉湯加[illegible]
○瘥後喜唾不已胸上有寒理中圓○瘥後從腰以下有水
氣牡蠣澤瀉散○瘥後日暮微煩以其病方瘥強與穀食而
不消也節飲食則愈

飲酒後

飲酒還數病復來　悶煩口燥舌生胎
妄言不寐仍乾嘔　解毒黃連湯妙哉

極陰變陽寒盛生熱古人以傷寒為大病大病之後可與酒
乎有勞復而發熱者有食復而發熱者飲酒致劇尤甚
於勞食復也
○傷寒已得汗解以飲酒而復劇煩悶口燥乾嘔呻吟妄語
不得眠黃連解毒湯[illegible]或竹皮為佐

尋衣摸牀

尋衣妄語熱蒸潮　下後陽弦病有瘳
脉濇為陰終不救　發黃須要小便流

華陀云病人手循衣縫不治間有一二活者幸也
○吐下後不解多日不大便日晡潮熱不惡寒獨語如見鬼
劇者不識人循衣撮空怵惕不安微喘直視微者但發熱譫
語並用大承氣湯下之若得大便後脉弦者生脉濇者死弦
為陽濇為陰是陽病見陰脉也○太陽病用火熏之以致發
黃陽盛則欲衄陰虛小便難陰陽俱虛身體枯燥頭汗及頸
口乾咽爛腹滿微喘或不大便譫語甚者噦循衣摸床此
證小便利則可治

百合

百合昏如祟物附　或時喜食或時嫌
似寒不冷熱無熱　欲步難行卧不恬

百合者百脉一宗舉皆受病無所謂經絡傳次也皆因傷寒
虛勞大病之後臟腑不平變而成此其狀似寒無寒似熱無
熱意中欲食復不能食默默欲卧復不得卧強欲出行復不
能行常朝口苦小便赤黃藥入即吐利也病源所載證狀一
同其脉微數每溺則頭痛者六十日愈若溺不頭痛但淅淅
如寒者四十日愈若溺則快然而但眩者二十日愈
○百合知母湯百合地黃湯滑石代赭湯雞子湯百合洗方
選用之

臟結

臟結無陽舌白胎　陰筋急痛引臍來
雖然飲食全如故　下利頻頻不可回

臟結者臟氣閉結而不復流布也一息不運機緘窮一毫不
續穹壤判臟其可結乎外證有如結胸但飲食如故時時下
利為異耳其脉寸浮關沉細而緊無陽舌胎陰筋引臍腹俱

痛是也病人脇下宿有痞氣連於臍傍痛引小腹而入陰筋者亦名臓結於此而圖其痊濟豈不難矣哉

○臓結無陽證不往來寒熱或寒而不熱其人反靜舌白胎者皆不可下也蓋其邪未全成執猶帶表寒可更用元八仍与小柴胡湯加生薑

兩感

兩感膀胱對少陰　頭疼口燥大而沉
胃脾肝膽二三日　脉證以傳推例尋

傷寒惟兩感不治兩感者半屬於陰半屬於陽臓腑俱受病也一日太陽少陰俱病則頭疼口乾煩滿而渴脉大而沉二日陽明太陰俱病則身熱鼻乾譫語腹滿不食脉長而沉三日少陽厥陰俱病則耳聾囊縮厥冷水漿不入脉弦而沉或三日而僵或六日而死張氏無治法但曰兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同雙鍾以意消息謂如下利不止身體疼痛急先救其裏與四逆湯如不下利但身体疼痛急先救其表與桂枝湯此為治有先後其達權識變之論也謝雅十釋張氏治有先後之說亦以為陽先受病在乎表則先解表陰先受病在乎裏則先救裏是亦一意然先表者裏不可緩先裏者表亦不可緩也歟

蚘厥狐惑

蛔厥烏梅及理中　臓寒胃冷吐長虫
咽乾聲啞名狐惑　濕䘌雄黃限數終

蚘厥證傷厥陰病家有寒妄發其汗或汗後身熱又復汗之以致胃中虛冷故長虫逆上飢不欲食食即吐虫其人靜作煩者虫或上而或止也虫聞食臭必出所以食則吐虫也張氏有言厥陰為病消渴氣上衝心飢不欲食食則吐蛔也蛔既出於胃冷復有消渴之證何哉蓋熱在上焦而中焦下焦虛寒無熱所致或大便難結是亦痼毒使然又不可備為

狀者用半夏瀉心湯加大黃入藥以利之白虎湯所以當太過也○治法先服理中圓次用烏梅圓若誤下之利不止則用四逆湯又法理中圓加伏龍肝黃連瀉者加附子

○狐惑與濕䘌皆虫證也狀如傷寒多因傷寒下利變壞成之蓋腹中有熱入食無多腸胃空虛故三虫求食而食人之五臓也其候四肢沉重並惡飲食默默欲眠目不能閉舌白齒晦面目閒赤白黑色變易不常虫食下部為狐下唇有瘡其咽乾虫食其臓為惑上唇有瘡其聲啞濕䘌異候例是難調理有方此越人所以望而驚也○治惑桃仁湯黃連犀角湯雄黃散備用而已金液丹方狀治濕䘌蓋能殺腹中諸虫無陽者與之

陰陽易陰陽交

陽易陰根腫痛深　腹連腰胯痛為陰
溫家脉躁重生熱　陰與陽交汗莫禁

男子陽易婦人陰易病新瘥而動淫慾也一名交易復感於情者亦然其候身重氣乏小腹絞痛頭不能舉足不能立四肢拘急百節解散眼中生花熱上衝胸在男子則陰腫入裏腹內攻刺在婦人則裏急腰胯引腹俱痛若手足拳攣其脉離經皆不可治或榮衛虛精髓竭翕翕少氣著床不能動搖者引歲月死呼內傷六氣外傷七情其為害若是歟

○損脉離經一呼一至是為不足至脉離經一呼三至是為有餘○燒裩散豭鼠糞湯竹皮湯青竹茹湯當歸白木湯以意擇用○陰陽交者溫病不得發汗若汗之復生大熱狂言不食其脉躁疾是也大抵不治若脉浮數則表證猶在可再汗之若脉沉實或狂語則為胃實陽盛又當下之發汗後復熱者通用此例○再汗用桂枝湯○再下用承氣湯

陰毒陽毒

陰毒身如被杖然　痰沉汗濕痛咽咽

身斑而赤多煩躁　陽毒狂言洪數強
陰氣獨盛陽氣暴絕則為陰毒身冷有汗其脈沉細而疾是也或有初病便然而成者有服藥數日變而成者蓋以腎氣虛損生冷傷脾內已伏陰外又感寒致之或先感外寒而後伏陰於內內外皆陰陽氣不守故偏陽氣獨盛陰氣暴絕則為陽毒身熱無汗其脈洪數是也有初病便然而成者有已經吐下變而成者蓋以酒熱過度丹砂燥藥胃經熱致之或病證為陽誤投溫藥助熱為邪內外皆陽陰氣不守故爾陰陽二毒皆有頭疼藏利之證抑陰用熱抑陽用涼則有膠倒然此二毒隨氣逆上結伏於胸中皆令人心下堅硬非常法所能通也當急作規察以泄之陰毒泄則陽氣復陽毒泄則陰氣復陰陽升降榮衛流行自然大汗而解矣若心下已結延至六七日間斷不可活外證治法詳于後篇○陰毒外證面目唇爪青黑口閉氣粗咽喉不利手足厥冷身不甚熱痛重如打撲或戰慄而寒頭目俱疼腰重背強毒氣攻心心下堅滿臍腹中絞痛外腎並縮下令硬額上及手背間冷汗不止嘔吐下利煩渴陰燥精神恍惚言語譫譫聲音鄭重舌上黑色陰病回陽服藥未透亦須外借火氣但勿迫脅也[illegible]能解散寒邪發越陽氣亦要藥也○陰毒脈細而疾身冷有汗[illegible]可服[illegible]用之令陽氣復而大汗解矣○陰毒已深見灸[illegible]二穴以手足和為度仍以[illegible]六脈附骨[illegible]者臍中用先灸法方訣詳具于後凡治陰毒得陽氣下復者皆生煩燥切勿誤投涼藥[illegible]催○陽毒外證身量大熱面目俱赤無汗頭疼腰背四肢疼痛發斑如錦紋心下結硬煩燥咽痛喘促嘔吐膿血下利赤黃小便赤黃譫語驚狂或夫甚者舌卷而焦黑鼻如煙煤○陽毒脈洪

促數○陽毒無汗[illegible]即[illegible]調下或研[illegible]大者三條入[illegible]各少許新汲水調灌下可沒用之令陰氣復汗解矣陽毒大熱煩渴譫語亦斑衄血不止[白虎湯]一服效○陽毒已深脈洪大內外結熱舌卷黑鼻中如煙煤用新汲水浸洗布數重搭於胸上頻又換新水浸布漬令熱就熱減即已之詳決于後○太歲陳北山方訣治陰毒心下結伏按之極痛大小便祕澁累日用藥不下但此氣猶燥亦可療治急取巴豆肉十粒研爛入[illegible]一錢許捻作一餅[illegible]實安臍心立小艾炷灸五七壯覺腹中鳴良久自通利其次用[illegible]一束緊紮切作數餅炙令溫熱貼於臍下以熨斗火熨其上續又易之漸覺體溫即以五積散二錢[illegible]一錢[illegible]七片棗一枚[illegible]水大盞煎七分為服連併二三[illegible]汗出而解又法以大蒜一枚搗研作餅子灸熨置於臍上灸十壯大小便即通○治陽毒累經藥下不通結胸堅硬按之極痛以利通而復再結喘促躁熱大躁狂亂即取大[illegible]少許洗淨乳缽內研如泥入生薑自然汁少許[illegible]一匙[illegible]少許新汲水小盞調和徐徐灌盡漸次涼快若熱服藥[illegible]少許如未効再作一劑自然汗出而解或用[illegible]已試[illegible]同灌下二毒灌藥必須以手揉其心胸須得藥下○本事方灸結胸巴豆肉七粒[illegible]七寸熱[illegible]律唾[illegible]安於臍心以艾灸其上不拘壯數以腹中有聲為効灸畢以溫湯利常拭之恐成瘡爛此方與[illegible]一同陰陽二毒但有機穿者皆可灸臍自有聲則得汗解○尚藥孫用和[illegible]治陰陽伏逆發為結胸五六日大便結攻之不及達之不可以此主之用[illegible]脂[illegible]巴豆肉不去油各十兩[illegible]半分[illegible]半錢[illegible]右件將法[illegible]半升入[illegible]

三未發成膏次入餘藥打和得所圓如芝子大〔圓〕〔每〕
二圓〔〕湯調下

陽證似陰陰證似陽

陽證如陰冷四肢　脈沉亦大便秘
面紅須燥身微熱　陰證如陽沉而微

陰極發燥陽極發厥物極則反也重陽必陰重陰必陽寒暑之變也四肢冷小便赤大便秘或身熱黑眼開而動脈沉而此謂之陽證似陰面赤煩燥身有微熱眼開氣促脈沉而微謂之陰證似陽欲知的定當推原反本察色辨聲辨以六經參以外證徐徐焉辨脈驗之數熱遲寒陰陽別矣〇陽之體輕陰之體重陰家脈重陽家脈輕〇陽盛且靜陰盛便躁陽盛發渴陰盛發爭〇陽證似陰〔白虎湯〕熱極生寒則四肢逆冷水或用〔承氣湯〕〇陰證似陽〔四逆湯〕加〔蔥白〕土之陰盛則陽下虛則面赤表寒則身微熱也

陰盛隔陽

〇陰盛隔陽脈細沉疾身冷大煩躁嗜臥泥水之中欲飲水而不欲入口者是飲水若非可服〔霹靂散〕〔火焰散〕〔丹砂丸〕〔不效〕孫用和以半兩〔黑附子〕一枚燒存性候冷爲末入真臘茶一大錢已和爲二服每服水一盞〔煎〕半盞前六分冷服躁止得睡汗出皆變之驗也

新刊仁齋傷寒類書活人總括卷之七

小柴胡湯加減法

傷寒諸方惟〔小柴胡〕爲用最多而諸家屢稱述之蓋以〔柴胡〕〔半夏〕能利能汗凡半表半裏之間以之和解皆可用也抑不知〔小柴胡〕非特爲表裏和解設其於解血熱消惡血誠有功焉蓋傷寒發熱一二日間解散不去其熱必至於傷血不問男女皆然〔小柴胡湯〕內有〔黃芩〕〔柴胡〕最行血熱所以屢獲奇功但藥性之寒用之貴能加減今所以活法凡表發熱裏又自嘔渴發熱若是爲以外俱熱〔小柴胡〕加〔大黃〕裏無邪證但發熱在表者〔小柴胡〕加〔桂〕桂主解表可以溫血所謂陽盛陰虛以寒甘辛發散者此也〔大黃〕主攻裏可以蕩滌血熱所謂陽盛內熱者苦湯泄者此也是又別其解表以溫攻裏以寒之義若遇少陽之證及無表裏證或表裏不分之證但依本方用之並不須加減此爲正訣虛者少與尤在酌量子每于後寺數益然傷寒輒用〔柴胡〕其效蓋於消血討不思一帶中脘二動爽延二三〔〕而熱又非〔柴胡〕之所能除盛之其奏否則熱入血室張氏特以〔〕〔〕主之何哉然均是和解其局方以〔和解散〕半種之劑爲和解張氏以〔小柴胡〕若寒之劑爲和解其安在哉蓋局方〔和解散〕爲藥當用和平解散也若夫熱在半表半裏既不可汗又不可下求〔小柴胡〕一劑既能內和而外解平然而奈若不下不可以輕心而用〔小柴胡〕也耶之不審證之不詳縮標〔〕就〔〕〔柴胡〕以爲公權脫遇熱似陽其不誤人陛命幾希矣甚而遂以〔小柴胡〕成效一二而乃不遵格法輒用〔大柴胡〕甚至一差禍不旋踵吁可畏哉

傷寒諸證

發汗〔肝〕絕〇反目搖頭直視形如煙薰〔心〕絕〇唇吻反青四肢直視狂言遺溺〔腎〕絕〇汗出髮潤喘而不休〔肺〕絕〇環口黧黑柔汗發黃〔脾〕絕〇汗出如油喘促無序水漿不下形体不仁命

總。大抵濕家汗則成痓，痓而痙不治。發濕溫汗必身青面變耳聾不語曰重暍不治。發風溫汗必譫語並不治。發風濕中濕汗並逆。發動氣汗不治。發少陰汗必九竅出血曰下厥上竭不治。發少陽汗則譫語。發汗只在頭面不至遍身鼻衄不止者逆。發汗不至足者逆。諸逆發汗微者言亂目眩並不治。當汗無汗服藥數劑汗不出者不治。汗出如珠不流不治。汗出如油口噤肉戰声吟喘促不治。汗後嘔吐水漿不入口者逆。熱病脈躁盛而不得汗不治。汗後不為汗衰後大熱脈躁疾狂言不食曰陰陽交不治。忽目眩無汗服藥後汗解則生若無汗脈不至者不治。少陰證並無脈服藥湯解其脈漸續則生暴出則不治。下利發熱無脈灸之脈不回身不溫不治。少陰四逆下利惡寒而拳發躁無脈不治。下利日十餘行其脈反實者逆。少陽陽明合病下利脈長大而弦曰負不治。陽病見陰脈不治。發熱屬陽見陰脈不治。代脈不治吐血衄血脈反浮大而牢不治。陰易陽易熱離經外腎腫腹中絞痛手足拳攣不治。欬逆上氣脈散者不治。譫語脈反沉微四肢厥冷不治。脈陰陽俱虛熱不止者不治。七八日以上發大熱難治。舌本爛熱不止者逆。下利發熱或汗不止厥不止並不治。下利發熱厥逆躁不得眠不治。譫語直視或喘滿或下利並不治。譫語稱眼見陰證者逆。傷寒脈乍疎乍數不治。發斑先赤後黯面色黧黑不治。發斑大便自利不治。發黃而変黑不治。口乾舌黑不治。口張目陷不治。張口出氣乾嘔脣燥熱痛者浮沒逆不止者不治。心下痞悶上氣喘鼻者逆。霍亂喘脹煩渴不治。誤下濕家額汗喘促或小便不利大便自利不治。頭汗內外閉格小便不利此為陽脫不治。腹滿咳逆不得小便不治。腹大滿而下泄不治若脈洪緊而滑沈可癒。臟結如附臍旁白胎陰筋引臍腹痛時時下利不治。結胸證具加煩躁不治。臟厥七八日發厥膚冷煩燥下利無時暫安不治。少陰吐利厥逆煩燥不治。厥而下利反能食者曰除中不治。四肢厥逆臍下絞痛右硬眼定者逆。厥陰脣青舌卷耳聾囊縮不治。頭連腦痛甚手足俱寒不治。陰毒陽毒過六七日不治。兩感不治。狐惑咽乾聲啞脣瘡不治。赤斑五救其一。黑斑十救其一。尋衣摸空者逆

傷寒別名

清便自調有可謂大小便如常也。大便秘而堅則曰鞕。小便不利小便少下利清穀清謂水穀不分。得大便曰更衣。大便堅小便利曰脾約。下利曰飧泄。腸澼謂痔也。寒而利曰鴨溏熱而利曰腸垢。轉失氣謂氣轉而鳴時時失下即後分泄氣。蓋腹中有積。大汗傷氣大下傷血或火邪逼迫驚狂或尺寸脈緊而反有汗或發汗後汗不止而漏風或陰病本無汗而反有汗或其脈浮遲微弱不能作汗皆曰亡陽。吐汗下溫針以後其病不解曰壞病曰何逆。瘥後更發熱曰過經。臍相紐賊門兩手無脈曰雙伏一手無脈曰單伏。左關脈曰人迎右關脈曰氣口足趺上動脈曰衝陽足後跟上踝中動脈曰太谿。婦人乳頭直下近腹處曰期門。臍下一寸曰氣海二寸曰丹田三寸曰關元。玄府即汗空也。臍間動氣曰奔豚。筋惕肉瞤曰瞤。中暑曰中暍。春發熱溫汗曰重暍。身欲飲水水入即吐曰水逆。心下停水怔忪身無大熱頭額微汗曰水結胸。乾嘔曰噦吃逆曰噦。目中不了了謂不明了也精不和謂不和平如常也。三月至夏方發病曰晚發

傷寒戒忌

傷寒新瘥後但少喫糜粥常令稍飢不得飽食反此則復。又不得早起不得梳頭洗面不得多言不得勞心費力反此則復。瘥後百日內氣體未得平復犯房事者死。忌食猪羊雞魚

狗肉肥魚油膩諸骨汁及生冷粘滑動氣臭物

藥有寒溫相濟

黃連湯用乾薑黃連柴胡桂薑湯用黃芩與桂枝麻黃升麻湯用桂枝石膏返陰丹用附子硝石除旦湯用乾薑黃芩與夫桂枝石膏湯桂枝大黃湯乾薑黃連黃芩人參湯其藥性寒其藥性溫溫以調陰寒以調陽事使陰陽調而得其正其有陽證當下而裏怯者陰證當溫而帶熱者皆可以前例推之亦當權其冷熱重輕爲之增減斯可矣雖然古之分劑與今之分劑多寡又不同焉並前料三四錢爲一服水則用一大盞取七分爲一劑此亦通今之論也所謂利藥不嫌生溫湯須要熟又當權衡於此云

持脉

傷寒治法以脉爲要間雖有之證如此脉亦如此條例徑行若證熱而脉遲證寒而脉數切不可自惑於倉卒須是畧去外證專以脉爲主須斟酌而調理之庶無差誤雖然偏陽之脉又何耶曰人稟陰陽二氣陰根於陽陽根於陰往來流通而無間斷者也一或偏勝百病生焉善偏陽則多熱偏陰則多寒偏陰則六脉沉濡按之無力頗有細滑輕浮之狀病主沉寒法當溫散人所易知若夫病雖內外有熱其脉不數不洪但指下急疾而小緊如枝條刮刮之狀此則爲陽勝陰當用寒涼之劑以解陽熱鬱伏之邪以行血熱凝結之毒不可錯認以爲脉小弱虛冷以溫藥益其疾也縱或咽喉不大熱身表虛熱氣閉陽衝不可以溫燥之劑投之否則逼從火積新之轍矣凡病皆當審斯

警省

傷寒證候須刻傳以傷寒治法細又難識非可以輕心視之也其間種類不一條例甚繁甚則難矣至於陰極發燥熱極發厥陰證如陽陽證如陰脚氣似乎傷寒中暑似乎熱病與夫蓄血一證上熱下冷乍開乍閉食至四肢發厥昏迷悶絕凡此等類方從消息而明辨之若疑似未別體認未明姑且試探切不可妄投決病之劑方已難施死生之係也謹之哉

藥方

本祖南陽活人書其詳見於傷寒百問

凡下證不得用圓子藥謂水溢丹巴豆之類作圓以爲轉下藥性有毒只取積滯傷動臟腑不能蕩滌邪熱以去病也

○小兒傷寒鍼度如大人法但分劑少異其間用藥小冷耳

產婦傷寒

或問婦人傷寒可得聞乎曰傷寒三百九十七條一百一十三方比張氏截然之筆削也於其證則有其藥實皆以男女爲別哉要之月事去來產前產後男子所無請啟明其證以解世俗之惑盍婦人以血爲主發熱惡寒經水適來經日熱除而胸脅滿如結胸者是則邪氣結於胸脇當刺期門隨其實而取之傷風經日續得寒熱發作以經而經水適斷者是則血結而不行當以小柴胡湯散之所謂治之而愈者此也至如傷寒發熱經水適來晝日明了暮則讝語如見鬼狀是則熱無留邪熱隨血散所謂不治自愈者此也前乎吐血下血兩條併以犀角地黃湯黃連阿膠湯葶藶之類言之詳矣抑產前產後治法將何擇焉曰產前安胎產後消瘀於是傷寒條例斟酌輕重而調理之安胎者何然生四物湯爲要藥也如阿膠艾葉白朮黃芩安胎及姙熱等證則不可輕用也消瘀者何四物湯加牡丹皮桃仁紅花爲要藥也如內補攔住敗血之劑則不可輕進也宋氏以四物湯加生人參茯苓白朮等而細末糯米飲調劑爲孕婦安胎以至臨月一分桂枝湯半之前爲解表消瘀以護胎且夫劑濃汁爲產前發散以小柴胡湯去半夏和解熱入子宮邪搐中以四物湯一度減半末之吐服主大便秘澀又以承氣湯一法真可活人然則產婦證治觀此可以開津矣雖然如安胎則不可不調氣消瘀則不可不扶虛

附子以調氣也[illegible]人參以補虛也退熱則柴胡黃芩

解肌則麻黃葛根潤腸則大黃芒硝助陽則乾薑附子其間

採撫雖未備古人之經然而甘辛為陽酸苦為陰皆不越古人

之意姑存之篇末以便參考者之觀覽云

小兒傷寒

或問小兒傷寒何得聞乎曰小兒傷寒与大人法事則同但分

劑少異用藥小冷巳略陳於前矣然而驚風瘡疹亦皆發熱布此

尤不可闕請發明其證而條析之感風寒者必隈人藏身引

衣密隱是為表證可微取其汗也感熱內實者必出頭露面揚

手擲足煩渴燥糞掀衣氣麁是為裏證可略与疏利也冷若頭

額冷手足涼口中冷氣面色黯淡大便泄青此則陰病裏虛當

以溫藥救其裏也凡是三者汗下溫之法可以類推矣發汗用

[illegible]解肌用[illegible]加[illegible]通利[illegible]

[illegible]微利[illegible]溫裏[illegible]承常感

冒或參蘇飲傷風發熱人參羌活散或[illegible]壯

熱[illegible]潮熱者[illegible]小柴胡湯加大黃小便不通

[illegible]表裏俱熱如表裏俱見之證[illegible]

主之咳嗽則人參[illegible]加[illegible]夾食則[illegible]

亦視其小便或赤或白可以知裏熱之有無或清或濁可以知

裏熱之輕重幼而嬰孩則以虎口指紋之紅色驗之長而童穉

則以一指按其三關擇左手人迎之緊盛醫者斷之所謂七十二

證其證其方皆無越張朱格例特不過小小分劑而中病則止

也不然幼幼新書顱顖集小兒傷寒雖略舉世之一二而終備以

活人書為法果何意哉故附于卷末以備參考者之觀覽云

# 新刊河間劉守真傷寒直格三卷

（金）劉完素撰

元天曆元年建安翠巖精舍刻本

傷寒直格方三卷傷寒標本心法類萃二卷（通行本）

舊本皆題金劉完素撰。傷寒直格方大旨出入於原病式，而於傷寒證治議論較詳。前序一篇，不知何人所撰。馬宗素傷寒醫鑒引平城翟公旹行運燈之語與此序正相合，殆即翟公所撰歟。醫鑒又元完素著六經傳變直格一部，計一萬七千零九字。又於宣明論中集緊切藥方六十道，分六門，亦名直格。此書有方有論，不分門類，不能確定原為何種。卷首又題為臨川葛雍編。蓋經後人竄亂，未必完素之舊矣。傷寒標本心法類萃上卷分別表裏，辨其緩急。下卷則載所用之方。其中傳染一條，稱雙解散、益元散皆為神方。二方即完素所製，不應自譽至此。考完素原病式序稱，集傷寒雜病脈證方論之文，目曰醫方精要宣明論。今檢宣明論中已有傷寒二卷，則完素治傷寒法已在宣明論中，不別為書。二書恐出於依託。然流傳已久，姑存之以備參考焉。

# 新刊劉河間傷寒直格目錄

傷寒方論自漢長沙張仲景之後惟前金河間劉守真深究其旨著為傷寒直格一書誠有益于世今求到江北善本乃命臨川葛仲穆編校敬壽梓行嘉與天下衛生君子共之
歲次戊辰中秋書林翠巖精舍刊行


上卷

習醫要用直格

十干　十二支
攝形數理合　主運主客天地四時
合有六義　陰陽臟府
經絡病證　內外八邪
內外兩生四類　九氣
五邪　五邪微甚
十干夫婦配合成五運　五運大過不及
十二支應六氣　六氣有餘不足
六氣　五運應五藏主病
六氣為病　脈應三部九候
脈有輕重　脈息遲速
七表為陽　八裏為陰
四時平脈　六步主位平脈
結代促　診傷脈
大絡脈　死生脈候

中卷

習醫要用直格

傷寒總評　裏外傷



表裏證　主療
傷寒表證　傷風表證
俱中風寒　諸可下證
瘀血下證　發黃
結胸　痞
懊憹

下卷

習醫要用直格

諸證藥石分劑　泛論
戰汗　發汗
汗後　傷寒傳染

後集

[illegible]

傷寒心要論方　餘論

續集

[illegible]

論陽證　論六經傳受
論呼[illegible]　論陽厥極深
論蓄熱發黃　論不得眠
論嘔吐　論蓄熱下利
論霍亂　論好用涼藥
論小兒瘡疹

別集

[illegible]

傷寒論與[illegible]散　論發汗
論攻表　論攻裏發表
[illegible]　傷寒[illegible]往來[illegible]
[illegible]


新刊劉河間傷寒直格目錄

# 新刊河間劉守真傷寒論方卷上

臨川葛雝仲穆編校

## 習醫要用直格

○十干

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

○藏府配合

甲膽手少陽　乙肝手厥陰　東方木也
丙小腸手太陽　丁心手少陰　南方火也
庚大腸手陽明　辛肺手太陰　西方金也
壬膀胱足太陽　癸腎足少陰　北方水也
戊胃足陽明　己脾足太陰　中央土也

凡先言者為剛為陽為夫為府主於表後言者為柔為陰為妻為藏主於裏也

○十二支

寅卯辰　巳午未　申酉戌　亥子丑

○藏府經絡配合

寅三焦手少陽　卯大腸手陽明　辰小腸手太陽
巳包絡手厥陰　午心手少陰　未肺手太陰
申膽足少陽　酉胃足陽明　戌膀胱足太陽
亥肝足厥陰　子腎足少陰　丑脾足太陰

手足三陰三陽者十二經絡之名也

○手足經絡應天地四時

寅卯辰手三陽天陽春也　巳午未手三陰天陰夏也
申酉戌足三陽地陽秋也　亥子丑足三陰地陰冬也

○合主表裏　合音閤　余不音者並如字

太陽少陰合　陽明太陰合　少陽厥陰合

足與足合　手與手合　如足太陽膀胱水合足少陰腎水也陽為府屬表
陰為藏屬裏

○陰陽藏府

肝與膽厥陰風木也　心與小腸少陰君火暑熱也
包絡及三焦少陽相火也　肺與大腸陽明燥金也
脾與胃太陰濕土也
腎與膀胱太陽寒水也

此六藏與六府

脾 心 肝 肺 腎 兼包絡一名命門 為六藏
胃 小腸 膽 大腸 膀胱 兼三焦 為六府

○經絡病證

絡者正經脈道之旁小絡如支絡孫絡之類也皆運行氣血之脈也各見於本經焉

手太陰肺病則肺脹膨膨而喘欬缺盆中痛甚則上氣喘喝煩心胸滿臑臂內前廉痛厥甚則交兩手而瞀肩背痛而汗出虛則氣不能報息小便變

十二經始於肺終於肝其序如此　喝乙介切聲也　缺盆在肩下橫骨陷中也　臑音如從肩至肘通名曰臑自手至肘通名曰臂　瘵其所也

瞀音茂目眩也亦悶也言氣亂兩手相交而瞀也　不能報息謂所云氣少不能接續也　數音朔頻也

手陽明大腸病則齒痛頰腫虛則目黃口乾鼽衄喉痺腹中雷鳴以泄為鶩溏不能久立肩前臑痛大指次指不能為用

頗音拙面顴骨目下起骨也　鼽音求清涕也　衄音女六切鼻血也

不能為用言屈伸不能如意也

足陽明胃經病則洒洒振寒善伸數欠顏黑惡人與火聞木聲則惕然而驚心欲動獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是為骭厥氣盛則身以前皆熱消穀善飢溺色黃氣虛則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿脘當心而痛上支兩脇鬲咽不通食飲不下狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎唇胗頸腫喉痺腹水大腹膝臏腫痛循膺乳氣街股伏兔骭外廉足跗上皆痛中指不能動

振動也　欠音佉　若伸自努能也　數欠頻呵欠也　心欲動不寧也

閉戶為惡人聲多驚　賁音奔　響腸鳴也

文骭也　骭骨也　瘧亂也　臏音牝膝蓋也股膝脛內　伏兔膝上起肉也

跗戶當切乃脛骨也　跗趺音夫足面動脈處

足太陰脾經病則舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重得後與氣快然而衰甚則肌肉痿足不收行善瘛腳下痛四肢不舉大小便不通虛則腹脹腸鳴飧泄食不化舌本痛不能動搖食不下煩心心下急痛溏瘕泄水閉黃疸不能臥股膝內腫厥大指不用

秋占按寸口手太陰寸口也 瘖 不能言 瘕 音假腹中結病也
水閉 言不得宣通也 噦 於月切逆氣上衝也 殼 苦角切
嘔吐也 契 口也 於血不通而相搏也 喉 咽喉也 欬 其也不能言
手少陰心經病則胸中痛脇支滿脇下痛膺背肩胛間痛兩臂內痛其病嗌
乾心痛渴而欲飲身熱膚痛煩心譫妄虛則善悲脾欬作嘔嘔脇下痛腰背
相引而痛目黃脇痛臑後廉痛掌中熱
譫 音占多言也 妄 見虛妄而言也 欬 喉中聲 嘔 音歐吐也
作 音乍 熱而痛也
手太陽小腸經病則嗌乾頷腫不可回顧肩似拔臑似折虛則小腹控卵引
腰脇上衝心痛耳聾目黃頰腫頸腫肩臑肘臂外廉痛
嗌 音益氣管也 少腹 臍下兩旁也 控 引也 卵 陰丸也
足太陽膀胱經病則頭強頭中痛目似脫項似拔腰似折髀不可
以曲膕如結腨如裂虛則痔瘧狂顛疾頭顖頂腦戶中痛目黃淚出
項背腰尻後膕腳皆痛小指不爲用
衝頭痛 膕 曲膝處也 結 腨 市兗切 名腓
腸也謂腓肚也 顖 頂也 尻 苦刀切 脊骨盡處也
足少陰腎經病則飢不欲食面黑如漆咳唾則有血喝喝而喘坐而欲起目
䀮䀮如無所見心懸如飢驚大骨痿喘咳身重汗出憎風虛則胸中痛大腹小腹痛
泄寒濕流水脹股痛腹脹腸滿脊不仁足痿而厥意不樂大便難善恐
心惕惕如人將捕口熱舌乾咽腫上氣嗌乾而痛心煩而痛黃疸腸澼脊股
內後廉痛痿厥嗜臥不安足下熱而痛
喝 乙介切 䀮 音荒 濡 濡泄也 寒濕 不便 不利也
心煩亂不寧也 痿 痺痿也 清厥 手足清冷而厥逆也
嗜臥 不安也 腸澼 下利也
手厥陰心胞絡病則手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿心澹澹大動面
黃目赤喜笑不休虛則煩心心痛掌中熱
澹澹 水搖動貌
手少陽三焦病則耳聾渾渾焞焞虛則目銳眥痛耳後肩臑肘臂外皆痛小
指次指不能爲用
面塵 面如浮塵 馬刀 瘰名 俠 音協
足厥陰肝經病則腰不可俛仰丈夫㿉疝婦人少腹腫脇痛引少腹甚則
嗌乾面塵善怒忽忽眩冒顛疾目赤腫痛耳聾頰痛虛則目䀮䀮如無所
見耳無所聞善恐如人將捕之嘔逆洞泄狐疝遺溺癃閉
喉 脇肋 下骨爲肋脇肋之下曰肋 忽忽 心昏亂也 眩
暈也 俛仰 同疾病也 狐疝 音孤 氣之
若狐也 遺溺 小便不禁而病 癃

## 內外八邪

外有風寒暑濕內有飢飽勞逸此八者乃疾病之所由生也與
相反故經曰勞者溫之逸者行之使氣血運行也
保其強力之勢久逆則導引以宣積滯之氣或作役者誤也

## 內外病生四類

一者因氣變動內成積聚癥瘕癲癇之類也
癥 音貞 瘕 音假
二者因氣變動而外成癰腫瘡瘍疥癩疽痔掉瘛浮腫目赤瘭胗胕腫痛
痒之類也
不因一時所傷而病乃久以漸積聚時變動與衰而病皆是可因氣變動
也 所知卒然而即成病 不因氣之變動也 而大腸
三者不因氣變動而病生於內則留飲辟食飢飽勞損宿食霍亂悲恐喜怒
想慕憂結之類也
癖 霍亂 上吐而下泄也
四者不因氣之變動而病生於外則瘴氣賊魅蟲蛇蠱毒蜚尸鬼擊衝薄墜墮
風寒射剌割捶撲打擦壓溺之類也
蜚 夫尸 傷人也

## 九氣

怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收炅則氣泄驚則氣亂勞
則氣耗思則氣結
炅 音桂 熱也
人怒則氣逆甚則嘔血及飧泄故氣上也
人喜則氣和而志達榮衛通利故氣緩緩猶和也故令人氣散也 悲則
心系急肺布葉舉而上焦不通榮衛不散熱氣在中故令人氣消也 恐
則精卻卻則上焦閉閉則氣還還則下焦脹故氣下行也 寒則腠理閉
而氣不行故氣收也 炅者熱也熱則腠理開而榮衛通汗大泄故氣泄
也。驚則心無所倚神無所歸慮無所定故氣亂也 勞則喘且內外皆
越故氣耗也越散也 思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣

結也結者陽而不通也

五邪

母乘子曰虛邪 自後而來 如心火熱乘脾土也

子乘母曰實邪 如肺金燥乘脾土也

妻乘夫曰微邪 如腎水寒乘脾土也

夫乘妻曰賊邪 如肝木風乘脾土也

自病曰正邪 如脾土自病濕也

五臟所同治 各以類推

五邪微甚

微虛正實賊從微至甚也

此亦大略之言細而推之各有微甚

十干夫婦配合成五運

甲己合為土運 甲剛木克己柔土為夫婦成土運

乙庚合為金運 乙柔木嫁庚剛金

丁壬合為木運 丁陰火配壬陽水

丙辛合為水運 丙陽火娶辛柔金

戊癸合為火運 戊陽土娶癸柔水

五運太過不及

陽剛者為太過 陰柔者為不及

此其略也凡六十年而周甲子其中有歲運同司天曰天符同歲支曰歲會又與年支同曰支德符歲運同司地曰同天符同歲會凡此一千九歲太過可天克之曰天刑及年前大寒交氣其時運與氣程為夫妻若不程終待皆非太過不及乃年運之氣中申子辰年須初交已酉丑年巳亥交寅午戌年申初交亥卯未年亥初交氣也

十二支應六氣三陰三陽

六氣為本三陰三陽為標

子午少陰君火 丑未太陰濕土 寅申少陽相火

卯酉陽明燥金 辰戌太陽寒水 巳亥厥陰風木

六氣有餘不足

孟少仲平季多也

乃以寅申巳亥四孟為一陰一陽也子午卯酉四仲為一陰一陽也辰戌丑未為二陰二陽也然陽為先故主運先而化氣微而少陰為後故王

形休而安靜而多也故風火動亂至陽為先居孟未甚為少寒濕靜至陰為後居季也其寒為多燥熱為得平中故居仲而平也經曰氣有多少是言六氣形有盛衰言五運也

六氣

寒暑燥濕風火

五運主病

諸風掉眩皆屬肝木 諸痛癢瘡瘍皆屬心火

諸濕腫滿皆屬脾土 諸寒收引皆屬腎水

諸氣膹鬱病痿皆屬肺金

臟腑亂也將[illegible]

六氣為病

諸暴強直支痛耎戾裏急筋縮皆屬於風 乃厥陰風木所屬之氣也 諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之如鼓有聲癰疽瘍疹瘤氣結核吐下霍亂瞀鬱腫脹鼻塞鼽衄血溢血泄淋閟身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄衊皆屬於熱 少陰君火乃真心小腸之氣也

注泄也下迫後重而痛也 結核言肌肉結核如果中核也

暴注出也下出 衊血汗也

諸痙強直積飲痞隔中滿霍亂吐下體重胕腫肉如泥而按不起皆屬於濕 太陰濕土乃脾與胃之氣也

瘈 音契 脈急也 風狂病也 一名曰瘈 又至切 積飲水畜不散也 痞 否 腸胃氣不閉而血脈不閑不能運行 痞也 水穀傳化阻隔失常則曰痞 胕 音附

諸熱瞀瘛暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭胕腫疼酸氣逆衝上禁慄如喪神守嚏嘔瘡瘍喉痹耳鳴及聾嘔涌溢食不下目昧不明暴注瞤瘛暴病暴死皆屬於火 少陽相火乃心包絡三焦之氣也

瞀 音茂 昧 瘖 音陰 瘛 狂者亂而狂也 禁慄 惊恐而戰慄也 如喪神守 謂如喪失心神之守也 嚏 音帝

諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥 陽明燥金乃肺與大腸之氣也

諸病上下所出水液澄澈清冷癥瘕癩疝堅痞腹滿急痛下利清白食已不飢吐利腥穢屈伸不便厥逆禁固皆屬於寒 太陽寒水乃腎與膀胱之氣也

脈論

三部九候

夫三部者寸關尺也寸應天為上部關應人為中部尺應地為下部九候者各浮中沈浮為天沈為地中為人也

脉訣刊誤

高骨爲動脉爲關

中指正按高骨之端是也俗不明其正理但以掌後下指而先定高骨於頭中指之間如此則三指各差在本位之後半部耳或以一指正在高骨或更在高骨之後者此不通脉之理也也使使心精審然既下指失其本位則亦無以知其爲何病也

關前至魚際爲寸是名陽位

一名寸口正在東關前高骨後赤白肥肉際宛中骨縫陷中可容一頁者是乃名魚際者也

關後爲尺是名陰位

關後至本經手太陰所入爲合在肘內大約脉動處是名尺澤長一尺故名尺也陰陽兩者之間則名關三部長三寸以應三才凡男左女右以中指與大指相按如關後中指上及中指兩指並之際爲一寸凡取脉以此爲則而脉位之尺寸亦照此也凡寸脉主自心胸上至頭也而關脉主中心胃至臍也尺脉主下臍以至足也

左寸主心及小腸君火 左關主肝膽風木 左尺主腎膀胱寒水 右寸主肺大腸燥金 右關主脾胃濕土 右尺主命門三焦相火

所以然者左手爲陽陽爲君而南面陽始於子水以一歲六氣正位分之則陰於亥正至丑終氣寒也水之位主於左尺之脉故從尺入十故水生風木於左關應丑至卯初之氣也木生君火於左寸陽道已成故爲君火猶乾始於子而終於巳也自卯正至巳二之氣也君上而臣下陽道而升陰退而降故右手爲陰始於午火面北而受氣自巳至正未三之氣也三焦爲正火主右尺之脉相火生濕土於右關未正以至酉四之氣也濕土生金於右寸應酉至亥五之氣也又主左尺水周而復始也及夫男左女右爲夫婦故左寸君火克右寸之金左關木克右關之土左尺水克右尺之火及夫命門者右腎也屬火不屬水乃手厥陰心包絡之藏其世皆言心包絡之藏有名而無形由不明理也夫三焦乃水谷傳化之道路自口至胃上口爲上焦下至胃下口小腸分泌爲中焦下至傳化出處爲下焦道已三焦今俗並言無形狀而空有名者誤也且如人從前數至尾骨不謂之人則亦安可言人無形狀而全身而言之謂之人也且臟腑盡皆受胃藏府運行周身如果無而謂三焦之形體則何得氣血運行之道路耶

各附於肺而沈於藏中而和緩者胞也

脉在肌肉以上曰浮在肌肉之下曰沈或以肺養皮毛心養血脉脾養肌肉肝養筋腎養骨髓以此浮沈而分五藏之脉者言脉位則可爲用則有失治病之道也

脉息遲速

呼爲陽以應天脉隨動以應春夏吸爲陰以應地脉再動以應秋冬

氣出爲呼入爲吸 出兩次也動至也

一呼脉以大息而又一動者以應長夏閏上故一息四至五至皆爲和平

大息言呼吸或有長者也長夏六月也 平和言爲平人不病之脉

謂一息可得五行俱備也五至以上曰數不滿四至曰遲過備者死不及一至者亦死

數爲熱 遲爲寒 謂脉八至之上亦是以平人之息合病人之脉也故經曰常以不病調病人由是小兒以八至爲和平十至有熱六至爲寒也

自六歲以下曰小兒以此三歲之法人小則脉如數長短亦然

七表

浮芤滑實弦緊洪此名七表爲陽以數之數七

浮脉者舉手乃得重按之不見脉見按之[illegible]爲表虛表寒

脉動於肌肉之上也浮爲風爲病在表 一名[illegible]

或傷風自汗脉浮爲表熱浮緩之證爲表寒

芤脉者浮大而軟按之中央空其兩畔實也

乳中動脉天而寸芤則吐血[illegible]則[illegible]下血尺芤則大便血[illegible]甚則[illegible]

滑脉者往來流利[illegible]爲痰[illegible]或亡液血氣難順而反澀也或[illegible]

實脉[illegible]平而[illegible]者實之本脉

[illegible]大而長浮中皆得[illegible]也

弦脉者[illegible]而按端直而長也弦主大風或[illegible]弦如張弓者弦之太過也

緊脉者[illegible]緩也或如轉索或如切繩者緊之太過也切按之

緊脉主[illegible]則爲熱痛或爲堅積[illegible]脾相乘者爲痛也

洪脉者極大而數[illegible]者指實抱之[illegible]者也

八裏爲陰 爲少陰之數八[illegible]虛弱也

微脉者[illegible]細而軟也[illegible]或[illegible]汗出吐利氣

液損虛者或陽厥極深者或熱極將死脈欲絶者脈亦有微沉緩濇遲伏濡
弱諸陰脈見也不終使曰爲寒須以得本明之
先者爲本根本也後病爲標神不止又爲病之氣爲本受病之藏府經絡
爲標世俗差訛更不以其陽極熱證但以執其陰脈爲寒以外熱令救於
陽則殘陰異治而反致死亡者不少也且察色聽聲問證切脈爲神聖功
巧以察之四法而獨缺爲下則安可執巧之一法而去其神聖功之三法
但以及夫八裏之脈皆有此藏以微脈爲寒故於此總而言之也
沉脈輕手不見重切乃得動在肌肉之下其陰陽爲病在裏一名藏病
或寄於胸及膀胱者雖爲府病其脈亦沉則皆宜下之由十二經行俱行裏
而經絡之在表也大抵但以浮爲表沉爲裏然雖藏爲陰主裏府爲陽主表
其於疾病之浮沉有所不拘也故大陰脾藏之病陰陽而脈浮諸性肢攻於
表也大脈沉數爲裏熱沉遲爲裏寒餘脈皆倣此
或裏熱回厥氣液損此積或陽厥極深或熱極將死者亦皆見諸陰脈沉
切宜審之不可妄以施治
緩脈者從緩而不緊似遲而小疾緩而遲爲寒緩大而長爲熱
一云當脈自汗或自汗過度亦爲濕寒熱甚也
濇脈者血而不滑也或如刀刮竹或澀而止住者曰澀之大遲主少血濇
由于世此利或血蓄血泄或鞠麻氣液而成痹也一曰濇主心痛血少故
也以濇養血
遲脈者一息四至以下也遲爲陰寒然熱發自汗吐利過極則亦爲遲也
氣液損虛故脈遲而不能數
伏脈者附于骨沉之甚也伏主水畜於內閉斂不散也伏位陽極或在表浮
也病之深微以汗出陰陽別之而切近也
水畜爲內一名留飲
濡脈者按之似無舉之無力也有似於弱多兼於陰主於極冷然或熱微後
或熱在將死者脈亦陰弱須以外證辨之
弱脈者軟虛而無力也弱之虛故以弱爲浮也或而陽虛中易熱甚而自
汗大出則亦緩弱而遲也
四時平脈
春弦 夏洪一曰數一曰鉤
秋毛一曰澀 冬石一曰沉
六步主位平脈

初之氣 自大寒日至春分厥陰風木之所用事而氣微故曰
冬至後日甲子少陽王然又至甲子斯無常也以大約分之 月如在冬
後卽大寒交初氣之分也 歲六居甲子以應六氣下皆倣此 一氣正月
二月也
脈乍大乍小乍短乍長 時物及風木之象也
二之氣 春分至小滿少陰君火之位陽氣清明正在兩陽合明之間故又
云陽明主
脈弦
三之氣 小滿日至大暑少陽相火之位陽氣萬物皆盛故亦云太陽主
脈洪大而長 天氣萬物人脈盛與造化同
四之氣 大暑日至秋分大陰濕土之位天氣尚盛而夏後陰已用事故云大
陰主以三陰三陽去六氣標本之陰陽異矣
脈緩大而長 或云脈大而長者爲之誤也濕土主緩大而長燥金主緊
細而短濇以萬物乾而明可見焉時濕土盛蒸腠閉通汗液時出故脈雖
大長而力緩不牢緊也 至秋後氣收實腠理閉故雖緩細而力緊也
五之氣 秋分日以至小雪陽明燥金之位氣衰熱盛故又云少陰主也
脈緊細而微
終之氣 一曰六之氣 小雪日以至大寒太陽寒水之位陰極而終尽天氣
之所收斂故曰寒陰主藏者是也
脈沉短以敦 敦緊也 万物收藏在內寒熱閉塞而精氣藏不能散越故
脈沉短而敦有力敦緊而如石也
凡四時六位平脈大長則時氣有餘而爲病
如春弦大過則風爲病
不及者弦長而爲病
四時脈微見爲平此言過微也如秋脈微而夏熱之類也
反見他脈者他氣有餘而來爲病也
是爲寒而數爲熱之類也
結代促
結脈者遲緩而時一止爲陰也主於積聚怫鬱痼冷或熱極厥極深以至身冷脈
微欲絶而遲緩而時一止者亦皆陽熱怫此止爲熱極而非寒也皆須以標本
明之
促脈者陽也數而時一止也主三焦積熱怫鬱所成亦或熱極失下則令脈

促下之則平也
代脈者主經弱而無力不能動因而復動故以危而死

趺陽脈

趺陽脈者胃土之脉也趺陽脈遲而緩者胃氣如經也
動在足趺陽之經故曰趺陽一日[illegible]者[illegible]過之[illegible]者停也
如經如本經之常脈
沉乃胃寒 [illegible] 數為消穀 [illegible] 緊則難治 [illegible]
滑為胃實緊為脾強浮而滑者[illegible]
為本緊浮盛而土[illegible]故曰難治浮而大者[illegible]
故也浮而[illegible]伏而濇者伏則吐逆水穀不化[illegible]
故也濇則[illegible]不下食[illegible]不出則身冷膚鞕

太谿脈

太谿者腎水之脉也動于左足内踝下後跟骨下陷中足少陰腎水之會故
曰大谿也大谿脉滑則腎氣如經也弱則[illegible]

死生脉候

陽病見陰脉者死[illegible] 汗後[illegible]見陰脉者[illegible]
陰陽俱盛脉浮者[illegible] 脉浮而洪
身汗如油喘而不休水漿不入形体不仁[illegible] 乍靜乍動 命
絕也 汗出髮潤喘不休者肺先絕也 陽反獨留体如烟熏直視搖頭心
先絕也
唇吻反青四支漐習者肝先絕也[illegible]言汗不止也
環口黧黑柔汗發黃者脾先絕也[illegible] 溲便遺失狂言直視者腎先絕
也[illegible] 寸口脉陰陽俱緊[illegible]
陽後為陰 大汗出不解者死 脉陰陽俱虛熱不止者死 汗後[illegible]
陰病而静者[illegible]不可便言死也[illegible]
生欲作大汗故也[illegible] 脉[illegible] 脉浮大手足溫者
出必[illegible]先絕則陽氣後竭而死矣[illegible]
死[illegible] 逆冷脉沉細者不過一日死

新刊河間劉守真傷寒直格卷上

新刊河間劉守真傷寒直格卷中

臨川 葛 雍 仲穆 編校

# 習醫要用直格

傷寒總評

傷寒六經傳受

經言[illegible]傷於寒[illegible]寒傷皮毛[illegible]
鬱不能[illegible]内作故身熱燥而[illegible]曰人之傷於寒也則為病
熱又曰夫熱病者皆傷寒之類也内經[illegible]一身為病之[illegible]
也以[illegible]傷寒[illegible]外傷之寒邪也以[illegible]之所傷之[illegible]
不同故只言傷寒而不通言[illegible]病也其寒邪為害至大故一切内外所傷
俱為受汗之熱病者通明之傷寒也一名大病者皆以為害之大也又春
曰温病夏曰熱病秋曰濕病冬曰傷寒[illegible]四時天氣春溫夏熱
秋涼冬寒[illegible]以明四時[illegible]主表[illegible]大而言之則
一也[illegible]病有此異耳[illegible]
春[illegible]
寒而内生怫熱[illegible]
寒[illegible]
亦有一時[illegible]
或[illegible]或因他病變成或因他人傳染皆能成之[illegible]以分
門[illegible]此六經傳受乃[illegible]六經[illegible]
要法也

傷寒一日太陽受之故頭項痛腰脊強
此足太陽[illegible]之經也故與經言五日足少陰[illegible]
太陽者[illegible]
詳論云五藏六府[illegible]
經而其病甚少于手經[illegible]
裏故不單言手經而[illegible]
足之經矣

二日陽明受之故身熱目疼鼻乾不得眠也

三日少陽受之故胸脅痛而耳聾

四日太陰受之故腹滿而嗌乾

五日少陰受之故口燥舌乾而渴

六日厥陰受之則煩滿而囊縮

或言傳至厥陰包絡相火則水火陰陽[illegible]傳足厥陰肝經則土敗木賊而當死者妄說也此經言足厥陰肝經之證也

大法曰前三日三陽病在表故宜汗之

汗後熱退身涼而愈

後三日三陰病在裏故宜下之

下後裏熱去則怫熱宣通汗出氣和而愈也亦有內熱下之後汗出氣和而愈者也凡言曰前三日病在表者謂此其證也

兩感者未愈[illegible]傳經之七日太陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣[illegible]

此亦大略言之耳傳變不必拘此但以明其證而如法治之耳

裏證

如得病便[illegible]而裏熱者[illegible]傳之內傷也脈浮而表病者[illegible]外傷也

病在身體四肢為表病 病在胸腹之內為裏病

表裏證

身熱為熱在表 言皮膚壯熱而反惡寒亦謂自發熱也

引飲煩渴或小便黃赤為熱在裏 身熱飲水或小便黃赤為[illegible]皆有熱也

涼不渴小便清白則表裏皆無熱 不言[illegible]表裏如[illegible]亦有身表不熱而裏不渴故也

渾身疼痛[illegible]表熱[illegible]而脈浮者皆為熱在表也引飲譫妄腹滿[illegible]熱而脈沉者皆為熱在裏也[illegible]

況[illegible]邪熱半在表半在裏也

夫邪熱在表而浸淫邪氣而畏[illegible]故[illegible]而反惡寒也[illegible]則腠理[illegible]而怫熱怫加故怫熱在裏而[illegible]不畏於[illegible]物[illegible]故不[illegible]而反[illegible]熱也半在表半[illegible]常[illegible]往來也寒多為表多熱多為裏多脈浮沉也諸病寒熱[illegible]作[illegible]此由表之正氣與邪[illegible]表氣虛而裏[illegible]乃[illegible]其[illegible]水之化[illegible]故病熱極而反寒[illegible]汗而[illegible]及[illegible]戰[illegible]表[illegible]也飲水而脈微不見也裏之正氣與邪氣并出於表則表熱裏虛是以須臾汗出而脈浮也經以熱并於裏之陰分則為陰勝而發寒熱并於表之陽分則為陽勝而發熱也俗未知其為表裏之陰陽而妄為寒熱之陰陽故皆失內經之本旨也夫傷寒之寒熱者為寒氣熱實和故脈浮發熱為裏熱表氣不足故發熱而[illegible]也氣并不并故寒熱相反而有微甚也熱并則甚不并則微也

傷寒表證當汗不可下

法

反下之則[illegible]熱內陷而成結胸或為痞痞堅懊憹而腹痛下利不止發黃驚狂斑出諸熱交錯危而死矣

裏證當下而不可汗

反汗之則熱甚發黃驚狂斑出譫妄而[illegible]危而死矣

半在表半在裏則宜和解

揭和則解表裏也

不可發汗吐下妄治之則有前諸證

在上則涌之

言病在胸上如[illegible]而[illegible]或[illegible]但以[illegible]之

在下者泄之

言首熱下結則承氣[illegible]之類泄之皆隨病所在而之

傷寒無汗表病裏和則麻黃湯汗之或天水散之類亦佳

身熱惡寒[illegible]脈浮緊而數者

表不解半入於裏半尚在表者小柴胡湯主之或天水涼膈[illegible]各一服合而服之尤佳表熱多裏熱少者小柴胡湯主之裏熱多者大柴胡湯微下之更甚者大承氣湯下之表雖未罷[illegible]

柴胡[illegible]入于裏而生[illegible]熱而下後表熱[illegible]

表熱[illegible]裏熱[illegible]天水涼膈[illegible]以和解也

[illegible]天水一服上下同法

[illegible]大承氣湯下之[illegible]

下者[illegible]大柴胡[illegible]三一承氣下之[illegible]

[illegible]表熱入裏而成結胸及[illegible]病也

發汗不徹下證仍在後則須[illegible]

極也除此之外還證下[illegible]出現故此而已

但證表裏微甚而以證之兩感證一日太陽與少陰[illegible]兩證俱見二日陽明

與太陰三日少陽與厥陰俱病前六經之證是也

病人自汗表病裏和者桂枝湯解肌

[illegible]表實不可服桂枝湯　有汗為傷風不可服[illegible]

汗在表半在裏[illegible]入于裏白虎湯和解[illegible]

[illegible]承氣湯下之　一[illegible]風寒兼證[illegible]

[illegible]不了了者[illegible]

[illegible]而將死者[illegible]大承氣湯下之或三乙

承氣湯下之[illegible]大發汗汗出不解及無汗脈尚浮者不可[illegible]

之

[illegible]

裏實宜白虎湯[illegible]可下者宜大承氣湯或三乙承氣湯

不妙

[illegible]吐下[illegible]

[illegible]太陽之和[illegible]

[illegible]不宜汗之表熱[illegible]

吐下之則表之熱大東[illegible]而入反[illegible]則[illegible]也

或大下後[illegible]不能保本氣損虛而脈不能實[illegible]更下

[illegible]下脈而[illegible]不下之則[illegible]

[illegible]

[illegible]少便赤澀大便[illegible]

作[illegible]解恐湯以解之也

[illegible]或以下後而[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]不通[illegible]

不能[illegible]

脈須[illegible]

之理[illegible]

[illegible]

萬物滋潤而後[illegible]

[illegible]

其汗皆出上[illegible]

[illegible]

[illegible]

汗之證也[illegible]天水散之類[illegible]

[illegible]

[illegible]

脈反沉遲者太陽病下之

故下之早而心下痞汗出惡寒[illegible]桂枝以解表而後以大黃黃連瀉心湯以攻其痞也太陽病不解而蓄血下焦者[illegible]桂枝解表已而後下血也

宜桃仁承氣湯或抵當湯攻之

俱中風寒

[illegible]

熱煩躁多渴面熱頭昏[illegible]咽燥舌乾或鼻[illegible]目赤鼻衄[illegible]口舌生瘡
瘡當不利或腹脹[illegible]臥不安譫語狂妄腸胃燥結便秘悶亂一切風熱痼
癖風眩癇瘲及傷寒陽明胃熱發斑下證未全者或誤服[illegible]
證并溫熱斑疹[illegible]小兒斑瘡[illegible]未出及驚風積熱傷寒不能辨別者或斑疹
其斑瘡已出未快者或熱[illegible]

小兒瘡豆未出誤以熱藥發汗[illegible]其害甚也不快多致黑陷
而死因以世俗多斑疹不敢服涼藥以謂小兒當病多矣亦不知古人所留
瘡瀉之藥通治風熱[illegible]使熱毒稍退而斑
出[illegible]得痊安也若用此最為妙也
閻孝忠集小兒方論未達錢氏本意不明造化之理反言[illegible]瘡痘黑陷
寒反曰凡瘡疹始終不可服涼藥[illegible]其之誤人[illegible]
不可勝計也閻公宜不詳自所編錢氏方治斑瘡黑陷用牛李膏及百祥
真凡寒涼下之而安得[illegible]
明哉經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火[illegible]
而小便赤澀不通[illegible]
反為累者也
並兩感諸證三陰三陽[illegible]
不宜下下之則陰氣暴絕陽氣後竭而死矣惟宜[illegible]
汐而後以三乙承氣湯[illegible]
少少服之與邪熱不致再作也
白虎湯治傷寒自汗桂枝證表未解半入裡者可以和解者
脈在肌肉而不可下者也
或中暑自汗脈虛弱者
熱傷[illegible]汗大出故病不能自已而[illegible]虛弱
或無[illegible]自汗脈滑數而實表裏俱熱
脈沉浮皆得有力而數身熱頭痛[illegible]渴而小便赤黃也
或三陽合病[illegible]
渴而[illegible]
或歌迎自汗[illegible]
年老[illegible]
又傳[illegible]
無問四時[illegible]

五苓散　治中暑并傷寒大發汗後胃中乾煩渴不得眠脈浮小便不利
微熱消渴及表裏俱熱飲水反吐名曰水逆或攻痞不解[illegible]小便
不利或[illegible]尚在而利不止者或當汗而反下之利遂不止脈浮表不解自利
或小便不利者
凡用五苓散無問脈之沉浮
或一切留飲不散以此散水止渴并能兩解太陽少陽但病
經只入經無涉者是也
或一切吐瀉[illegible]小兒[illegible]傷風[illegible]
[illegible]名五苓白术散[illegible]中風[illegible]外一切所傷
[illegible]頭痛[illegible]或小便[illegible]
[illegible]中外諸邪所傷而并吐瀉者
[illegible]之時大宜服之
并治小兒[illegible]
白术散　治[illegible]痛一切吐瀉[illegible]霍亂[illegible]
治酒痛嘔噦
四逆湯　治傷寒表熱未入於裡[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
大安丸[illegible]

或已利而熱勢甚者，本方服本方及下之而後寒涼諸藥不能退其熱勢之甚者

或兩感諸證同法

兩感者，一日太陽與太陰俱病，則頭痛口乾而煩滿；二日陽明與太陰俱病，則身熱譫語而腹滿。通宜此方以退表裏熱。朱氏不明此皆熱證，妄言前三日爲病寒，以四逆湯急溫裏，而後以桂枝湯急解表，大誤人也。此二方皆不可用，但攻表裏熱，當微表以退其熱，使無致如揣而死者，是也。若熱甚宜下者，加大承氣湯下之。又夫經言凡三日傳受，亦大略之法也，大抵宜隨證以施治，亦不必拘也

或熱甚，傷下焦不能退其熱者，加大承氣湯下之。或熱結極深而諸藥數下畢竟不能利，不救必死。若此法更加甘遂末一錢，已下之，此利後如或但自熱結胸中，心胸滿硬，腹痛不消而但喘急、脈結、譫語，昏冒，脈沉數而實者，尤宜此法急以下之

瓜蒂散　吐而佳　治表證罷邪熱入裏，結於胸中，煩滿而飢不能食，煩而脈作煩者，宜以吐之

諸可下證

大柴胡湯　治裏服小柴胡湯證，後病不解，表裏熱勢更甚而心下急鬱微煩，或發熱汗出不解，心下痞硬，嘔吐下利，已上屬太陽；或陽明病多汗，或少陰病下利清水，心下痛而口乾，或太陰病腹滿而痛，或無表裏證，但發熱七八日，雖脈浮而數，或脈在裏而沉實數而滑者，及宜服解可下，急以除表證之熱者，並宜此劑

大承氣湯　治大小二柴胡證後，表裏俱熱而勢更甚者，或陽明脈遲汗出不惡寒，陽明主肌肉，雖自汗多，故表不能散而反惡也。裏熱更甚，故不惡寒而反微熱也。身重短氣，腹滿而喘，有時潮熱，惡寒者表未解，當汗之，不可下，發熱惡寒熱當下而不可汗。或手足心濈然汗出者，四肢皆受氣於胃，切和也。今言惟足心手心氣於和，然而汗出也。此大便已鞕也。或吐下後不解，不大便五六日至十餘日，日晡潮熱，不惡寒，獨語如見鬼狀，劇者發則不識人，循衣摸床，惕而不安，微喘直視，脈弦者生也

足陽明胃經，外肌肉，爲十二經之長，內爲五臟之本，六腑之大源，故陽明胃病雖爲腑病，其脈沉數而實者，皆當下之也。故腸胃熱甚則大黃自黃亦發視以至於黑者，難治也。凡潮熱譫語，不能食者，胃中必有燥糞五六枚者，但能食者，云胃中有燥糞，此雖屬陽明證，若及陽明也，燥糞亦在於腸耳

或陽明病下之後，心中懊憹而煩，胃中有燥糞者，可攻也。或頭熱汗出則解後如瘧狀，日晡發熱，脈沉實者，宜以下也。脈浮虛者桂枝湯主之

或六七日不大便，目不了了，睛不和，無表裏證，大便難，身微熱者，或小便不利，大便乍難乍易，時有微熱，喘冒不能臥者，有燥糞也。或三部脈皆平，心下硬，或脈大而緊者，或下利脈遲而滑者，或下利不欲食者，內實也。或下利而數之實者寒也

或少陰病二三日，口燥咽乾者，或自利清水，色純青，心下痛，口燥者，當急下之。陽結於胸腸之內而成下利也，故熱則燥結，燥則痛明，故水液不結，滲泄於外，則腸胃之外燥熱太甚而煩渴，不止腸胃之內，濕熱瀉也，本因熱鬱而留，以致溢也

或諸腹滿實痛者，煩渴者，燥熱而脈沉者，無問日數，並宜大承氣湯。又或裏熱燥甚，腸胸結痛，喘悶不散，煩渴上胸，腹高起痛不可忍，但復冷汲水，又不能飲，飲亦不能止其渴，喘急鼻煽，但欲死者，服下咽立止其渴。有若無病之人，頭更大汗而愈。至此往往多汁和而汗出，亦有勞力但隨汗之宜通則不利而愈者也

小承氣湯　治傷寒日深，恐有燥糞，欲知之法，少服小承氣湯，腹中轉失氣，謂氣轉失曲之下氣也，有燥糞也，乃可攻之。不轉失氣者，必初鞕後溏，未可攻之，攻之則腹滿不能食也。欲飲水而噦，其後發熱者，大便復鞕而少也，宜小承氣和之。若腹大滿不通，與小承氣湯微和胃氣，勿大洩也。陽明病，多汗，津液外出，胃中燥，大便必鞕，鞕則譫語也。或譫語潮熱，或發汗吐下後，微煩，小便數，大便因鞕者，或下利譫語者，有燥糞也，通宜小承氣湯下之。或得病二三日，脈弱，無太陽柴胡證，煩躁，心下鞕，至四五日雖能食，少少與小承氣湯和之，令小安

調胃承氣湯　治諸發汗和解，吐後不惡寒，但熱，發而或蒸蒸然者，或但煩心，下虛二，欲吐而胸中痛，大便溏，腹滿，鬱鬱微煩，先此時自極吐下者，先鬱煩切

先此時之先以此時之前已[illegible]吐下而[illegible]也

或口[illegible]氣[illegible]當[illegible]下之[illegible]以[illegible]曰[illegible]之以致

[illegible]

也[illegible]和[illegible]合也

[illegible]病[illegible]熱而又與辛熱[illegible]則[illegible]

利不止也下利[illegible]而其[illegible]之故[illegible]

利不止而[illegible]大而[illegible]也

[illegible]下之大早表熱[illegible]入[illegible]

[illegible]

老[illegible]小便[illegible]大便[illegible]

三[illegible]

大承氣[illegible]

[illegible]

抵當湯　治太陽日深表證仍在隨經而熱畜于裡脈微而沉不結胸而
發狂者熱在下焦少腹當鞕滿小便自利也血下乃愈宜以攻之或太陽病
身黃脈沉者循經而畜熱下焦也少腹鞕小便不利為無血小便自利如狂
者血證也或陽明病熱內甚而喜忘者許恐切或狂大便雖鞕而反易其
色必黑也其必有畜血也或無表裏證但發熱日深脈雖浮者亦可下之或
已下後脈數而熱不解消穀善飢數日不大便者有瘀血也並宜抵當湯下之

發黃

茵陳湯　治陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以致濕熱相搏而身體
發黃
或言寒熱相搏而發黃皆誤也則如萬物濕熱甚則自生黃色者或也本
傷寒熱極失下或誤汗之溫之灸之熨之或誤服銀粉巴豆大毒熱藥下
之反以亡液損其陰氣邪熱轉甚或下之太早熱入裏不成結胸但以發
黃者或失寒涼調治或熱勢不畏故攻治之不能退其熱勢之甚者
或下後熱勢不退皆能發黃也大抵本因熱鬱極甚留飲不散濕熱相
搏而發黃也
其候但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者身必發黃也
怫熱在表鬱而無汗濕熱存裏而甚不能散越于外則身熱之氣鬱甚蒸
上行以至頭面陽氣之分則濕熱之氣蒸汗而頸下無汗然濕熱不能自
然宜通散越於周身故濕熱鬱之極甚而面目遍身發黃色也故內屬陽
遍身自汗出者便易謂之散越不發於黃也小便不利者濕熱鬱留之
證也或小便自利或狂或大便黑者瘀血證也發黃亦有瘀血者本所不
言以其證未明故不須言也
宜茵陳湯下五苓散以利小便退其濕熱也以黃者茵陳湯利大小便也

結胸

汗下之後不大便五六日舌上燥而渴日晡小有潮熱從心至少腹鞕滿而痛
不可近脈尚沉緊或滑數也關脈沉緊者須宜大陷胸湯或丸下之或脈浮
者表未罷也不可下之下之死宜小陷胸湯及小柴胡之類和解表罷者方
可下之或結胸雖脈浮而裏熱勢惡須可下者宜三乙承氣湯一服分作三
次約三時許服訖得利其良雖表未罷脈必漸沉而裏證者止用三乙承氣
湯半服微而下之表熱甚者以大陷胸湯大半服而下之
謂有前藥之力也然須二方中甘遂及甘草或酸惡者故意以甘草擊甘
遂使同服則反而為效速矣孫訓方乃治人甚毀[illegible]之不宜用甘草甘遂

也
或但結胸別無大段熱證但頭微汗出脈沉者水結胸也通宜大陷胸湯
小結胸者心下按之而痛脈浮滑者小陷胸湯無大段熱證也
此亦下之早而熱結心下也但以熱勢微於大結胸而甚於痞也熱之微甚
也俗未明之又以反常謂之結胸無大熱證為寒實結胸而不知表仲景言
熱病而實者無也又此結胸皆以熱結者然以熱結於胸而胸為陽氣之所
聚[illegible]結[illegible]名[illegible]結也熱結於胸則燥而為
故[illegible]熱結[illegible]證曰浮而甚病其故[illegible]而難治矣或膿結胸
熱[illegible]而[illegible]證亦不見但俗未知本熱極而
致又[illegible]寒[illegible]熱以妄加熱藥反熱甚而暴死者無一
生者以此專[illegible]結便為死病也若以表裏六氣脈證標本驗之則明可見
其熱證也留飲不散而成痞其而脈沉若反於骨者積飲以成水結胸
刃水結胸者通宜小陷胸湯也

痞

[illegible]表裏俱熱下證未全法當和解誤下之早則成痞心下痞滿而不痛按
之軟虛也
若[illegible]裏之陰分已受熱入而[illegible]謂痞發於陰也或熱證下證未全[illegible]
不任轉[illegible]誤下之[illegible]熱[illegible]外反為熱入所損虛而表熱故
入裏雖不能成結胸乃作痞也[illegible]調陰氣之作發下之早而成痞
者誤也然既病已[illegible]裏何得更謂發於陰也其病畢竟不可下何得言
其下之早也既言表裏俱熱[illegible]表[illegible]陰也故此之邪熱病之表裏分而
裏和未有邪熱反以下之大早則表乃輕虛而表之全熱大入於裏也大
之至大故成結胸而病[illegible]誤之小故為熱勢輕微也小結胸
者微於大結胸而甚於痞也但[illegible]之大小熱之微[illegible]為寒也故
仲景本攻痞多用大黃黃連瀉心之類或以加附子乾姜之類其
以苦熱佐其寒[illegible]結[illegible]能散結滯也非攻寒也故攻痞開
後留[illegible]胸湯寒藥下其熱也或[illegible]用大柴胡大承氣雖下未可使表
熱入裏以成結胸及痞蓋謂用調胃承氣但攻其裏則表熱入裏而成
痞也或無問可下不可下而[illegible]用銀粉巴豆燥熱大毒[illegible]下之及以損
陰亡液以使佛熱大甚或成痞或為諸熱證各於本論詳之
痞脈浮而惡寒者表未解也當先桂枝湯解表已而後攻痞也或只服五

不散，復以散者，裏甚良或惡寒而汗出者，或蒸而發渴，小便不利者，或煩
閉留，或溫熱下利者，或已成痞而因熱利尚不止，以其症而設更作小陷胸湯下
轉甚，嘔噦下利，心煩懊憹者，無問各脉浮沉，並宜煎生薑湯下
五苓散，每服四五錢，頻服，或痞不已，則後亦宜陷胸湯，或與宜寧脉沉無汗細
者，宜大黃黃連瀉心湯，或用前方小陷胸亦得　懊憹烏刀切　憹奴刀切

懊憹者，煩心熱燥悶亂不寧也。甚者似中巴豆草烏頭之類毒藥之狀也。

梔子湯　治煩懊憹煩心反覆顛倒不得眠者，燥熱怫鬱於內而氣不能宣通也。

經曰：血氣者，人之神，由神斷血氣運行則神在其中也，故神行於表則榮衛流注於經，謂之行陽，合入於藏，謂天之日出為晝也；神行於裏則五藏相生而順傳，謂之行陰，合人寐，故神識外無所用而寂，神遊於內則夜為寢也，猶日入於夜。其夫燥金主於收斂，土主濕，夫燥濕之体必先因之於發氣而後為其病化也。猶先大寒而物凝，又風勝而濕其濕而成燥。体及熱氣甚則萬物溫明而出汗者也。由是表熱無燥者，氣血運行通利而成壯健，而力大。甚者，燥熱病於內者，氣血運行則壅滯而無力也，故耕力者而無燥者，津液滋潤，氣血通利，則肯實多睡也。如洗心散、涼膈散言之多睡者也。故小兒素無病，晝夜安寐，由血液不衰也。夫燥熱病於內者，氣血滯而則燥煩心不得眠也。夫熱蒸之燥熱者，因發太發吐下，或嘔吐瀉痢自汗過多，或陽熱太甚，耗陰液，亡液則血衰而成燥熱也。或灸熨，或多服熱劑，或誤因銀粉巴豆燥熱大毒之藥下之，及損陰亡血，血衰則燥熱太甚，多為此證。經曰：目得血而能視，耳得血而能聽，手指得血而能攝，掌得血而能握，足得血而能步，臟得血而能液，腑得血而能氣。若則一身之至貴者，莫過於血。故陽熱雖甚而血液不衰，則榮衛通利而為病微；血液既衰，以成燥熱，怫鬱則為病甚也。且如酒熱方甚，而血液未衰，則氣血宣通而和暢，因其濕熱損陰亡液，以致血衰而渴欲，以散之燥熱怫鬱而閉悶為病於酒也。而再飲，後得平者，氣液宣行而燥熱怫鬱得散也。或不受飲者，酒毒已甚，燥熱不能散也。亦猶世俗安寧以分陽毒微於陰毒者，是謂內外燥熱太甚，而血液不衰，則血氣運行之太甚而為病者，猶秦極失常，以為陽毒也。以血液衰竭，燥熱太甚，畜之於內則陽氣不能營運於表，故徧身青冷，或與病危極將死者，或謂突極陰毒也。因以中外急救其陽，而反誤投燥熱，或病熱尚微而誤中寒，使言辛熱開發強劫之劑，因以至於已陡，以謂陰毒及死之證，救之以活。致使世俗愈惑，而惟恨攻之不及，誤人多矣。殊不知但以退熱潤燥，散結氣宣行則愈也。故經曰：辛以潤之，開腠理，致津液，通氣液也。故氣通和即津液生行也。故經曰：氣和而生，津液相成，神乃自生。

或胸滿結痛，或頭微汗出，虛煩者，梔子湯主之。或少氣者，加甘草一錢；或加嘔者，及初證以囫圇不若加生薑半兩。凡懊憹虛煩者，皆用涼膈散甚佳。及宜湯灌手足，使心胸結熱宣散而已。

梔子厚朴湯　治心煩腹滿，臥不安

新刊河間劉守真傷寒直格卷中

四十九

# 新刊河間劉守真傷寒論方卷下

臨川 葛雝 仲穆 編校

## 習醫要用直格

○諸證藥石分劑

麻黃散

麻黃去節 桂枝一兩 甘草半兩

杏仁

右剉如麻豆大，每服五錢，水一盞半，煎至八分，濾去滓，溫服。以取微汗。或溫病身煩痛，小便自利者，加白朮四分，微汗之。每一分二錢半也。

益元散 一名天水散 一名太白散

滑石六兩 白膩好者 甘草一兩

右為細末，每服三錢，蜜少許，溫水調下，無蜜亦可，每日三服。或欲冷飲者，新汲泉水調下亦得。解利發汗，煎葱白豆豉湯調下，每服水一盞，葱白五寸，豆豉五十粒，煮取汁七分，調藥并三四服，以效為度。此藥是寒涼解散鬱熱，設病甚不解，多服無害，但有益耳。本草俗名太白散，俗惡性寒，兼易得之賤物，而又不明素問造化之理，故不取本草神驗之言，而多不用焉。若以隆暑熱之巧，凡人之仙藥也，何可缺欤。大傷寒當汗則不可下，當下則不可汗，且如誤服此藥，則汗自不出而裏熱亦得不燥，亦有裏熱便得宣通而愈者也。或半在表半在裏，可和解而不可吐下發汗者，若服此藥多愈，或不愈亦小減，加涼膈散和解尤佳。或自當汗解者，更加蒼朮末三錢，同葱豉湯調服尤良。或孕婦不宜滑石、麻黃、桂枝發汗者，即用甘草一兩，蒼朮二兩，同為粗末，每服四錢，水一盞，葱白五寸，豉五十粒，同煎至六分，濾去滓，熱服，并二三服，取微汗。是名蒼朮湯。或大白散加麻黃二兩，去節，如法煎服，世云神白散。或通聖散加麻黃為末，去滓服，云青龍散。或青龍散更加滑石末，最為發汗之妙藥，名曰大通聖散。或下利用益元散調下，或煎涼膈散調下益元散，或冷飲之，類調下四錢，不拘時候，日三服。以產後血運，或胎死不下者，以油蜜調下五錢，并三服，以產為度。一服調下益元散五錢，須臾更服，用油蜜調益元散溫服，產後俱下，而胎下可活，產婦也。凡難產或死胎不下，皆由風熱燥澀，緊斂結滯而不能舒緩，故產之不得自如。胎順而產也，且滑石力不一，則結滯頓開而產矣。後慎不可溫補，而反生燥熱也。俗未知產後亡液損血，疼痛怖懼，以致神狂氣亂，則陰氣損虛，邪熱太甚而為諸熱證，由不讀素問，不知造化，故不識證候陰陽，反以為寒而溫補之，誤以熱藥溫補，或見煩渴者，不令飲水，何其誤哉。又有自益心爽，更不宜多食之道，但以臨時審其所用，六氣虛實，明其標本，如法治之而已矣。其余證治甚多，用之殊功不可勝數，而俗以為假藥，而所謂者甚反，相侮慢，以黃丹加令桃紅色，名曰紅玉散；加青黛，令輕碧色，名碧玉散；加薄荷葉一分，名雞蘇散。主療不殊，收效則一。俗目惜之，何能別上，可遠吾輩可顯其功，後之學者其究心焉。

桂枝湯

桂枝去皮 芍藥 甘草炙

右剉如麻黃，大每服八錢，水一盞半，薑三片，棗二枚，煎至七分，令去滓，溫服。熱多寒少，可加黃芩一兩，名陽旦湯。大熱者，有熱人可兼加知母半兩，石膏一兩，或通加升麻。乃桂枝證之不成結胸，以病似風，證宜加芍藥，大實痛者更加大黃半兩。

桂枝加葛根湯

桂枝 芍藥 甘草各六分二字 葛根一兩二分

右如桂枝湯服。謂本桂枝湯煎服也。下並做此。

葛根湯

葛根一兩 麻黃泡去黃汁焙半兩二分 桂枝去皮

芍藥 甘草炙 各半兩

右如桂枝湯服

大青龍湯

麻黃如前製 石膏為末 各二分 桂枝一分半

甘草炙一分 杏仁十枚，湯去皮尖雙仁

右剉如麻豆大，抄五錢，水一盞半，生薑三片，棗二枚，碎之，煎至七分，去滓，溫服，令身汗出，不汗再服。

小青龍湯

麻黃去根節 半夏湯洗 芍藥 細辛 乾薑
甘草炙 桂枝去皮各一分 五味子一分
右㕮咀豆大每服八錢水一盞半生薑四片煎至七分去滓溫服 渴者
去半夏加栝蔞根三錢 微利去麻黃加芫花彈子大 噎者去麻黃加
附子一錢炮 以開滯熱結滯 小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓四分
喘者去麻黃加杏仁去皮尖 如前法此方解至溫散其水以潤腸胃滋行之
導以開發中外之結熱結滯者也

## 小柴胡湯

柴胡去苗洗一兩 黃芩 甘草 人參各三分 半夏六分湯洗五七次
右㕮咀如麻豆大抄五錢水一盞半生薑三片棗二枚切煎至半盞去滓溫
服日三 小兒一服作二服 證兼煩渴

## 涼膈散 一名連翹飲子

連翹一兩 山梔子 大黃 薄荷葉去土
黃芩 甘草各半兩 朴硝一分
右爲末每服二三錢水一盞蜜少許煎[illegible]可[illegible]用竹葉[illegible]不須[illegible]
至七分溫去滓溫服 甚者可服四五錢亦可服一二十錢者也 治咽喉
并喉痹加桔梗一兩 荊芥穗半兩 咳而嘔者本方加半夏半兩 每服生薑
三片煎 鼻衄嘔血者加當歸芍藥各半兩 生乾地黃一兩 淋者加滑石
四兩茯苓一兩 風眩者加芎藭[illegible]各半兩 石膏三兩 酒毒者加葛根
一兩 斑疹豆瘡加荊芥穗赤芍藥 川芎 防風 桔梗各半兩 二兩 兒可服七
八錢 或熱甚黑陷腹滿喘急 小便赤澀而將死者此一服更加大承氣湯
約以下之得利立甦
凡言加者皆自本方加也 但加者每服五七錢以意加減調理 兩感傷
寒下後前後以退表裏之熱者 煎本方四五錢調下益元散二四錢 其本
方合益元散[illegible]加[illegible]為效速也

## 白虎湯

知母一兩半 甘草一兩炙 粳米一合 石膏四兩爲末
右㕮咀麻豆大抄五錢水一盞煎至六分去滓溫服無時日三四服 熱甚者
服七八錢至十餘錢 或吐或嘔或痰者加半夏半兩 陳皮半兩 每服用生
薑三片煎服 或傷寒發汗不解 脈浮者加蒼朮半兩 名曰蒼朮白虎湯
或發汗或吐或下後煩渴口乾 或脈洪大 或微惡寒者 或不可下者 或
除可者之藥外 並宜加人參半兩 以調之名人參白虎湯

## 五苓散

豬苓去黑皮 茯苓 白朮各半兩 桂去皮一分 澤瀉一兩
右爲細末每服二三錢 熱湯調下 惡熱欲冷飲者 新水調下 或生薑湯調
下 或加滑石二兩 甚或喘嗽煩心不得眠者 更加阿膠半兩炒

## 桂苓甘露飲 一名桂苓白朮散

桂半兩 茯苓 白朮各半兩 甘草炙 澤瀉
石膏 寒水石各一兩 滑石二兩
右爲極細末熱湯調下三錢 欲冷飲者新水調下 或生薑湯調下尤良 小
兒服一錢

## 白朮散

白朮 茯苓去皮 人參 藿香葉各半兩
甘草炙一兩半 木香一分 葛根一兩
右爲細末白湯調下三錢 若煩渴者加滑石二兩 甚者加[illegible]粗末每服一
兩半水一大升煎至七合 放冷徐徐細飲之 小兒尤宜

## 四逆湯

甘草炙 乾薑各一分 附子半兩去皮臍
凡用附子以半兩[illegible]桂小者力弱大者[illegible]宜也 世俗
嘉其大若未知古人之有說也
右㕮咀麻豆大用水一盞[illegible]至一盞 去汁分溫二服[illegible]實人一劑作一服
或加[illegible]若手足[illegible]則不宜此方 當以下之也

## 茯苓半夏湯

茯苓去皮 生薑取汁各一分 半夏一分
右㕮咀麻豆大用水一盞[illegible]四分 去滓下薑汁溫服

## 半夏橘皮湯

半夏湯洗 陳皮湯浸洗去白 甘草炙 人參
茯苓 黃芩去腐各一分 葛根半兩 厚朴去皮各一分
右㕮咀豆大用水三盞生薑一分切煎至一盞半 絞取汁分四服 作一日
食後溫服

## 黃連解毒湯

黃連去須 黃蘗 黃芩 大梔子各半兩
右㕮咀麻豆大每服秤半兩 水一茶盞煎至四分 絞取汁溫服無時 日三四
以效為度 每一二服效[illegible]或吐或欲作利者 每服加半夏三枚全用

厚朴二分剉　茯苓去皮　生水一盞半生薑三片煎至半盞去滓熱服
名曰半夏茯苓運解毒加減下若本方加大承氣湯一服
法以利為度　汗法羌活細末水圓如小豆大溫水下二十圓以利為度
瀉痢甚良

瓜蒂散

瓜蒂　赤小豆等分

右為細末以香豉半合水一盞半煮取汁半盞調下一錢匕不吐
加服得快吐乃止虛人不宜

大柴胡湯

柴胡去苗八錢　大黃各半兩　黃芩　芍藥各一分
半夏二錢　枳實三錢生用小者是也
枳實不去穰為效甚速下並同

右剉麻豆大分作三服每服水一盞生薑三片棗一枚煎至半盞去滓取汁
溫服未利再服

大承氣湯

大黃錦紋者　芒硝朴硝有者皆可用　厚朴去皮
枳實各半兩　加甘草一兩是名三乙承氣湯

右剉麻豆大分一半用水一盞半生薑三片煎至八分納消煎一二沸
凡煎藥須慢火煎沸即下火為一沸或言沸盡分亦如此法煎不可
強火耗去其水也
絞去滓熱服　凡病熱甚而欲服寒藥則初能拒藥多不能下故經曰
寒因熱用　未利再服熱甚者此一劑分大半作一服未利再服少半
熱更甚者一劑都作一服　熱勢甚者亦可併此一劑為一服劑分劑為
劑為一半方得利而効者臨時消息以利為度消息謂劑分多少也
凡用藥多少倣於此耳

小承氣湯

大黃半兩　厚朴三錢　枳實三錢

右剉如麻豆大作二服每服用水一盞生薑三片煎至半盞絞取汁熱服
未利再服或微下者一劑分作二服或和胃氣不欲利者一劑分為四五
服

調胃承氣湯

甘草　大黃　芒硝各半兩

右剉如麻豆大分一半用水一大盞煎至半盞去滓納硝再煎一二沸熱
服未利再服

十棗湯

芫花慢火炒變色　大戟　甘遂各等分

右為散用水一盞肥棗十枚切開煮取汁半盞調下半錢匕
服一錢匕以意加減快利為度

桃仁承氣湯

桃仁湯去皮尖双仁用麸炒　芒硝半兩　大黃六錢
桂去粗皮　甘草各三錢

右剉如麻豆大分作三服每服用水一盞煎至半盞下消服
取汁熱服日三以微利為度

抵當圓

水蛭炒　虻蟲炒各七枚　桃仁八粒　大黃一分

右為細末蜜和作二圓用水一小盞煮一圓至六分溫服晬時血未下者
再服

抵當湯

水蛭炒　虻蟲炒去翅足各十枚　桃仁七枚　大黃一分

右剉如麻豆大分作二服每用水一盞煮至七分去滓溫服未下再服

茵陳湯

茵陳蒿去莖一兩一名山茵陳　川大黃半兩
山梔子七枚小者十枚

右剉如麻豆大用水兩盞半慢火煮至一盞絞取汁溫服六分未利再服
四分以利為度勢甚者作一服未利再作以意加減當下如爛魚肚及膿
血膠膘等物及小便多出金色如皂角汁或見證狀欲發黃者也　劑分
作四服每服調下五苓散二錢凡治發黃充類此法也
世俗有傳發黃而或欲者此發實之人表不中死不發而又溫熱發散之
散者焙之而證中強劫開發持閉氣血宣通則作汗而愈或體虛表虛
濕熱結甚則劫發不開而反致死者不為少矣其若仲景法對證以茵陳湯
治之則免致難劫不開而反損人生命也　及夫近世妄傳有睡搐
附黃而內外急救其陽為害多矣況若病微而慎中開發得愈亦以
鮮矣而傷生者不可勝言也大抵凡諸黃者皆二則濕熱極而黃
物皆見然又如麥秀而遇雨濕熱極則黃宣者也及水潦而天氣

濕熱則草木[illegible]死而色黃者也或病虚後[illegible]則虚燥於表其面身而瘦黃者猶方草而萎木萎黃也夫病雖熱而黃者當退熱潤燥而止傷寒濕熱甚而發黃者用結退熱燥利大小腑以除水濕則利而兩愈也

諸陷而發黃者同陷胸湯各半服下之或錯服巴豆熱毒發黃熱下之及猶陰氣凌陽熱利不止而發黃者同大承氣各半服下之亦有協熱利不止更或結胸而發黃者用陷胸丸分同陷胸湯三分大承氣二分以下之或兩感發黃者本方加黃連解毒湯一服急下之或頭汗小便利而微黃者濕微也宜此梔子蘗皮湯

大山梔子十五枚　甘草一兩　黃蘗半兩

右剉如麻豆大此剉則作二服每服水三盞煮至一盞絞取汁分三次作一日服

大陷胸湯

大黃　芒硝各二兩　甘遂末三字匕

右剉如麻豆大一劑分作二服每服用水一盞煮大黃至六分內硝煎一二沸內汁調甘遂一字匕半溫服未快利再服[illegible]不能利者以意加服

大陷胸丸

大黃半兩　葶藶三分微炒　芒硝一分　杏仁十二箇去皮尖炒色黃

右六味搗細末下杏仁葶藶杵再研杏仁硝如泥和匀丸如彈子大每服一丸入甘遂末一字匕白蜜半匙水一盞煮至半盞溫服當一宿許乃下未利再服

小陷胸湯

半夏四兩湯洗全用不剉　生薑一兩切　黃連二兩剉

栝蔞實大者半箇惟剉其瓤子則不剉或只用其中子者非也

右以水三盞先煮栝蔞取汁一盞半內餘藥煮至一盞絞取汁分兩次溫服以効為度

大黃黃連瀉心湯

大黃　黃連　黃芩各一分　一法加生薑[illegible]

梔子湯

大梔子七枚劈破　豉半合

右以水兩盞煮梔子至一盞半內豉煮至半盞絞汁溫服

凡加者皆用梔子先煮

或吐者止後服　凡諸梔子湯皆非吐人之藥以其燥熱鬱結之甚而藥頓攻之不能開通則鬱發而吐因其嘔吐發開燥結則氣通津液宣行而已故不須再服也

梔子厚朴湯

大梔子七枚　厚朴半兩炙去粗皮　枳實二枚

右剉如麻豆大以水一盞半煮絞汁半盞溫服

泛論

凡傷寒[illegible]下後熱不退下證尚在者再三下之以熱退為度雖熱退尚未痊[illegible]者[illegible]調之凡下之前後或大汗將出或大汗已出俗言好汗是謂大汗或汗後煩渴及諸吐瀉雖熱一切煩渴者並以細細飲之微漸未止者頻頻時與但不可過多以成留飲不散者也　留飲一名水氣又曰支飲

夫病飲水者[illegible]留積於內而不能消化者也夫腸胃[illegible]大[illegible]則以[illegible]以加其水[illegible]故成留飲而心痞則以[illegible]為[illegible]以止其煩渴也若以[illegible]

[illegible]飲之[illegible]內[illegible]其[illegible]而死矣

夫[illegible]之[illegible]其宜不可過與不及凡治病之道以[illegible]六氣[illegible]使無偏傾各守其常平和而已嗟夫世俗以妄為[illegible]家[illegible]欲出陽胃[illegible]熱煩渴及汗已出及[illegible]求[illegible]大汗不與水者或[illegible]煩渴者或吐瀉煩渴者或産婦[illegible]皆以妄為[illegible]不可飲水也[illegible]未知古人云渴欲飲水少少與之[illegible]若夫[illegible]而煩渴者[illegible]況不與水而反以大[illegible]之[illegible]之飲水[illegible]能多飲而[illegible]之[illegible]者以其苦[illegible]心火[illegible]陽[illegible]而燥[illegible]水[illegible]之體[illegible]而[illegible]多飲不[illegible]之[illegible]多飲者以[illegible]以飲多則[illegible]熱[illegible]而多[illegible]也[illegible]之[illegible]其[illegible]力多於水[illegible]多即[illegible]而[illegible]水本[illegible]而[illegible]而[illegible]之[illegible]大[illegible]而煩渴及不與水者[illegible]

為熱嘔常以退熱開結散水潤燥之藥，則又必致煩躁大渴而嘔復作[illegible]
成留飲雖多飲亦不上其腸胃積飲之熱煩渴而成腸胃之內[illegible]
以成吐焉也宜用白虎五苓及桂苓甘露之類[illegible]以潤之也
或成留飲諸症者隨證擇之
宜小青龍湯五苓桂苓甘露黃連解毒湯小陷胸大承氣之類詳本方
論中

戰汗

天氣下降大汗將出而反戰慄者
古人以為陽病皆為難治，惟傷寒名曰大病，俗曰汗病是也。以表裡之邪
大抵經言大汗者，非謂卽熱自汗大出者也，乃陽氣併熱鬱結[illegible]
陽氣能宣通見熱[illegible]而陰汗出，是謂大汗，亦曰大汗，陽熱鬱結之氣[illegible]
頭發以為汗出，故曰大汗也。故經曰：大氣皆去，病得已矣。
表之正氣與邪熱并甚，則熱極而反兼水化制之，故反戰慄也。此
謂兼化之化也。

經曰：少陰所至為驚惑，惡寒戰慄，[illegible]少陰君火為病之所至而然
此專言之病也。又經曰：諸禁鼓慄，如喪神守，皆屬於火。注云：熱之內作
其俗作噤，[illegible]禁本振搖反兼水化也。經曰：亢則害，承乃制。
謂五行之道，微者當其本化，甚者[illegible]兼己之化以制其甚也。
乎天天之道，其猶張弓乎，高者抑之，斯其道也。經云：[illegible]
已無為但順物之氣味也，及方圓不與物爭，乃至乎[illegible]若水本寒
極則水冰如地而氣微物又[illegible]
水之土化是也[illegible]
靜而溢極甚[illegible]
而反以[illegible]
而[illegible]是兼金化也
行之燥[illegible]
是則[illegible]
病在燥氣少燥金之化[illegible]
天[illegible]而萬物反得以出水液[illegible]
燥金熱極而反化為水，是火極而反兼水化制之[illegible]
滿脇人[illegible]
在[illegible]病及惡寒戰慄[illegible]大天道造化病微者

當其本化，甚見水化，熱見火化也。病甚者反兼勝己之化，知[illegible]反故[illegible]
土熱極反似寒，水之化也。若夫百病之[illegible]其狀反於[illegible]亢反者
以[illegible]不求其病之本[illegible]百端[illegible]知[illegible]不得已而但[illegible]之[illegible]
[illegible]為其治反助其[illegible]害於生者多矣。以至舉世皆[illegible]之[illegible]
[illegible]雖[illegible]殊不知但以運氣造化之理推之，則證者[illegible]
[illegible]而歸其要則一也。何得[illegible]而故經曰：夫標本之為道，要
而[illegible]小而大，可以言一而知百病之害。又曰：善言[illegible]於終[illegible]
近者必知其遠，是則至數而道不惑，所謂明矣。故老子曰：不出[illegible]天道
不出戶見天下，其出彌遠，其知彌少，[illegible]不知要也。古聖曰：反常合
道[illegible]大理大道合同而常俗之心則有相反者也。然古聖言道不離
於[illegible]包於俗而入俗也。又云俗白雖道皆常俗[illegible]合於道也。夫
俗則[illegible]五行之變化，[illegible]常而本化白見乃有
[illegible]化以白見也，甚則反似勝己之化，乃無相而反常合道
以[illegible]本化之相而反見勝己之化也。其化之道多端，此且[illegible]
相[illegible]化也。故經曰：大道似不肖[illegible]其本相於內而反
[illegible]勝己之化[illegible]外，[illegible]反常合於道者也。抑以道眼[illegible]則其內
化[illegible]其外則逆相而[illegible]也。故聖經[illegible]
化[illegible]道合同而俗與所謂[illegible]
後人皆[illegible]
呼可[illegible]
寒之氣勝則[illegible]若背經之本旨也。[illegible]表裏之陰陽正氣之[illegible]
勝者為不病而不勝者為病也。故經曰：陰勝則陽病，陽勝則陰病
則[illegible]陰勝[illegible]
陰之一[illegible]
二部[illegible]
為陰[illegible]下之[illegible]
汗[illegible]
寒[illegible]
當汗[illegible]發熱而當下之，又經曰：重寒則熱，重熱則寒，若[illegible]
極重[illegible]
寒[illegible]
不[illegible]

則不發熱而後惡寒戰也此汉言陽和衛氣并之於表陽分則病[illegible]之
時為陽勝也病氣与衛氣并其裏表之分則為陰勝也此亦表裏之陰
陽正氣之与邪熱相併而以言為虛実也然邪熱在於表則必惡寒而熱与
衛氣并之於表則反頭熱也邪熱併在於裏則後熱而表之正氣与
邪熱并之於裏則反寒戰也故經云陽虛則外寒陰虛則內熱此言不併
者也正氣而受邪熱故言虛也又曰陽勝則外熱陰勝則內寒此言其
若也夫表裏陰陽之分受其邪熱之所在其中和正陽之分又与邪熱
相并而為病之所正氣轉実而不虛故經言勝也 故經云陽氣并
於陰當是之時陽虛而陰実外無氣故先寒慄也 陰氣逆極則後出之
陽陽氣後併於外則陰虛而陽実故先熱而渴又曰并於陽則陽勝并
於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱是言表裏之陰陽相并之為実也非并
於陰陽之虛実也故經曰病在陽則熱而脈躁在陰則寒而脈静然氣
并於內而外无氣故寒戰[illegible]
大盛者外熱与衛氣并則作發而不并則休止也故經曰衛氣相離故
病得休也衛氣集則復病也故又云陰虛而陽実[illegible]則[illegible]復反
入於此寒也此說言表裏之陰陽氣下并者[illegible]
之[illegible]若乃熱之一也俗未明[illegible]
而反惡寒[illegible]
渴小便清白吐利[illegible]
慄者也故經言人多病氣也陽少[illegible]水中出又曰人有
身寒湯火不能熱厚衣不能温[illegible]不東慄
寒令也[illegible]
戸則寒承乃制[illegible]
而寒戰者多有[illegible]
寒則裏熱[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

寒戰也[illegible]分陽熱之氣[illegible]而後出之[illegible]大汗作也
此所謂[illegible]
則[illegible]於表之陽分是謂[illegible]而後作汗也或[illegible]
出於表者[illegible]
死矣大欲汗而[illegible]沈細而或不見者[illegible]
煩乱[illegible]
則神昏而躁[illegible]
令自[illegible]
[illegible]
[illegible]
乃[illegible]
以熱[illegible]也 大法曰[illegible]汗不可下[illegible]
之[illegible]至二三日汗不能出[illegible]
[illegible]
[illegible]
不[illegible]
以[illegible]
不并陰也或戰而無汗而自愈者[illegible]
[illegible]由[illegible]和而[illegible]也
或不[illegible]汗而愈者陽不并陰則不戰[illegible]而已也
[illegible]以[illegible]人多矣

[illegible]汗

大[illegible]不可[illegible]其[illegible]用水温[illegible]其[illegible]也
陽[illegible]作汗而出者若為外[illegible]入於裏而
不能[illegible]而死矣
亦不可[illegible]其汗[illegible]而[illegible]大汗[illegible]而早出也
[illegible]
[illegible]
而[illegible]死矣
[illegible]汗後
[illegible]
[illegible]

熱汗病兩感風氣雜病一切傷病作發三日裏外並宜服之[illegible]者是之
汗後本雜病者常服三兩日間亦漸減可並無所損或裏熱極甚腹滿實痛
煩渴譫妄須可急下者以大承氣湯下之三乙承氣湯亦妙或下後未愈
[illegible]木全或大汗前後逆氣或汗後餘熱不解或遺熱勞復或感他人病氣
汗毒傳染或中傷氣瘴氣羊氣一切穢毒并解酒毒食一切藥毒及除驚
打撲傷損疼痛或久新風眩頭痛中風偏枯破傷風洗頭風風癇病或婦人
產後諸疾小兒驚風積熱瘡瘍疹痘諸證無問日數但服之周身中外氣血
宣通病皆除愈是防風通聖散加天水散各一半

防風　川芎　當歸切焙　芍藥　薄荷葉淨　大黃
麻黃去根節　連翹　芒硝別研各半兩　石膏別研
桔梗各一兩　滑石十五兩別研　白朮　山梔子
京芥穗　甘草四兩剉炒　黃芩各一分

右為粗末每服五錢六錢水一大盞半入葱白五寸鹽豉五十粒生薑三片煎至一盞濾汁去滓溫服無時日三四服以効為度常服二錢水一中盞煎至六分濾汁溫服不拘時兼夜四服或欲令發汗者[illegible]常服伸[illegible]不再作新病不生舊病漸愈無問歲以平人常服之[illegible]

[illegible]也嗟夫世俗反以妄傳中年[illegible]毒之劑害人無數豈知識病之法全憑脈證[illegible]中年上下為則耶此藥除孕婦及產後月事經水過多并泄瀉者不宜服

或治雜病亦宜治風熱極效一名通氣防風散一名通解散

## 傷寒傳染論

夫傷與傳染之由者因鬪大汗蒸發以致神狂氣亂邪熱暴甚於內作發於外而為病也則如西山記曰近穢氣而觸真氣錢仲陽云步穢[illegible]之積氣候近於嬰兒若闘其氣則令兒[illegible]病所搐也[illegible]真人云[illegible]浴更衣然後方可近於嬰兒使不闘焉汗[illegible]者是為天吊驚[illegible]搐也故剝死馬者感其毒氣而成馬氣丁瘡之類皆由闘其毒氣之所作也故聖惠方一法大汗出則發藥於戶辟其大汗蒸毒氣使傷於人也世以此尺傳屬者皆其義也多染親屬[illegible]時奉之人或役者由其神氣[illegible]動乱故也何以知傳染者脈不浮者是也若熱[illegible]解表不惟不[illegible]其病甚而危殆矣其治之法汗宜以蒼朮白虎湯無汗宜滑石凉膈散[illegible]愈其不解者為其表裏搬其所治之而與傷寒之法皆無異也

# 傷寒標本心法類萃二卷

（金）劉完素撰

明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本

傷寒標本心法類萃卷上

河間劉守眞編集

新安吳勉學校正

傷風

傷風之証頭疼項强肢節煩疼或目痛肌熱乾嘔鼻塞手足溫自汗出惡風其脉陽浮而緩陰浮而弱此爲邪在表已上傷風之証皆宜桂枝湯第二次以解肌傷寒汗出怕風而加項强痛者桂枝葛根湯第三傷風及無汗者雖已服桂枝湯反煩不解而無裏証者先刺風池風府却與桂枝葛根湯服之不若通用雙解散五十一免致有桂枝麻黃之悞傷風自汗白虎湯二十二金匱方太陽病無汗而渴者不可與白虎湯



傷寒

傷寒之證頭項病疼腰脊强身體拘急惡寒不煩燥無自汗或致頭面目疼肌熱鼻乾或胸滿而喘手足指末微厥脉浮數而緊若邪在表以上傷寒之証皆宜麻黃湯第一以發其汗傷寒冒風頭目痛四肢拘倦北金散四十六不若通用天水散四十九或雙解散五十一甚佳無使藥不中病而益加害也

白虎合涼膈散二十一 乃調理傷寒之上藥傷風之妙

中暑

中暑之証身熱頭痛背寒面垢自汗煩燥大渴口乾倦怠而身不痛或時惡寒或[illegible]目昏脉虛而弱無問表裏通宜白虎夏月感冒發熱[illegible]二十四桂苓甘露飲三十四黃連香薷飲五十二或雙解散或表熱裏腹滿而脉沉可下者大承氣湯下之或三一承氣湯尤妙半表半裏者小柴胡涼膈天水散

中濕



中濕之證一身盡疼重者發黃[illegible]節煩疼發熱鼻塞[illegible]或腹滿脉大便利脉沉[illegible]中濕之証先用雙解散微微汗之次用五苓散[illegible]桂苓甘露飲皆用甘露飲不愈却用茵陳[illegible]若劑止七之日此屬土故以火劑燥[illegible]

風寒俱中

風寒俱中之証頭痛項强肢[illegible]手足溫爲中風反無汗惡寒脉浮緊爲傷寒也或頭項疼腰脊强身體拘急指末微厥不自汗爲傷寒反煩燥而脉緩者[illegible]傷風也風則傷衛寒則傷榮榮衛俱傷則表裏[illegible]

者通宜以大青湯或雙解散最妙

內外傷寒

始得脉便沉而裏病表和者內傷也脉浮而表病裏和者外傷也病在身體四肢為表病病在胸腹之內為裏病內傷通解散外傷雙解散內外一切所傷通神散然不若雙解散以子和為之三法至神

一切汗候

風寒暑濕飢飽勞逸憂愁思慮恚恐悲怒四時中外諸邪所傷但覺身熱頭疼拘倦強痛無問日汗無汗增寒發熱渴與不渴殺某傷寒疫癘汗病兩感風氣



雜病一切舊病發作三日裏外並宜雙解散設若感之勢甚本難解者常服雙解散三兩日間亦漸可減並無所損或裏熱極甚腹滿實痛煩渴譫妄須可下者三乙承氣湯為妙或下後未愈或下証未全或大汗前後逆氣或汗後餘熱不解或遺熱復勞或來他人病氣汗毒傳染或中瘴氣羊氣牛氣一切穢毒并漆毒酒毒食毒一切藥毒及墜墮打撲傷損疼痛或久患風眩頭疼中風偏枯破傷風洗頭風風癇病或婦人產後諸疾小兒驚風積熱瘡瘍疹痘無問日數但以雙解散服之則身中外氣血宣通病皆除愈然雙解乃通仙之藥但除孕婦及產後月經[illegible]病者勿與服之惟年老人最宜自有造化於中矣

傳染

凡傷寒疫癘之病何以別之蓋脉不浮者傳染也設若以熱藥解表不惟不解其病反甚而危矣其治之法自汗宜以蒼朮白虎湯無汗宜滑石涼膈散散熱而愈其不解者通其表裏微甚隨証治之而與傷寒之法皆無異也雙解散益元散皆為神方

表証

凡表証脉浮身體肢節疼痛惡風惡寒者可汗之不



可下也傷寒無汗麻黃湯傷風自汗桂枝湯一法不問風寒通用雙解散或天水散最妙

裏証

凡裏証脉實而不浮不惡寒及惡熱身不疼自汗譫語不大便或咽乾腹滿者可下之不可汗也以上之証宜小承氣湯大承氣湯調胃承氣湯選而用之一法不問風寒暑濕或表裏兩証俱不見但無表証而有可下者通用三乙承氣湯下之此藥殺峻劫使藥表熱入裏而無結胸及痞之眾疾也或熱結極甚[illegible]數下畢竟不能利不救成死者大承氣湯[illegible]

方一錢匕下之病在裏脈沉細者無問風寒暑濕或表裏證俱不見或內外諸邪所傷有汗無汗心腹痛滿譫妄煩燥蓄熱內盛但是痰實者宜三乙承氣湯合解毒湯下之解毒調胃承氣湯能瀉大熱

表裏證

表裏俱見之證或半表或半在裏之證者謂前表裏二證病在相參有欲汗之而有裏病欲下之而表病未解汗之不可吐之又不可法當和解傷風白虎湯傷寒中風或兩感小柴胡湯一法不問風寒暑濕用涼膈散天水散二藥合一服用煎解之或表熱多裏



熱少天水一涼膈半或裏熱多表熱少涼膈 天水半表熱極裏有微熱身疼頭痛或眩或嘔不可汗吐下者天水涼膈散合和解之解之又不能退其熱者用黃連解毒湯表裏之熱俱微者五苓散表裏之熱俱盛者大柴胡湯微下之更甚者大柴胡合大承氣湯下之雙除表裏之熱服雙解散之後若不解病已傳變後三日在裏法當下之殊不知下之太早則表熱乘虛而入裏遂成結胸虛痞懊憹發黃之證輕者必危危者必死但宜平和之藥宣散其表和解其裏病勢或有汗而愈或無汗氣和而愈用小柴胡涼膈天水合和主之病在半表半裏用小柴胡涼膈散和而解之或小柴胡合解毒湯加服熱勢未退者以柴胡合三乙承氣湯表裏俱微半表半裏若裏微者宜大柴胡合黃連解毒湯合服諸小柴胡湯證後病不解表裏熱勢更甚而心下急鬱微煩或發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐不利或陽明病多汗或少陰病下利清水心下痛而口乾或太陰病腹滿而痛或無表裏證但發熱七八日雖脈浮而數而脈在肌肉實數而滑者並宜大柴胡湯病至七八日裏熱已甚表漸微脈雖浮數用三乙承氣湯合解毒下之下證未



全不可下者用白虎湯或知母石膏湯脈洪滑裏有微熱不可汗者用黃連解毒湯

汗後不解

凡是表證法當汗之依法汗之其病又不解汗後不解其證前後別無異證者通宜涼膈散調之以退其熱無使變證甚危殆也除此之外迭勝小柴胡湯兩感至此而已汗後餘熱用益元散或小柴胡湯宜武人參石膏湯傷寒大發汗汗出不解反無汗脈尚浮者蒼术白虎湯解之傷寒用桂枝湯發後半日許復熱煩脈浮者再宜桂枝湯汗後不解下證未全者白虎

身汗後煩躁不得眠微熱而渴五苓散汗後不解中
外有熱口乾煩渴柴胡飲子解表之後尚未愈者解
毒涼膈天水散能調順陰陽洗滌藏府

下後不解

凡是裏証法當下之依法下之其病又不解或大下
後或再三下後熱勢尚甚而不退本氣虛損而不能
實擬更下之恐下脫而立死不下之則熱極而死寒
涼諸藥不能退其熱勢之甚者或濕熱內餘下利不
止熱不退者或因大下後濕熱利不止而熱不退脉
弱氣虛不可更下者或諸濕熱內餘小便赤澁大便



澁泄頻併少腹而急痛者必欲作痢也通宜黃連解
毒湯以解之傷寒下之大過胃中無熱飲水無力白
朮散又有大下之後其熱不退再三下之熱愈甚若
下之不止其人脉微氣虛氣弱不加以法無可生之
理至此下之亦死不下亦死但用涼膈合解毒湯調
之陽熱退陰脉漸生爲之妙法下之前後無問日
數餘熱不解小柴胡湯汗下後胃虛大橘皮湯汗下
後煩渴而赤茯苓湯

在上涌之

言病在膈者當用瓜蒂散吐之或表証罷邪熱入裏
結於胸中煩滿而飢不能食欲吐故欲而脉乍急
宜瓜蒂散吐之傷寒頭疼身不食久則胸膈亦
有宿痰故也當先湧之次以[illegible]湯加減

在下泄之

言病留熱下焦則承氣抵當之類泄之而可也

合病

三陽合病腹滿身重難以轉側口燥而垢譫語遺尿
如假發汗則譫語益甚下之則額上汗出後必
發黃白虎湯

兩感



兩感者一日太陽少陰兩証俱見二日陽明與太陰
俱病三日少陽與厥陰俱病前六經之証是也小柴
胡湯涼膈散五苓散天水散通聖散雙解散大柴胡
湯可選用之熱勢甚欲可下者三乙承氣湯或解毒
合承氣湯

痓病

痓之爲病發熱腹滿口噤頭搖瘈瘲不語項强背直
腰身反張或目瞪或目赤或閉或反目或足溫或憂
汗其脉沉弦有汗或帶脈者但汗出則痓作汗曰柔
痓通宜三乙承氣湯合解毒下之

頭疼

頭疼之証無問風寒暑濕雜病自汗頭疼但宜白虎
湯或加川芎荊芥尤妙頭疼久不愈必致喪明宜先
涌痰次用白虎加減風賊痰逆喘嗽頭痛半夏茯苓
湯頭痛脉弱痛黄連解毒湯頭疼口乾桂枝甘露飲
風痰喘嗽頭疼白虎半夏橘皮湯風熱頭疼心煩昏
憒人參石膏湯傷寒壯熱頭疼不卧散

身疼

身疼之証無問風寒通解散表熱甚頭項肢體疼痛
黄連解毒湯傷寒瘟疫遍身疼痛少力頭旋腰脚麻



痺喧啞殘壯熱減食三乙承氣減硝加貫衆紫河車入
金銀煎名銀煎散中濕一身盡痛五苓散

腹脹滿痛

腹脹滿脉沉者以三乙承氣湯合解毒下之諸腹滿
實痛煩渴譫妄脉實數而沉者無問日數三乙承氣
湯少陽証腹中痛者小柴胡去黄芩加芍藥湯少陽
証脇下痞鞕者小柴胡去棗子加牡蠣太陰証腹滿
時痛桂枝加芍藥痛甚加桂枝大黄

往來寒熱

往來寒熱少陽一日二三作來往無期用小柴

湯主之

潮熱

潮熱屬陽明一日一發日晡而作也陽明裏熱極
或吐下後不解大便五六日至十餘日日晡潮熱心
胸煩熱而懊憹如瘧狀脉沉實者三乙承氣湯陽明
少陽合病下利日晡發熱如瘧者大柴胡湯通宜三
乙承氣合解毒

自汗

自汗者不發表解肌自出汗也傷風自汗也傷風自
汗桂枝湯傷寒自汗脉沉數而實表裏俱熱者三陽



合病自汗者厥逆自汗者頭疼自汗者傷寒自汗未
解半入於裏者中暑自汗脉虚者但宜白虎湯傷寒
發汗不止白虎湯加麻黄根浮麥傷寒汗下後自汗
脉虚熱不已白虎加人參蒼术服之汗止後凉通仙
之法也
中暑自汗白虎湯後以溶滲湯調之自汗多宜武人
參石膏湯

自利并候下

自利者不經下藥攻裏而自利也脉浮表不解自利
或小便不利者五苓散一切瀉痢間作桂苓甘露飲

溢濕內甚而作痢者黃連解毒湯或自利清水色純
青心下痞痛口燥者皆濕熱相搏於腸胃之內而成
下利者三一承氣湯當汗而反下及不成結胸而但
下利清穀不化表証在表熱裏寒也急以四逆湯溫
裏利止裏和急以桂枝解表或用巴豆熱藥下之而
協熱利不止皆宜五苓散止利兼解表

小便不利

小便不利者小便難而赤澁也中暑并傷寒大發汗
後胃中乾煩燥不得眠脉浮小便不利微熱煩渴者
口乾煩渴小便不利者小便赤澁通宜五苓散桂苓
甘露飲主之



嘔吐

凡嘔吐者火性上炎也無問表裏通宜涼膈散傷寒
雜病一切嘔吐調胃承氣湯煩悶乾嘔黃連解毒湯
嘔吐煩渴者桂苓甘露飲五苓散懸咳嘔者白虎加
半夏湯皮傷寒嘔吐四肢厥逆清冷調胃散濕溫內
甚惡心嘔吐者白虎合解毒湯

吐瀉

吐瀉者上吐下瀉亦名霍亂也一切吐瀉霍亂通宜
五苓散益元散白朮散吐瀉霍亂煩渴并中外諸邪
所傷而吐瀉腹滿痛悶者並皆桂苓甘露飲淡滲之

喘嗽

大熱喘嗽而滿者黃連解毒湯或熱甚喘嗽悶亂三
乙承氣湯少陽咳者小柴胡去人參大棗生薑加五
味子乾薑喘嗽頭疼者茯苓半夏湯咳嗽者白虎湯
加半夏桔梗咳嗽不已人參石膏湯或真武人參石
膏湯痰逆咳嗽半夏橘皮湯汗之後氣悶咳嗽五味
子湯

渴

凡口乾煩渴者傷寒汗出而渴者飲水反吐名曰水
逆俱宜五苓散少陰病二三日口燥咽乾三一承氣
湯或裏熱燥甚傷寒怫鬱留飲不散煩渴不止腹
滿痛不可忍但嘔冷逆大渴不能飲飲亦不能止
其渴喘急悶亂但欲死者三乙承氣湯熱下渴甚止
其渴有若無病之人須臾大汗而愈至此往往多有
不利而汗出亦有藥力但隨汗之宜通不利而愈或
汗吐下後煩渴口乾脉浮大白虎湯加人參煩燥多
渴涼膈散加滑石



煩燥

傷寒煩燥多渴涼膈散加滑石中暑傷寒汗後煩燥

五苓散一切火熱狂躁喘滿黃連解毒湯煩躁而渴
白朮散或加滑石甚者白虎湯

懊憹　虛煩　不得眠

懊憹煩心反復顛倒不得眠者煩熱怫鬱於內而氣
不能宣通也或胸滿結痛或頭微汗出虛煩者梔子
湯主之或氣少者加甘草・嘔或嘔者及初病以圓
藥下者加生薑半兩凡懊憹虛煩者皆用涼膈散甚
佳及安湯濯手足使心胸結熱宣散而已心煩腹滿
坐臥不安梔子厚朴湯主之或陽明病下之後燥熱
而懊憹者三乙承氣湯汗後煩燥不得眠五苓散或



涼膈散口燥呻吟錯語不得眠五苓散黃連解毒湯
煩心者涼膈散少陽証胸中煩而不嘔者小柴胡去
半夏人參加瓜蔞實主之

留飲

一切留飲不散五苓散桂苓甘露飲黃連解毒湯涼
膈散白虎湯小陷胸湯三乙承氣湯選用傷寒表未
罷心下有水氣乾嘔發熱而咳或嘔或利或噎或小
便不利小腹滿或喘者小青龍湯

痞

傷寒表裏俱熱下証未全法當和解誤下之蚤則心
痞心下痞滿而不痛按之虛軟者痞脈浮而尚惡寒
者表未解也當先桂枝解表已而後用大黃黃連瀉
心湯攻痞也或只用五苓散使除表裏[illegible]惡
寒而汗出者或痞而煩小便不利者或痞留飲濕熱
下利者或已成痞因藥尚不止以其痞滿誤速下之
其痞轉甚噎蠟下利心煩躁者無問痞脈浮沉症宜
生薑瀉心湯調下五苓散頻服之或痞不已則後亦濕
熱煩滿或瀉安脈沉無他証者宜大黃黃連瀉心湯
或小陷胸湯亦可下早成痞檳榔散



結胸

結胸之証有三不按而痛者名大結按之而痛者名
小結胸心下怔忡頭汗出者名水結胸也汗下之後
不大便五六日舌乾而渴日晡少有潮熱從心下至
小腹鞭滿而痛不可近而脈沉緊滑數或但關脈沉
緊者宜大陷胸湯或陷胸貞下之或脈浮者表未罷
也不可下下之則死宜小陷胸湯及小柴胡湯之類
和解之表罷者方可下之或結胸雖脈浮而裏熱勢
惡須可下者宜三乙承氣湯分作三次約三時許服
訖得利其良雖未稍減脈必沉病微者止用三乙承
氣半服接法而下之裏熱甚者以大陷胸湯大半服

而下之或但結胸別無大段熱証但頭微汗出脉沉潛者水結胸也通宜大陷胸小結胸心下按之而痛脉浮而滑別無大段熱証及水結胸者小陷胸湯傷寒下之太早結胸黄連解毒湯加枳殼傷寒結胸虚痞涼膈散加枳殼桔梗或但自熱結胸者其胸高起腹雖不滿而但喘急悶結譫妄昏冒闗脉沉數而緊者用大承氣湯加甘遂一錢七下之表証罷熱入裏結於胸中煩滿而饑不能食微厥而脉乍緊者瓜蒂散吐之太陽中風下利嘔逆表証罷乾嘔短氣不惡寒熱熱汗發作有時頭痛心下痞鞕滿引脇下痛者



十棗湯結胸而發黄者茵蔯湯合陷胸湯各半服下之協熱下利不止更結胸發黄茵蔯湯五分陷胸湯三分大承氣湯二分下之為佳脉浮不可下者小陷胸湯合小柴胡湯

## 血証

太陽病日深表証仍在循經熱畜於下焦脉微而深不結胸而發狂者熱在下焦小腹當鞕滿小便自利也血下而愈宜攻之或太陽病身黄脉沉者循經而畜熱下焦也小腹鞕小便不利為無血小便自利如狂者瘀血症或陽明畜熱内甚而譫妄或狂大便雖鞕而反易其色者有畜血也或無表裏証但發熱日深脉浮者亦可下或已下後脉數胃熱消穀善饑數日不大便有瘀血也並宜抵當湯下之傷寒有熱小腹滿小便自利者為有血也當下未敢用湯用抵當丸最為穩當太陽病不解而畜熱下焦先以桂枝解表已而下血宜桃仁承氣湯或抵當圓攻之傷風汗下不解熱鬱經絡隨氣湧泄為衂或淸道閉流入胃脘吐出淸血及鼻衂吐血不盡餘血停畱以致面黄大便黑犀角地黄湯發狂加黄芩大黄

## 譫語



譫語發狂三乙承氣湯合解毒湯下之若傷寒過經譫語以有熱也當以湯下之若利小便大便當鞕而下利脉和者醫以圓藥下之非其治也若自利者腹當厥今反和此為内實調胃承氣湯或涼膈散通用

## 發黄

陽明病表熱極甚煩滿熱鬱畱飲不散以致濕熱相搏而身體發黄其候但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴飲水漿者中濕發黄宜茵蔯湯調下五苓散結胸而發黄者茵蔯同陷胸湯各半下之或倶服熱毒閉渠下之反損陰氣遂協熱利不止更或結胸

而發黃者用茵陳湯五分合解毒湯三分或大承氣湯下
下之或兩感發黃者用茵陳湯加黃連解毒湯一服
急下之頭微汗小便利而發微黃者濕熱微也梔子
蘗皮湯發黃甚者茵蔯合三乙承氣湯

發斑

發斑下証未全涼膈散未曾下胃熱發斑白虎湯加人參白术陽明胃熱發斑脈沉須可下者三乙承氣湯下之傷寒胃熱發斑涼膈散加滑石調五苓散甚妙傷寒七八日發黃有斑微熱腹滿者或痰實壅上難諸承氣湯不過者仲景曰寸脈浮滑者可用瓜蒂散吐之



發狂

傷寒發狂奔走罵詈不避親疎此陽有餘陰不足三乙承氣湯加當歸並棗名當歸承氣湯以利數行候微緩以三聖散吐之後用涼膈散洗心散黃連解毒湯調之譫妄發狂踰垣上屋赴井投河皆爲陽熱極甚用三乙承氣合解毒下之驚悸顛狂三乙承氣湯發狂極甚投河入井者三下不過不可下攻便當涌之以瓜蒂散吐出痰涎宿物一掃而愈後以甘露、之類調之

發戰

凡熱病大汗將出而反寒戰者表之証氣與邪氣併甚於身表火熱亢極而反兼水化制之反爲寒戰脈微欲絕者三乙承氣湯或十棗湯下之凡欲作汗狂渴病之微甚或已經汗下者或下証未全者但以涼膈散調之甚者黃連解毒湯或下後二三日或未經下腹滿煩渴脈沉實而有裏証者三乙承氣湯下之勢惡者加黃連解毒湯或戰不快者或戰後汗出不快者或戰數次經大戰而汗不當者乃拜之不甚而法之不逆通宜三乙承氣湯或更加黃連解毒湯下之以散怫熱而開鬱結也



發厥

或表熱極甚而恐承氣不能退者或已下後而熱不退者或畜熱內甚陽厥極深以陽氣怫鬱不能營運於身表四肢以致通身清冷痛甚不堪項背拘急目赤睛疼昏眩恍惚咽乾或痛躁渴虛汗嘔吐下利腹滿實痛煩冤悶亂喘急鄭聲脈雖疾數以其畜熱極深而脈道不利又致脈沉細而欲絕俗未明其造化之理而反謂其傷寒極陰毒者或始得之陽熱暴甚而便有此証候者或兩感熱勢極者通宜解毒加八

承氣湯下之熱不退者宜再下之然雖古人云三下之而熱未退即死矣亦有按法以下三五次利一二十行熱方退而得活者免致不下退其熱而必死也下後熱少退而未愈者黃連解毒湯調之或失下熱極以致身冷脉微而昏冒將死者若急下之從陰暴絕而死蓋陽氣後竭而然也不下亦死宜涼膈散或黃連解毒湯或二藥合服或白虎合涼膈散養陰退陽積熱漸以宜散則心胸溫煖脉漸以生至於脉復有力方可以三乙承氣湯下之或解毒加六一散調之愈後宜服退熱之藥忌發熱諸物裹熱脉厥者宜



白虎湯熱極厥深而諸藥下畢竟不能利者不救必死黃連解毒湯更加甘遂末一錢七下之

循衣摸床

陽明病脉遲汗出不惡寒身重短氣狂語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸床惕而不安直視微喘三乙承氣湯

勞復食復

汗下後勞復柴胡飲子飲酒復剛黃連解毒湯或雙解加黃連在裏者三乙承氣湯在表者益元散或雙解散半表半裏大柴胡湯小柴胡湯涼膈散解毒湯

隨證用之食復三乙承氣湯

傷寒標本心法類萃卷下

河間劉守真編
新安吳勉學校正

麻黃湯 一

麻黃六錢 桂枝四錢 甘草二錢 杏仁七枚

右作二貼水二鍾煎八分取汁麻黃性熱惟冬及春兼病人素虛寒者乃用正方夏至之後服之必發斑黃須加知母半兩石膏一兩黃芩一分桂枝加減月令同

桂枝湯 二

桂枝 芍藥各二錢半 甘草一錢半

右作一貼薑三片棗一枚煎服取微汗倍加芍藥名桂枝芍藥湯加大黃名桂枝大黃湯金匱方曰太陽病自汗而小便數者不可與桂枝湯

桂枝葛根湯 三

桂枝 芍藥 甘草各二錢半 生薑四錢

大棗二枚 葛根五錢二分

右作二服水煎取微汗

葛根湯 四

葛根一兩 麻黃一錢 生姜二錢 桂枝



甘草 芍藥 棗 枚

右作二貼水煎服[illegible]取汗為度

升麻葛根湯 五

升麻 乾葛 芍藥 甘草各一兩

右作二服水煎若大段寒即熱服若熱即溫服身涼為度

大青龍湯 六

麻黃 石膏各四錢 桂枝半錢 甘草同上

杏仁三分

右作二貼薑三片棗一枚水煎取微汗不可太過恐亡陽以溫粉撲之



小青龍湯 七

半夏八分 此五味各一錢 麻黃 芍藥

細辛 甘草 乾薑 桂枝各一錢八分

右作二貼生薑四片水煎當方皆不用生薑

大柴胡湯 八

柴胡一錢 黃芩 將軍七錢 芍藥一錢半

半夏二錢 枳實二錢

右作一貼生薑五片棗一枚煎大柴胡合三乙承氣湯合黃連解毒湯合大承氣湯

小柴胡湯 九

柴胡 八錢 黄芩 甘草 人參 各三錢

半夏 二錢半

右五錢生薑五片棗一枚煎溫服

一法本方合涼膈天水 一法本方合涼膈散

一法本方合解毒湯 一法本方去棗子加

一法本方去人參大棗生姜加五味子乾姜

一法本方去半夏人參加栝蔞實

大承氣湯 十

大黄 芒硝 各二錢 厚朴 四錢 枳實 三枚



右作一貼水二鍾先煎厚朴枳實去下大黄消服

八分去滓入硝煎一二沸放溫服

一法本方加甘遂末一錢二

調胃承氣湯 十一

大黄 二錢 芒硝 一錢 甘草 一錢半

右作一貼水一鍾煎溫服

小承氣湯 十二

大黄 厚朴 枳實 一錢

右作一貼水二鍾煎溫服

三乙承氣湯 十三

大黄 芒硝 各半 厚朴 枳實 一錢

甘草

右作一貼水煎溫服

一法本方減硝加甘草名柴河車入金銀煎名銀煎

散

一法本方加當歸姜棗名當歸承氣湯

桃仁承氣湯 十四

桃仁 去皮尖 芒硝 錢半 大黄 二錢 桂

甘草 各錢半

右作一貼水煎空心服



犀角地黄湯 十五

犀角 白芍藥 牡丹皮

生地黄

右作一貼水煎消熱加黄芩一錢發狂血証加大

黄本方無大黄血証内有

大陷胸湯 十六

大黄 芒硝 一錢 甘遂

右作一貼水煎溫服未快再服勿過不有以意加

之

大陷胸 十七

大黄半兩 芒硝二錢半 葶藶三錢炒另研
杏仁十二枚炒
右大黄末下葶藶杵令杏仁芒硝如泥圓如彈子大每服一丸入甘遂末三字白蜜半匙水一盞煎至半鍾溫服當一宿不利再服

小陷胸湯 十八
半夏 黄連 括蔞實一枚四分用之一
右作一貼水煎溫服未利再服微利黄涎即愈
一法本方合小柴胡湯

抵當湯 十九

水蛭炒 虻蟲各七箇去足翅炒 杏仁七枚
大黄二錢七
右作二貼水煎再服

抵當圓 二十
水蛭炒 虻蟲各七箇去足翅炒 杏仁七枚
大黄二錢半
右細末煉蜜作二圓用水二鍾煎一圓至六分溫服晬時血未下再服

黄連解毒湯 二十一
黄連 黄檗 黄芩 梔子

每服五錢水煎溫服 本方合大承氣湯
一法本方加枳殼 本方合三乙承氣湯
一法本方加甘遂末一錢七 本方合調胃承氣湯
一法本方合涼膈天水散

白虎湯 金匱方云太陽病無汗而渴者不可服
知母二兩 甘草一兩 粳米六合 石膏四兩
右五錢水煎溫服 一法本方加蒼术
一法本方加人參蒼术 一法本方加半夏橘皮
一法本方加半夏桔梗 一法本方合解毒湯
一法本方加人參白术 一法本方合涼膈散

一法本方加麻黄根浮麥

涼膈散 二十三
連翹一兩 黄芩半兩 梔子半兩 甘草半兩
朴硝分 薄荷 大黄半兩
右五錢水煎入蜜少許 一法本方合解毒湯
一法本方加滑石 一法本方加桔梗枳殼
一法本方合天水散 一法本方加滑石調五苓

五苓散 金匱方云陽明病汗多而渴者不可服
猪苓 伏苓 白术各半兩 桂心一分
澤瀉一兩

右或調或煎　一法本方加生姜汁調服

沉參湯 方見五苓合益元散也　二十五

瓜蒂散 細剉炒　赤小豆 等分又用半夏少許　二十六

右為末豆豉半合水一盞半煮汁半盞調下

七不吐加服

頭痛加鬱金　腸痛蝎梢

三聖散 見吐門　二十七

食前先食蘿卜汁半盞後調藥服一半用鵝翎探引

吐出如吐少更以熟蘿汁投之不已用麝香煎湯

服半盞立止



梔子湯　二十八

大梔子 十四枚　豆豉 半合

右以水煎梔子至一盞半入豆豉煎至半盞溫服

梔子蘗皮湯　二十九

大梔子 十五枚　黃蘗 半兩　甘草 一錢半

右㕮咀水二鍾煎

梔子厚朴湯　三十

大梔子 十四枚　厚朴 八錢　枳實 一錢

右㕮咀水煎

十棗湯　三十一

芫花　大戟　甘遂 等分

右為末水一盞棗十枚劈開煮汁半盞調藥一

錢七實者一錢七

茵陳湯　三十二

茵陳 一兩　大戟 半兩　梔子 十枚

右五錢水煎　本方合陷胸湯　本方合大承氣湯

本方五分陷胸湯三分入承氣二分

本方合解毒湯

大黃黃連瀉心湯　三十三

大黃　黃連　黃芩 等分



右五錢方煎

一法如生姜甚良

桂苓甘露飲 即五苓散加寒水石石膏滑石　二十四

右為末或溫湯或新水生姜湯調或煎

一方不用猪苓　一方加甘草

一方有人參藿香木香乾姜根白甘草共一十三

味一名桂苓白术散

人參石膏湯　三十五

人參 一兩　白术 一兩　知母　黃芩 一兩

川芎 半兩　茯苓 一兩　半夏　山梔 一錢

甘草一兩 石膏三兩
右㕮咀姜煎
崔宣武人參石膏湯 三十六
人參二錢 石膏一兩 川芎二兩 黃芩一錢
茯苓 防風各二錢 甘草五錢
右五錢水煎
半夏橘皮湯 三十七
半夏 陳皮 甘草 人參
茯苓 厚朴各一錢半 葛根半兩
五錢姜五片



茯苓半夏湯 三十八
茯苓 半夏 生姜各一錢 取於素問證用水一大盞煎至四分殺汁調下生姜汁服
右水煎 一方加黃芩甘草陳皮各一錢
大橘皮湯 三十九
陳皮 甘草各一兩 人參二兩
右五錢姜三片
赤茯苓湯 四十
陳皮 甘草各一兩 人參二兩 半夏
白朮 川芎 赤茯苓各半兩

右五錢姜五片
檳榔散 四十一
檳榔 枳殼等分
右爲末三錢黃連煎湯調下或黃連解毒湯調
或瀉心湯調下
白朮散 四十二
白朮 茯苓 人參 藿香各半兩
甘草 葛根各一兩 木香二錢
右末白湯調下二錢熱加滑石或加生姜
四逆湯 四十三



甘草一錢 乾姜一錢 附子中者半箇
水煎溫服
五味子湯 四十四
五味子半兩 麥門冬 人參 杏仁
陳皮二錢
右五錢姜棗煎
不卧散 四十五
川芎一兩 石膏七錢半 藜蘆半兩 甘草
人參 細辛各一錢
右爲末口噙水搐鼻少時飲白湯半碗汗出

一方無人參細辛
川芎散 川芎 藁本 蒼术等分
右為末湯調三錢須臾嘔汗便解
茈胡散
柴胡 人參 甘草 大黃
當歸 芍藥
右剉五錢姜五片水煎 崔宣武加半夏五味一
桔梗
劉庭瑞方 四十五
柴胡 甘草一兩 黃芩 當歸

芍藥 人參 半夏 大黃
大勞熱五七分以為度
北金散 四十六
荆芥 麻黃 白芷 細辛
川首烏 菊花 防風 石膏
川芎 薄荷 全蝎 草烏
右為末各等分每服一錢煎服或茶酒送下
調胃散 四十七
水銀 舶上硫黃
右研至黑用一錢米飲下重者二錢

通神散河間另有六神通解散於此加麻黃
惟和劑方中葱白散於此去黃芩滑石加川
芎白术乾姜亦妙方也 四十八
蒼术 石膏四兩 甘草 黃芩二兩
滑石六兩
益元散 即天水散 四十九
滑石六兩 甘草一兩
右為末水調或加蜜或葱豉湯調一名天水散名六
一散
通聖散 五十一

防風 川芎 當歸 芍藥
大黃 薄荷 麻黃 連翹
芒硝各半兩 石膏 黃芩 桔梗各一兩
滑石三兩 甘草二兩 荆芥 白术
梔子各一錢半
右剉五錢薑五片水煎
雙解散 五十一
益元散 通聖散各半
右一兩薑葱豉水煎此藥雙解加減在通聖散條
黃連香薷飲 五十二

香薷 四兩　厚朴 半兩　白扁豆 [illegible]香[illegible]

右剉五錢入酒少許水煎冷服

治腰腳骨髓痛不[illegible]

用葳靈仙煎酒合[illegible]溫服極妙

無憂丸　治一切食積氣積茶積酒積瀉痢[illegible]脹

脹膨悶肚腹疼痛

黑牽牛 一斤取末十二兩　檳榔 二兩好者　豬牙皂角 二[illegible]

三稜 二兩　莪朮 二兩各用好醋浸濕紙裹煨香取出切碎

右同前藥晒乾為末又用大角二兩煎湯打麵糊

為丸每服二錢半白湯送下茶亦可姜湯下



太乙神鍼

羌活　獨活　芎藭 各四兩為末

麝香 二錢　乳香 三錢

右用三月三日艾四月八日亦可曬乾打許入前

藥末和勻用好白紙七層包前藥如筋大治風痺或

在腿或在腰在肢灸七炷二七炷三七炷甚効

治風蟲牙疼方

防風 [illegible]　細辛 去葉　巴豆 去殼油各等分

右各味等分[illegible]為末[illegible]牙痛處涎出立止切忌

下如食飲[illegible]以[illegible]一漱飲[illegible]

神効追蟲取積感應丸 [illegible]

檳榔 半斤　苦楝根 [illegible]　杜仲 [illegible]　大黃 [illegible]

三稜 醋[illegible]　雷丸 [illegible]　莪茂 醋炙　使君子 [illegible]兩

木香 二兩　芫花 [illegible]　苦楝根皮 八兩

黑牽牛 二斤半取末十兩為末　皂角 酒煉

茴香

自檳榔至牽牛為末外用皂角等三味濃煎汁為

丸如梧桐子大每服二錢重

金刀如聖散 又名[illegible]方

茅山蒼朮 六兩[illegible]　白芷 [illegible]兩　川烏 [illegible]



防風 [illegible]兩　細辛 [illegible]兩　白朮 [illegible]兩五錢

草烏 四兩

本方用兩頭尖無則

川芎 四兩　雄黃 [illegible]

右件俱各生用晒乾為末用皮

一切金瘡及多年惡瘡用自己小便洗過貼藥立効

破傷風紫惡用好酒調藥半錢或一錢服之蛇傷

入稍自然少許調藥作之蝎螫傷用吐服盡之汗

也如汗不出再服或汗出亦驗傷處付藥可

風狗咬傷先口含水洗淨將藥貼傷處

湯火傷盛者以新汲水調藥付之
雷頭風并乾濕癬麻痺每服半錢服之立効
蘆薈丸　治小兒疳疾疳勞肚大腹脹面黃肌瘦脾
胃不和驚積食積並皆治之
蘆薈　麥糵　胡黃連各一兩　黃連去毛
蕪荑　肉豆蔻　木香　龍膽草各四錢
川練子五十箇取肉　三稜　蓬朮各六錢
檳榔八錢　史君子六十箇　陳皮
青皮各八錢　麝香一錢　神麴一兩　乾蝦蟆
右為細末薄荷豬膽汁為丸粟米大每服一錢空
心米湯下



無價寶一名壯陽丹　專治五勞七傷四肢無力脚
腿沉困骨節酸疼面目無光陽事不起下元虛冷
夢失精夜服至十夜面目光潤二十夜老轉少年
一月後陽道復原四十夜增進飲食至一百日萬
病皆除冬不寒夏不熱[illegible]不白婦人服之強陰
煖子宮陰陽有益最有功效
川練子[illegible]　牛膝[illegible]　檳榔　兔絲子[illegible]
蛇床子　乾姜五錢　穿山甲[illegible]
蓮肉[illegible]　乳香另研　沉香另研

白檀香五錢另研　鹿茸一兩炙　巴戟一兩
大茴香　仙靈皮　破故紙　甘草
胡蘆巴　人參　澤瀉　山藥一兩
五味子　熟地黃　麥門冬　白茯苓
茯苓已上各一兩　白芍藥五錢
右二十七味除乳香沉香白檀香兔絲子四味另
研為細末其餘二十三味各搗爛為細末同前四
味煉蜜為劑同搗一二百千杵丸如梧桐子大每
服三十丸增至十九丸好酒送下以乾物壓之修合
之日再加丁香一錢



貼瘡藥方[illegible]
黃香[illegible]　麻油[illegible]　穿山甲　白芨二味各等分許做膏藥
蓖麻[illegible]
定子藥
白[illegible]　[illegible]　乳香[illegible]
沒藥　辰砂[illegible]
[illegible]定
生肌散
龍骨[illegible]　赤石脂[illegible]　乳香
沒藥　海螵蛸　輕粉　金[illegible]

右為末待瘡[illegible]在瘡口上以[illegible]
貼之一日[illegible]一二日一換

追風托裏散

甘草　黃耆　當歸　芍藥
白芷　防風　川芎　官桂
瓜蔞仁　金銀花　桔梗

每服水酒共二鍾煎至一鍾空心服

象牙丸

象牙五錢　蜂房三錢　蟬蛻三錢　木香二錢
沒藥一錢　乳香三錢　全蝎　又[illegible]　姜蠶二錢



先將黃蠟半斤化開待黑色過却將前藥為細末入蠟內攪匀傾入水內取出冷定為丸如棗大每服空心一丸滾酒化開連三日三服待藥從瘡痕出隔三日再一服第五日再服一丸後下定予藥

傷寒用藥加減賦

萬物之生也人之最靈因時有變兮百疾兆生欲辨陰陽之証必明天地之情指寒溫表裏之疑式明標本施汗下補吐之法凊溶凝生始而毫毛大傳[illegible]惡風自汗乃桂枝之証喘熱惡寒則麻黃[illegible]之

復虛而身必痒各半[illegible]共作而脈尚虛一二共湊[illegible]於是助以葛根雜以豉葱便利惡風者[illegible]若建中脈熱極而煩者入人參於白[illegible]者加杏子以青龍恍惚下痢而陰虛[illegible]效頭眩肉瞤而水泄玄武當功致使桔梗寬咽甘草平悸腹內脹滿兮厚朴薑心中懊憹兮梔子豉小便不利則投之以猪苓膈間有痰則吐之以瓜蒂或乃熱作而腹痛脹滿又若狂妄而潮熱發悸或裏以入而表未除或小便澀而大便秘必明大小柴胡前後承氣結胸多渴視待



者議任陷胸譫語發狂將軍即大黃功先調胃當知青龍十棗兮水有表裏二黃四逆兮利有寒溫下利者甘草煩躁者茯苓茯苓四逆湯脈絕用當歸當歸四逆湯[illegible]亡血須人參四逆加人參汗出加附子附子瀉心湯惡風入黃芩黃芩瀉心湯臍下有水則生姜生姜瀉心湯心中嘔逆則人參人參瀉心湯上四者同歸於四逆下四者乃同於瀉心溫寒而結積姜三白之功妙生津液而逐水道加五苓之最深唾血則黃耆宜服便膿則桃仁可加黃連阿膠求之瓜蒂先瓜蒂後[illegible]班毒紫雪當宜用於升麻

尖□麻從紫雪溫濕之于桂附蒼朮可入□□□內
附子宜加此外若青能與柴胡有加減之餘議身有
餘熱皆有桂枝湯下硬滿者大黃可陪多汗者附子加
小柴胡奔豚者桂枝加桂喘者小青龍加杏仁嗽者
小柴胡加五味子瓜蒂治痞□朮除茯苓醫小便不利
肉寒者乾薑外腫者防己生薑止嘔并麥冬咳用枳
殼兮□□□留腳有黃芪兮因衄血而□或得人參
以除煩或取茯苓而全悸頭疼如破葱白連須咳逆
欲乾乾枯併帶下利□□□□痛則枳鼓豈二方之
□用亦衆藥之同推妙哉吾今特此四十餘年活人
□實□□功當識

# 素問病機氣宜保命集三卷

（金）劉完素撰

明萬曆二十九年新安吳勉學刻古今醫統正脈全書本

病機氣宜保命集三卷（兩淮鹽政採進本）

金張元素撰。元素字潔古，易州人。八歲應童子舉，二十七試進士，以犯廟諱下第，乃去而學醫，精通其術。因抒所心得，述爲此書。凡分三十二門，首原道、原脈、攝生、陰陽諸論，次及處方用藥，次第加減、君臣佐使之法，於醫理精蘊，闡發極爲深至。其書初罕傳播，金末楊威始得其本刊行，而題爲河間劉完素所著。明初寧王權重刊，亦沿其誤，并僞撰完素序文，詞調於卷首以附會之。至李時珍作本草綱目，始糾其謬，而定爲出於元素之手。於序例中辨之甚明。考李濂醫史稱完素嘗病傷寒八日，頭痛脈緊，嘔逆不食，元素往候，令服某藥，完素大服，如其言遂愈。元素自此顯名。是其造詣深邃，足以自成一家，原不必託完素以爲重。今特爲改正，其僞託之序亦並從刪削焉。

# 素問病機氣宜保命集敘

夫醫道者以濟世爲良以愈疾爲善蓋濟世者憑乎術愈疾者使乎法故法之與術悉出内經之玄機此經固不可力而求知而得也況軒岐問荅理非造次奥藏金丹寶典深隱生化玄文爲修行之經路作達道之天梯得其理者用如神聖失其理者似隔水山其法玄妙其功深遠固非小智所能窺測也若不訪求師範而生穿鑿者徒勞皓首耳餘二十有五志在内經日夜不輟殆至六旬得遇天人授飲美酒若橪斗許面赤若醉一醒之後目至心靈大有開悟衍其



功療左右逢源百發百中今見世醫多賴祖名倚約舊方恥問不學特無更新之法縱聞善說反怒爲非嗚呼患者遇此之徒十誤八九豈念人命死而不復者哉仁者鑒之可不痛與以此觀之是未知陰陽變化之道況木極似金金極似火火極似水水極似土土極似木故經曰亢則害承乃制謂已亢極反似勝已之化俗流未知故認似作是以爲陰陽失其本意經所謂誅罰無過命曰大惑鄙徒執迷反肆傍議縱用獲効終無了然之悟其道難與語哉僕見如斯首述玄機刊行於世者已有宣明等三書革庸病之鄙陋正俗論之紕謬宜揚古聖之法則普救後人之命今將餘三十年間信如心手親用若神遠取諸物近取諸身比物立象直明其理治法方論裁成三卷三十二論目之曰素問病機氣宜保命集此集非崖略之說蓋得軒岐要妙之旨故用之可以濟人命捨之無以活人生得乎心髓秘之篋笥不敢輕以示人非絶仁人之心蓋聖人之法不遇當人未易授爾後之明者當自傳焉時大定丙午閏七月中元日河間劉

完素守真述

素問病機氣宜保命集總目卷上
原道論第一　原脈論第二　攝生論第三
陰陽論第四　察色論第五　傷寒論第六
病機論第七　氣宜論第八　本草論第九
素問病機氣宜保命集總目卷中
中風論癲癇附　厲風
破傷風　解利傷寒論　熱論
內傷論　瘧論　吐論
霍亂論　瀉痢論　心痛論
素問病機氣宜保命集總目卷下
咳嗽論　虛損論　消渴論
腫脹論小兒附　眼目論　瘡瘍論齊口瘡附
瘰癧論　痔疾論　婦人論帶下附
大頭論　小兒癍疹論　藥略針法論



# 素問病機氣宜保命集卷上

河間處士　劉完素　守真　述
新安　吳勉學　師古　校

## 原道論第一

經曰觀天之道執天之行盡矣蓋天一而地二北辨而南交入精神之運以行矣擬之於象則水火也畫之於卦則坎離也兩者相須彌滿六合物物得之況於人乎蓋精神生於道者也是以上古真人把握萬象仰觀日月呼吸元氣運氣流精脫骨換形執天機而行六氣分地紀而運五行食乳飲血省約儉育日夜流光獨立守神肌肉若一故能壽敝天地無有終時此其道生之要也夫道者能卻老而全形身安而無疾夭水火用法象也坎離言交變也萬億之書故以水為命以火為性土為人人為主性命者也是以主性命者在乎人去性命者亦在乎人養性命者亦在乎人何則修短壽夭皆自人為故經曰精神內守病安從來又曰務快其心逆於生樂所以然者性命在乎人故人受天地之氣以化生性命也是知形者生之舍也氣者生之元也神者生之制也形以氣充

氣耗形病神依氣位氣納神存修眞之士法於陰陽和於術數持滿御神專氣抱一以神爲車以氣爲馬神氣相合可以長生故曰精有主氣有元呼吸元氣合於自然此之謂也智者明乎此理吹噓呼吸吐故納新熊經鳥伸導引按蹻所以調其氣也平氣定息握固凝想神宮內視五臟照徹所以守其氣也法則天地順理陰陽交媾坎離濟用水火所以交其氣也神水華池含虛鼓嗽通行榮衛入於元宮溉五臟也服氣於朝閉想於暮陽不欲迭陰不欲覆鍊陰陽也以殺起居適早晏出處協時令忿怒以全陰抑喜以



全陽泥丸欲多櫛天鼓欲常鳴形欲常鑑津欲常嚥體欲常運食欲常少眼者身之鑑也常居欲頻脩耳者體之牖也城郭欲頻治面者神之庭也神不欲覆髮者腦之華也腦不欲減體者精之元也精不欲竭明者身之寶也明不欲耗補瀉六腑淘鍊五精可以固形可以全生此皆修眞之要也故修眞之要者水火欲其相濟土金欲其相養是以全生之術形氣貴乎安安則有倫而不亂精神貴乎保保則有要而不耗故保而養之初不離於形氣精神及其至也可以通神明之出皆在於心獨不觀心爲君主之官得之所養則血脈之氣王而不衰生之本無得而損也神之變無得而測也腎爲作強之官得所養則骨髓之氣榮而不枯蟄封藏之本無得而傾也精之處無得而奪也夫一身之間心居而守正腎下而立始精神之居此宮不可太勞亦不可竭故精太勞則竭其屬在腎可以專嗇之也神太用則勞其藏在心靜以養之唯精專然後可以內守故昧者不知於此欲拂自然之理謬爲求補之術是以僞勝眞以人助天其可得乎

## 原脈論第二



大道之渾淪莫知其源然至道無言無以明其理大象無形非立象無以測其與道象之妙非言不明嘗試原之脈者何也非氣非血動而不息營行脈中衛行脈外經曰脈者血之府也自是問而下迄於今經所不載無傳記而莫聞其名焉然而玄機與妙聖意幽微雖英俊明哲之士非輕易可得而悟也夫脈者果何物乎脈者有三名一曰命之本二曰氣之神三曰形之道經所謂天和者是也至於折一支瞽二目亦不爲害生而脈不可須臾失失則絕命害生矣經曰春絃一曰長夏洪一曰鉤秋毛一曰濇冬石一曰沉此言正

脉同天真造化之元氣也巡於春夏秋冬木火水金之位生長收藏參和相應故稟二儀而生不離於氣故於脉有生死之驗經曰脉者血之府也如世之京都州縣有公府廨署也國因置者所以禁小人爲非道也公府不立則善者無以伸其枉惡者無以罰其罪邪正混同賢愚雜處而亂之根也經曰五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也既陰陽爲神明之府脉爲血之府而明可見焉血之無脉不得循其經絡部分周流於身滂沠奔迫或散或聚氣之無脉不能行其筋骨臟腑



上下或暴或蹶故經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危故氣化則物生氣變則物易氣盛則物壯氣弱則物衰氣絕則物死氣正則物和氣亂則物病皆隨氣之盛衰而爲變化也脉字者從肉從末從爪從血四肢百骸得此真元之氣血肉筋骨爪髮榮茂可以倚憑而能生長也長久末固道故從肉從末者是也從爪從血者延之如水分流而布遍周身無有不通也釋名曰脉脉幕也如幔幕之遮覆幕絡一身之形導其太一真元之氣也元氣者在氣非寒非熱非暖非涼在脉者非弦非洪非濇非沉不爲氣而爲

沉不爲血而流停乃冲和自然之氣也故春溫夏熱秋涼冬寒所以然者爲元氣動而不息巡於四方木火水金之位溫涼寒暑之化生生相續新新不停日月更出四序迭迁脉不爲息故人有身形之後五臟既生身中元氣即生焉故春弦夏洪秋毛冬石此四時之氣也而脉者乃在其中矣道經曰視之不見聽之不聞搏之不得迎之不見其首隨之不見其後此如脉之謂也又云埏埴以爲器當其無有器之用故有之以爲利無之以爲用又曰吾不知名字之曰道强爲之名曰大斯立脉之名之本意也故道者萬物之奥脉者百骸之靈奥靈之妙其道乃同元氣者無



器不有無所不至血因此而行氣因此而生故榮行脉中衛行脉外瞻之在前忽然在後而不匱者皆由於脉也分而言之曰氣曰血曰脉統而言之惟脉運行血氣而已故經曰血氣者人之神不可不謹養也陰陽別論曰所謂陽者胃脘之陽也此陽者言脉也胃者土也脉乃天真造化之氣也若土無氣則何以生長收藏若氣無土何以養化萬物是無生滅也以平人之氣常稟於胃正理論曰穀入於胃脉道乃行陰陽交會胃和脉行人稟天地之候故春胃微弦曰

平得弦而無胃曰死夏胃微鉤曰平但鉤而無胃曰
死長夏微耎曰平但弱而無胃曰死秋胃微毛曰平
但毛而無胃曰死冬胃微石曰平但石而無胃曰死
陰者眞藏也見則為敗敗則必死五藏為陰肝脉至
中而無外急如循刀刃責責然如按琴弦心脉至堅
而搏如循薏以仁累累然肺脉至大而虛如毛羽中
人皮膚腎脉至搏而絶如以指彈石辟辟然脾脉弱
而乍數乍踈夫如此脉者皆為藏脉獨見而無胃脉
五藏皆至懸絶而死故經曰別於陽者知病忌時別
於陰者知生死之期故人性候躁急慢促遲緩耎弱



長短大小皮堅肉厚各隨其狀而脉應之常以一息
四至為準者言呼出心與肺吸入腎與肝五者胃兼
主四旁在呼吸之間數則為熱遲則為寒如天之
春秋二分陰陽兩停晝夜各得五十度自此添一遭
則熱減一遭則寒脉之妙道從此可知矣或如散葉
或如燃薪或如丸泥或如絲縷或如涌泉或如吐頹
或如偃刀或如轉索或如遊魚假使千變萬化若失
常者乃眞元之氣離絶五藏六腑不相管轄如喪家
之狗元氣散失而命絶矣經曰積陽為天積陰為地
陽化氣陰成形此言一氣判而清濁分也元氣者天

地之本天和者血氣之根華佗云脉者[illegible]
也孔子曰天不言而四時行焉百物生焉而脉[illegible]
之又經曰自古通天者生之本皆通乎天氣也通天
者謂通元氣天眞也然形體者假天地之氣而生故
本生之氣通計於天稟受陰陽而為根本天地合氣
命之曰人天氣不絶眞靈內属動靜變化悉與天通
易云乾坤成列而易立乎其中矣故天地之體得易
而後生天地之化得易而後成故陽用事則春生夏
長陰用事則秋收冬藏寒往則暑來暑往則寒來始
而終之終而復始天地之化也而易也默然於其間



而使其四序各因時而成功至於寒不凌暑暑不奪
寒無愆陽伏陰之變而不至於大肅大溽故萬物各
得其沖和之氣然後不為過而皆中節也故經曰萬
物負陰而抱陽沖氣以為和百姓日用而不知斯脉
之道也故脉不得獨浮沉獨大小獨盛衰偏陰陽須
可沉中有浮浮中有沉大中有小小中有大盛中有
衰衰中有盛陰中有陽陽中有陰充塞一身之中盈
溢百骸之內無經絡不有無氣血不至養筋骨毛[illegible]
至壯[illegible]浮非心非腎非肝非脾五臟之盛眞氣[illegible]
不為邪傷若憂愁思慮飢飽勞逸風雨寒暑大驚[illegible]

恐真氣耗亂氣血分離為病之本意夫萬物之中五常皆備審脉之道而何獨無五常邪夫仁固衛一身充盈五臟四肢百骸皆得榮養無冲和之氣獨真藏脉見則死矣生則不見死則獨見好生惡死此仁之謂也分布軀體和調氣血貫之在頭目耳鼻口之在蹠腳陰竅不得上而有不得下而無無所不施無所不至此義之謂也長人脉長短人脉短肥人脉沉瘦人脉浮大人脉壯小人脉弱若長人短短人長肥人浮瘦人沉大人弱小人壯夫如此者皆不中理而為病此禮之謂也見在寸則上病見在關則中病見在



尺則下病五臟有疾各有部分而脉出見不為潛藏伏匿一一得察有餘不足而愈其病此智之謂也春弦夏洪秋毛冬石太陽之至其脉沉太陰之至其脉大而長少陰之至其脉浮陽明之至其脉濇而短少陽之至其脉鉤厥陰之至其脉弦四序不失其期六氣常準者此信之謂也非探賾索隱鉤深致遠學貫天人旁通物理者未能達於此矣

## 攝生論第二

論曰內經謂法於陰陽和於術數飲食有節起居有常不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去今時之人不然也以酒為漿以妄為常醉以入房以欲竭其精以耗散其真不知持滿不時御神務快其心逆於生樂起居無節故半百而衰也且飲食起居乃人生日用之法從恣不能知節而欲傳精神服天氣者不亦難乎又經曰飲食自倍腸胃乃傷起居如驚神氣乃浮是以聖人春木旺以膏香助胃夏火旺以膏腥助肺金用事膳膏臊以助肝木用事膳膏膻以助心所謂因其不勝而助之也故食飲之常保其生之要者五穀五藥五畜五菜也脾胃待此而倉廩備三焦待此而道路通榮衛待此以清以濁筋



骨待此以柔以正故經云蓋五味相濟斯無五宮之傷所以養其形也雖五味為之養形若味過於酸肝氣以津脾氣乃絕味過於鹹大骨氣勞短肌心氣抑味過於甘心氣喘滿色黑腎氣不衡味過於苦脾氣不濡胃氣乃厚味過於辛筋脉沮弛精神乃央所謂失五味之常而損其形也王注曰味有偏緣臟有偏絕此之謂也飲食者養其形起居者調其神是以聖人春三月夜臥早起被髮緩形見於發陳之時且曰以使志生夏三月夜臥早起無厭於日見於蕃秀之時且曰使志無怒使氣得泄秋三月早臥早起與雞

俱與見於容平之時收斂神氣且曰使志安寧以應秋氣冬三月早卧晚起去寒就溫見於閉藏之時且曰使志若伏若匿若有私意若已有得此順生長收藏之道春夏養陽秋冬養陰順四時起居法所以調其神也經所謂逆於春氣則少陽不生肝氣内變逆於夏氣則太陽不長心氣内洞逆於秋氣則太陰不收肺氣焦滿逆於冬氣則少陰不藏腎氣獨沉此失四時之氣所以傷其神也智者順四時不逆陰陽之道而不失五味損益之理故形與神俱久矣乃盡其天年而去與夫務快其心逆於生樂者何足與語此道哉故聖人行之賢者佩之豈虛語哉



## 陰陽論第四

論曰天地者陰陽之本也陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也故陰陽不測謂之神神用無方謂之聖倘不如此謂天自運乎地自處乎豈足以語造化之全功哉大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生所以天爲陽地爲陰水爲陰火爲陽陰陽者男女之血氣水火者陰陽之徵兆惟水火既濟血氣變革然後剛柔有體而形質立焉經所謂天覆地載萬物悉備莫貴乎人人稟天地之氣生四時之法成故人生於地懸命於天人生有形不離陰陽蓋人居天之下地之上氣交之中不明陰陽而望延年未之有也何則蒼天之氣不得無常也氣之不襲是謂非常非則變矣王注曰且蒼天布氣尚不越於五行人在氣中豈不應於天道左傳曰違天不祥繫辭云一陰一陽之謂道老子曰萬物負陰而抱陽故偏陰偏陽謂之疾夫言一身之中外爲陽内爲陰氣爲陽血爲陰背爲陽腹爲陰府爲陽臟爲陰肝心脾肺腎五臟皆爲陰胃大腸小腸膀胱三焦六腑皆爲陽蓋陽中有陰陰中有陽豈偏枯而爲



道哉經所謂治心病者必求其本是明陰陽之大體水火之高下盛衰之補瀉遠近之大小陰陽之變通夫如是惟達道人可知也

## 察色論第五

論曰聲合五音色合五行聲色符合然後定立臟腑之榮枯若滋榮者其氣生如翠羽雞冠蟹腹豕膏烏羽是也枯夭者其氣敗如草茲衃血枳實枯骨如炲是也至如青赤見於春赤黃見於夏黃白見於長夏白黑見於秋黑青見於冬是謂五臟之生者以五行之相繼也得肝脉色見青白心脉色見赤黑脾脉色

見黃青肺脉色見白赤腎脉色見黑見是謂眞臟
見者以五行之相克也若乃肺風而眉白心風而口
赤肝風而目青脾風而鼻黃腎風而肌黑以風善行
數變故爾肝熱而左頰赤肺熱而右頰赤心熱而顏
赤脾熱而鼻赤腎熱而頤赤以諸熱皆屬火故爾以
至青黑爲痛黃白爲熱青白爲寒以九氣不同故爾
鼻青爲腹水黑爲水氣白爲無血黃爲胸寒赤爲有
風鮮明爲留飲而五色取決於此故爾然審病者又
皆以眞脾之爲本蓋眞脾之黃是謂天之氣五色又
明病雖久而面黃必生者以其眞氣外榮也此數者



雖皆成法然自非心清見曉於冥冥不能至於此故
五色微診可以目察尤難難經曰望而知之謂之神
爲見五色於外故決死生也

傷寒論第六

論曰夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死止於六七
日間若兩感於寒者必不免於死經所謂人所傷於
寒者則爲病熱熱雖甚不死蓋傷寒者非雜病所比
非仲景孰能明於此故張僊公深得玄機之理趣達
六經之標本知汗下之淺深若投湯劑正與不正禍
福影響何暇數日哉然仲景分三百九十法一百一

十二方其證有六其治有四經云一日巨陽受之其
脉尺寸俱浮二日陽明受之其脉尺寸俱長三日少
陽受之其脉尺寸俱弦四日太陰受之其脉尺寸俱
沉五日少陰受之其脉尺寸俱微緩六日厥陰受之
其脉尺寸俱沉濇其太陽病者標本不同標熱本寒
從標則太陽發熱從本則膀胱惡寒若頭項痛腰脊
強太陽經病也故宜發汗其陽明病者雖從中氣標
陽本實從標則肌熱從本則譫語若身熱頭疼鼻乾
不得卧陽明經病故宜解肌太陽傳陽明非表裏之
傳若譫語從本爲實故宜下便王注曰以陽感熱其



少陽病者標陽本火從標則發熱從本則惡寒前有
陽明後有太陰若胃脇痛而耳聾往來寒熱少陽經
病故宜和解其太陰病者標陰本濕從標則身目黃
從本則腹滿而嗌乾太陽經病故宜泄滿下濕從其
本治其標少陰病者標陰本熱從標則爪甲青而身
冷從本則脉沉實而發渴若口燥舌乾而渴少陽經
病故宜温標下本其厥陰病者故厥陰之中氣宜温
也若煩滿囊縮厥陰經病故爲熱宜苦辛下之故經
日所爲知標知本萬舉萬當不知標本是爲妄行又
曰各通其臓乃催汗泄非宜之謂也故明斯六經之

標本乃知治傷寒之規矩此所謂發表有六也且如發
汗桂枝麻黃之輩在皮者汗而發之葛根升麻之輩
因其輕而揚之發也承氣陷胸之輩下者因而竭之
法也瀉心十棗之輩中滿泄之之法也瓜蒂梔豉者高
者因而越之法也故明此四治之輕重可爲了傷寒
之綱要此之謂其治有四也若明六經四法豈有
發黃生斑畜血之壞證結胸痞氣之藥過難經所
謂未滿三日可汗而已其滿三日可泄而已故仲
景曰太陽病脉浮緊無汗身疼痛八九日不解表
證仍在當發其汗宜麻黃湯主之少陰病得二三



日口燥咽乾者急宜大承氣下之豈敢執於三四
日汗泄之定法也是以聖人書不盡言言不盡意說
其大槩此之謂也經所謂發表不遠熱攻裏不遠寒
余自製雙解通聖辛涼之劑不遵仲景法桂枝麻黃發
表之藥非余自衒理在其中矣故此一時彼一時柰
五運六氣有所更世態居民有所變天以常火人以
常動動則屬陽靜則屬陰内外皆擾故不可峻用辛
溫大熱之劑縱獲一效其禍數作豈曉辛涼之劑以
葱白鹽豉大能開發鬱結不惟中病令汗而愈免致
辛熱之藥攻表不中其病轉甚發惑狂衄血斑出之

屬熱藥所致故善用藥者須知寒涼之味况兼應三
才造化通塞之理也故經所謂不知年之所加氣之
盛衰虛實之所起不可以爲工矣大抵雜病者氣之
常也隨方而異其治不全者病者氣之異其治則同
其愈則異昔黃帝與四方之問岐伯舉四治之能故
傷寒之法備矣哉大矣哉若視深淵如迎浮雲莫知
其際是以知發表攻裏之藥性察標本虛實之併傳
量老少壯弱之所宜勞逸緩急之禀性切脉明陰陽
之分部詳證之邪氣之淺深故可宜會通之法矣内
經曰謹熟陰陽無與衆謀此之謂也



## 病機論第七

論曰察病機之要理施品味之性用然後明病之本
焉故治病不求其本無以去深藏之大患故掉眩收
引膹鬱腫脹諸痛痒瘡瘍皆根於内夫百病之生也
皆生於風寒暑濕燥火以知化之變也經言盛者瀉
之虛者補之余錫以方士而方士用之尚未能十全
余欲令要道必行桴鼓相應猶拔刺雪汙工巧神聖
可得聞乎經曰刺深而猶可拔汙深而猶可雪
莊子曰雪猶洗也岐伯曰審察病機無失氣宜此之
謂也黃帝曰願聞病機何如岐伯對曰

諸風掉眩皆屬於肝少□無怒風勝則動肝者罷極之本魂之居也其華在爪其充在筋以生血氣其味酸其色蒼為將軍之官謀慮出焉此為陰中之少陽通於春氣其脈弦王注曰肝有二布葉一小葉如木甲折之狀故經所謂其用為動乃木之為動火太過之政亦為動蓋火木之主暴速所以掉眩也掉搖也眩昏亂也旋運皆生風故也是以風火皆屬陽陽主動其為病也胃脘當心痛上支兩脅膈咽不通食飲不下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴僵仆裏急緛戾脅痛嘔泄甚則掉眩巔疾兩脅下痛引少腹令人善



怒也虛則目䀮䀮而無所見耳無所聞善恐如人將捕之凡病肝木風疾者以熱為本以風為標故火本不燔遇風烈乃焰肝本不甚熱因金衰而旺肺金不勝心火木來侮於金故諸病作矣其為治也燥勝風王注曰風自木生燥為金化風餘則制之以燥肝勝治以清涼清涼之氣金之氣也木氣之下金氣承之又曰風淫於內治以辛涼肝欲散急食辛以散之故木主生榮而主春其性溫故風火則反涼而毀折是兼金化制其木也故風病過極而反中外燥澀是反兼金化也故非為金制其木是甚則如此中風偏

枯者由心火暴勝而水衰不能制則火實剋金金不能平木則肝木勝而兼於火熱則卒暴僵仆凡治消癉仆擊偏枯痿厥氣滿發肥貴人膏粱之疾也故此藏氣平則敷和太過則發生不及則委和

諸痛痒瘡瘍皆屬於心靜則神明熱勝則腫心者生之本神之變也其華在面其充在血脈為陽中之太陽通於夏氣其脈鈎其味苦其色赤為君主之官神明出焉此陽中之陽也王注曰心形如未敷蓮花中有七空以導引天真之氣神明之宇也經所謂其用為燥火性燥動其明於外熱甚火赫燥石流金火之



極變也燔焫山川旋及炎宇火之災眚也故火升同水水智而火惡其性暴速其為病也當胸中熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱咳喘唾血血泄鼽衄嚏嘔溺色變甚則瘡瘍胕腫肩背臂及缺盆中痛心痛身熱驚惑惡寒戰慄譫妄□□語笑瘡瘍血流狂妄目赤病中痛脅下痛背膺肩胛間痛兩臂內痛虛則胸腹大脅下與腰背相引而痛其為治也以寒勝熱王注曰小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣汗以發之發之不盡逆制之制之不盡求其屬以衰之又曰用水之主以制陽光經曰氣有多少病有盛衰治

有緩急方有大小此之謂也是以熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之心欲耎急食鹹以耎之君火之下陰精承之火氣之下水氣承之是故火主暴虐故燥萬物者莫熯乎火夏月火熱極甚則天氣薰蒸而萬物反潤以水出液林木津流及體熱極而反汗液出是火極而反兼水化俗以難辯認以是作非不治已極反攻王氣是不明標本但隨兼化之虛象妄爲其治反助其病而害於生命多矣故此篇平則升明大過則赫曦不及則伏明王注曰百端之起皆自心生諸濕腫滿皆屬脾土味和氣化濕勝



則濡泄脾者倉廩之官本營之居也名曰化糟粕轉味而出入者也其華在唇其充在肌其味甘其色黃故爲倉廩之官又名諫議之官五味出焉此至陰之類通於土氣爲陰中至陰脾也其脉緩王注曰脾形象馬蹄內包胃脘象土形也其用爲化兼四氣聚散復形群品以土溉灌肝心肺腎不主於時寄旺四季經所謂善不可見惡不可見也其變驟注其災霖潰其爲病也胕腫骨痛陰痺按之不得腰脊頭頸痛時眩大便難陰氣不用飢不欲食咳唾則有血積飲否膈中滿霍亂吐下爲善脹肉痿足不收行腸鳴嘔吐

泄注下王注曰脾熱則生虛則腹滿腸鳴飧泄食不化若有胃之寒者有胃之熱者色白澄徹清冷者屬寒色黃水赤渾濁者屬於熱故仲景曰邪熱不殺穀火性疾速此之謂也其爲治也風勝濕濕自土生風爲木化土餘則之以風脾盛治之以燥故濕傷肉濕勝則濡泄甚則水閉胕腫王注曰濕爲水水盛則腫水下形肉已消又曰濕氣爲淫皆爲腫滿但除其濕腫滿自衰若濕氣在上以苦吐之濕氣在下以苦瀉之以淡滲之治濕之法不利小便非其治也故濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥之以淡泄之若濕



上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗爲故而止濕淫於內治以苦熱佐以酸淡以苦燥之以淡泄之脾苦濕急食苦以燥之又曰土氣之下木氣承之本草曰燥可去濕桑白皮赤小豆之屬王注曰半身已上濕氣有餘火氣復鬱所以明其熱能生濕經云風寒在下燥熱在上濕氣在中火遊行其間是以熱之用矣故土主濕燥生雨而安靜而熱振拉則飄驟散落是反兼風木制其土也若脾其土自燥去其濕以寒除熱脾土氣衰以甘緩之所以燥泄積飲痞隔腫滿濕熱乾涸消渴慎不可以溫藥補之故積溫成熱性之

溫乃勝氣之藥也故此藏喜新而惡陳常令滋潤使
使乾潤土平則備化太過則敦阜不及則卑監
諸氣膹鬱病痿皆屬於肺金 常清氣利 燥勝則乾肺
者氣之本魄之處也其華在毛其充在皮其味辛其
色白而為相傅之官治節出焉為陽中之少陽通於
秋氣其脉毛王注曰肺之形象有二布葉一小葉中
有二十四空行列以布分諸藏清濁之氣經所謂其
用為固其變肅殺其眚蒼落其為病也骨節內變左
胠脇痛寒清於中感而瘧太涼革候咳腹中鳴注泄鶩
溏咳逆心脇滿引小腹善暴痛不可反側嗌乾面



塵色惡腰痛丈夫㿗疝婦人少腹痛浮虛鼽尻陰股
髀腨䯒足病皴揭實則喘厥逆氣肩背痛汗出尻陰
股膝髀虛則少氣不能報息耳聾嗌乾其為治也熱
勝燥燥自金生熱為火化金餘則制之以火肺勝則
治之以苦又曰金氣之下火氣承之燥淫于內治以
苦溫佐以苦辛以苦下之若肺氣上逆急食苦以泄
之王注曰制燥之勝必以苦溫故受乾病生焉是以
金王於秋而屬於其氣涼涼極天氣清明而萬物反
燥故燥若火是金極而反兼火化也故病血液衰也
燥金之化極甚則煩熱氣鬱痿弱而手足無力不能

收持也凡有聲之痛應金之氣故此藏平氣則審平
太過則堅成不及則不從革諸寒收引皆屬於腎水
能衰動耗 寒勝則浮腎者主蟄封藏之本精之處也
其華在髮其充在骨其味鹹其色黑為作強之官伎
巧出焉為陰中之陰通於冬氣其脉石王注曰腎藏有
二形如豇豆相并而曲附於膂筋外有脂裹裹白表
黑主藏精故儸經曰心為君火腎為相火是言在腎
屬火而不屬水也經所謂膻中者臣使之官喜樂出
焉故膻中者在乳之間下合于腎水是火居水位得
升則喜樂出焉雖君相二火之氣論其五行造化之



理同為熱也故左腎屬水男子以藏精女子以繫胞
右腎屬火遊行三焦興衰之道由於此故七節之傍
中有小心是言命門相火也經所謂其變凝冽其眚
冰雹其為病也寒客心痛腰腿痛大關節不利屈伸
不便若厥逆痞堅腹滿寢汗實則腹脛腫喘身重汗
出憎風虛則胸中痛大小腹痛清厥意不樂王注曰
大小腹大小腸也此所謂左腎水發病也若夫右腎
命門相火之為病少氣瘡瘍疥癬癰腫脇滿胸背首
面四肢浮腫腹脹嘔逆瘛瘲骨痛節有動注下溫瘧
腹中暴痛血溢流注精液目赤心熱甚則瞀昧暴瘖

瞀悶懊憹嚏嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔湧溢食不下目昧不明暴注瞤瘛暴病
暴死瘤氣結核瘍疹皆相火熱之所為也其為治也寒
勝熱熱勝寒若熱淫于內治以鹹寒火淫所勝平以
酸冷故相火之下水氣承之熱淫于內治以甘寒
佐以苦辛寒淫所勝平以辛熱又曰腎苦燥急食辛
以潤之腎欲堅急食苦以堅之故水本寒寒急則水
冰如地而能載物水發而雹雪是水寒亢極反似土
水之土化謂兼化也所謂寒病極者反腎滿也左腎
不足濟之以水右腎不足濟之以火故此藏水平則
靜順不及則涸流大過則流衍



諸厥固泄皆屬於下厥謂氣逆固謂固氣則肝腎失
守失守則不能禁固出入無度燥濕不恒故氣下則
飧也經所謂厥氣上行滿脈去形
諸喘嘔逆皆屬於上肺者藏之長也為心之華蓋故
肺熱葉焦發痿躄是氣鬱不利病喘息而嘔也嘔謂
嘔酸水火氣炎上之象也胃膈熱甚則為嘔也若火
火之炎痰熱則愈利肺之氣喘息自調也道路開通
吐嘔則除凡病嘔涌溢食皆屬火也王注曰內格嘔
逆食不得入是有火也經所謂三陽有餘則為痿易
王注曰易有變常用自痿弱無力也故此者熱之明

矣
諸熱瞀瘛皆屬於火熱勝則濁亂昏昧也瞀示乃
昏也經所謂瘛謂筋脈引縮而急名曰瘛者故俗為之
搐是也熱勝風搏并于經絡故風主動而不寧風火
相乘是以熱瞀瘛而生矣治法祛風涤熱之劑折其
火勢熱瘛可立愈若妄加灼火或飲以發表之藥則
死不旋踵
諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火禁慄禁不或如喪神守
悸動怔忪皆熱之內作故治當以制火制其神守血
榮而愈也



諸痙項強皆屬于濕寒濕同性水火同居故足太陽
膀胱經屬水而位下所以濕可傷也其脈起目內眥
上額交巔上其支別從巔入絡于腦還出下項故
主項強太陽表中風加之以濕客於經中內挾寒濕
則筋脈拘急故痙項強而不柔和也此太陽寒濕當
詳有汗無汗治以流濕祛風緩發表而愈也
諸逆衝上皆屬於火衝攻也氣炎上故作嘔涌溢食
不下也
諸脹腹大皆屬於熱肺王于氣若氣通暢若熱甚則
鬱于內故肺脹而腹大是以火主長而高茂形現彰

顯升明舒榮皆肝之象也熱去而見自利也

爲躁狂越皆屬於火火實則四支實而能登高也六

四肢者諸陽之本經所謂陰不勝陽則脈流薄疾并

乃狂是以陽盛則使人妄言罵詈不避親踈神明之

亂也故上善若水下愚若火此之謂也治之以補陰

瀉陽奪其食則病已

諸暴強直皆屬於風暴虐而害也強勁有力而不

柔也乃厥陰風木勢甚而成[illegible]陽鬱於內而陰

行於外乎金曰強直爲風治以瀉火補金木能自平

也



諸病有聲鼓之如鼓皆屬於熱腹脹大而鼓之有聲

如鼓者熱氣甚則然也經所謂熱勝則腫此之類也

是以熱氣內鬱不散而聚所以叩之如鼓也諸腹脹

大而鼓之皆爲裏證何以明之仲景曰少陰病腹脹

不大便者急下之宜大承氣湯所謂土堅勝水則乾

心與大承氣湯下之以救腎水故知腹脹其熱明矣

諸病胕腫疼酸驚駭皆屬於火胕腫熱勝內則陽氣

鬱故也疼酸由火實制金不能平木則木旺而爲酸

酸者肝之味也故經所謂二陽一陰發病主驚駭注

注曰肝主驚然肝主之原其本也自心火甚則腎水

所以驚則心動而不寧也故火衰水平治之本也

諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱熱氣燥爍於筋故筋

轉而痛應風屬於肝也甚則吐不止暍熱之氣加之

以泄濕勝也若三氣雜乃爲霍亂故仲景曰嘔吐而

利名爲霍亂故有乾霍亂有濕霍亂得其吐利邪氣得

出名濕霍亂也十存八九若不得吐利揮霍撩亂邪

無出名曰乾霍亂十無一生者皆以胃暑中熱飲食

不節寒熱氣不調清濁相干陰陽乖隔則爲此病若

或言寒者大誤矣故熱則小便渾而不清寒則潔而

不濁故井水煎沸則自然渾濁也



諸病水液澄徹清冷皆屬於寒水液爲病寒也故水

清淨其氣寒冷水穀不化而吐利其色白而腥穢傳

化失常食已不饑雖有邪熱不殺穀而不饑者無倦

而常好動其便色黃而酸王注曰寒者上下所出及

吐出溺出也又法曰小寒之氣溫以和之

諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱流而不腐動而不蠹

故吐嘔酸者胃膈熱甚則鬱滯於氣物不化而爲酸

也酸者肝木之味也或言吐酸爲寒者誤也暴注者注

泄也乃腸胃熱而傳化失常經所謂清氣在下則生

飧泄下迫者後重裏急窘迫急痛也火性急速而能

造物故也俗云虚坐努責而痛也
諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥澁枯者水液氣衰少血不榮於皮肉氣不通利故皮膚皴揭而澁也及甚則麻痺不仁涸乾者水少火多 系辭云燥萬物者莫熯乎火故火極熱甚水液乾而不潤於身皮膚乃啓裂手足有如斧傷而深一二分者冬月甚而夏月衰故法曰寒能收斂收斂則燥澁皴揭熱能縱緩則滋榮潤澤澤皆屬燥金之化也王注曰物之生滑利物之死枯澁其爲治也宜開通道路養陰退陽涼藥調之榮血通流麻木不仁澁涸乾勁皴揭皆得其所愼



毋以烏附之藥經所謂金木水火土運行之數寒暑燥濕火風臨御之化則失道可見民病可謂凡受諸病者皆歸於五行六氣勝復盛衰之道矣王注曰人生有形不能無患既有其患亦常有逃生化出陰陽者也故曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之盛者責之虚者責之必先五勝踈其血氣令得調達而致和平此之謂也

## 氣宜論第八

論曰治病必明六化分治五味五色所主五臟所宜五行之運行數六氣之臨御化然後明陰陽三才之數故數之可數者人中之陰陽也然所合之數可得者也夫陰陽者數之可十推之可萬故天地陰陽者不以數推以象之謂也經曰丹天之氣經于牛女戊分黅天之氣經于心尾已分蒼天之氣經于危室柳鬼素天之氣經于亢氐昴畢玄天之氣經于張翼婁胃所謂戊己分者奎壁角軫則天地之門戸也是以將前三數與天象俱明始終之六氣所司之高下在泉淺深之勝復左右之間同與不同三紀太過不及之理故可分天地之化産民病之氣宜矣經所謂太陽司天之政故歲宜苦以燥之温之陽明司天之政



故宜以辛苦汗之清之散之又宜以鹹少陽司天之政故歲宜以鹹宜辛宜酸滲之泄之漬之發之觀氣寒温以調其氣太陰司天之政故宜苦燥之温之甚者發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮折而水血交流少陰司天之政故歲宜鹹以耎之而調其上甚則以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之厥陰司天之政故歲宜以辛調之以鹹潤之人必折其鬱氣先資其化源是以迎而奪之王氣之法也故云六氣有餘用熱遠熱用温遠温用寒遠寒用涼遠涼食宜同法此其道也故王注曰夏寒[illegible]甚則可以熱

犯熱寒不甚則不可以犯也若有表證若有裏證故法云發表不遠熱攻裏不遠寒不發不攻而犯寒犯熱使寒熱內賊其病益甚故無者生之有者甚之所以不遠熱則熱至不遠寒則寒至其寒至則堅痞腹痛急下利之病生矣熱至則身熱吐下霍亂癰疽瘡瘍瞀昧昏鬱注下瞤瘛腫脹吐嘔鼽血衄血頭痛骨節變肉痛血溢血泄淋閉之病生矣王注曰食已不飢吐利腥穢亦寒之疾也暴瘖冐昧目不識人躁擾狂越譫語罵詈驚癎亦熱之病也故經所謂無失天信無逆氣宜無翼其勝無贊其復是謂至也倘不知



斯寒熱內賊失氣之宜因不知四時五行因加相勝釋邪攻正絕人長命術不通經為粗工之戒是以六氣上司九宮中司九元下司九宜三數俱明各分主客勝復淫治尅伐主病歲物氣味之厚薄故經所謂氣味有厚薄性用有躁靜治保有多少力化有淺深故少陽在泉寒毒不生太陽在泉熱毒不生故其氣專其味正少陰在泉寒毒不生太陰在泉燥毒不生此所謂天化地產故天地氣合氣合六節分而萬物化生矣經所謂謹候氣宜無失病機病機者寒暑燥濕風金木水火土萬病悉自此而生矣故謹察病機之本得治之要者乃能愈疾藥亦當之若不明六氣五行之所宜氣味之厚薄所用人不知為病之所由而能必獲其效者鮮矣哉

## 本草論第九

論曰流變在乎病主治在乎物制用在乎人三者並明則可以語七方十劑宜通補瀉輕重滑澁燥濕是十劑也大小緩急奇偶複是七方也是以制方之體欲成七方十劑之用者必本於氣味生成而成方焉其寒熱溫涼四氣者生乎天酸苦辛鹹甘淡六味者成乎地氣味生成而陰陽造化之機存焉是以一物



之中氣味兼有一藥之內理性不無故有形者為之味無形者謂之氣若有形以無形之治喘急昏昧乃生無形以有形之治開腸洞泄乃起經所謂陰味出下竅陽氣出上竅王注曰味有質故下流便瀉之竅氣無形故上出呼吸之門故陽為氣陰為味味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味王注曰氣化則精生味化則形長是以有生之大形精為本故地產養形形不足者補之以氣天產養精精不足補之以味形精交養充實無虧雖有奇疾弗能為害故溫之以氣者是溫之以肺補之以味者是補之以腎是

以人爲萬物之靈備萬物之養飲和食德以化津液以淫筋脉以行榮衛故經所謂陰之所生本在五味氣味合而服之以補精益氣所以爲全生之術故五穀五畜五菜五菓甘苦酸辛鹹此爲五味之本也則穀入於口而聚於胃胃爲水穀之海喜穀而惡藥之邪所入不若穀氣之先達故治病之法必以穀氣爲先是以聖人論真邪之氣者謂汗生於穀不歸於藥石辯死生之候者謂安穀則生過期不佳數於五臟凡明胃氣爲本以此知五味能養形也雖藥攻邪如國之用兵蓋出于不得已也是以聖人發表不



遠熱攻裏不遠寒辛甘發散爲陽酸苦湧泄爲陰故辛散酸收甘緩苦堅鹹耎隨五臟之病證施藥性之品味然後分奇偶大小緩急之制也故奇偶者七方四制之法四制者大小緩急也所謂氣有多少病有盛衰治有緩急方有大小故大小者君一臣二奇之制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君二臣六偶之制也又曰奇方云君一臣二君二臣三偶方云君二臣四君二臣六所以七方者四制之法奇偶四制何以明之假令小承氣調胃承氣爲奇之小方也大承氣抵當湯爲奇之大方也所謂因其攻下

而爲之用者如此桂枝麻黄爲偶之小方葛根青龍爲偶之大方所謂因其發而用之者如此經所謂近者奇之遠者偶之身之表者爲遠身之裏者爲近汗者不以奇下者不以偶不以者不用也故補上治上制以緩補下治下制以急急則氣味厚緩則氣味薄故味厚者爲陰薄是陰之陽爲味不純粹者也故味所厚則泄之以下味所薄則通氣者也王注曰味厚則泄薄則通氣氣厚者爲陽薄者爲陽之陰故附子乾薑味甘温大熱爲純陽之藥爲氣厚者也丁香木香味辛温平薄爲陽之陰氣不純粹者也故氣所厚



則發熱氣所薄則發泄經曰薄則發泄厚則發熱王注曰陰氣潤下故味薄則發泄陽氣炎上故氣厚則發熱味薄爲陰少故通泄氣薄爲陽少故汗出是以論氣味之薄厚合奇偶之大小故腎肝位遠數多則其氣緩不能速達於下必大劑而數少取其迅急可以走下也心肺位近數少則其氣急不能發散於上必小劑而數多取其氣易散可以補上也王注曰肺服九心服七脾服五肝服三腎服一乃五臟生成之常數也若奇之不去則偶之是謂重方也偶之不去則反佐以取之是謂寒熱温涼反從其病也王注曰

是以聖人反其佐以同其氣令聲氣應合復令寒熱參合使其終異而始同燥潤而敗堅剛強必折柔脆自消爾故逆者正治從者反治從少從多觀其可也假令仲景曰少陰病下利而脉微者與白通湯利不止厥逆無脉者乾嘔煩者白通加猪膽人尿注曰若調寒熱之逆冷熱必行則熱物冷服下泄之後冷體其消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且不違而致大益此加人尿猪膽汁鹹苦寒物於白通湯熱劑中要其氣相從可去格拒之寒也經所謂熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通用必伏其所主而先



其所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣和可使必已此之謂也若病所遠而中道氣味之者食而過之無越其制度也注曰假令病在腎而心之氣味飼而冷是仍急過之不飼以氣味腎藥凌心心腹益衰與上下遠近例同是以聖人治上不犯下治下不犯上和中上下俱無犯故經所謂誅罰無過命曰大惑此之謂也有中外不相及其治其主病皆論標本不令妄攻也故從所來者爲本其所受者爲標是以內者內調外者外治內者調之不言其治外者治之不言其調經所謂上淫於下所勝平之外

淫於內所勝治之此之謂也若從內之外盛於外先調其內而後治其外從外之內而盛於內者先治其外而後調其內王注曰謂先除其根底後削其枝條也是故病發有餘本而標之後治其本故仲景曰傷寒醫下之續得下利清穀身疼痛者急當救裏身疼痛清便自調急當救表救裏四逆湯救表宜桂枝湯故裏不足必先救之清便自調知裏氣已調然後急與桂枝湯以救表是謂病發本而標之先治其本後治其標此以寒爲本也故知標本者萬舉萬全不知標本是謂妄行此之謂也經本草曰上藥一百二



十種爲君應天中藥一百二十種爲臣應人下藥一百二十種爲使應地若治病者特謂此三品之說未也經所謂有毒無毒所治爲主適其小大爲制也故主病者爲之君佐君者爲之臣應臣者爲之使非上中下三品之謂也王注曰但能破積愈疾解急脫死則爲良方非必要以先毒爲是後毒乃非有毒爲是無毒爲非必量病輕重大小之常也帝曰三品何謂也岐伯曰所以明善惡之殊貫也是以聖人有毒無毒服自有約故病有新久方有大小有毒無毒宜合常制矣大毒治病十去其六常毒治病十去其七

毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食
養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法王注
法謂前四約也餘病不盡然再行之毒之小大如約
而止必無大過矣是以上古聖人謂重身之毒有故
無殞衰其大半而止故毒之性味本以藥治疾誠能
處以中庸以疾適當且如半而止之亦何疑於攻治
哉此之謂也故非調氣而得者治之柰何有毒無毒
何先何後願聞其道王注曰夫病生類其有四焉一
者始因氣動而內有所成爲積聚癥瘕瘤氣癭起結
核癲癇之類是也二者始因氣動而外有所成者謂



癰腫瘡瘍痂疥疽痔掉瘛浮腫目赤瘭胗胕腫痛痒
之類是也三者不因氣動而病生於內留飲澼食饑
飽勞損宿食霍亂悲恐喜怒想慕憂結之類是也四
者不因氣動而病生於外瘴氣賊魅蟲毒蜚尸鬼
擊衝薄墜墮風寒暑濕斫射刺割捶朴之類是也如
此四類者有獨治內而可愈大小承氣陷胸抵當湯
三花神祐蘱用之類是也有兼治內而愈者大小柴
胡通聖洗心涼膈黃連解毒之類是也有獨治外而
愈者善應膏拔毒散點眼生肌之類是也有兼治外
而愈者消雲散苦參散千金內托散之類是也有先

內後治外而愈者瘭胗用寧瘡湯次進三豆之類是也
三焦相火熱甚於內必先疏利其中涼苦寒之劑蠲
滌臟腑或以砭射敷掃塗抹於外者是也有先治其
外後治其內而愈者傷寒刺割破傷皆因風寒之邪
從外之內先以發散其外發之不已量其淺深峻泄
之有楙毒而攻擊者暴病大小便不利胎死堅積滿
脹之類是也有復無毒而調引者痰滯氣痞胃虛脾
弱氣不往來以通經利其氣之藥之類是也方法所
施或勝或復寒者熱之熱者寒之溫者清之散者收
之抑者折之燥者潤之急者緩之剛者柔之衰者補



之強者瀉之堅者削之留者攻之客者除之勞者溫
之溫養也結者散之燥者濡之損者溫之補也逸者
行之勞者動之驚者平之平常也常見常聞上之吐
之下之泄之摩之灸之浴之薄之劫之燔之針劫其
下開之發之適可爲故各安其氣必清必淨則病氣
衰去歸其所宗此治之大體也是以聖人法無定體
體變布施藥不執方合宜而用故論言治寒以熱治
熱以寒而方士不能廢繩墨而更其道也有病熱者
寒之而熱有病寒者熱之而寒二者皆在新病復起
柰何治諸寒而熱者取之以陰熱之寒者取之以陽

所謂求其屬也王注曰謂治之而病不衰退反因與寒而隨生寒熱病之新也謂其益火之原以消陰翳用水之主以制陽光故曰求其屬也夫取心者不必齊以熱取腎者不必齊以寒取但益心之陽寒亦通行若強腎之陰熱之猶可此論五味所歸五臟寒熱溫涼之主也嗚呼聖人之道久塞而後之人獨不能之也王注曰言少可以貫多舉淺可以料深何法之明也如此故非聖人之道孰能至於是耶是以治病之本須明氣味之厚薄七方十劑之法也方有七劑有十故方不七不足以盡方之變劑不十不足以盡



劑之用方不對病非方也劑不蠲疾非劑也今列而論之七方者大小緩急奇偶複大方之說有二一則病有兼證而邪不專不可以一二味治之宜君一臣三佐九之類是也二則治腎肝在下而遠者宜分兩多而頓服之是也

小方之說有二一則病無兼證邪氣專一可以君一臣二小方之治也二則治心肺在上而迫者宜分兩微而頻頻少服之亦為小方之治也

緩方之說有五有甘以緩之為緩方者為糖蜜甘草之類取其戀膈也有丸以緩之為緩方者蓋丸比湯散藥力宜行遲故也有品味群衆之緩方者蓋藥味衆多各不能騁其性也有無毒治病之緩方者蓋藥性無毒則攻自緩也有氣味薄而緩方者藥氣味薄則常補於上比至其下藥力既已衰為補上治上之法也

急方之說有四有急病急攻之急方者如腹心暴痛前後閉塞之類是也有急風蕩滌之急方者謂中風不省口噤是也取湯劑蕩滌取其易散而施攻速者是也有藥有毒之急方者如上涌下泄奪其病之大勢者是也有氣味厚之急方者藥之氣味



厚者直趣於下而力不衰也謂補下治下之法也

奇方之說有二有古之單行之奇方者為獨一物是也有病近而宜用奇方者為君一臣二君二臣三數合於陽也故宜下不宜汗也

偶方之說有二有兩味相配而為偶方者蓋兩方相合者是也有病遠而宜用偶方者君二臣四君四臣六數合於陰也故宜汗不宜下也

複方之說有二有二三方相合之為複方者如桂枝二越婢一湯之類是也有分兩勻同之複方者如胃風湯各等分之類是也又曰重複之複二三

組合而用也反復之[illegible]之不去則偶之是也

十劑者宣通補瀉輕重滑澁燥濕

宣者宣鬱而不散爲壅必宣劑以散之如痞滿不通之類是也本草曰宣可去壅必宣劑以散之如薑橘之屬攻其裏則宣者上也泄者下也湧劑則瓜蔕梔豉之類是也發汗通表亦同

通留而不行爲滯必通劑以行之如水病痰癖之類也本草曰通可去滯通草防已之屬攻其內則通者行也甘遂滑石茯苓芫花大戟牽牛木通之類是也



補不足爲弱必補劑以扶之如氣形羸弱之類是也本草曰補可去弱人參羊肉之屬攻其裏則補養也經所謂言而微終日乃復言者此奪氣也故形不足温之以氣精不足補之以味是以膏粱理疾藥石蠲疾五穀五畜能補善養也

瀉有餘爲閉必泄劑以逐之如腹脹脾約之類是也本草曰洩可去閉即葶藶大黄之屬經所謂濁氣在上則生䐜脹故氣不施化而鬱閉不通所以葶藶大黄味苦大寒專能洩熱去濕下氣仲景曰趺陽脉浮而濇浮則胃強濇則小便數浮濇相搏大便難其脾爲約束津液不得四布苦寒之劑通[illegible]燥而能泄胃強也

輕實則氣壅欲其揚也如汗不發而腠密邪勝而中蘊必輕劑以揚之本草曰輕可去實麻黄葛根之屬經所謂邪在皮者汗而發之其實者散而泄之王注曰陽實則發散

重怯則氣浮欲其鎮也如喪神守而驚悸氣上厥以顛疾必重劑以鎮之本草曰重可去怯即磁石鐵粉之屬經所謂厥成爲顛疾以驚乃平之所以鎮涎也故使其物體之重則涎而用之也



澁滑則氣脫欲其收歛也如開腸洞洩便溺遺失必澁劑以收之本草曰澁可去脫則牡蠣龍骨之屬如寧神寧聖之類是也

滑澁則氣着欲其利也如便難内閉必滑劑以利之本草曰滑可去着即冬葵榆皮之屬滑能養竅故潤利也

燥濕氣淫勝腫滿脾濕必燥劑以除之本草曰燥可去濕即桑白皮赤小豆之屬所以濕甚於上以苦吐之淡以泄之是也

濕津耗爲枯五藏痿弱榮衛涸流必濕劑以潤之[illegible]

草曰濕可去枯卽紫石英之爲故虛弱者用之
注曰心熱甚則火獨光火炎上腎之脉常不行令
火盛而上炎乃爭故腎脉亦隨火炎爍而逆上行
也陰氣厥逆火復內燔陰上隔陽下不守位心氣
通脉故主脉痿是故樞樞紐如折去而不相提挈
脛筋縱緩而不能任用故也可下數百行而愈故
此十劑七方者乃太古先師設繩墨而取曲直何
叔世方士出規矩以爲方員王注曰嗚呼人之死
者但曰命不謂方士愚昧而殺之邪是以物各有
性以謂物之性有盡也制而用之將使之無盡物



之用有窮也變而通之將使之無窮夫惟性無盡
用無窮故施於品劑以佐使斯人其功用亦不可
一而足也於是有因其性而爲用者有因其所勝
爲制者有氣同則相求者有氣相剋則相制者有
氣有餘而補不足者有氣相感則以意使者有質
同而性異者有名異而實同者故蛇之性上竄而
引藥蟬之性脫而退翳虻飲血而用以治血鼠善
穿而用以治漏所謂因其性而爲用者如此弩牙
速産以機發而不括也杵糠下噎以杵築下也所謂
因其用爲使者如此萍不沉水可以勝酒獨活不

搖風可以治其風所謂因其所勝而爲之用制也
如此麻木穀而治風豆水穀而治水所謂氣相同
則相求者如此牛土畜乳可以止渴疾豕水畜心
可以鎮恍惚所謂因其氣相剋則相制也如此熊
肉振羸兔肝明視所謂因其氣有餘補不足也如
此鯉之治水鶩之利水所謂因其氣相感則以意
使者如此蜂蜜成於蜂蜜溫而蜂寒油本生於麻
麻溫而油寒茲同質而異性也蘼蕪生於芎藭蓬
蔂生於覆盆茲名異而實同者也所以如此之類
不可勝舉故天地賦形不離陰陽形色自然皆有



法象毛羽之類生於陽而屬於陰鱗介之類生於
陰而屬於陽空青法木色青而主肝丹砂法火色赤
而主心雲母法金色白而主肺磁石法水色黑而
主腎黃石脂法土色黃而主脾故觸類而長之莫
不有自然之理也欲爲醫者上知天文下知地理
中知人事三者俱明然後可以愈人之疾病不然
則如無目夜遊無足登涉動致顚殞而欲愈疾者
未之有也故治病者必明天地之道陰陽更勝
之先後人之壽夭生化之期乃可以知人之形氣
矣王注曰不明天地之理又昧陰陽之候則以壽

天以天爲壽雖盡上聖救生之道心明經府然石之妙猶未免世中之詬斥也明乎醫者幸詳究焉

素問病機氣宜保命集卷上終



# 素問病機氣宜保命集卷中

河間處士劉完素守真述
明新安 吳勉學師古 鮑士奇正卿 校

## 中風論第一

論曰經云風者百病之始善行而數變行者動也風本生於熱以熱爲本以風爲標凡言風者熱也叔和云熱則生風冷生氣是以熱則風動宜以靜勝其躁是養血也治須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損榮其汗下各得其宜然後宜治在經雖有汗下之戒而有中臟中腑之說中腑者宜汗之中臟者宜下之此雖合汗下亦不可過也仲景曰汗多則亡陽下多則亡陰亡陽則損其氣亡陰則損其形經曰血氣者人之神不可不謹養也初謂表裏不和須汗下之表裏已和是宜治之在經也其中腑者面加五色有表證脉浮而惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中腑也其治多易中臟者脣吻不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞀大小便秘結皆曰中臟也其治多難經曰六腑不和流結爲癰五臟不和九竅不通若外無留結內無不通

知有終也初證既定宜以大藥養之當順時令
陽安臟腑而[illegible]審氣宜而分治
若風中腑者先以加減續命湯隨證發其表若忽
然者則大便多秘澀宜以三化湯通其滯表裏證
已定別無他變故以大藥和治之大抵中腑者多著
四肢中臟者多滯九竅雖中腑者多兼中臟之證至
於舌強失音久服大藥能自愈也有中風濕者夏月
多有之其證身重如山不能轉側宜服除濕去熱之
藥治之不可用鍼可用灸今具六經續命湯通治八
風五痹痿厥等疾以一歲為總以六經為別春夏加



石膏知母黃芩秋冬加桂附又於六經別藥隨證細
分加減自古名醫不能越此
凡覺中風必先審六經之候慎勿用大熱藥烏附之
類故陽劑剛勝積火燎原為消狂瘡腫之屬則天
癸竭而榮衛涸是以中風有此證故經所謂邪風之
至疾如風雨易曰撓萬物者莫疾乎風若感之淺者
留於肌膚感之深者達骨髓蓋禍患之機藏於細微
非常人之豫見及其至也雖智者不能善其後是以
聖人之教下皆謂之虛邪賊風避之有時故中風者
俱有先兆之證凡人如覺大拇指及次指麻木不仁
或手足不用或肌肉蠕動者三年內必有大風之至
經曰肌肉蠕動名曰微風宜先服八風散愈風湯天
麻丸各一料為効故手大指次指手太陰陽明經風
多著此經也先服祛風滌熱之劑辛涼之藥治內外
之邪是以聖人治未病不治已病又曰善治者治皮
毛是止於萌芽也故初成獲愈固久者伐形是治病
之先也
中風之人如小便不利不可以藥利之既得自汗則
津液外亡小便自少若利之使榮衛枯竭無以制火
煩熱愈甚當候熱退汗止小便自行也兼此證乃陽



明大忌利小便須當識此中風之人能食者凡中風
病多能食蓋甲己化土脾盛故能食由是多食則脾
氣愈盛土能制腎水水虧則病增劇也病宜廣服藥
不欲服多食病能自愈中風多食風木也盛則尅脾
脾受敵求助於食經曰實則夢與虛則夢取是也當
瀉肝木治風安脾脾安則食少是其効也
中風之人不宜用龍麝珠砂之提鈴巡於街使盜
者伏而不出益使風邪入於骨髓如油入麵莫能出
也此之類焉若久滯不省昏憒不知事宜用藥下其
痰涎故風者乃百病之長

小續命湯

麻黃去節 人參 黃芩 芍藥

防己 桂枝 川芎 甘草各一兩

防風一兩半 杏仁一兩

右除附子杏仁外擣爲麁末後入二味令勻

每服五七錢水一盞半生薑五片煎至一盞

去滓稍熱服食前

凡中風下審六經之加減雖治之不能去其

邪也內經云開則淅然寒閉則熱而悶知暴

中風邪宜先以加續命湯隨證治之



中風無汗惡寒麻黃續命主之

麻黃 防風 杏仁

依本方添加一倍宜鍼太陽至陰出血崑崙

舉蹻

中風有汗惡風桂枝續命主之

桂枝 芍藥 杏仁

依本方添加一倍宜鍼風府已上二證皆太

陽經中風也

中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之

石膏 知母各一兩 甘草依本方加一倍

中風有汗身熱不惡風葛根續命主之

葛根二兩 桂枝 黃芩依本方

宜鍼陷穀刺厲兌鍼陷穀者去陽明之賊刺厲

兌者瀉陽明經之實熱也已上二證陽明經

中風也

中風無汗身涼附子續命主之

附子加一倍 乾薑加二兩 甘草加三兩

宜刺隱白穴去太陰之賊也此陰經中風也

中風有汗無熱桂枝續命主之

桂枝 附子 甘草依本方加一倍



宜鍼太谿此證少陰經中風也中風六證混

淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁

宜羌活連翹續命主之

小續命八兩 加羌活四兩 連翹六兩

右之續命混淆無六證之別今各分經療治

又分經鍼刺法厥陰之井大敦刺以通其經

少陽之經絕骨灸以引其熱是鍼灸同象法

治之大體也

中風外無六經之形證內無便溺之阻格知血

弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語

以養血而筋自榮大秦艽湯主之

秦艽三兩 甘草二兩 川芎二兩 當歸二兩

白芍藥二兩 細辛半兩 川羌活 防風

黃芩一兩 石膏二兩 吳白芷一兩 白朮一兩

生地黃一兩 熟地黃一兩 白茯苓一兩 川獨活二兩

右十六味剉每服一兩水煎去滓溫服無時如遇天陰加生薑煎七八片如心下痞每兩加枳實一錢同煎

中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內有便溺之阻格後以三化湯主之



厚朴 大黃 枳實 羌活各等分

右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利為度無時法曰四肢不舉俗曰攤緩故經所謂太過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此真所謂膏粱之疾非肝腎經虛何以明之經所謂三陽三陰發病為偏枯痿易四肢不舉王注曰三陰不足以發偏枯三陽有餘則為痿易易為變易常用而痿弱無力也其治則瀉令氣弱陽衰土平而愈或三化湯調胃承氣湯選而用之若脾虛則不用也經所謂土不及則卑陷卑下也陷坑也故脾病四肢不用四肢皆稟氣於胃而不能至經必因於脾乃得稟受也今脾不能與胃行其津液四肢不能稟水穀氣氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治可補十全散加減四物去邪留正

愈風湯中風證內邪已除外邪已盡當服此藥以行導諸經久服大風悉去縱有微邪只從此藥加減治之然治病之法不可失其通塞或一



氣之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和如初覺風動服此不致倒仆

羌活 甘草 防風 蔓荊子

川芎 細辛 枳殼 人參

麻黃 甘菊 薄荷 枸杞子

當歸 知母 地骨皮 黃耆

獨活 杜仲 吳白芷 秦艽

柴胡 半夏 前胡 厚朴

熟地黃 防己各兩 茯苓 黃芩各五兩

石膏四兩　芍藥三兩　生地黃　蒼朮各兩
桂枝一兩

右剉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇天陰加生薑煎空心一服臨臥再煎滓粗服俱要食遠服空心一服嚥下二丹元方之重劑臨臥一服嚥下四白丹爲之輕劑動以安神靜以清肺假令一氣之微汗用愈風湯三兩麻黃一兩勻作四服一服生薑五片空心服以粥投之得微汗則佳如一旬之通利用愈風三兩大黃一兩亦均作四服如前



煎臨臥服得利則妙常服之藥不可失四時之轉如望春大寒之後加半夏二兩通四兩柴胡二兩通四兩人參二兩通四兩謂迎而奪少陽之氣也初夏之月半加石膏二兩通六兩黃芩二兩通五兩知母一兩通四兩謂迎而奪陽明之氣也季夏六月加防已二兩通四兩白朮二兩茯苓三兩謂勝脾土之濕也初秋大暑後加厚朴二兩通四兩藿香二兩桂一兩通二兩謂迎而奪太陰之氣也霜降之後望冬加附子一兩桂一兩通二兩當

歸二兩通四兩謂勝少陰之氣也得寒淑冬四時類此雖立法於四時之加減又宜臨病之際審病之虛實熱寒土地之宜邪氣之多少此藥具七情六慾四氣無使五臟偏勝及不動於榮衛如風秘服之永不燥結如久瀉服之則能自調初覺風氣便能服此藥及新中天麻丸各一料相爲表裏治未病之勝者也及已病者更宜常服無問男子婦人及小兒驚癇搐急慢驚風等病服之神効如解利四時傷風隨四時加減法又療脾腎虛筋



弱□□□□□神昏惧及治內弱風□□內弱者乃風□□火先體重者乃風□□之□□之爲病□一臂肢體偏枯或肥□□□□□臨□恐而使□喜以多思故思忘之□□□不足也是以心亂則百病生於心靜則百病悉去故此能安心養神調□□□□偏勝及不動榮衛

四白丹　能治□□□□□□□中風者多昏冒氣不清利也

白朮半兩　白芷一兩　白茯苓半兩　白檀一錢半
人參半兩　知母二錢　縮砂仁半兩　羌活半錢

薄荷半三錢 獨活半二錢 防風 川芎各五錢
細辛一錢 甘草九錢 甜竹葉 香附子五錢
龍腦半錢另研 麝香一字另研 牛黃半錢
藿香半一錢
右件二十味計八兩六錢三字為細末煉蜜
為丸每兩作十丸臨卧嚼一丸分五七次嚼
之上清肺氣下强骨髓
二丹丸 治健忘養神定志和血內安心神外
華腠理
丹參半兩 丹砂二錢為衣 遠志去心半兩 茯神一兩
人參五錢 菖蒲五錢 熟地黃半一兩

天門冬去心一兩半 麥門冬去心一兩
甘草一兩
右為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十丸
至一百丸空心食前常服安神定志一藥清
肺一藥安神故清中者歸肺以助天真清中
濁者堅强骨髓血中之清榮養於神血中之
濁榮華腠理如素有痰久病中風津液涌溢
在胸中氣所不利用獨聖散吐之後用利氣
瀉火之劑本方在後

瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能
安卧此是風熱煩燥
當歸 龍膽 川芎 梔子
羌活 大黃 防風各等分
右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸竹
葉湯化下
天麻丸 係新方中
天麻六兩酒浸三日焙乾秤 牛膝六兩同上浸
當歸十兩 杜仲七兩炒去絲 玄參六兩
羌活十兩 萆薢六兩別研為細末秤 生地黃十六兩

附子一兩
右為細末煉蜜為丸如桐子大常服五七十
丸病大治百丸空心食前溫酒或白湯下平
明服藥至日高饑則止服藥大忌壅塞失於
通利故服藥半月稍覺壅微以七宣丸輕疏
之使藥再為用也牛膝萆薢治筋骨杜仲筋
骨相着天麻羌活利風之勝藥當歸地黃養
血能和榮衛玄參主用附子佐之行經也
獨聖散 治諸風膈痰諸癎痰涎津液湧溢雜
病亦然

瓜蒂一兩

右剉如麻豆大炒令黃色爲細末每服量虛實久新二三錢茶末一錢虀汁一盞調下若用吐法天氣清明陰晦無用如病卒暴者不拘於此法吐時辰巳午前故內經曰平旦至日中天之陽陽中之陽也論四時之氣仲景曰大法春宜吐是天氣在上人氣亦在上一日之氣卯辰寅候也故宜早不宜夜也先令病人隔夜不食服藥不吐再用熱虀水投之如吐風癇病者加全蝎半錢微炒如有



蟲者加狗油五七點雄黃末一錢甚者加芫花末半錢立吐其蟲出如濕腫滿者加赤小豆末一錢故此不可常用大要辨其虛實實則瓜蒂散虛則梔子豉湯滿加厚朴不可一槩用之吐罷可服降火利氣安神定志之劑治風癇病不能愈者從厚朴丸宜春秋加添外又於每一料中加

人參　菖蒲　茯神去木各一兩半

右依厚朴丸春秋加添法和劑服餌厚朴丸方在吐論中

防風通聖散

[illegible]　川芎　當歸　芍藥

大黃　芒硝　連翹　薄荷

麻黃各半兩　石膏　桔梗

黃芩各一兩　白朮　山梔子　荊芥穗各

[illegible]　滑石[illegible]兩　甘草

右爲麤末每服一兩生薑同煎溫服日再服勞汗當風汗出爲皶鬱乃痤勞汗出於玄府脂液所凝去芒硝倍加芍藥當歸發散玄府之風當調其榮衛俗云風刺或生癮疹或赤



或白倍加麻黃鹽豉葱白出其汗麻黃去節亦去芒硝咸走血而內凝故不能發汗罷依前方中加四物湯黃連解毒三藥合而飲之日二服故內經曰以苦發之謂熱在肌表連內小便澁前方去麻黃加滑石連翹煎藥湯調木香末二錢麻黃主表不主於裏故去之腰脇痛走注疼痛者加硝石當歸甘草一服各二錢調車前子末海金砂各一錢內經曰腰者腎之府破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以下之兼散之汗下後通利血氣祛

[illegible]逐[illegible]每一兩內加荆芥穗大黃各二錢調
全[illegible]一錢諸風潮搐小兒急
慢驚風[illegible]大便[illegible]邪熱[illegible]甚腸胃乾燥寢汗
咬牙上竄睡語筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩
加大黃二錢梔子二錢[illegible]茯苓二錢如肌肉
蠕動調羌活末一錢經曰肌肉蠕動命曰微
風風傷於肺咳嗽喘急每一兩加半夏桔梗
紫花各二錢如打撲傷損肢節疼痛腹中惡
血不下每一兩加當歸大黃各三錢半調沒
藥乳香末各二錢解利四時傷寒內外所傷



每一兩內加益元散一兩葱白十莖鹽豉一
合生薑半兩水一碗同煎至五七沸或煎一
小碗溫冷服一半以筋投之即吐罷後服一
半稍熱服汗出立解如飲酒中風身熱頭痛
如破者加黃連鬚二錢葱白十莖依法立愈
慎勿用桂枝麻黃解之頭旋腦熱鼻塞濁涕
時下每一兩加薄荷黃連各二錢半內經曰
膽移熱於腦則辛頞鼻淵鼻淵者濁涕下不
已也王注曰膽移熱於腦腦液下滲則為濁
涕下不已如水泉故曰鼻淵也此為足太陽

[illegible]脉與陽明脉俱盛也如氣逆者調木香末一
[illegible]錢

## 癘風論第二

內經曰癘風者有榮氣熱胕其氣不清故使鼻柱壞
而色敗皮膚瘍潰故先風寒客於脉而不去名曰癘
風又曰脉風成為癘俗云癩病也故治法云大風骨
節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉病故汗出百日王注
曰泄衛氣之怫熱刺骨髓汗出百日泄榮氣之怫熱
凡三百日鬚眉生而止鍼怫熱屏退陰氣內復故多
汗出鬚眉生也先樺皮散從少至多服五七日後灸



承漿穴七壯灸瘡輕再灸瘡愈再灸後服二聖散泄
熱祛血之風邪戒房室三年鍼灸藥止述類象形此
治肺風之法也然非止肺臟有之俗云鼻屬肺而病
發於肺端而言之不然如此者既鼻準腫赤脹作為
瘡之類乃謂血隨氣化既氣不施化則血聚矣血既
聚使肉腐爛而生蟲也謂厥陰主生五蟲厥陰為風
木故木生五蟲蓋三焦相火熱甚而制金金衰故木
來尅侮經曰侮勝也宜瀉火熱利氣之劑蟲自不生
也法云流水不腐戶樞不蠹此之謂也故此疾血熱
明矣當以藥緩疏泄之煎局方內升麻湯下錢氏內

瀉□□□合□□□□之故病風者陽氣先受上也

樺皮散 治肺藏風毒遍身瘡疥及癮疹搔之成瘡又治面風刺及婦人粉刺

樺皮 四兩燒灰 荊芥穗 二兩 甘草 半兩炙 杏仁 二兩去皮尖用水一碗煎令減半[illegible] 枳殼 四兩去穰用炭火燒欲灰於濕紙上令冷[illegible]

右件除杏子外餘藥為末將杏子別研細次用諸藥令均磁盒放之每服三錢食後溫酒調下

二聖散 治大風癘疾

大黃 半兩 皂角刺 三錢

右將皂角刺一二斤燒灰研細煎大黃半兩湯調下二錢早服樺皮散中煎升麻湯下瀉青丸晚服二聖散此數等之藥皆為緩疎泄血之風熱也

七聖丸 局方中 七宣丸 局方中

皆治風壅邪熱潤利大腸中風風癇癘風大便秘澁皆可服之此方局方中治法曰雖訶子味苦澁而能止臟腑此利藥中用訶子令大黃枳實緩緩而推陳泄去邪氣若年老風



秘澁者乃津液內亡也故不可用峻劑攻之內經年四十而氣自半也起居衰矣年五十體重耳目不聰明矣年六十陰痿氣大衰九竅不利下虛上實涕泣出矣故曰知之則強不知則老衆世皆言年老之人無熱俱虛豈不明年四十而陰氣自半故陰虛陽盛明矣是以陰虛其下陽甚於上故上實下虛此理明矣

破傷風論第三

論曰夫風病者百病之始也清淨則腠理閉拒雖有大風苛毒而弗能為害也故破傷風者通於表裏分別陰陽同傷寒證治閭閻往往有不知者只知有發表者不知有攻裏者和解者此汗下和三法亦同傷寒證有在表者有在裏者有半在表半在裏者在裏宜下在表宜發汗在表裏之間宜和解然汗下亦不可過其法也故破傷風者從外至內甚於內者則病也因此卒暴傷損風襲之間傳播經絡至使寒熱更作身體反强口噤不開甚者邪氣入臟則分汗下之治諸瘡不差榮衛虛肌肉不生瘡眼不合者風邪亦能外入於瘡為破傷風之候故諸瘡不差時舉

皆言若灸爲上是爲熱除而不知火熱客逐經皆
變不可勝數彼則發熱甚則生風而搐或角弓反發
口噤目邪皆因瘡鬱結於榮衛不得宣通而生亦有
破傷不灸而病此者瘡著白痂瘡口閉塞氣難通泄
故陽熱易爲鬱結而熱甚則生風也故表脈浮而無
力太陽也脈長而有力者陽明也脈浮而弦小者少
陽也太陽宜汗陽明宜下少陽宜和若明此三法而
治不中病者未之有也

羌活防風湯 治破傷風邪初傳在表

羌活 防風 川芎 藁本
當歸 芍藥 甘草各一兩 地榆
華細辛各二兩

右㕮咀每服五七錢水一盞半同煎至七分
去滓熱服不拘時候量緊慢加減用之熱則
加大黃二兩大便秘則加大黃一兩緩緩令
過

白朮防風湯 若服前藥之過有自汗者宜服
此藥

白朮一兩 防風二兩 黃耆一兩

右㕮咀每服五七錢水一盞半煎至一盞去



滓溫服不拘時候
臟腑和[illegible]用此藥
破傷風[illegible]自汗不止者內用[illegible]
黃汗出不[illegible]宜速下之先用芎
黃湯二三服後用大芎黃湯下之

芎黃湯

川芎一兩 黃芩六錢 甘草二錢

右㕮咀每服五七錢水一盞半同煎至七分
去粗溫服不拘時候三服即止再用下藥

大芎黃湯

川芎一兩 羌活 黃芩 大黃各一兩

右㕮咀依前煎服宜利爲度

發表雄黃散

雄黃一錢 防風二錢 草烏一錢

右爲細末每服一字溫酒調下裏和至愈可
服[illegible]不[illegible]服

蜈蚣散

[illegible]

右件爲細末每服一錢淸酒調下治法依

用裏和至愈可服後裏證不可服次當下之

用前蜈蚣散四錢燒餅為丸如菉豆大每服一丸漸加六七丸清酒調蜈蚣少許送下宜利為度內外風去可常服羌活湯緩緩而治不拘時候服之

羌活湯 羌活湯者治半在表半在裏也

羌活 菊花 麻黃 川芎

防風 石膏 前胡 黃芩

細辛 甘草 枳殼 白茯苓

蔓荊子各一兩 薄荷半兩 吳白芷半兩

右㕮咀每服五錢水一盞半入生薑五片同煎至一盞去滓稍熱服不拘時候日進二服



防風湯 治破傷風同傷寒表證未解入裏宜急服此藥

防風 羌活 獨活 川芎各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服二三服後宜調蜈蚣散大效

蜈蚣散

蜈蚣一對 鰾三錢

右為細末用防風湯調下如前藥解表不已覺轉入裏當服左龍丸微利看大便硬軟加巴豆霜服之

左龍丸

左盤龍五錢炒 白殭蠶 鰾各五錢炒

雄黃一錢

右為細末燒餅為丸如桐子大每服十五丸溫酒下如裏證不已當於左龍丸一處半內入巴豆霜半錢燒餅為丸如桐子大每服一丸同左龍丸一處合服每服藥中一丸如此漸加服至利為度若利後更服後藥若搐痓不已亦宜服後藥羌活湯也



羌活湯

羌活 獨活 防風 地榆各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服如有熱加黃芩有涎加半夏若病日久氣血漸虛邪氣入胃宜養血為度

養血當歸地黃散

當歸 地黃 芍藥 川芎

藁本 防風 白芷各一兩 細辛五錢

右㕮咀依前煎服

雄黃散　治表藥

天南星二錢半炮　天麻各五錢　雄黃二錢半

右爲細末每服一錢温酒調下如有涎於口

藥中加大黃爲下藥

地榆防風散　治破傷中風半在表半在裏頭

微汗身無汗不可發汗宜表裏治之

地榆　防風　地丁香　馬齒莧各等分

右件爲細末每服三錢温米飲調下

白术湯　治破傷風大汗不止筋攣搐搦



白术　葛根各一兩　升麻　黃芩各半兩

芍藥一兩　甘草二錢半

右㕮咀每服一兩水一盞半煎至一盞去滓

温服不拘時候

江鰾丸　治破傷風驚而發搐臟腑秘澀知病

在裏可用江鰾丸下之

江鰾半兩剉炒　野鴿糞半兩炒　雄黃一錢

白殭蠶半兩　蜈蚣一對　天麻一兩

右件爲細末又將藥末作三分用一分燒餅

爲丸如梧子大硃砂爲衣後將一分入巴豆

霜一錢同[illegible]丸如梧子大不[illegible]

硃砂[illegible]

每服一丸[illegible]加至[illegible]爲度再服硃

砂爲衣藥病愈止

沒藥散　治刀箭所傷止血定痛

定粉一兩　風化灰一兩　枯白礬三錢別研

乳香半錢　沒藥一字別研

右件各研爲細末同和勻再研摻之

解利傷寒論第四

論曰傷寒之法先[illegible]三陽表當急裏



當緩三陰表當[illegible]脈浮當汗脈沉當下

脈浮汗急而下緩[illegible]脈沉下急而汗緩謂三

陰裏也麻黃湯謂之急[illegible]湯謂之緩內

經云有其形以爲汗[illegible]汗之[illegible]之表也又曰在皮

者汗而發之[illegible]太之[illegible]汗者太陽緩汗

者少陰是臟[illegible]也假令[illegible]附子細辛湯是

[illegible]和無汗故[illegible]以爲汗假

[illegible]脈浮無汗裏和

[illegible]也在皮[illegible]之也[illegible]治主以緩治客以急

此之謂也

麻黄湯

麻黄[illegible] 桂枝[illegible] 甘草[illegible] 杏仁[illegible]

右㕮咀都作一服水煎去滓溫服

假令得肝脈其外證善潔面青善怒其三部脈俱弦而浮惡寒裏和謂淸便自調也麻黄湯內加羌活防風各三錢謂肝主風是膽經受病大便秘或泄下而水無數皆裏不和也

假令得心脈其外證面赤口乾善笑其尺寸脈俱浮而洪惡寒裏和謂淸便自調也麻黄湯內加黄芩石膏各三錢謂主心熱是小腸受病也

假令得脾脈其外證面黄善噫善思善味尺寸脈俱浮而緩裏和惡寒麻黄湯內加白朮防己各五錢謂脾主濕是胃經受病也

假令得肺脈其外證面白善嚏悲愁不樂欲哭其尺寸脈俱浮而澁裏和惡寒麻黄湯內加桂枝生薑各三錢謂肺主燥是大腸受病也

假令得腎脈其外證面黑善恐其尺寸脈俱



浮遲而[illegible]其麻黄湯內加附子生薑[illegible]

[illegible]也

[illegible]謂在皮者急汗而發

[illegible]皮之裏者下之當緩謂脾臟

[illegible]尺寸脈俱浮而後有表證也發熱飲水便[illegible]或泄下而水按之內實或痛麻黄[illegible]加大黄元加藥同煎作五服[illegible]一服加大黄半錢邪盡則止未盡[illegible]大黄一錢邪未盡加三服加大黄一錢[illegible]又加之邪[illegible]則止此所謂先緩而後急是表之裏證下之當緩也

麻黄附子細辛湯

麻黄[illegible] 細辛[illegible]

附子[illegible]

右㕮咀都作一服水煎去滓溫服

假令得肝脈其內證滿悶淋溲便難轉筋其尺寸脈俱沉而弦裏和惡寒肝經受病麻黄附子細辛湯內加羌活防風各三錢

假令得心脈其內證煩心心痛[illegible]

其尺寸脉俱沉裏和惡寒心經受病加[illegible]石膏各三錢

假令得脾脉其內證腹脹滿食不消怠惰嗜臥其尺寸脉俱沉裏和惡寒脾經受病加白术防己各三錢

假令得肺脉其內證喘咳灑淅寒熱其尺寸脉俱沉裏和惡寒肺經受病加生薑桂枝各三錢

假令得腎脉其內證泄如下重足脛寒而逆其尺寸脉俱沉裏和惡寒腎經受病更加附子生薑各三錢



已上五證裏之表也宜漬形以爲汗皆臟受病也裏者下之當急謂隨臟內證已顯尺寸脉俱沉復有裏證者謂大小便秘澀或泄下赤水或瀉無數不能飲食不惡風寒發熱引飲其脉俱沉或按之內實而痛此謂裏實宜速下之麻黄附子細辛內去麻黄與隨臟元加藥內分作三服每下一證初一服加大黄三錢邪盡則止如邪未盡再一服加大黄二錢此先急而後緩謂裏之裏也當速下之也

兩解何傷寒不問何經所受皆能混然解之不犯各經之受病雖不解盡亦無壞證

羌活湯

羌活二兩 防風一兩 川芎一兩 黄芩一兩

細辛三錢半 甘草炒一兩 黒地黄炒一兩

白术三兩如無用蒼术加一兩

右㕮咀每服五七錢水二盞煎至一盞無時溫服清如覺發熱引飲加黄芩甘草各一兩更隨證加頭痛惡風於白术湯一兩內加羌活散三錢都作一服



羌活散

羌活一兩半 川芎七錢 細辛根半二錢

如身熱依前加石膏湯四錢

石膏湯

石膏二兩 知母半兩 白芷七錢

如腹中痛者加芍藥散

芍藥散

芍藥二兩 桂枝五錢

柴胡散

加往來寒熱而嘔加柴胡散二錢半

柴胡根[illegible] 半夏五錢[illegible]

加生薑煎如心下痞加枳實一錢如有[illegible]

加大黃初一服一錢次二錢又三錢邪去

止

論曰有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝然春夏汗孔踈雖有汗不當用桂枝宜用黃芪湯和解秋冬汗孔閉雖無汗不當用麻黃宜用川芎湯和解春夏有汗脉乃微而弱惡寒者乃太陽證秋冬之脉也亦宜黃芪湯無汗亦宜川芎湯秋冬有汗脉盛而浮發熱身熱者乃陽明證春夏之脉也亦宜黃芪湯無汗亦宜川芎湯大抵有汗者皆可用黃芪湯無汗者亦可用川芎湯



黃芪湯 有汗則可止也

黃芪 白术 防風各等分

右㕮咀每服五七錢至十餘錢或半兩一兩水煎溫服清汗多惡風甚者加桂枝

川芎湯 無汗則可[illegible]也

川芎 白术 羌活各等分

右㕮咀同黃芪湯[illegible]法稍熱惡寒甚則及[illegible]

大浮半加[illegible] 五歲之脉寸關尺[illegible]

止[illegible]尺寸[illegible]也[illegible]和而[illegible]

[illegible]錢而[illegible]

若傷寒食少發渴[illegible]不可太涼[illegible]止之然恐涼藥止之損其胃氣必不能食也

和胃白术湯

白术 茯苓

起卧不能謂之濕身重是也小柴胡湯黃芩芍藥湯

起卧不安眠[illegible]梔豉湯竹葉石膏湯解利四時



解利四時傷寒混解六經不犯禁忌

大白术湯

白术[illegible] 防風 羌活 川芎各[illegible]

黃芩[illegible] 細辛 [illegible]白芷[illegible] 石膏二兩

知母七錢 甘草[illegible] 枳實[illegible]

右為麤末每服半兩服藥[illegible]又作一服春倍防風羌活夏倍黃芩知母季夏雨淫倍白术白芷秋加桂枝[illegible]冬加桂枝八錢或一兩立夏之後至立秋處暑之間傷寒者身多微涼微有自汗四肢沉重[illegible]謂之濕溫又謂之濕淫

宜蒼朮石膏湯

蒼朮石膏湯

蒼朮 半兩 石膏 一錢 知母 半錢 甘草 一分

右剉細同和均都作一服水二盞煎至一盞溫服清謂內有濕熱也多不欲飲水如身熱脉洪無汗多渴者是熱在上焦積於胸中宜桔梗散治之

桔梗散

薄荷 黃芩 甘草 山梔仁 各一錢

桔梗 半兩 連翹 二錢

右剉每服五錢或七錢秤半兩水煎加竹葉如大便秘結加大黃半錢



熱論第五

論曰有表而熱者謂之表熱也無表而熱者謂之裏熱也有暴發而爲熱者乃久不宜通而致也有服溫藥過劑而爲熱者有惡寒戰慄而熱者蓋諸熱之屬者心火之象也王注曰百端之起皆自心生是以上善若水下愚若火治法曰少熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之甚熱之氣則汗發之發之不盡則逆治之制之不盡求其屬以衰之故曰苦者以治五臟五臟屬陰而居於內辛者以治六腑六腑屬陽而在於外內者下之外者發之又宜養血益陰其熱自愈此所謂不治而治也故不治謂之常治治之而不治謂之暴治經所謂諸寒而熱者取之陰諸熱而寒者取之陽此所謂求其屬也王注曰益火之源以消陰翳壯水之主以制陽光此之謂也

有暴熱者病在心肺有積熱者病在腎肝暴熱者宜局方中雄黃解毒丸積熱者局方中妙香丸暴熱上喘者病在心肺謂之高喘木香金鈴子散上焦熱而煩者牛黃散臟腑秘者大黃牽牛散上焦熱無他證者桔梗湯有虛熱不能食而食者脾虛也宜以厚朴白朮陳皮之類治之有實熱能食而熱者胃實也宜以梔子黃芩湯或三黃丸之類治之蘇金柴胡之類亦是也有病久憔悴發熱盜汗謂五臟齊損此熱勞骨蒸病也瘦弱虛煩腸澼下血皆蒸勞也宜養血益陰熱能自退當歸生地黃或錢氏地黃丸是也



木香金鈴子散 治暴熱心肺上喘不已

大黃 半兩 金鈴子 木香 各三錢 輕粉 少許

朴硝 二錢

右爲細末柳白皮湯調下三錢或四錢食

服以利為度[illegible]止

牛黃散 治上焦[illegible]面赤不能睡臥

梔子 半兩 大黃 半兩 鬱金 半兩 甘草 二錢

右為細末每服五錢水一盞煎溫服食後微利則已

大黃牽牛散 治相火之氣遊走臟腑大便秘結

大黃 一兩 牽牛 頭末半兩

右為細末每服三錢有厥冷用酒調三錢無厥冷而手足煩熱者蜜湯調下食後微利為度此謂不時而熱者小熱也



地黃丸 治久新憔悴寢汗發熱五臟齊損瘦虛弱煩腸瀉下血骨蒸痿弱無力不能運動

熟地黃 一兩 山茱萸 四錢 乾山藥 四錢 牡丹皮

白茯苓 澤瀉 各三錢

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服五十丸空心溫酒送下如煩渴皮膚索澤食後煎

防風飲子空心服地黃丸

防風當歸飲子

柴胡 人參 黃芩 甘草 各一兩

大黃 當歸 芍藥 各半兩 滑石 二兩

右為麤末每服五錢水一盞半生薑三片同煎至七分去滓溫服如[illegible]知大便黃米穀完出驚悸溺血淋閉咳血衄血自汗頭痛積熱肺痿後服金花丸

小金花丸

黃連 黃柏 黃芩 山梔子各兩

右為細末滴水為丸如小豆大每服一百丸溫水下日二三服或大便實加大黃自利不用大黃如中外有熱者作散劑名解毒湯或腹滿嘔吐欲作痢者每服半兩解毒湯中加半夏茯苓厚朴各一錢生薑三片如白膿下痢後重者加大黃三錢



涼膈散 加減附子後

連翹 山梔子 大黃 薄荷葉

黃芩 各半兩 甘草 一兩半 朴硝 一錢

右件為麤末每服一兩水一盞半煎至一盞去滓入蜜一匙調溫服

咽嗌不利腫痛并涎嗽者加桔梗一兩荊芥穗半

兩[illegible]

如其上焦有熱者加黃芩[illegible]生地黃各半兩一料

內　如淋閉者加滑石四兩茯苓一兩

或閉而不通臍下狀如覆碗痛悶不可忍者乃腸胃乾涸膻中氣不下故經所謂膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣故膻中者臣使之官名三焦相火下合右腎為氣海也王注曰膀胱津液之府胞內居之小腹處間毛內藏胞器者得氣海之氣化則溲便注下氣海之不足則閟隱不通故不得便利也先用沉香木香各三錢酒調下或八正散甚則宜上湧之令氣通達小便自通經所謂病在下取之上王注曰熱攻於上不利於下氣盛於上則溫辛散之苦以利之可也



當歸承氣湯

當歸　大黃各一兩　甘草半兩　芒硝九錢

右剉如麻豆大每服二兩水一大碗入生薑五片棗十枚同煎至半碗去滓熱服若陽狂奔走罵詈不避親疎此陽有餘陰不足大黃芒硝去胃中實熱當歸補血益陰甘草緩中加生薑棗胃屬土此引至於胃中也經所謂

微者[illegible]大利為度

微緩以[illegible]其病自愈後調洗心散涼膈散[illegible]治之

牛黃膏　治熱入血室發狂不認人者

牛黃二錢半　朱砂　鬱金　牡丹皮各三錢　腦子　甘草各一錢

右為細末煉蜜為丸如皂子大新水化下

治暴熱者局方中雄黃解毒丸

治久熱者局方中妙香丸

治虛勞骨蒸煩熱下血者錢氏地黃丸



治病熱不能食者脾虛也宜以厚朴白朮陳皮之類治之

治實熱能食者胃實也宜以梔子黃芩或三黃丸之類治之[illegible]柴胡亦可

治表熱惡寒而渴白虎湯也

治膚如火燎而熱以手取之不甚熱為肺熱也目白睛赤煩躁或引飲獨黃芩一味主之水煎

兩脇下肌熱脈浮弦者柴胡飲子主之

兩脇肋熱或一身盡熱者或日晡肌熱者皆為血熱也四順飲子主之

夜發熱者行陰乃[illegible]也四肢[illegible]承氣湯下[illegible]
視其夜[illegible]則[illegible]有表入裏腹中[illegible]
之晝則明了夜則譫語 四順飲子證與[illegible]承
氣相似不可不辨也發熱 雖無腸熱亦[illegible]證
晝則行陽二十五度氣也大抵[illegible]則行陰二
十五度大抵四順飲子

內傷論第六

論曰人之生也由五穀之精化五味之備故能生形經曰味歸形若傷於味亦能損形今飲食反過其節腸胃不能勝氣不及化故傷焉經曰壯火食氣氣食少火壯火散氣少火生氣痺論曰飲食自倍腸胃乃傷或失四時之調養故能爲人之病也經曰氣口緊而傷於食心胃滿而口無味與氣口同氣口者乃脾之外候故脾胃傷則氣口緊盛夫傷者有多少有輕重如氣口一盛脈得六至則傷於厥陰乃傷之輕也檳榔丸之氣口二盛脈得七至則傷於少陰乃傷之重也[illegible]厚朴丸主之氣口三盛脈得八至則傷於太陰塡塞悶亂甚則心胃大痛兀兀欲吐得吐則已俗呼食迷風是也經曰上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死[illegible]以瓜蔕散如不能則無治也經曰[illegible]



[illegible]因而傷之下者引而竭之也

檳榔丸

檳榔[illegible]　木香　牽牛[illegible]

右爲細末[illegible]丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸米飲下生薑湯亦可

[illegible]黃丸

雄黃[illegible]另研　巴豆[illegible]錢生用去皮研爛入雄黃末

右二味再研入白麪二兩同再和研均滴水爲丸如桐子大每服時先煎漿水令沸下藥二十四丸煮三十沸撈入冷漿水中沉冷一時下二丸一日二十四丸也加至微利爲度用浸藥水送下此藥治腸下痃癖痛如神

瓜蔕散

瓜蔕[illegible]　赤小豆[illegible]

右爲細末溫水調一錢以吐爲度如傷之大重備急丸獨行丸皆急藥也

金露丸　治大行時疾內傷飲食心下痞悶

大黃[illegible]　枳實[illegible]　牽牛[illegible]　桔梗[illegible]

右爲細末燒餅爲丸如梧桐子大每服三五十丸食後溫水下如常服十丸二十丸甚妙

枳實丸　治氣不下降食難消化常服進食

枳實　炒　白朮　兩

右為細末燒餅為丸如桐子大每服五十丸米飲下

治飲食不化心腹膨悶檳榔丸主之

如甚則脇肋虛脹食黃丸主之

治氣不下降飲食難消金露丸主之

瘧論第七

經曰夏傷於暑秋必病瘧蓋傷之淺者近而暴發傷之重者遠而為痎痎者久瘧也是知夏傷於暑濕熱閉藏而不能發泄於外邪氣內行至秋而發為瘧也初不知何經受之隨其動而取之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪氣其證各殊同傷寒論之也故內經曰五臟皆有瘧其治各別在太陽經者謂之風熱瘧治多汗之此三陽經受病皆謂之暴瘧發在夏至後處暑前此乃傷之淺者近而暴也在陰經則不分三經總謂之濕瘧當從太陰經論之其病發在處暑後冬至前此乃傷之重者遠而為痎痎者老也故謂之久瘧氣居西方宜毒藥療之瘧之為疾因內



暑熱之氣不能宣泄于外而為瘧也當盛夏之時能食寒涼之物而助陰氣者縱使有暑熱之氣微者自消矣更時復以藥疏利臟腑使邪氣自下內經曰春食涼夏食寒秋食溫冬食熱是謂春夏養陽秋冬養陰人能於飲食起居之間順四時之氣而行之邪氣何由得生也

治瘧病處暑前頭痛項強脉浮惡風有汗桂枝羌活湯

桂枝　羌活　防風　甘草炙各半兩

右為麤末每服半兩水一盞半煎至一盞溫服清迎發和服之如吐者加半夏麴等分



治瘧病頭痛項強脉浮惡風無汗者麻黃羌活湯

麻黃去節　羌活　防風　甘草炙各半兩

同前服如吐者加半夏麴等分

治瘧如前病證而夜發者麻黃桂枝湯主之

麻黃一兩去節　甘草三錢炙　桃仁三十箇去皮尖

黃芩五錢　桂枝二錢

右五味同為細末依前服桃仁味苦甘辛肝者血之海血聚則肝氣燥經所謂肝苦急急

食其以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣[illegible]
而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散[illegible]
風寒之劑

治瘧病身熱目痛熱多寒少脉長睡臥不安先以大柴胡湯下之微利為度如下過外微邪未盡者宜服白芷湯以盡其邪

白芷一兩 知母一兩七錢 石膏四兩

右為麄末同前煎服

治瘧無他證隔日發先寒後熱寒少熱多宜桂枝石膏湯



桂枝五錢 石膏 知母各一兩半 黃芩一兩

右為麄末分作三服每服水一盞同前煎服

問日者邪氣所舍深也

治瘧寒熱大作不論先後皆太陽陽明合病也謂之大爭寒作則必戰動經曰熱勝而動也發熱則必汗泄經曰汗出不愈知為熱也陽盛陰虛之證當內實外虛不治必傳入陰經也當用桂枝芍藥湯主之

桂枝[illegible]錢 黃耆 知母 石膏
芍藥[illegible]兩

右為麄末每服五七錢至半兩水煎如前藥服之寒熱轉大者知太陽陽明少陽三陽合病也宜桂枝黃芩湯和之

桂枝黃芩湯

柴胡一兩二錢 黃芩 人參 甘草各四錢半
半夏四錢 石膏 知母各五錢 桂枝二錢

右為麄末依前服之服藥已如外邪已罷內邪未已再詮下藥從卯至午時發者宜以大柴胡承氣湯主之

前項下藥微利為度以小柴胡湯徹其微邪



之氣立秋之後及處暑前發瘧漸瘦不能食者謂之痎瘧此邪深遠而中陰經為久瘧也

治久瘧不能飲食胸中鬱鬱如吐欲吐不能吐者宜吐則已當以藜蘆散雄黃散吐之

藜蘆散

大藜蘆末半錢溫虀水調下以吐為度

雄黃散

雄黃 瓜蒂 赤小豆各一錢

右為細末每服半錢溫虀水調下以吐為度

治秋深久瘧胃中無物又無痰癖腹高而食少

俗云瘧氣入腹宜蒼术湯主之

蒼术四兩 草烏頭一錢 杏仁三十個

右為麄末每服一兩水一升半煎至一半均作

服一日服盡如發前服

又 中七宣丸治瘧之聖藥也

又方中神效飲子乃瘧疾之聖藥也

又名交結飲子

從白至子時發者或至寅時知邪氣在血也宜

桃仁承氣湯下之

微利後宜調制之 以桂枝黃芩湯調下



吐論第八

論曰吐有三氣積寒也皆從三焦論之上焦在胃口上通於天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主腐熟水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脈浮而洪其證食已暴吐渴欲飲水大便燥結氣上衝而胸發痛其治也當降氣和中中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假為積而痛其脈浮而弱其證或先痛而後吐或先吐而後痛治法當以毒藥去其積檳榔木香行其氣下焦吐者皆從於寒地道也其脈沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法當以毒藥通其閉塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也

治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先和中桔梗湯

桔梗一兩半 半夏麴二兩 陳皮去白一兩 枳實麩炒一兩

白茯苓去皮一兩 白术一兩半 厚朴薑製一兩

右㕮咀每服一兩水一盞煎至七分取清溫服調木香散二錢隔夜空腹食前服之三服之後氣漸下吐漸止然後去木香散加芍藥二兩黃芪一兩半每料中和算加上件分兩依前服之病愈則已如大便燥結食不盡下以大承氣湯去硝微下之少利為度再服前藥補之如大便復結又依前再微下之



木香散

木香 檳榔各等分

右為細末前藥調服

治暴吐者上焦氣熱所衝也經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於火脈洪而浮荊黃湯主之

荆芥穗（兩） 人參（半兩） 甘草（二錢） 大黃（一錢）

右爲麄末都作一服水二盞煎至一盞去滓調檳榔散二錢空心服

檳榔散

檳榔（一錢） 木香（一錢） 輕粉（少許）

右爲細末用前藥調服如爲丸亦可用水浸蒸餅爲丸如小豆大每服二十丸食後服

治上焦吐頭發痛有汗脉弦青鎮丸主之

柴胡（二兩） 黄芩（二錢半） 甘草（二錢） 半夏（湯洗半兩）

青黛（二錢半） 人參（二錢半）

右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大每服五十丸生薑湯食後服



白术湯 治胃中虛損及痰而吐之

半夏麴（半兩） 白术（一錢） 檳榔（二錢半） 木香（一錢）

甘草（一錢） 茯苓（一錢）

右六味同爲細末每服二錢煎生薑湯調下食前吐而食脉弦者肝乘於脾而吐乃由脾胃之虛宜治風安脾之藥

金花丸

半夏（湯洗一兩） 檳榔（二錢） 雄黄（一錢半）

右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大[illegible]另丸生薑湯下從少至多漸次服之以吐止爲度[illegible]於脾故飲食自下

紫沉丸 治中焦吐食由食積爲寒氣相假故吐而痛宜服之

半夏麴（三錢） 烏梅（去核二錢） 代赭石（三錢） 杏仁（去皮尖一錢）

丁香（二錢） 縮砂仁（三錢） 沉香（一錢） 檳榔（二錢）

木香（一錢） 陳皮（五錢） 白豆蔻（半錢） 白术（一錢）

巴豆霜（半錢另研）

右爲細末入巴豆霜令匀醋糊爲丸如黍米大每服五十丸吐愈則止小兒另丸治小兒食積吐食亦大妙



一法治翻胃吐食用橘皮一箇浸少時去白裹生薑一塊麪裹紙封燒令熟去麪外生薑爲三番並橘皮煎湯下紫沉丸一百丸一日二服得大便通至不吐則止此主治寒積氣皆可

治嘔吐腹中痛者是無積也胃强而乾嘔有聲無物脾强而吐食持實繫强是以腹中痛矣

木香白术散

木香（一錢） 白术（半兩） 半夏麴（一兩） 檳榔（二錢）

茯苓半兩 甘草四錢

右為細末濃煎烏藥生薑湯調下一二錢

積而痛手按之愈痛無積者按之不痛

治下焦吐食朝食暮吐暮食朝吐大便不通宜

附子丸

附子炮五錢 巴豆霜一錢 砒

右同研極細鎔黃蠟為丸如桐子大每服一二丸冷水送下利則為度後更服紫沉丸常服不令再閉

厚朴丸 主反胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾加法在後烏頭減半更妙

厚朴二兩 黃連二兩 紫菀去苗 吳茱萸洗焙

菖蒲 柴胡去苗 桔梗

皂角去皮弦子炙 茯苓去皮 官桂刮

乾薑炮各二兩 人參二兩 川烏頭炮裂去皮各二兩半

蜀椒二兩去目閉口者微炒出汗

右為細末入巴豆霜一分和均煉蜜和為劑旋丸桐子大每服三丸漸次加至以利度生薑湯食後臨臥服

此藥治療與局方溫白丸同及治處若六



秋冬間臓腑下閉大效春夏再加黃連一二兩

秋冬再加厚朴一兩

治風痛痺不能[illegible]丸依春秋加添外

又於每料中加[illegible]各一兩半

右依前法和劑為服[illegible]又大便不通者是腸勝胃也服局方中厚朴丸一二百丸如大便秘用後藥

附子半兩 巴豆 砒一豆許

右為極細末生薑糊為丸如菉豆大每服一丸白湯下

## 霍亂論第九

論曰醫之用藥如將帥之用兵本草曰良醫不能以無藥愈疾猶良將無兵不足以勝敵也故用藥如用兵轉筋霍亂者治法同用兵之急不可緩也故吐瀉不止者其本在於中焦或因渴大飲或因飲而過量或饑而飽甚或濕內甚故陰陽交而不和是為吐瀉仲景曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且瀉此為急病也然吐利為急十死其一二如揮霍撩亂而不得吐瀉此名乾霍亂必死法曰既有其入必有所出今有其入而不得其出者否也塞也

故轉筋吐瀉者其氣有三一曰風二曰火三曰濕吐
爲暍熱也王注曰炎熱薄爍心之氣也火能炎上故
吐也瀉爲濕也叔和云濕多成五泄內經曰濕勝則
濡瀉又曰風勝則動筋屬肝而應於風木故腳轉筋
燥急也內經曰諸筋反戾水液渾濁皆屬於熱故仲
景治法曰熱多欲飲水五苓散寒多不飲水者理中
丸凡覺此證或先五苓益元桂苓甘露飲乃吐瀉之
聖藥也慎無與粟米粥湯穀入於胃則必死本草曰
粟米味鹹微寒無毒主養胃氣去脾胃中熱益氣霍
亂者脾胃極損不能傳化加以粟米如人欲斃更以



利刀鋸其首豈有能生者耶如吐瀉多時欲住之後
宜微以粥飲漸漸養之以遲爲妙

半夏湯 治霍亂轉筋吐瀉不止

半夏麯 茯苓 白朮各半兩 淡桂二錢半
甘草炙一兩

右爲細末渴者涼水調下不渴者溫水調下
不拘時候服

五苓散

白朮 茯苓 豬苓各一兩半
澤瀉二兩半 桂枝一兩

右[illegible]

理中丸

人參 [illegible]

右爲細末煉蜜爲丸如[illegible]大每服一丸[illegible]
水化下

如吐瀉不止身出冷汗無脈者可服瀉痢論
中漿水散兼桂枝加白朮湯皆可服後痢門中
求亦可選用

凡霍亂不可飲熱白米粥飲之死必不救切須
慎之



瀉論第十

論曰臟腑瀉痢其證多種大抵從風濕熱論是知寒
少而熱多寒則不能久也故曰暴瀉非陽久瀉非陰
論曰春宜緩形形動則肝木乃榮反靜密則是行秋
令金能制木風氣內藏夏至則火盛而金去獨火木
旺而脾土損矣輕則飧泄身熱脈洪穀不能化重則
下痢膿血稠黏皆屬於火經曰溲而便膿血知氣行
而血止也宜大黃湯下之是爲重劑黃芩芍藥湯爲
之輕劑是實則瀉其子木能自虛而脾土實矣故經
曰春傷於風夏必飧泄此逆四時之氣人所自爲也

有自太陰脾經受濕而為水泄虛滑微滿身重不知
穀味假令春宜益黃散補之夏宜瀉之法云宜補宜
和宜止設令和則芍藥湯是也止則訶子湯是也久
則防變而為膿血脾經傳腎謂之賊邪故難愈若先
痢而後滑謂之微邪故易痊此皆脾土受濕天行為
也雖聖智不能逃口食味鼻食氣從鼻而入留積於
脾而為水瀉有厥陰經動下痢不止其脈沉而遲手
足厥逆涕唾膿血此為難治宜麻黃湯小續命汗之
法曰謂有表邪縮於內當散表邪而愈有暴下無聲
身冷自汗小便清利大便不禁氣難布息脈微嘔吐



急以重藥溫之漿水散是也故法云後重則宜下腹
痛則宜和身重則除濕脈弦則去風血膿稠黏以重
藥竭之身冷自汗以毒藥溫之風邪內縮宜汗之則
愈膿潰為痢當溫之又云在表者發之在裏者下之
在上者湧之在下者竭之身表熱者內疏之小便澀
者分利之又曰盛者和之去者送之過者止之兵法
云避其來銳擊其惰歸此之謂也凡病泄而惡風寒
是太陰傳少陰木來尅土也用除濕白朮茯苓安脾
芍藥桂黃連破血也火邪不能勝水也太陰經不能
傳少陰而反火邪上乘肺經而痢必白膿也加黃連

當歸之類又裏急後重脈大而洪實為裏熱而甚
是有物結墜也若脈浮大甚不宜下雖裏急後重
脈沉細弱者謂寒邪在內而氣散也可溫養而自愈
裏急後重閉者大腸經氣不宣通也宜加檳榔木香
宜通其氣如痢或泄而嘔者胃中氣不和也上焦不
和治以生薑橘皮中焦不和治以芍藥當歸桂茯苓
下焦不和寒治以輕熱甚以重熱藥[illegible]大
便虛秘澀久不愈恐太陰傳少陰多傳變為痢太陰
是為賊邪先以枳實厚朴湯以防其變若四肢懶倦
小便少或不利大便走沉困飲食減宜調胃去濕白



朮芍藥茯苓三味水煎服以白朮之甘能入胃而除
脾胃之濕芍藥之酸澀除胃中之濕熱四肢困茯苓
之淡泄能通水道走濕此三味泄痢須用此如發熱
惡寒腹不痛加黃芩為主如未見膿而惡寒乃太陰
欲傳少陰加黃連為主桂枝佐之如腹痛甚者加當
歸倍芍藥如見血加黃連為主桂當歸佐之如燥煩
或先白膿後血或發熱或惡寒非黃芩不止上部血
也
如惡寒脈沉或腰痛或血痢下痛非黃連不能止此
中部血也

下血久脉沉先血後便非止愉不能止此下部血也
便膿血相雜而脉浮大慎不可以大黄下之下之
必死謂氣下竭也而陽無所收也凡陰陽不和惟可
以分陰陽藥治之又云暴泄非陽久泄非陰大便完
穀下有寒有熱者脉疾身多動音聲响亮暴注下迫
此陽也寒者脉沉而細疾身不動作目睛不了了
飲食不下鼻準氣息者薑附湯主之若身重四肢不
舉术附湯主之

黄芩芍藥湯　治泄痢腹痛或後重身熱久而不愈脉洪疾者及下痢膿血稠



粘

黄芩　芍藥各一兩　甘草五錢

右為麁末每服半兩水一盞半煎至一盞濾清温服無時如痛則加桂少許

大黄湯　治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度久不愈者大黄一兩

右細剉好酒二大盞同浸半日許同煎至一盞半去大黄將酒分為二服頓服之痢止一服如未止再服以利為度服芍藥湯以和之痢止再服黄芩湯和之以徹其毒也

芍藥湯　下血調氣經曰溲而便膿血氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩　當歸　黄連各半兩　檳榔二錢　木香二錢　甘草炙二錢　大黄三錢　黄芩半兩　官桂一錢半

右㕮咀每服半兩水二盞煎至一盞食後温清服如血痢則漸加大黄如汗後藏毒加黄柏半兩依前服

白术黄芪湯　服前藥痢雖已除猶宜此藥和之



白术一兩　黄芪七錢　甘草三錢

右㕮咀均作三服水一盞半煎至一盞去滓温清服之

防風芍藥湯　治泄痢飧泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛微汗

防風　芍藥　黄芩各半兩

右㕮咀每服半兩或一兩水三盞煎至一盞滓温服

治太陰脾經受濕水泄注下體微重微滿困弱無力不欲飲食暴泄無數水穀不化先宜白术

芍藥湯和之身重困下是大勢來亦宜和之

白朮芍藥湯

白朮 一兩 芍藥 一兩 甘草 五錢

右剉每服一兩水二盞煎至一盞溫服濇如痛甚者宜

蒼朮芍藥湯

蒼朮 二兩 芍藥 一兩 黃芩 半兩

右剉每服一兩加淡味桂半錢水一盞半煎至一盞溫服清如麻脈弦頭微痛者宜

蒼朮防風湯

蒼朮 防風 各二兩 上使

右剉同前煎服如下血者宜

蒼朮地榆湯

蒼朮 三兩 地榆 一兩 下使

右剉同前煎服

已上證如心下痞每服各加枳實一錢如小便不利每服各加茯苓二錢如腹痛漸已瀉下微少宜訶子散止之法為大勢已去而宜止之

訶子 一兩半生半熟 木香 半兩 黃連 三錢

甘草 二錢

右為細末每服二錢以白朮芍藥湯調下如止之不已宜歸而送之也訶子散加厚朴一兩竭其邪氣也虛滑久不愈者多傳變為痢疾太陰傳少陰是為鬼邪先以厚朴枳實湯防其傳變

厚朴枳實湯

厚朴 一兩 枳實 一兩 訶子 一兩半生半熟

木香 半兩 黃連 一錢 甘草 三錢炙 大黃 二錢

右為末每服三五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服



漿水散 治暴泄如水周身汗出一身盡冷脈微而弱氣少而不能語其甚者加吐此為急病治之宜以此

半夏 二兩湯洗 附子 半兩炮 乾薑 五錢 良薑 二錢半

桂枝 五錢 甘草 炙五錢

右為細末每服三五錢漿水二盞煎至一盞和滓熱服甚者三四服微者一二服太陽經動下痢為鶩溏大腸不能禁固卒然而下成小泊光色其中或有硬物欲起而又下欲了而

不了小便多而此寒也宜溫之春夏各

秋冬白术湯

桂枝湯

桂枝　白术　芍藥各半兩　甘草二錢炙

右剉每服半兩水一盞煎至七分去滓取清宜溫服之

白术湯

白术　芍藥各三錢　乾薑半兩炮　甘草二錢炙

右剉為麄末如前服之甚則去乾薑加附子三錢辛能發也治厥陰動為瀉痢者寸脉沉



而遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利或唾膿血瀉痢不止者為難治宜升麻湯或小續命湯以發之法曰謂表邪縮於內故下痢不止當散表邪於四肢布於經脉外無其邪則臟腑自安矣

諸瀉痢入胃名曰溢飲滑泄渴能飲水水下復瀉而又渴此無藥証當灸大椎

諸瀉痢久不止或暴下者皆太陰受病故不可離于芍藥若不受濕不能下痢故須用白术是以聖人立法若四時下痢於芍藥白术內春加

防風夏加黃芩秋加厚朴冬加桂附然更詳諸寒熱屬之如裏急後重須加大黃如身困倦須加白术如通身自汗逆冷氣息微加桂附以溫之如或後重膿血稠黏雖在盛冬於溫藥內亦加大黃諸下痢之後小便利而腹中虛痛不可忍者此謂陰陽交錯不和之甚也當服神効越桃散

大梔子三錢　高良薑三錢

右和勻每服三錢米飲或酒調下其痛立效

治大便後下血腹中不痛謂之濕毒下血宜服



黃連湯

黃連去鬚　當歸各半兩　甘草一錢炙

右㕮咀每服五錢水一盞煎至七分食後溫服

治大便後下血腹中痛者謂熱毒下血當服芍藥黃連湯

芍藥　當歸　黃連各半兩　大黃一錢　桂半錢淡味　甘草二錢炙

右㕮咀每服半兩同煎服如痛甚者調木香檳榔末一錢服之

治久病腸風痛痒不任大便下血宜服地榆湯
蒼朮四兩 地榆二兩
右㕮咀每服一兩水一盞煎至七分食前多
服除根
治濕瀉茯苓湯
白朮一兩 茯苓去皮七錢半
右㕮咀水煎一兩食前服食入而瀉謂胃中
有宿穀也當加枳實五錢酒入而瀉濕熱瀉
也加黃芩五錢
治寒積痢男子小兒婦人皆不問赤白或清痢
如水不後重者寒也經云澄徹清冷皆屬於寒
皆爲虛寒中有積宜附子巴豆之類下之見痢
則愈空心服
治瀉痢久臟腑不止虛滑穀不化用蒼朮湯下
桃花丸
蒼朮二兩 防風一兩
右剉爲細末用水一碗煎至一大盞絞清汁
下桃花丸八十丸立愈如小便澁少以五苓
散下桃花丸或赤石脂丸小便利則愈矣
太陽爲協熱痢凉膈散主之



陽明爲痼瘕進退大承氣湯主之[illegible]
少陽風氣自動其脉弦大柴胡湯主之
太陰濕勝濡瀉不止[illegible]痢可益四逆湯主之
少陰蟄封不動[illegible]乾薑湯主
之
厥陰風泄以風治風小續命湯消風散主之
治下痢膿血裏急後重日夜無度導氣湯
芍藥一兩 當歸五錢 大黃 黃芩各二錢半
黃連 木香各一錢 檳榔一錢
右爲末每服三五錢水一盞煎至七分去滓
溫服如未止再服不後重則止
褾例
泄而便膿血者大腸泄也脉五至之上洪者
宜以七宣丸如脉平者立秋至春分宜香連
丸春分至立秋宜芍藥蘗皮丸四季通用宜
加減平胃散七宣丸之類後宜服此藥去其
餘邪兼平胃氣
芍藥蘗皮丸
芍藥 黃蘗各等分
右爲細末醋糊爲丸如桐子大每服五十

丸至二丁[illegible]食前服

加減平胃散

白朮 [illegible] 陳皮 [illegible] 甘草 七錢

檳榔 [illegible] 木香 [illegible] 桃仁 黃連

人參 阿膠 [illegible] 白茯苓 [illegible]

右為細末同平胃散煎服

血多加桃仁 泄加黃連

小便澁加茯苓

氣不下後重加檳榔木香

腹痛加芍藥甘草 膿加阿膠



濕加白朮 脉洪加大黃

四時以胃氣為本久下血痢則脾虛損而血不流於四肢入於胃中為血宜滋養脾胃則愈

夫五泄者之病其治法各不同者外證各異也

胃泄者飲食不化色黃承氣湯下

脾泄者腹脹滿泄注食即嘔吐逆建中及理中湯

大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛乾薑及附子湯

小腸泄者溲便膿血少腹痛承氣湯

大瘕泄者裏急後重數至圊而不能便足少陰是也[illegible]使此五泄之病也胃

小腸大瘕二泄[illegible]其泄自止

後厥陰少陰二證另有治法厥陰證加甘草

謂[illegible]是也內經曰肝苦急急食甘以緩之少陰經證多裏急後重故加大黃令急推過物去則輕矣內經曰因其重而減之又曰在下者引而竭之又有太陰陽明二經



證當進退大承氣湯主之太陰證不能食當先補而後瀉之乃進藥法也先煎厚朴半兩俱依本方加水一盞半煎至一半服之若三兩服後未已謂有宿食不消又加枳實二錢同煎服二兩服泄又未已如稍加食尚有熱毒又加大黃三錢推過泄止住藥如泄未止謂腸胃有久塵垢滑黏加芒硝半合宿垢去盡則愈矣

陽明證能食是也當先瀉而後補謂退藥法也先用大承氣湯五錢水一盞作前法煎至

七分稍熱服如泄未止去芒硝後稍稍熱[illegible]
大黃一半煎兩服如熱氣盡已其人必頓[illegible]
又減去大黃枳實厚朴湯又與三兩服如是
腹脹滿退泄亦自愈後服厚朴湯數服則已
又寒熱水瀉之例于後
瀉者一也總包五法謂之六義曰六解難經有傷寒
五泄叔和云濕多成五泄仲景解四經泄利有不可
汗有不可下者可吐可灸者仲景隨經[illegible]之假令
渴引飲者是熱在膈上水多入則下膈入胃中胃經
本無熱不勝其水名曰水恣故使米穀一時下此證



當灸大椎三五壯立已乃瀉督也如用藥乃使車前
子搐苑白朮茯苓之類可選用之五苓散亦可
又有寒泄者大腹滿而泄又有鶩溏者是寒泄也鴨
溏者大便如水中有少結糞者是也如此者當用天
麻附子乾薑之類是也
又法曰泄有虛實寒熱虛則無力黏衣不便已泄出
謂不能禁固也實則數至圊而不能便俗云虛坐努
責故也裏急後重皆依前法進退大承氣湯主之一
說素問云春傷于風夏必飧泄又云久風為飧泄者
乃水穀不化而完出爾非水[illegible]胃而成此證非[illegible]

恣也此一證不飲水而穀完出名曰飧泄治法于後
先以宣風散導之[illegible]四味者是也後服蒼
朮防風湯
蒼朮防風湯
蒼朮[illegible]　麻黃[illegible]　防風[illegible]
右為麤末每服一兩生薑七片水二盞煎至
一盞去滓溫服泄止後服椒朮丸
椒朮丸
蒼朮二兩　小椒[illegible]
右為極細末醋糊為丸如桐子大每服二十



丸或三十丸食前溫水下一法惡痢久不愈
者加桂　如小兒病丸如黍米大
治瀉痢膿血乃至脫肛地榆芍藥湯
蒼朮[illegible]　地榆[illegible]　芍藥三兩
右㕮咀每服一兩水一大盞半煎至一半溫
服病退藥
五泄傷寒乃分三節
初說暴　次說中　後說久泄
此說在難經二十二難是三節內包十五法初以暴
藥中以的對證藥後疾得中也末治久泄法仲景[illegible]

陰經治法是也
久滯法先進續煎小續命湯是發其汗從外
以外淺于內然後治其痢秋冬開下府風吐論中
厚朴丸大效
凡臟腑之秘不可一例治療有虛秘有實秘胃實而
秘者能飲食小便赤當以麻仁湯七宣丸之類主之
胃虛而秘者不能飲食小便清利厚朴湯主之
厚朴五兩薑製 白朮五兩 半夏二兩 枳實炒一兩
陳皮一兩去白 甘草炙一兩
右為麤末每服三五錢水一盞半生薑五片



棗三枚煎至一盞去滓溫服空心實秘者物
也虛秘者氣也
平胃丸
治病久虛弱厭厭不能食而臟腑或秘或溏
此胃氣虛弱也當服和中消痰去濕及厚腸
胃進飲食
厚朴一兩 白朮一兩二錢 陳皮八錢去白 木香一錢
生半夏一兩湯洗 檳榔二錢半 枳實五分
甘草一錢炙
右為細末薑汁浸蒸餅丸如桐子大每

五十丸生薑湯送下
心痛論第十
論曰諸心痛者皆少陰厥氣上衝也有熱厥心痛者
身熱足寒痛甚則煩躁而吐額自汗出知為熱也其
脈洪大當灸大谿及崑崙謂表裏俱瀉之是謂熱病
汗不出引熱下行表汗通身而出者愈也灸畢服金
鈴子散痛止服枳朮丸去其餘邪也有大實心中痛
者因食受時氣卒然發痛大便或秘久而注悶心胸
高起按之愈痛不能飲食急以煮黃丸利之利後以
藁本湯去其餘邪有寒厥心痛者手足逆而通身冷



汗出便利溺清或大便利而不渴者氣微力弱急以
朮附湯溫寒厥暴痛非久病也朝發暮死當急救之
是知久痛無寒而暴痛非熱
金鈴子散
治熱厥心痛或發或止久不愈者當用金鈴子
散
金鈴子 玄胡各一兩
右為細末每服三錢酒調下
大實心痛煮黃丸
雄黃一兩研 巴豆五錢去皮生用研細入雄黃末
右再研二味白麪二兩同和再研均滴水丸

子137 ɔ16

如洞[illegible]八[illegible]時[illegible]用漿水令沸下藥[illegible]
四丸[illegible]入冷漿水沉冷一[illegible]服二丸一日二十四丸加至微利爲度用淡漿水送下此治腸下[illegible]癖痛如神

治大實心痛大便已利宜藁本湯徹其毒也

藁本半兩　蒼朮一兩

右爲麄末每服一兩水二盞煎至一盞溫服清

治寒厥暴痛脉微氣宜朮附湯

附子[illegible]一兩　白朮一兩　甘草炙二兩



右爲麄末入附子令均每服三錢水一大盞半入生薑五片棗一枚擘破同煎至一盞去滓溫服食前

此藥又治風濕相搏身重疼煩不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重者不知食味暖肌補中助陽氣止自汗

治男子婦人心經搐熱如痫病狀宜服妙香丸風痫者煎[illegible]活爲引下妙香丸[illegible]痫常歸湯[illegible]下

刺心[illegible]諸[illegible]手後

真心痛手足[illegible]至節痛甚旦發夕死夕發旦死

心痛腹[illegible]大便不利取足太陰

心痛引腰脊[illegible]少陰

心痛引小腹滿[illegible]熱[illegible]庭便溺難刺足厥陰

心痛短氣刺手太陰

心痛刺當九穴刺之立已不已上下求之得之則已

按經三法

心痛與背相接善恐如從後觸其心傴僂者腎心痛也先刺經骨崑崙不已刺合骨

心痛腹脹胸滿心尤痛者胃心痛也刺太都太白二穴



心痛如錐刺乃脾心痛也刺然谷太谿

心痛蒼然如死狀終日不得休息乃肝心痛取行間太衝

心痛卧若徒居心痛間動作痛益甚色不變此肺心痛也刺魚際大淵宜通氣行[illegible]所[illegible]病則病愈也

大谿穴足少陰腎經土也爲腧在足內踝後跟骨上脉動陷中可灸三壯[illegible]宜此瀉熱厥心痛

崑崙足太陽膀胱經水也[illegible]足外踝後跟骨上陷中可灸三壯或五七壯亦可瀉熱厥心痛

河間處士　劉完素守真述
明　新安　吳勉學師古　校

## 欬嗽論第二十一

論曰欬謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽是無聲而有痰脾濕動而為痰也欬嗽謂有痰而有聲蓋因傷於肺氣動於脾濕欬而為嗽也脾濕者秋傷於濕積于脾也故內經曰秋傷於濕冬必欬嗽大抵素秋之氣宜清肅反動之氣必上衝而為欬甚則動于脾濕發而為痰焉是知脾無留濕雖傷肺氣而不為痰也有痰寒少而熱多故欬嗽者非專主于肺而為病以肺主皮毛而司于外故風寒先能傷之也內經曰五臟六府皆能令人欬非獨肺也各以其時主之而受病焉非其時各傳而與之也所病不等寒暑燥濕風火六氣皆令人欬唯濕病痰飲入胃留之而不行止入于肺則為欬嗽假令濕在于心經胃之熱痰濕在脾經胃之風痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰所治不同宜隨證而治之若欬而無痰者以辛甘潤其肺故欬嗽者治痰為先治痰者下氣為上



其以南星半夏勝其痰而欬嗽自愈枳殼陳皮利其氣而痰自下痰而能食者大承氣湯微下之少利為度痰而不能食者厚朴湯治之夏月嗽而發熱者謂之熱痰嗽小柴胡四兩加石膏一兩知母半兩用之冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍加杏仁服之然此為大例更當隨證隨時加減之量其虛實此治法之大體也

蜜煎生薑湯　蜜煎橘皮湯　燒生薑胡桃

此者皆治無痰而嗽者當以辛甘潤其肺故也如但使青陳皮藥使當去白本草云陳皮味辛理上氣去痰氣滯塞青皮味苦理下氣二味俱用散三焦之氣也故聖濟云陳皮去痰穢不除即生痰麻黃發汗節不去而止汗



治風痰熱欬嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺秘澁心多燥怒水煮金花丸

南星　半夏各一兩生用　天麻五錢　雄黃二錢
白麪三兩　寒水石一兩燒存性

右為細末滴水為丸每服五七十丸至百丸煎漿水沸下藥煮令浮為度漉出淡漿水浸另用生薑湯下或通聖加半夏及局方中川芎丸防風丸皆

可用也

小黃丸治熱痰欬嗽脈洪面赤煩熱心痛唇口乾燥多喜笑宜小黃丸

南星湯洗 半夏洗 黃芩各一兩

右爲細末生薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大每服五十丸至七十丸食後薑湯下及小柴胡湯中加半夏亦可

白朮丸治痰濕欬嗽脈緩面黃肢體沉重嗜臥不收腹脹而食不消化宜白朮丸

南星 半夏各一兩 白朮一兩半

右爲細末糊爲丸如桐子大每服五七十丸生薑湯下及局方中防已丸亦可用



玉粉丸治氣痰欬嗽脈澁面白上喘氣促洒淅惡寒愁不樂宜服之

南星 半夏各一兩洗 官桂去皮

右爲細末薄糊爲丸如桐子大每服五七十丸生薑湯下食後及局方中防已丸亦可玉粉丸加減在後心下痞者加枳實伍錢身熱甚者加黃連五錢體重者加茯苓一兩氣上逆者加苦葶藶五錢氣促者加人參桔梗各五錢浮腫者加郁李仁杏仁各伍錢大便秘者加大黃半兩

雙玉散治痰熱而喘痰涌如泉

寒水石 石膏各等分

右爲細末煎人參湯調下二錢食後服

治痰千緡湯

半夏大者七枚 大皂角去皮子一兩

右同於絹袋中盛之用水三升生薑七大片同煎至一半以手揉洗之取清汁分作三服食後併二服効

防風丸治痰嗽胸中氣不清利者 枳朮丸亦妙

防風半兩 枳殼麩炒去穰半兩 白朮一兩



右細末燒餅爲丸每服五七十丸生薑湯下

天麻丸

天麻一兩 半夏 南星各一兩 雄黃少許

右以白麵三兩滴水爲丸如桐子大每服五十丸至百丸煎淡水令沸下藥煮十餘沸漉出食前生薑湯下

利膈丸主胸中不利痰嗽喘促利脾胃壅滯調秘瀉藏推陳致新消進飲食治利膈氣之勝藥也

木香 檳榔一錢 人參一錢 當歸一錢

[illegible] 大黃 厚朴三兩
甘草
右為細末滴水和丸如梧子大每服三五十丸
後諸飲皆下
款冬花 治久嗽痰喘滿氣[illegible]
青皮去白 陳皮去白 檳榔 木香
杏仁去皮尖 郁李仁去皮 茯苓 澤瀉
當歸 茂 馬兜零 葶藶
肥子各二兩 人參 防己 [illegible]
右為細末生薑汁麪糊為丸如梧子大每服一二



十丸加至五七十丸生薑湯下食後服
玉粉丸治痰結咽喉不利語音不出
半夏洗 草烏一字 桂一字
右同為末生薑汁浸蒸餅為丸如雞頭大每服一
丸至夜含化多歲不愈者亦効
枳殼湯治久痰胷脅不利者多上焦發熱
枳殼 桔梗三兩 黃芩一兩半
右剉每日早用二兩半水三盞煎至二盞勻作
三服午時一服申時一服臨卧時一服三日七[illegible]
半[illegible]服生半夏湯

生半夏湯
半夏
右每服秤三錢水一盞半入生薑五大片同煎至
一盞和滓食後服一日三二服服三日畢再服枳
朮丸盡其痰為度論曰先消胸中氣後去膈上痰
再服枳朮丸謂首尾合盡消其氣謂令痰不復作
也
清鎮丸治熱嗽
小柴胡湯內加人參一倍 青黛半兩
右為細末麪糊丸如桐子大每服五十丸生薑湯



下
半夏丸治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒
已吐加檳榔三錢
半夏 雄黃三錢研
右同為末生薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服三十
丸生薑湯下小兒丸如黍米大
白朮散治夏暑大熱或醉飲冷痰湧不止膈不利
白朮 茯苓 半夏 黃芩各等分
右為麤末每服三五錢至七錢水二盞入生薑十片
煎至一盞去滓調陳皮末一錢神麴末一錢食後服

法曰大熱大飲蓋酒勞熱而引飲冷冷與熱皴於胸中不散而成濕故痰作矣甚者宜吐之吐後服五苓甘露勝濕去痰之劑

白术湯治痰潮上如湧泉久不可治者

白术　白茯苓　半夏各等分

右為末每服半兩病大者一兩水二盞生薑七片煎至一盞取清調神麴末二錢頻服之病甚者下玉壺丸一百丸大効永除根

天門冬丸治婦人喘手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲面目浮腫



天門冬十兩去心　麥門冬八兩去心　生地黃三斤取汁為膏子

右二味為末膏子和丸如梧子大每服五十丸煎逍遙散送逍遙散中去甘草加人參或服王氏博濟方中人參荊芥散亦可如面腫不已經曰面腫曰風故宜汗麻黃桂枝可發其汗後服柴胡飲子去大黃故論曰治藏者治其俞治府者治其合浮腫者治其經治俞者治其土也治合者亦治其土也如兵家圍魏救趙之法也

## 虛損論第二十二

論曰虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛損自上而下治之宜以辛甘淡過于胃則不可治也感熱則損陰陰虛則陽盛故損自下而上治之宜以苦酸鹹過于脾則不可治也自上而損者一損損于肺皮聚而毛落二損損于心血脈虛少不能榮于臟府婦人月水不通三損損于胃飲食不為肌膚自下而損者一損損于腎骨痿不能起于床二損損于肝筋緩不能自收持三損損于脾飲食不能消尅論曰心肺損而色蔽腎肝損而形痿穀不能化而脾損感此病者皆損之病也漸漬之深皆虛勞之疾也

四君子湯治肺損而皮聚毛落益氣可也



白术　人參　黃芪　茯苓各等分

右為麁末每服五六錢七錢水一盞煎至七分去滓食遠溫服

八物湯治心肺虛損皮聚而毛落血脈虛損婦人月水愆期宜益氣和血

白术　人參　黃芪　茯苓

川芎　熟地黃　當歸　芍藥各等分

右麁末服五七錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

十全散治心肺損及胃飲食不為肌膚宜益氣和血

調飲食

白朮　人參　黄耆　伏神

桂枝　熟地黄　當歸　川芎

芍藥　甘草(等分)

右爲末加生薑棗同煎水一大盞藥五錢煎至七分食前日三服

金剛丸治腎損骨痿不能起于床宜益精

萆薢　杜仲(炒去絲)　蓯蓉(酒浸)　兎絲子(等分酒浸)

右爲細末酒煑猪腰子爲丸每服五七十丸空心酒下



牛膝丸治腎肝損骨痿不能起于床筋緩不能收持宜益精緩中

牛膝(酒浸)　萆薢　杜仲(炒去絲)　蓯蓉(酒浸)

防風　兎絲子(酒浸)　白蒺藜(各等分)　桂枝(減半)

右細末酒煑猪腰子擣丸桐子大空心酒下五七十丸

煨腎丸治腎肝損及脾損穀不化宜益精緩中消穀

牛膝(酒浸)　萆薢　杜仲　蓯蓉

兎絲子　防風　白蒺藜　胡蘆巴

破故紙(等分)　桂(減半)

右[illegible]丸[illegible]不起者甚効

黑地黄丸治陽盛陰衰脾腎不足房室虛損形瘦無力面多青黄而無常色宜此藥養血益腎

蒼朮(一斤米泔浸)　熟地黄(一斤)　川薑(冬一兩夏五錢春七錢)

五味子(半斤)

右爲細末棗肉爲丸如梧子大每服一百丸至二百丸食前米飲下或酒治血虛久痔甚效經曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣五味子味酸故酸以收之此雖陽盛不燥熱乃是五藏虛損於内故可益血收氣也此藥類象神品藥也



治陽虛陰盛心肺不足宜八味丸若形體瘦弱無力多困未知陰陽先損夏月地黄丸春秋宜腎氣丸冬月宜八味丸

消渴論第二十三

論曰消渴之疾三焦受病也有上消中消腎消上消者上焦受病又謂之鬲消病也多飲水而少食大便如常或小便清利知其燥在上焦也治宜流濕潤燥中消者胃也渴而飲食多小便黄經曰熱能消穀知熱在中法云宜下之至不欲飲食則愈腎消者病在

下焦初發為膏淋下如膏油之狀至病成而面色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂治法宜養血以肅清分其清濁而自愈也法曰燥上而渴辛甘而潤肺故可用蜜煎生薑湯大器頓之時時呷之法云心肺之病莫厭頻而少飲內經云補上治上宜以緩又曰辛以潤之開腠致津液通則肺氣下流故氣下火降而燥衰矣其渴乃止又經曰二陽結為消王注曰二陽結於胃及大腸俱熱也腸胃藏熱則善消水穀可甘辛降火之劑黃連末一斤生地黃自然汁白蓮花藕自然汁牛乳汁各一斤熬成膏子劑黃連末為丸如梧桐子大每服三十丸少呷溫水送下日進十服渴病立止



治上焦消而不欲多食小便清利宜小柴胡湯或加白虎湯或錢氏地骨皮散內加 芍藥 黃耆 石膏 黃芩 桔梗之類是也

人參石膏湯治膈消上焦煩渴不欲多食

人參（四兩） 石膏（一兩二錢） 知母（七錢） 甘草（四錢）

右為粗末每服五錢至七錢水煎食後溫服

順氣散治消中熱在胃而能食小便赤黃微利之為效不可多利服此藥漸漸利之不欲多食則愈

厚朴（一兩） 大黃 枳實

右剉每服五錢水煎食遠服

茴香散治腎消病下焦初證小便如膏油

茴香（炒） 苦楝（炒）

右細末酒調二錢食前服

八味丸治腎消大病加減法

本方內倍加山藥外桂附從四時加減假令方內桂附一兩春各用三錢夏用一錢秋用五錢冬全用一兩

珍珠粉丸治白淫夢泄遺精及滑出而不收



黃柏一斤（於新瓦上燒令通赤為度） 真蛤粉一斤

右為細末滴水丸如梧桐子大每服一百丸空心酒下法曰陽盛乘陰故精泄也黃柏降火蛤粉鹹而補腎陰也又治思想無窮所願不得之證

竹籠散治消渴

五靈脂 黑豆（去皮）

右等分為細末每服三錢冬瓜湯調下無冬瓜苗葉皆可日二服小渴二三服効渴定不可服熱藥唯服八味丸去附子加五味子

腫脹論第二十四

靈樞脹論云帝問岐伯脹形何如岐伯曰夫心脹者
煩心短氣臥不安肺脹者虛滿而喘咳肝脹者脇下
滿而痛引少腹脾脹者善噦[illegible]不能勝
衣臥不安腎脹者[illegible]
者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨于食[illegible]
腸鳴而痛濯濯冬日重感於寒則飧泄食不化小腸脹
者小腹䐜滿引腰而痛膀胱脹者少腹氣滿而氣癃
三焦脹者氣滿于皮膚中輕輕然而不堅膽脹者脇
下痛脹口苦善太息[illegible]帝問岐伯水脹何
如答曰水始起也目窠上微腫如新臥起之狀其頸



脈動時咳陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手
按其腹隨手而起如裹水之狀此[illegible]曰膚脹
何如岐伯曰膚者寒氣客于皮膚之間[illegible]不堅腹
身大盡腫皮厚按其腹窅而不起[illegible]此其候
也鼓脹何如答曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼
黃腹筋起此其候也[illegible]何如答曰[illegible]客于腸外
與衛氣相搏氣不得榮[illegible]惡氣乃起
瘜肉生其始大也大如[illegible]大至其成如懷
子之狀[illegible]月事不以時下此
其候也[illegible]何如答曰石瘕生于胞中寒氣客于子
門閉塞氣不通惡血當瀉不瀉[illegible]狀如
懷子月事不以時皆生于女子[illegible]膚脹鼓
脹可刺邪曰先瀉其脹之血絡後調其經刺去其血
絡也
經云平治權衡去菀陳莝開鬼門潔淨府平治權衡
者察脈之浮沉也去菀陳莝者疏滌腸胃也開鬼門
潔淨府者發汗利小便也又鼓脹之病治以雞屎醴
名醫云其腫有短氣不得臥為心水兩脇痛為肝水
大便鴨溏為肺水四肢皆腫為脾水腰痛足冷為腎
水口苦咽乾為膽水乍虛乍實為大腸水各隨其經



絡分其內外審其脈證而別之大有風水皮水石水
黃汗歸各臟以論之風合歸肝皮合歸肺黃汗歸脾
石合歸腎風水脈浮必惡風皮水脈亦浮按下沒指
石水脈沉腹滿不喘黃汗脈沉遲發熱而多涎久而
不愈必致[illegible]水腫脈浮帶數即是虛寒潛止其間
久必沉伏沉伏則陽虛陰實為水必矣要知水脈必
沉是也論曰脈出者死與病不相應也諸唇黑則傷
肝缺盆平則傷心臍出則傷脾足平則傷腎背平
則傷肺此五者必不可療也治法云腰以上宜發汗
腰以下利小便[illegible]又論虛實腹脹實則不因吐瀉久

病之後亦不可下利服[illegible]亂[illegible]
有宿食不化[illegible]先白餅子紫霜丸下
之夏草認大小[illegible]不過先利小便後利大便虛
則久病吐瀉後其脈微細肺主目胞腮虛腫手足冷
當先服塌氣丸後服異功散及和中丸益黃散溫其
氣　因于氣腫者橘皮煎丸　因于濕爲腫者[illegible]已
黃膏湯調五苓散　因于熱爲腫者服八正散
又一法燥熱於肺爲腫者乃絕水之原也當清肺除
燥水自至矣于豉梔湯中加黃芩知熱在下焦陰消
使氣不得化者當益陰則陽氣自化也[illegible]連是



也

五臟論五水灸法

青水灸肝井　赤水灸心榮　黃水灸脾俞　白水
灸肺經　黑水灸腎合

婦人蠱脹無脈燒青丸　五皮散亦是

論諸蠱脹者有二腫若從胃則旦食而不能夜食旦
則不脹夜則脹是也若水腫證濡泄者是也內經曰
蠱脹之病治以雞屎醴酒調服水脹之病當開鬼門
潔淨府也

白茯[illegible]湯[illegible]水

白茯苓　澤瀉[illegible]　郁李仁[illegible]

右㕮咀作一服水一[illegible]一[illegible]常服無時[illegible]
一主多以或煎得澄入生薑自然汁在內和麵或[illegible]
粥飯作常食五七日後覺脹下再中以白朮散

白朮　澤瀉[illegible]

右爲細末每服三錢煎茯苓湯調下或丸亦可服三
十丸

末治之藥服黃耆芍藥建中之類以調養之平復後
忌房室豬魚鹽麵等物

治水氣蠱脹潔淨府楮實子丸



楮實子[illegible]　白丁香[illegible]　茯苓[illegible]

右三味爲細末用楮實膏爲丸如桐子大不計丸
數從少至多服至小便清利及腹脹減爲度後服
中治藥末治藥調養藥疏啓其中忌甘苦酸補其
下五補七宣

取穴法

治腫治其經治金火也井榮俞經陰經金也金木[illegible]
火陽經火也

治腫木香散

木香　大戟　白牽牛各等分

右為細末每用三錢豬腰子一對批開摻藥
燒熟空心服之如右腳塌左右腳塌右如水氣
能全去於腹上塗甘遂末在臍滿腹少飲甘草
水其腫便去也

治水腫

螻蛄去頭尾與葫蘆心同研焙七日晒乾為細末
淡酒調下暑月滋用尤佳

又方

棗一斗鍋內入水上有四指用大戟并根苗蓋之
遍盆合之煮熟為度去大戟不用旋旋吃無時盡



棗決愈神効

眼目論第二十五

論曰眼之為病在府則為表當除風散熱在藏則為
裏宜養血安神暴發者為表而易治久病者在裏而
難愈除風散熱者瀉青丸主之養血安神者定志丸
婦人熟乾地黃丸是也或有體肥氣盛風熱上行目
昏澀者槐子散主之此由胸中濁氣上行也重則為
疾厥亦能損目當使胸中氣清無此病也又有因目
疾服藥多而損者有久之眼漸昏弱乍明乍暗不
視物此目少血之驗也熟乾地黃丸消風散定志
丸相須而養之或有見物不明見黑花者此謂之腎
弱也宜補腎水駐景丸是也或有暴失明者謂眼竅
諸陽交之會也而陰反閉之此氣邪內滿當有不測
之疾也暴赤腫痛為風熱上行也或淚入眼此肝氣
而發在表也翳膜已生在表明矣宜發散而去之反
疏利則邪氣內搐為翳則深也邪氣未定謂之熱翳
而浮邪氣已定謂之冰翳而沉邪氣牢而深者謂之
陷翳當以焮發之物使其邪氣再動翳膜乃浮補之
退翳之藥則能自去也病久者不能速効當以歲月
除之



治眼赤暴發腫散熱飲子

防風　羌活　黃芩　黃連各一兩

右剉每服半兩水二盞煎至一盞食後溫服如大
便秘澀加大黃一兩如痛甚者加當歸地黃如煩
燥不能眠臥加梔子一兩

川芎散治風熱上衝頭目眩熱腫及胸中不利

川芎　槐子各一兩

右細末三錢如胸中氣滯不利生薑湯調目疾茶
調風熱上攻㕮咀一兩水煎食後服

治眼久病昏澀因發而久不愈者

防風　羌活　黄芩　黄連
地黄　當歸　人參　茯神
右爲麁末每服五七錢水一盞半煎至一盞去滓
溫服食後
梔子散
梔子　黄芩　木賊
右細末茶清調下食後
治眼生瞖膜及瘀入眼然赤已過者瀉肝丸主之當
半成大黄如大便秘燥氣未定依方服之
治水瞖久不去者羚羊角散主之
羚羊角　升麻　細辛各等分　甘草減半



右爲細末一半爲散一半煉蜜爲丸如桐子大每服
五七十丸以羚羊角散下之食後臥米泔水煎服
治太陽經衛虛血實目瞳人瞼重頭中濕淫膚脈瞤痛
肝風盛眼黑腎虛桔梗丸
桔梗一斤　牽牛頭末三兩
右爲末煉蜜爲丸如桐子大每服四五十丸
加至百丸食前溫水下日二服
金絲膏　點眼藥
生薑取汁　白沙蜜一兩　綠豬膽汁二錢

黄連
右先煎黄連水入蜜同煎去沫淨
入下項藥六
腦子一錢四　麝香　硇砂
輕粉五錢　熊膽　青鹽　鵬砂二錢
右極細攪勻熬令稀稠點用
治眼暴赤發腫痛不可忍者救苦丸
黄連一兩　當歸二錢　甘草
右同剉細新水半椀浸一宿以慢火熬約至一半
以綿濾去滓以淨磁砂用火再熬作稠膏子爲度
攤在碗上倒合以物盛之用熟艾一大彈子許底



下燃之用艾烟熏之艾盡爲度再入下項藥
朱砂一錢　腦子　乳香　沒藥
右同研極細入黄連膏內搜和丸如米大每用二
丸點眼大角內仰面臥藥化則起
治眼發赤腫毒氣侵睛脹痛宜毒散
盆硝　雄黄　乳香　沒藥
右爲極細末以小竹筒吹鼻內之
治眼風毒發腫藥中吹噴嚏多人損而生瘡宜風散
川芎　甘菊　乳香　沒藥各一錢

右和勻再研極細少許點眼內嗜之
能遠視不能近視者方中定志丸日能近視不能
遠視萬壽地芝丸
生薑四兩焙 天門冬四兩去心 枳殼二兩 甘菊二兩
右爲細末煉蜜丸如桐子大茶清或溫酒下一百
丸食後此藥能愈大風熱
洗眼藥
訶子一兩 黃丹四兩 蜜八兩 柳枝四十九
右以河水二椀熬至半椀用一錢熱水化洗之石
器內熬



治眼赤瞎以青泥蛆不以多少淘淨曬乾末之令害
眼人仰臥合目用藥一錢散在眼上須臾藥行待少
時去藥赤瞎亦無
治倒睫 無名異末之掺在紙中搓作撚子點著到
藥處吹殺以烟熏睫自起

瘡瘍論第二十六

論曰瘡瘍者火之屬須分內外以治其本內經曰膏
粱之變足生大丁其原在裏發于表也受持如虛
內結而發諸外未知從何道而出皆是從虛而出也
假令太陽經虛從背而出少陽經虛從鬢而出陽明經
虛從髭而出督脈經虛從腦而出 又經曰地之濕氣
感則害人皮肉筋脈是言其在外也則內行若其脈沉實
當先疏其內以絕其原也其脈浮大當先托裏恐氣
入於內也有內外之中者邪氣至甚遏絕經絡故發
癰腫經曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫此因失托
裏及失疏通又失和榮衛也治瘡之大要須明托裏
疏通行榮衛三法托裏者治其外之內疏通者治其
內之外行榮衛者治其中也內之外者其脈沉實發
熱煩躁外無焮赤痛其邪氣深於內也故先疏通以
絕其原外之內者其脈浮數焮腫在外形證外顯恐



邪氣極而內行故先托裏內外之中者外無焮惡之
氣內亦臟腑宜通知其在經當和榮衛也用此三法
之後雖未差必無變證亦可使邪氣峻減而易痊愈
故經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火又曰知其要者一言
而終不知其要流散無窮
鍼灸法曰凡瘡瘍可灸刺者須分經絡部分血氣多
少俞穴遠近若從背而出當從太陽五穴隨證選用
或刺或灸泄其邪氣 凡太陽多血少氣
至陰 通谷 束骨 崑崙 委中
從鬢而出者當從少陽五穴選用 少陽少血多

數食[illegible]灸谿[illegible]

[illegible]而出者當從陽明五穴選用[illegible]

厲兌　內庭　陷谷　衝陽[illegible]

食脇而出者初發脇痛[illegible]必且[illegible]瘡中[illegible]之海當灸刺絕骨以泄邪[illegible]驗者合也故服[illegible]太陽經依前選用[illegible]長者從陽明經依前選用脈絡者從少陽經依前選用[illegible]曰[illegible]各有井滎[illegible]合井主心下滿[illegible]及瘡[illegible]色俞主體重節痛瘡[illegible]咳嗽寒熱[illegible]曰色合主氣逆而泄瘡黑色隨經病而有此證者或宜灸宜鍼以泄邪



氣經曰邪氣內搏則腫熱宜砭[illegible]也內經曰大癰氣之息者宜以鍼開除之氣勝[illegible]者宜[illegible]而泄之王注曰石砭也可以破大癰出膿今以鈹鍼代之砭瘡瘍已覺微漫腫硬皮[illegible]不變色脈沉不痛者當外灸之引邪氣出而方止如以有膿水者不可灸當刺之淺者亦不灸經曰陷者灸之如外微覺木硬而不痛者當急灸之是邪氣深陷也淺者不可灸慎之瘡瘍[illegible]如[illegible]者是[illegible]氣[illegible]于胃也[illegible]中宜倍加白朮服之

內疏黃連湯治嘔噦心逆發熱[illegible]不[illegible]門[illegible]皮肉[illegible]前[illegible]藏[illegible]秘[illegible]疏利之

黃連　芍藥　當歸　檳榔

木香　黃芩　山梔子　薄荷

桔梗　甘草已上各一兩　連翹二兩

右除檳榔木香二味為細末外並剉每服一兩水一盞半煎至一盞先喫一二服次每服加大黃一錢再服加一錢以利為度如有熱證止服黃連湯大便秘澀加大黃覺無熱證少煎沒藥內托復煎散時時服之如實無熱及大小便通止服復煎散



稍有熱證却服黃連湯秘則加大黃如此內外皆通榮衛和調則經絡自不[illegible]矣

治腫焮于外根盤不深形證在表其脈多浮痛在皮肉邪氣盛則必侵于內急須內托以救其裏也服內托復煎散

地骨皮　黃耆　芍藥　黃芩

白朮　茯苓　人參　柳桂味淡者

甘草　防己　當歸已上各一兩　防風二兩

右㕮咀先煎蒼朮一斤用水五升煎至三升去[illegible]滓入前藥十二味再煎至三四盞絞取清[illegible]

四五錢終日服之又前藥未痊爲湯去滓再依前
服[illegible]一味滓此除濕散滑熱使胃氣和平如或少之
已再作半料服之若大便秘及煩熱少服黃連湯
[illegible]微利及煩熱已過却服復煎散半料如此使榮
衛俱行邪氣不能內侵也

治諸瘡瘍藏府已行如痛不可忍者可服當歸黃耆
湯并加減在後

當歸　黃耆　地黃　地骨皮
川芎　芍藥各等分

右㕮咀每服一兩水一碗煎至五分去滓溫服如



發熱者加黃芩煩熱不能臥者加梔子如嘔是濕
氣侵胃也倍加白朮

[illegible]方

[illegible]芝[illegible]兩半　當歸兩半　杏仁[illegible]　桃柳枝各一兩[illegible]

[illegible]二大枝新綿一葉包[illegible]於一枝上內
[illegible]一枝攪於鐵器內煎成入黃丹三兩一處
[illegible]中[illegible]成不散如[illegible]子爲度

治金絲瘡一云紅絲瘤其狀如綫或如繩巨細不等
經所謂丹毒是也但比熛毒不甚廣闊人患此

[illegible]有之下行至心則死下行之上行亦然[illegible]
頭截經[illegible]之以出血後[illegible]之立愈

治從高[illegible]下[illegible]此[illegible]得過者苦杖散

苦杖[illegible]

右細末熱酒調下如產後瘀血不散或聚血皆治
之

治丁瘡奪命散

烏頭尖　附子底　蝎稍　雄黃各一錢
蜈蚣一條　硇砂　粉霜　輕粉
麝香　乳香各一錢半　信[illegible]　腦子[illegible]少



右爲細末先破瘡出惡血畢以草杖頭用紙帶入
于內以深爲妙

治瘡難消不能作膿痛不止木香散

地骨皮去土一兩半　木香五錢　穿山甲炙黃[illegible]　麝香一字

右爲細末酒調下三錢及小兒斑後生癰米飲調
下効如神

治丁瘡毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁　蟬殼　貫仲各半兩　丁香
乳香各一錢

右細末每服二錢溫酒調下

治惡瘡有死肉者及追膿
白丁香 輕粉 粉霜 雄黃
麝香各八[illegible]
右同研[illegible]用之
治諸瘡久[illegible]不辨肉色[illegible]腫光色名曰附骨瘡[illegible]
神三生散
露蜂房 蛇退皮 頭髮洗淨等分
三味燒灰存性研細酒調三錢
治膀胱移熱于小腸上爲口糜好飲酒人多有此疾
當用導赤散五苓散各半兩煎服

治少陰口瘡半夏散若聲絕不出者是風寒遏絕陽
氣不伸也
半夏制一兩 桂一字 草烏頭一字
右同煎一盞水分作二服其効如神
治太陰口瘡甘礬散
生甘草一寸 白礬一栗子大
右噙化嚥津
治赤口瘡乳香散
乳香 沒藥各一錢 白礬飛半錢 銅綠少許
爲細末摻用

諸瘡[illegible]金銀花[illegible]
黃芪[illegible] 右三味[illegible]入[illegible]
口[illegible]二時取出去滓放溫服之
諸瘡已破未破焮腫甚當歸散主之 常[illegible]
栝蔞 木香 黃連等分 右爲粗末每服五錢[illegible]
乳香散 治瘡口痛大者 寒水石燒一兩 滑石一兩
乳香 沒藥各五分 腦子少許
右各研細同和勻少摻瘡口上
雄黃散 治諸瘡有惡肉不能去者 雄黃一錢研
巴豆一個去皮 右一處同研[illegible]入乳香沒藥少許再研
細少上惡肉自去也

木香散 治瘡口久不斂
木香 檳榔各一錢 黃連二錢
右爲細末摻上如瘡加當歸一錢[illegible]之自收斂
又方 小椒去目[illegible] 定粉[illegible] 白礬[illegible]
乳香 沒藥各一錢 右爲細末摻瘡口上
鍼頭散 治瘡瘍焮腫木硬 蟾酥 麝香各一錢
各同研極細以兒乳汁調和泥入合磁內盛乾
不拘[illegible]以唾津調摻少許於腫處更以膏
[illegible]自出不能爲瘡雖有膏亦輕

治白口瘡沒藥散

沒藥　乳香　雄黃各一錢　輕粉半錢

巴豆霜少許

右細末乾掺

瘰癧論第二十七

夫瘰癧者經所謂結核是也或在耳前後連及頤頷下連缺盆皆爲瘰癧或在胸及胸之側下連兩脇皆爲馬刀手足少陽主之此經多氣少血故多堅而少軟潰白而稀如泔水狀治者求水清可也如瘰癧生去別經臨時於銅人內隨其所屬經絡部分對證之穴灸之并依經內藥用之獨形而小者爲結核續數連結者爲瘰癧形表如蛤者爲馬刀



治馬刀連翹湯

連翹二斤　瞿麥一斤　大黃三兩　甘草一兩

右㕮咀一兩水兩碗煎至一盞半早食後巳時服在項兩邊是屬少陽經服藥十餘日後可於臨泣穴灸二七壯服藥不可住了至六十日決効有一方加大黃不用甘草更加貝母五兩雄黃七分檳榔半兩同末熱水調下三五錢

治瘰癧文武膏

文武實

右以布袋取汁銀石器中熬成膏每服白湯點一匙日三服

痔疾論第二十八

論曰手陽明大腸名曰害蜚　六元正紀論陽明又曰司殺府手陽明　大腸名害蜚謂金能害五虫又曰司殺府謂金主殺既有此二名何以自生虫蓋謂三焦相火盛而能制陽明金故木來相侮內經曰侮謂勝已也木主生五虫叔和云氣主生于脾藏傍大腸疼痛陣難當漸覺稍瀉三焦熱莫誤多方立紀綱



此言飲酒多食熱物脾生大熱而助三焦氣盛火能生土也當瀉三焦火熱退使金得氣而反制木木受制則五虫不生病自愈矣

蒼朮澤瀉丸

蒼朮四兩去皮　澤瀉二兩　枳實二兩　地榆一兩

皂子一兩燒存性

右爲細末燒飯爲丸桐子大每服三十丸食前酒或米飲下

又方

川烏炮　古石灰等分　依前丸服

[illegible]

天仙子　荊芥　小椒　蔓荊子各等分

右以水煎洗

黑地黃丸治痔之聖藥也在虛損門下有方

婦人胎產論第二十九

論曰婦人童幼天癸未行之間皆屬少陰天癸既行皆從厥陰論之天癸已絕乃屬太陰經也治胎產之病從厥陰經者是祖生化之源也厥陰與少陽相為表裏故治法無犯胃氣及上二焦為三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下早之證利大便



則脈數而已動于脾利小便則內亡津液胃中枯燥製藥之法能不犯三禁則榮衛自和而寒熱止矣外則和于榮衛內則[illegible]先將此法為之初治次後詳而論之見證消息同壞證傷寒為之緩治或小便不利或大便秘結或積熱於腸胃之間或以成瘻或散血氣而為浮腫證[illegible]多門故同傷寒壞證如發渴而白虎氣弱則黃芪血刺痛而用以當歸腹中痛而加之芍藥[illegible]上何證不犯三禁皆產後之久病也凡產後若痢疾[illegible]犯不可拘也如產後熱入血室者桃仁承氣[illegible]之類是也胃堅燥者大承氣不可以世俗[illegible]人多用烏金四物是不知四時之寒熱不同[illegible]實育然一槩用藥如此而愈加增劇者[illegible]大抵產病天行從增損柴胡雜證從加添四物[illegible]夏雖從柴胡秋冬約同四物藥性寒熱病[illegible]不可不察也四物湯常病服餌四時各有增損今具增損于后

春倍川芎（一曰春二曰脈弦頭痛）夏倍芍藥（一曰夏二曰脈洪[illegible]）秋倍地黃（一曰秋二曰血虛）冬倍當歸（一曰冬二曰脈沉寒而不食）

此常服順四時之氣而有對證不愈者謂失其輔也

春防風四物（加防風倍川芎）夏黃芩四物（加黃芩倍芍藥）秋天門冬



四物（加天門冬倍地黃）冬桂枝四物（加桂枝倍當歸）此四時常服隨證用之也如血虛而腹痛微汗而惡風四物加茂桂謂之腹痛六合如風虛眩運加秦艽羌活謂之風六合如氣虛弱起則無力匡然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合如發熱而煩不能安卧者加黃連梔子謂之熱六合如虛寒脈微氣難布息不渴清便自調加乾薑附子謂之寒六合如中濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合此婦人常病及產後病通用之藥也治婦人虛勞[illegible]方中謂之首尾六合者如八聖散下熟乾地黃丸[illegible]無熱虛勞專其養也中

通聖散牡丹煎丸空心食前人參荊芥散臨臥食後
此有熱虛勞藥也
治婦人懷胎腹脹枳殼湯
枳殼炒二兩　黃芩一兩
右為麄末每服半兩水一盞半煎一盞去滓溫服
治產前脹滿身體沉重枳殼湯中加白朮一兩
治產前寒熱小柴胡湯中去半夏謂之黃龍湯
治懷孕胎漏二黃散
生地黃　熟地黃各等分
右為細末加白朮枳殼湯調下一兩日二服



治有孕胎痛地黃當歸湯
當歸半兩　熟地黃二兩
右為麄末作一服水三升煎至升半去滓頓服
束胎丸
白朮　枳殼去穰麩炒等分
右為末燒飯為丸如桐子大又月一日食前服三
五十丸溫熟水下胎瘦易生也服至產則已
產門藥
治胎孕不下或子死腹中或血衝上昏悶或血暴下
及胞乾而不能產者宜服半夏湯

半夏麴一兩半　桂七錢半　大黃五錢　桃仁三十個炒
右件為麄末先服四物湯三兩服次服半夏湯
生薑三片水一盞煎去三分食後如未效次服
胎丸
下胎丸
半夏生　白蘞各半兩
右為細末滴水為丸如桐子大食後用半夏湯下
三二丸續續加至五七丸如有未效者須廣大其
藥榆白皮散主之又不効大聖散主之有宿熱人
宜服人參荊芥散



產後藥
治產後經水適斷感于異證手足牽搐咬牙昏冒宜
增損柴胡湯
柴胡八錢　黃芩四錢半　人參三錢　半夏三錢
石膏四錢　知母二錢　黃蘗二錢半　甘草四錢炙
右為麄末每服半兩生薑五片棗四箇水一盞半
煎至一盞溫服清無時
前證已去次服秦艽湯去其風邪
秦艽八錢　人參半錢　防風四錢半　芍藥半兩
柴胡八錢　黃芩四錢半　半夏三錢　甘草四錢炙

右爲麁末每服五七錢水一盞[illegible]
無時二三日[illegible]
胡小料中[illegible]五[illegible]
煎服[illegible]之氣除風邪[illegible]
蒼朮二兩 防風二兩 當歸一兩 羌活一兩
右爲粗末每服一二兩水三盞煎至一盞半取清
續續常服無時
凡胎前之藥無犯胎氣產後變化並同傷寒壞證蓋
從加減四物湯調治
治產後腹大堅滿喘不能臥白聖散



樟柳根三兩 大戟一兩半 甘遂一兩炒
右爲極細末每服二三錢煎[illegible]湯調下取大便宜利
爲度此藥主水氣之勝藥也
治產後風氣在表面目四支浮腫宜加減局方中七
聖丸每服二十丸白湯下日加三[illegible]丸以利爲度如
浮腫喘嗽加木香檳榔倍之謂氣[illegible]浮則腫如頭目
昏冒加羌活川芎謂多風也如只浮腫依七聖丸本
方[illegible]之
治產後日久虛[illegible]川久而脈浮疾者宜服三元湯
柴胡八錢 黃芩 人參 半夏洗

甘草[illegible] 川芎 芍藥一兩 熟地黃
當歸各半錢
右爲麁末同小柴胡湯煎服
治日久勞虛微有寒熱脈沉而浮宜柴胡四物湯
川芎 熟地黃 當歸 芍藥各一兩半
柴胡八錢 人參 黃芩 甘草
半夏麴各三錢
右爲麁末同四物煎服
如日久虛勞鍼灸小藥俱不效者宜服三分散
白朮 茯苓 黃耆 川芎



芍藥 熟地黃 當歸各一兩 柴胡一兩[illegible]
黃芩六錢 人參六錢 半夏六錢 甘草六錢
右爲麁末每服一兩水一盞煎至半盞溫服清日
一服
治產後虛勞不能食宜十全散
白朮 茯苓 黃耆各一兩 人參
川芎 芍藥 熟地黃 當歸各一兩
桂半兩 甘草一兩炙
右㕮咀如麻豆每服半兩水一盞半入生薑五片棗
三枚同煎至七分空心食前溫服清

凡虛損病有淺深治有次第[illegible]

治產後諸風痿攣無力血風湯

秦艽　羌活　防風　白芷

川芎　芍藥　當歸　地黃

白朮　茯苓[illegible]

右為細末一半煉蜜丸如梧子大一半散溫酒下丸子五七十丸甚妙

治產後諸積不可攻當養陰去熱其病自退宜服芍藥湯

芍藥一斤　黃芩　茯苓[illegible]



右三味為麄末每服半兩水煎日三服去滓溫服

治產後兒枕大痛黑白散

烏金石[illegible]　寒水石[illegible]

右二味各等分另碾放臨服各抄末一錢半粥飲湯下痛止便不可服未止再服大效

治產後不[illegible]桃花散

新石灰[illegible]　黃丹[illegible]

右細末渴時冷漿水調一錢服

治產後衝服胸中有物狀是噎氣不降紫金丹

代赭石　磁礪石[illegible]

右為細末醋糊為丸如梧子大每服三五十丸[illegible]下[illegible]中痛加當歸湯下久服治血瘕

又方

代赭石[illegible]　桃仁[illegible]　大黃[illegible]

右為末薄荷水為糊丸如梧子大每服三五十丸溫水下無時

治臍腹痛不可忍四物湯一兩加玄胡三錢半

治血瘕腹痛及血刺腰痛四物湯細末二兩加酒煎玄胡細末二兩每服三錢酒調下

治血運血結血聚於胸中或偏于少腹或連于肋腸



四物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭紅花玄胡各一兩同為末如四物湯煎服取清調沒藥散服之

沒藥散

虻蟲[illegible]　水蛭一錢　麝香[illegible]　沒藥一錢

右為細末煎前藥調服血下痛止只服前藥

治產後頭痛血虛痰癖寒厥皆令頭痛加減四物湯

羌活　川芎　防風　香附子

白芷　石膏　細辛　當歸

熟地黃　甘草　蒼朮[illegible]

右為粗末每服一兩水煎服無時如有汗者[illegible]

弱頭痛也方中加芍藥三兩桂一兩半
如痰盛頭疼加半夏三兩茯苓一兩半加生薑煎
如熱痰頭痛又加白芷三兩石膏三兩知母一兩
半寒厥頭痛加天麻三兩附子一兩半生薑煎
治產後風虛血暈精神昏昧荊芥散
荊芥穗一兩 桃仁二兩去皮尖
右為細末溫水調服 微喘加杏仁去皮尖 甘草炒各三錢
治產前發胎不動如重物下墜腹冷如冰立效散
川芎 當歸焙

右為麄末每服秤三錢水二盞煎至一盞去滓食前服
治婦人胎漏及因事下血枳殼湯
枳殼半兩 黃芩半兩 白朮一兩
右為麄末每服五七錢水一盞煎至七分食前空心服
治婦人筋骨痛及頭痛脈弦增寒如瘧宜服風六合湯
四物湯四兩加羌活防風各一兩
治婦人血氣上衝心腹脇下滿宜服治氣六合湯
四物四兩加木香檳榔各半兩

治婦人臍下冷腹痛腰脊痛宜服玄胡六合湯
四物內加玄胡索苦楝炒各一兩
治婦人氣充經脈月事頻併臍下痛宜芍藥六合湯
四物內倍加芍藥
治婦人經事欲行臍腹絞痛宜服八物湯
四物內加玄胡苦楝各一兩檳榔木香各半兩
治婦人經水過多別無餘證
四物內加黃芩白朮各一兩
治婦人經水澀少
四物內加葵花煎
治婦人虛勞氣弱喘嗽胸滿宜厚朴六合湯

四物內加厚朴一兩製 枳實半兩炒
已上煎法並同四物服之
四物主治
熟地黃 補血如臍下痛非熟地黃不能除此通腎經之藥也
川芎治風瀉肝木如血虛頭痛非芎不能除此通肝經之藥也
芍藥和血理脾治腹痛非芍藥不能除此通脾經之藥也

當歸和血如血刺痛[illegible]能除如[illegible]此通心經之藥也

以上四味治法如[illegible]物湯中各加二味用之如少腹痛四物湯四兩加玄胡苦楝各一兩經水暴多四物四兩加黃芩一兩如腹痛者只加黃連如夏月用不去黃芩經水如黑豆水加黃連黃芩各一兩如經水少而色血和者四物四兩加熟地黃當歸各一兩如經水適來適斷往來寒熱者先服小柴胡以去其寒熱後以四物湯調治之如寒熱不退勿服四物是謂變證表邪猶存不能效也依前論中變證隨證用藥調治之



治婦人血積增損四物湯

四物內加廣茂京三稜桂乾漆皆依法製各加一兩如四物煎服

治婦人產後血昏血崩月事不調遠年乾血氣皆治之名曰紅花散

乾荷葉 牡丹皮 當歸 紅花

蒲黃炒

右各等分為細末每服半兩酒煎和滓溫服如衣不下另末榆白皮煎湯調半兩立效

治婦人惡物不下

當歸 芫花炒

右細末酒調三錢又好墨醋碎末之小便酒調下

炒

又治胎衣不下蛇退皮炒為細末二錢酒調下

[illegible]見血無寒衄血下血吐血溺血皆屬于熱但血家證皆宜服此藥生地黃散

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮

天門冬 黃耆 芍藥 甘草

黃芩



右各等分同剉每服一兩水一盞半煎至一盞去滓溫服脈微身涼惡風每一兩加桂半錢吐血者多有此證

治衄血不止麥門冬飲子

麥門冬 生地黃

右等分剉每服一兩煎服又衄血先硃砂蛤粉次木香黃連大便結下之大黃芒硝甘草生地黃溏軟梔子黃芩黃連可選用

帶下論附

論曰赤者熱入小腸白者熱入大腸原其本也皆濕

蟲結于脈女子[illegible]為赤白帶下本不病結
脈經[illegible]女子臍下痛而綿綿陰
中時下也故經曰任脈為病男子內結七疝女子
帶下瘕聚王注曰任脈自胞上過帶脈貫於臍上故
男子內結七疝女子帶下帶脈起于季脇章門如束
帶狀令濕熱冤結不散故為病也經曰脾傳之腎病
名曰疝瘕小腹冤熱而痛出白一名曰蠱所以為帶
下冤屈也冤結也屈滯而病熱不散先以十棗湯下
之後服苦練丸大玄胡散調下之熱去濕除病自愈
也如女子不月先瀉心火血自下也內經曰二陽之



病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消王
注曰大腸胃發病也心脾受之心主血心病則血不
流脾主味脾病則味不化味不化則精不足精血不
足故其證不能已虧則風邪勝而真氣愈消也又經
曰月事不來者胞脈閉也胞脈屬于心而絡于胞中
令氣上迫肺氣不得上通故月事不來先服降心火
之劑後服局方中五補丸後以衛生湯治脾養血氣
也

苦練丸治婦人赤白帶下

苦練碎酒 茴香炒 當歸

右等分為細末酒糊丸如桐子大每服三五十丸
空心酒下腰腿痛疼四物四兩加羌活防風各一
兩

衛生湯

當歸 白芍藥各二兩 黃耆三兩 甘草一兩

右為麄末每服半兩水二盞煎至一盞去滓溫服
空心如虛者加人參一兩

大頭論第三十

夫大頭病者是陽明邪熱太甚資實少陽相火而為
之也多在少陽或在陽明或傳太陽視其腫勢在何
部分隨經取之濕熱為腫木盛為痛此邪見于頭多
在兩耳前後先出皆[illegible]其病也治之不宜藥速
則過其病所謂上熱未除中寒復生必傷人命此病
是自外而之內者是血病況頭部分受邪見于無邪
迹之部當先緩而後急先緩者謂邪氣在上著無形
之分部[illegible]所不至若用重劑速下過其病
難已雖用緩藥若急服之或食前或頓服皆失緩體
則藥不能得除病當徐徐浸漬無形之分[illegible]性
味形[illegible]不能[illegible]是也且後急者謂緩劑
已[illegible]邪氣入于中是到陰部染于有形質之所若不

速去則損陰也此終不可[illegible]急去之是治客以急也且治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下各本家病也若急治之不能解紛而益亂也此故治主當緩治客以急者謂陽分受陰邪陰分受陽邪此客氣急除去之也假令少陽陽明為病少陽為邪出于耳之前後也陽明為邪者首大腫是也先以黃芩黃連甘草湯通炒過剉煎少少不住服或劑畢再用大黃煨鼠粘子新瓦上炒香煎藥成去滓內芒硝俱各等分亦時時呷之無令飲食在前得微利及邪氣已只服前藥如不已再同前次第服之取大便利邪氣即



止如陽明渴者加石膏如少陽渴者加瓜蔞根陽明行經升麻芍藥葛根甘草太陽行經羌活防風之類

雷頭風附

夫治雷頭者諸藥不效為與證不相對也夫雷頭者震卦主之震仰盂故予製藥內加荷葉謂象其震之形其色又青乃述類象形也當煎荷方中升麻湯

升麻湯兩　蒼木兩　荷葉一箇全者

右為細末每服五錢水一盞煎七分溫服食後或燒全荷葉一箇研細調煎藥服亦妙

耳論附

論曰耳者蓋非一也以竅言之是水也以聲言之是金也以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入者經也有若蟬鳴者有若鐘聲者有若火熇熇狀者各隨經見之其間虛實不可不察也假令耳聾者腎也何謂治肺肺主聲鼻塞者肺也何謂治心心主臭如推此法皆從受氣為始腎受氣于巳心受氣于亥肝受氣于申肺受氣于寅脾旺四季此法皆長生之道也

小兒斑疹論第三十一



論曰斑疹之病其狀各異瘡發焮腫于外者屬少陽三焦相火謂之斑小紅靨行于皮膚之中不出者屬少陰君火也謂之疹凡顯斑證者若自吐瀉者慎勿治則多吉謂邪氣上下皆出也大凡瘡疹皆首尾皆不可下恐妄動而生變此謂少陽通表宜和之也當先安其裏以解毒次微發之安裏解毒謂能安和五藏防風湯是也如大便不秘者以微發之藥錢氏方中多宜選用之如大便過秘者宜微利之當歸丸棗變百祥丸是也[illegible]若便發之令斑併出小兒[illegible]是使別生他證也首尾不可下者首曰上焦尾曰下焦若已吐利不可下也便宜安裏藥三五服

如能食大便秘者內實宜微䟽利之若內虛而利者宜安裏藥三五服末後一服調微發之藥服之大抵用安裏之藥多發表之藥少秘則微䟽之邪氣不併而能作番次使小兒易禁也身溫者順身凉者逆[illegible]

宜服防風湯以和之

防風湯

防風(一兩) 地骨皮 黃耆 芍藥

枳殼 荊芥穗 牛蒡子(已上各半兩)

右為細末溫水調下或為麄末煎服二三錢更妙

治大便秘而內實能食宜當歸丸



當歸(五錢) 黃連(半錢) 大黃(二錢) 甘草(炙一錢)

先將當歸熬作膏子入藥三味為丸漸次服十丸(妙)

治瘡疹大便秘結棗變百祥丸

大戟(去骨一兩) 棗(三箇去核)

右二味用水一椀煎至水盡為度去大戟不用將棗焙乾可和劑旋丸從少至多以利為度

五藏病各有所見證

熱則從心寒則從腎嗽而氣上則從肺風從肝瀉從脾假令瀉見嗽而氣上脾肺病也瀉白益黃散合而服之又宜黃芩厚朴湯白术厚朴湯(少許)謂脾苦濕肺苦燥氣則上逆此其以先瀉又[illegible]腸鳴呦呦者是也如見瀉[illegible]少者當服白术厚朴湯[illegible]若[illegible]此類然更詳

後說四時經移用藥

假令春分前風寒也宜用地[illegible]防風或地黃丸及瀉青相間服之春分後風熱也宜用羌活防風黃芩或瀉青丸用導赤[illegible]之立夏之後熱也用三黃丸導赤散夏至後[illegible]赤瀉黃散合而服之或黃芩甘草白术[illegible]勝濕之藥立秋後宜用益黃散瀉白散[illegible]人參木香之類秋分後



用瀉白散立冬之後地黃丸主之謂腎不受瀉也大凡小兒斑疹已發有瘡有聲音者形病氣不病也無瘡無聲音者乃氣病形不病也有瘡而無聲音者是形氣俱病也〇一[illegible]當清利肺氣八風湯或涼膈散大黃芒硝亦可或如聖湯加大黃或八味羌活湯加大黃此是春時[illegible]之曰風熱[illegible]瘡疹者內經云諸痛[illegible]瘡瘍皆[illegible]者是相君行命三焦真湯[illegible]入肝為水胞自病[illegible]心乃君火入于皮作瘡疹為肺上皮毛心不害肺金此乃君之德也未發而發搐而外感寒邪內發

心熱而發搐用茶粉下解毒丸或犀角地黃湯主之

其發便稠密形勢如針頭者當輕發其表涼其內連翹升麻湯主之若斑已發稠密甚而微喘飲水有熱者以去風藥微下之若出不快清便自調知為在表不在裏當微發之升麻葛根湯主之若有乾黑陷身不大熱大小便澁則知熱在內當煎大黃湯下宣風散身表大熱者表證未罷不可利大便若斑疹已出見小熱小便不利者當利小便已發後有餘毒不散為復有身熱癰瘡之類當用解毒之藥

## 藥略第三十二 針灸附



羌活 治支節痛太陽風藥也　防風 療風通用　甘草 和中調諸藥

肉桂 通氣助陽　桂枝 開汗和表　麻黃 發汗太陽

桃仁 破血　黃芩 瀉肺氣　雄黃 [illegible]

白芷 治陽明頭痛　知母 瀉腎火助陰　石膏 [illegible]

半夏 去痰　柴胡 治少陽厥陰寒熱往來　芍藥 [illegible]

人參 補氣和中　瓜蒂 [illegible]　赤豆 [illegible]

杏仁 潤肺燥　蒼术 [illegible]　草烏頭 [illegible]

南星 治風痰　大麻 [illegible]　神麯 消食

白术蒼术同功　陳皮 益氣　枳實 治心下痞

枳殼 [illegible]　黃連 瀉心火　白茯苓 [illegible]

[illegible]　桔梗 [illegible]

厚朴 [illegible]　黃芪 [illegible]

荊芥 [illegible]　烏梅肉 [illegible]　沉香 [illegible]

肉豆蔻 [illegible]　附子 [illegible]

梔子 [illegible]　當歸 [illegible]　川芎 [illegible]

地黃 補腎 [illegible]　萆薢 [illegible]

牛膝 補筋 [illegible]　蓯蓉 益陽道命門火衰　[illegible]

破故紙 補命門 [illegible]　五味子 [illegible]　巴豆 [illegible]

細辛 [illegible]　升麻 [illegible]　蛇蛻 [illegible]

茴香 [illegible]　苦楝子 [illegible]　廣茂 [illegible]



乾漆 [illegible]　生地黃 涼血　沒藥 [illegible]

地榆 治下部血　澤瀉 [illegible]

金木水火土

青赤黃白黑

寒熱溫涼平

辛酸鹹苦甘

形色性味体

[illegible]

流注經法

輕枯虛薄淺假宜上升重實潤深真宜下其中平者宜中餘形色性味皆隨臟腑所宜此處方用藥之大槩耳知者用心則思過半矣

心痛脈沉腎經原穴　弦肝經原穴　澁肺經原穴

浮心經原穴　緩解經原穴
腰痛　身之前足陽明原穴衝陽　身之後足太陽原
穴[illegible]身之側足少陽原穴丘墟
針之最要
兩腸痛針少陽經丘墟　心痛針少陰經太谿湧泉
及足厥陰原穴　腰痛不可忍針崑崙及刺委中出
血太陽喘滿痰實口中如膠針太谿穴　噦嗌無度
針手厥陰太陵穴　頭痛不可忍針足厥陰太陽經
原穴　熱無度不可止刺陷骨穴出血　骨熱不可
治前板齒乾燥當灸骨會大椎　小腸疝痛當刺足

厥陰肝經太衝穴　血不止鼻衄大小便皆血血崩
當刺足太陰井隱白　喉閉刺少陽手足井并刺少
商及足太陰井　大煩熱晝夜不息刺十指間出血
謂之八關大刺　目疾睛痛欲出亦大刺八關　百
節疼痛實無所知三稜針刺絕骨出血
根大背痛刺手太陽井穴少澤
小腸痛刺少陽井穴關衝
陰頭中痛不可忍者卒疝也婦人陰中痛皆刺足厥
陰井大敦穴


珞琭子云天元一氣定[illegible]元氣也金主
貝曰木瘦金方火尖水肥土[illegible]論五行以元氣為甚
根富貴壽夭係之出有[illegible]而[illegible]考亦有壯盛而暴
亡元氣固藏則雖[illegible]而無害及其散慢則壯盛而愈
危是以元氣為根本五行為枝葉夫元氣者兌之位
也元始之祖先天地生圓而無隙寂而不動感而遂
通虛而生神乾體成焉乾為天天一生水故一水二
火三木四金五土五行形焉四方之民均受元氣一
也及其生焉各類五行形體殊異是故西北之民金
水象金方水肥人方正肥厚東南之人木火象木瘦

火尖人多瘦長尖小北人肥南人瘦理宜然也北人
賦性沉靜體貌肥上長下短頭骨大腰背小此本體
也若尤明敏捷且疾速腰背豐隆者[illegible]氣固藏富
貴壽考坎中藏真火升而水[illegible]也南人賦性
急暴體貌尖瘦下長上短頭骨偏腰背輭此本體也
若寬大[illegible]額[illegible]則從元氣固藏而富貴壽考
[illegible]中藏真水降[illegible]利氣也又有南人似北人
北人似南人不富則貴以此推之要在察元氣觀五
行分南北定壽夭則攻守有方調養有法不妄[illegible]
[illegible]行刑滯絕其[illegible]使執法者不[illegible]

禁使出塗者不擾朝廷在於上明賞罰於百官施利氣於萬民故君得以尊無爲而治天下和平災害不生君臣和於上百官和於朝萬民和於下庶物和於野馴而行之于萬年計也醫者明方術制法度以療民病養性之藥訪其漸也猶巡尉也治病之藥馘其毒猶守令也保命之藥濟其弱猶漕憲也延年之藥防其危猶朝廷也良工總其要明虛實於三部調和氣於百骸故心得以寧神得以清則四大和平疾患不生神氣和於上五藏和於中步履和於下脉絡和於體馴而行之不死之道也人之生也自幼而至壯



自壯而老血氣盛衰其各不同不可一槩治之六歲至十六歲者和氣如春日漸滋長內無思想之患外無愛慕之勞血氣未成不勝寒暑和之違也膚腠踈薄易無感冒和之傷也父母愛之食飲過傷其治之之道節飲食適寒暑宜防微杜漸行巡尉之法用養性之藥以全其真二十歲至五十歲和氣如夏精神鼎盛內有思想之患外有愛慕之勞血氣方剛不畏寒暑和之違也勞傷筋骨冒犯八邪和之傷也以酒爲漿醉以入房其治之之道辯八邪八勞佚行守令之法宜治病之藥當減其毒以全其真五十歲至七十歲者和氣如秋精耗血衰血氣凝泣思慮無窮形體傷憊和之違也百骸踈漏風邪易乘和之傷也風雨晦明飲食遲進其治之之道順神養精調腑和臟行悞漕之權施賑濟之法守令內恤巡尉外護宜保命之藥以全其真七十歲至百歲者和氣如冬五臟空洞猶蛻之蟬精神浮蕩筋骨沮弛和之違也觸物易傷衣飲厚薄和之傷也大寒振慄大暑煎燔其治之之道餐精華處奥庭行相傳之道燮理陰陽周流和氣宜延年之藥以全其真夫如是則調御中節治療得陰陽協和榮衛流暢凡厥有生同躋壽域矣乎



諸吐方法三十四

仲景云傷寒三四日邪氣未傳於裏其邪氣在上用瓜蔕散吐而差豈可俟其汗又云傷寒六七日胸中微痞不欲言懊憹昏眩無下證仲景用梔子豉湯吐之立可又忽然中風不知人事亦不須汗喉中呷㖠之聲用稀涎散吐之亦可又有小兒驚風潮搐手足掣縮用發命散吐之又云風頭痛經云若不吐涎久則瞽目而不治用瓜蔕散吐之三吐而差又暴嗽風涎上壅咽嗌不利用茶調散吐之

又陽癎久不愈未成痴痳用導涎散吐之

又陰癎用二聖散吐之

又膏粱之人食物多食生鱠胸中不下化蟲伏於中胸膈不快噎食不下用綠礬散吐之

又久病患脇痛諸藥莫能治用獨聖散加蝎稍半錢吐之

諸癎不時發作不知人事用半生半熟湯吐之

背風病久不差發過如故用鬱金散吐之

痎瘧久不差發寒熱無時用常山散吐之

蛟龍瘕痛腹脹如蟲用毬糖散吐之

人病患傷食或用冷身腹悶亂身熱見食則吮用赤



小豆散吐之

婦人筋攣骨痛用神應散吐之

或曰筋病吐之何為答曰木鬱達之所謂達者令其條達也或又有打撲墜墮先吐之用金花散後下之用承氣湯蓋承者順也

偏枯證半身不遂是也用追風散吐之須風後有自

疾眼有半明可救之用防風湯吐之

小兒上喘朝熱先用蔚金散吐之後用鎮庭散下之

立効

治顛狂病久不已用三聖散吐之後大下之

諸風掉搖強直不知人事便可點豆膏涎出立効

胸膈滿悶皆痛或脅痛可先用祛風湯吐之後服藥散癘風或瘡瘍惡瘡便用二聖散吐之後服苦參丸

諸厥氣厥中風不省人事便用神聖散膏鼻內灌之吐出涎立効

破傷風牙關緊急角弓反張便與神聖散吐之後汗之下之効三法俱用之

又有人患蛟龍瘕痛久不愈欲死用毬糖膏吐之吐出其物形如蜥蜴長七八寸立可



吐法者上古高醫用之今庸下之流止看諸方不知治法不識病源即不行聖人之法去聖遠矣可不恐歟

治黃膽詩曰

白酒麯飛麵 青礬百草霜 依方炮製作 消却幾多黃

綠礬四兩 五棓子 百草霜一兩 木香二錢

右為細末用酒麯飛麵為丸如梧桐子大每服五丸空心酒下二三服

又方平胃散四兩青礬二兩醋糊為丸米飲

又方平胃散烏沉湯四兩青礬二兩酒糊為丸
又方好川當歸四兩用浮子酒浸七日青礬
兩製煆赤色成朱子為細末百草霜三兩同研
細用當歸酒同研細為丸如梧桐子大每服五
丸至七九服後一刀黃去立効此方祖傳七世

治諸氣腫茯苓散

芫花醋炒 澤瀉 郁李仁 甜亭力、
漢防己 藁本各二錢半 陳皮去白 白茯苓
白檳榔 瞿麥各一兩半 滑石 大戟各七錢半

右為細末每服一錢濃煎桑白皮湯空心調下



取下碧綠水如爛羊脂即効如未盡隔日又服
腫消不服忌食鹽一百日

治瘰癧方爛至胸前兩腋下有塊如茄子大或
牽至兩肩上四五年不能痊者並皆治之其驗
如神常州府武進縣朱守仁傳其頂不能回頭
數日減可減可始看瘡爛破胸前者用荊芥根
下段鍘碎煎沸待溫洗瘡良久看瘡爛破處紫
黑用鍼刺一一出血再洗三四次洗
右真芝麻油將章腦 雄黃為細末用油調雞
翎掃瘡上以出水下次日再洗仍用前藥掃三
日又用韭菜地上蚯蚓糞五更早晨收作員
口大用炭火上燒煆紅取出淨碾為末每一兩
添乳香沒藥輕粉各半錢少此二穿二甲九片煆
紅色為末令用芝麻油調敷患處其妙如神

千金漏蘆湯加心檳榔

點眼神効紫金膏

輕粉 雄黃 銅青 川芎
龍腦 射香 黃連 青鹽
海螵蛸 當歸 硇砂 乳香
血竭已上淨五分 硃砂 明砂各二錢



沒藥一錢 爐干石二兩童便製七次
黃丹二兩 白丁香二分

先將十九味乳製極細無聲
白砂蜜一斤先將黃連末熬後下爐干石
黃丹前日用槐枝攪不搽手煎如紫色用
磁器盛用油紙七片封口窨土内去火七
日方用神効

素問病機氣宜保命集卷下 終